

THE D. H. HILL LIBRARY  
NORTH CAROLINA STATE COLLEGE



SPECIAL COLLECTION

QH43

E58

v. 4

THE FRIEDRICH F. TIPPMANN

ENTOMOLOGICAL COLLECTION

Locked Shelves

**This book must not be  
taken from the Library  
building.**

---

---





# CAROLI LINNÆI

ENTOMOLOGIA,

FAUNÆ SUECICÆ DESCRIPTIONIBUS

AUCTA;

*DD. SCOPOLI, GEOFFROY, DE GEER, FABRICII, SCHRANK, &c. speciebus vel in Systemate non enumeratis, vel nuperrime detectis, vel speciebus Galliæ Australis locupletata, generum specierumque rariorum iconibus ornata;*

Curante & augente CAROLO DE VILLERS, Acad.  
Lugd. Massil. Villa-Fr. Rhotom. necnon Geometriæ  
Regio Professore.

TOMUS QUARTUS.



LUGDUNI,

Sumptibus PIESTRE ET DELAMOLLIERE.

---

1789.





## VII.

# APTERA.

*Alæ nullæ in omni sexu.*

## GENUS PRIMUM.

LEPISMA. *Pedes* VI. cursorii.

*Os* palpis 2 setaceis & 2 capitatis.

*Cauda* setosa, setis extensis.

*Corpus* squamis imbricatum.

Saccharina. 1. L. ( la saccharine ) squamosa, cauda triplici. t. II. f. 1.

*Brown. jam.* 425. setoura subargentea, cauda setosa setis hirsutis.

*Aldr. inf.* 570. t. 2. f. 5. forbicina.

*Geoff. parif.* 2. p. 613. t. 20. f. 3. forbicina.

*Sultz. inf.* t. 22. f. 142.

*Schæff. elem.* t. 75.

*Adam microgr.* t. 28. f. 147.

*Fab.* 1.

*De Geer tom.* 7. p. 14. semicylindrica; argentea, corpore semicylindrico squamoso, abdominis apice setis tribus.

*Enum. n.* 1009.

*Faun. Fridr. n.* 793.

*Insect. Tomus* IV.

A

D. H. HILL LIBRARY

North Carolina State College

*Hab. in America inter saccharum & utensilia domestica, inde per Europam vulgaris, hodie in Suecia incepit, edit etiam libros vestesque laneas.*

*Corpus lævissimum, cærulescens. Antennæ albidæ, longitudine corporis. Palpi 2 setacei & 2 capitati. Thoracem excipiunt scuta 2 majora. Abdomen segmentis 10 minoribus. Cauda setis 3 distantibus, longis, at subtus paria 2 setarum minimarum versus anum.*

*Obs. Bibliothecariis forte perperam invisum animal; mihi enim acaris vivere videtur, qui librorum compacturæ insidiantur, ipsum hominis supellectili, si forte dulcia demas, innoxium. Enum.*

**Polypoda. 2. L. (la polypede) scutata, cauda triplici.**

*Fab. 2. saltatoria, cauda triplici, abdominis segmentis subtus utrinque villosis.*

*Geoff. tom. 2. p. 614. n. 2. teres saltatrix. Stroem. ad. Hafn. 9. 575. t. 2.*

*Hab. in Dania. D. Brunniche. In Europæ littoribus lapidosis. F. In Gallia Aust. V.*

*Corpus fuscescens, minus præcedente, latum. Antennæ longitudine corporis; antennæ succenturiatæ inferius proximæque, prioribus triplo breviores, articulis 5, incurvatæ. Palpi 2, capitati, ad os. Pedes anteriores juxta os locati. Scuta tegunt corpus. Caudæ 3, longitudine corporis. Abdominis singula segmenta subtus ad marginem spina armata, pedis instar.*

*Obs. 1. Saltat velocissime furca subulata alba ani. Fab.*

*Obs. 2. Datur alia simillima cauda quintiplici, forte mera sexus varietas. Fab.*



Terrestris. 3. L. ( la terrestre ) nuda cauda triplici. \*  
*Hab. in Europa. Supra terram rarissima.*  
*In Gallia Aust. V.*

*Similis poduræ, sed major, corpore toto albo cylindrico. Antennæ corporis dimidii longitudine, obtusæ ut in podura.*

*Desc. Corpus cylindricum, album, facie poduræ. Antennæ corporis dimidii longitudine, obtusæ. Setæ caudæ tres exsertæ. Faun. 1926.*

*Ex spec. D. Fab.*

Lineata. 4. L. ( la rayée ) cauda triplici, corpore fusco, vittis duabus albis.

*Hab. in Helvetiæ muris.*

*Desc. Antennæ setaceæ, longitudine corporis. Thorax tectus scutis tribus postice emarginatis. Corpus squamosum, supra fuscum s. nigrum, cinereo irroratum, vittis duabus longitudinalibus albis. Cauda triplex pilis villosis, intermedia brevior. Setulæ aliquot sub cauda. Subtus argentea, pectore scutis tribus tecto. Pedes breves, femoribus compressis.*

*Ex Ent. Carn.*

Longicornis. 5. L. ( la longicorne ) antennis corpore longioribus.

*Hab. in Europa.*

*Desc. Corpus supra fuscescens, & squamulis imbricatis subargenteis tectum. Caput pilosum. Antennæ pallide ferrugineæ villosulæ. Tota subtus albida, tibiis antennarum colore. Femora compressa. Setæ caudales longiores tres, villosæ, corpore breviores, quibus subjacent duæ aliæ breviores.*

A ij

## G E N U S II.

PODURA. *Pedes* VI cursorii.

*Oculi* II compositi ex octonis.

*Cauda* bifurca, saltatrix, inflexa.

*Antennæ* setaceæ elongatæ.

Viridis. 1. P. ( la verte ) subglobosa viridis. \*

*Geoff. paris.* 2. p. 607. podura viridis, capite  
flavescente, antennis in medio fractis.

*Fab.* 2.

*Enum. n.* 1011.

*Hab.* in Europæ plantis, frequens in  
polygoni fagopyri foliis primordialibus.

*Desc.* Magnitudo majoris pediculi capitis.

*Abdomen* dilutius viride, globosum,  
parum in ovalem figuram terminatum,  
versus anum admodum convexum, vi-  
ride cum cinerascens mixtura. *Thorax*  
tenuissimus, vix conspicuus. *Caput* viri-  
de, obtusum, cicadis non adeo dissimile.  
*Oculi* supra caput nigri, cum linea utrin-  
que nigricante. *Pedes* albo-virides,  
æquales. *Antennæ* recurvæ. *Faun.* 1927.

Polypoda. 2. P. ( la polypède ) subglobosa atra, an-  
tennis longitudine corporis apice albis. \*

*Fab.* 3.

*Hab.* in Europæ plantis.

*Desc.* Inter majores hujus generis est. *Ab-*  
*domen* globosum, sed *anus* quasi capitulo  
eminet. *Antennæ* nigrae, corporis lon-  
gitudine, quas divaricatas antrorsum  
protendit, apice albæ. *Faun.* 1928.

Atra. 3. P. ( la noire ) globosa fusca nitida, an-  
tennis longis, articulis plurimis.

*Ad. Stockh.* 1743. p. 296. t. 7.

*Fab.* 4.

*De Geer tom.* 7. p. 35. n. 7. t. 3. f. 7, 8.  
globosa, fusca, nitida, antennis longis  
fractis, articulis plurimis.

*Enum. n.* 1010.

*Faun. Fridr. n.* 794.

*Hab. in Europæ terrestribus.* In Gallia  
Aust. V.

*Desc.* Fusca, globosa. *Antennæ* longæ,  
fractæ, quatuor articulis in parte  
infima, plurimis in superiore. *Oculi* 16,  
pone antennis utrinque 8. *Corpus*  
ovatum versus anum acuminatum.  
*Pedes* tenues. *Cauda* mobilis, furcata.  
Inter furcæ apices pars cylindri huic  
poduræ propria, e qua animal tenta-  
culos retractiles exferit.

Plumbea. 4. P. (la plombée) teres fusco-cærulea nitida.

*Sultz. inf. t.* 22. f. 143.

*Geoff. parisi.* 2. p. 610. n. 9.

*Fab.* 5.

*De Geer tom.* 7. p. 31. t. 3. f. 1.-4.  
corpore tereti, nigro-cæruleo, antennis  
quadrinodiis, capite pedibusque griseis.

*Enum. n.* 1014.

*Faun. Fridr. n.* 795.

*Hab. in Europæ terrestribus.*

*Desc.* Reliquis major & pediculi vulgaris  
magnitudinem attingens, omnino teres,  
fusco-cærulea, polita, pilis raris ad-  
spersa. *Pedes* albidii. *Curstat* & interdum  
salit. *Pedes* ani etiam albi. *Faun.* 1930.

*Obs.* Corpus squamosum uti lepidopto-  
rorum alæ. V.

Minuta. 5. P. (la petite) ovata flava, dorso maculis  
duabus ferrugineis.

*Fab.* 6.

*Hab. in Suecia. In Europæ hortis. Fab.*  
*Corpus omnium minimum. Humeri f.*  
*anterior pars abdominis, ut & os-*  
*tica pars supra dorsum versus caudam,*  
*fusco-ferruginea.*

**Nivalis. 6.** ( de la neige ) oblonga cinerea signaturis nigris. \*

*E. N. C. dec. 2. ann. 3. obs. 197. pulex nivis.*

*De Geer AÆ. Ups. 1740. p. 54. t. 2.*

— *tom. 7. p. 21. t. 2. f. 8.-10. Arborea*  
*grisea oblonga, griseo-cinerea, signa-*  
*turis nigris, antennis longis quadri-*  
*nodiis.*

*Fab. 7.*

*Enum. n. 1012.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1019.*

*Hab. in Europæ nemoribus, lignis. Hyeme*  
*frequens supra nives in vestigiis ho-*  
*minum & mammalium.*

*Desc. Corpus oblongum, cinereum, cha-*  
*racteribus nigris notatum. Faun. 1931.*

*Obs. Abdominis incisura quinta omnium*  
*longitudinem æquat. Sub arborum*  
*cornice cum atris reperiuntur. An*  
*sexus varietas ?*

**Vaga. 7. P.** ( la vagabonde ) oblonga nigra, abdomine antennisque fascia alba.

*Fab. 8.*

*Stivem. aÆ. Hafn. 9. 578. t. 3.*

*Hab. in Suecia. In Europæ nemoribus. Fab.*  
*Nigra, sed bases antennarum & furca*  
*alba. Fascia abdominis dorsalis albida,*  
*Pedes nigri.*

**Arborea. 8. P.** ( des arbres ) oblonga nigra, pedibus furcaque albis. \*

*Scop. carn. 1030.*

*De Geer. AÆ. Ups. 1740. p. 49. t. 1.*



—— *aḏ. Stockh.* 1740. p. 272. t. I.

—— *tom.* 7. p. 18. t. 2. f. 1.-6. *Arborea*  
nigra, oblonga nigra, antennis quadri-  
nodiis, pedibus furcaque pallide fuscis.

*Fab.* 9.

*Enum. n.* 1013.

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p.* 1019.

*Geoff. inf. tom.* 2. p. 609. n. 6. nigra,  
thoracis limbo antennarumque basi  
flavis, pedibus furcaque pallidis.

*Hab. in Europæ sylvis.* In arborum cor-  
ticibus lignis putrescentibus; in pagina  
superioris ribis rubri foliorum frequens.

*Enum.*

*Desc.* Tota parva nigra. Caudæ furca  
cum pedibus & antennis versus basin  
albæ. *Faun.* 1932. 1177.

*Obs.* Cylindrica, angusta. Caput nigrum,  
postice angulatum, maculatum. *Antennæ*  
articulis 4. *Corpus* incisuris octo. *Cauda*  
basi mobilis.

Villosa. 9. P. ( la velue ) oblonga villosa, fusco-  
nigroque variegata.

*Geoff. paris.* 708. t. 20. f. 2.

*Fab.* 10.

*Enum. n.* 1015.

*Beytr. Zur. nat. p.* 46. §. 3.

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p.* 1020.

*Sulz. hist. inf. t.* 29. f. 2

*Hab. in Gallia;* reliquis triplo major. In  
Europa Australiori. *Fab.*

*Desc.* Luteo-fusca. Caput, thoraxque  
hirsuta. *Antennæ* articulis 4, corpore  
breviores. Sub lapidibus frequens. *Geoff.*

Cincta. 10. P. ( l'entourée ) cylindrica grisea,  
cingulo atro antice albo.

*Fab.* 11.

*Hab. in sylvis Europæ.*

*Pusilla*. 11. *P.* ( la bronzée ) *cylindrica ænea*, furca alba.

*Fab.* 23.

*Hab.* in Europa, passim cursitat, egregie exsultat.

*Corpus omnium minimum, attente observandum ne oculos fugiat, totum æneum, oblongum & fere cylindricum.*

*Aquatica*. 12. *P.* ( l'aquatique ) *nigra aquatica*. \*

*Scop. carn.* 1027.

*Geoff. paris.* 610. n. 8.

*De Geer Ad. Ups.* 1740. p. 57. t. 3.

— *ad. Stockh.* 1740. p. 279. t. 3, 4.

— *tom.* 7. p. 23. n. 3. t. 2. f. 11.-17.

*aquatica nigra*, antennis quadrinodiis.

*Fab.* 15.

*Enum.* n. 1016.

*Iederm. epist.* 15. t. 7.

*Pod. gr.* p. 1020.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1020.

*Hab.* in aquosis Europæ, horis matutinis per phalanges decorticat aquas stagnantes.

*Obs.* Lemnam sæpe totam legit, sed habitat etiam libera supra aquas & sine medio. *Enum.*

*Desc.* Præter duos sexus a *D. de Geer.* egregie descriptos, etiam tertium, ni fallor, sexum observo, s. animalcula longe adhuc minora, rubra, rotundiora seu magis gibba, reliquis mixta. *Faun.* 1934.

*Obs.* 1. Super aquas stagnantes numerosæ. Aggregatæ laminis *P. nigris* similes. Aqua agitata, saltant, disperguntur, sed mox congregantur. *Antennæ* crassæ, quadrinodiæ. *Oculi* difficile conspicui, nigri. *D. de Geer.*

*Obs.* 2. *Poduræ* cineræ, at rariores his

societate junguntur. An sexu, an ætate,  
an specie distinctæ?

**Fimetaria. 13.** P. ( la printaniere ) terrestris alba.

*Scop. carn.* 1029.

*Fab.* 16.

*Beytr. Zur. nat. p.* 47. §. 4. t. 2. f. 1.

*Enum. n.* 1017.

*Hab.* in terra prægnante, frequens primo  
vere, imprimis exit humo aqua terra  
irrorata, cauda obtusa mutica; non salit.

*Desc.* Hæc omnium minima est totæque  
alba. *Faun.* 1935.

*Obs.* Cauda prorsus nulla.

**Ambulans. 14.** P. ( l'ambulante ) alba, cauda bifida  
extensa obtusa.

*Fab.* 17.

*De Geer tom.* 7. p. 33. t. 3. f. 5, 6.  
terrestris nivea, antennis quadrinodiis,  
cauda bifida brevi extensa.

*Faun. Fridr. n.* 796.

*Hab.* in montibus, sub muscis. In Galliæ  
vaporariis. V.

*Corpus cylindricum, reliquis longius,*  
*album, molle. Punctum fuscum supra*  
*anum. Cauda setis 2 extensis, longi-*  
*tudine dimidii corporis. Non salit.*

*Desc.* Facies omnino poduræ, teres,  
oblonga, alba, mollis, sed furca ca-  
rens, præter quod cauda sit bifida.  
Non salit. *Faun.* 1936.

*Ex Inf. paris. Entom.que paris.*

**Signata. 15.** P. ( la tachetée ) fusco-nigra, abdo-  
mine globofo, signaturis ferrugineis.

*Fab.* 1. subglobosa fusca, abdominis late-  
ribus fulvo maculatis.

*Hab.* sub lapidibus humidis.

*Desc.* *Antennæ* corporis longitudinem fere æquant. *Abdomen* griseum, rotundum, tribus quatuorve maculis lateralibus ferrugineis. *Cauda* abdomine pallidior.

Longicor- 16. P. ( la longicorne ) fusca non nitens, nis, antennis longitudine corporis.

*Hab.* sub arborum cortice.

*Desc.* Fusca rotunda. *Caput* rotundatum. *Antennæ* corporis longitudine.

Livida. 17. P. ( la livide ) livido-lutea, annulis transversis nigris.

*Fab. n. 12. annulata*, livida annulis nigris.

*Hab.* sub lapidibus.

*Desc.* Livida. *Abdomen* septem fasciis nigris. *Pedum* articuli nigri.

Annularis 18. P. ( l'annulaire ) nigra, thoracis limbo antenarumque basi flavis, pedibus furcaque pallidis.

*Hab.* in lignis excisis.

*Desc.* Nigra. *Antennæ* basi flavæ. *Thorax* basi flavus. *Pedes*, caudaque pallide albida.

Viatica. 19. P. ( des chemins ) atra, viatica.

*Hab.* in viis.

*Desc.* Nigra, ad lentem villosa. *Antennæ* dimidii corporis longitudine.

Violacea. 20. P. ( la violette ) violacea.

*Hab.* cum communi.

*Desc.* Podura plumbea minor. An ætate diversa?

*Ex op. D. de Geer.*

Aquatica- 21. P. ( l'aquatique-grife ) lineis dorsoalibus grisea. nigris, antennis quadrinodiis. t. 11. f. 2.



*Ad. Upf.* 1740. p. 63. t. 4.

— *Succ.* 1740. p. 278. t. 4.

*Hab.* cum podura arborea & aquatica.

*Desc.* Villosa. *Antennæ* sæpe inæquales, articulis tribus una, quatuor altera. *Caput* rotundatum, maculis duabus ovatis. *Abdomen* linea, præter duas laterales pallidiores. *Aquaticæ* poduræ varietatem credidit *Linn.*

*Ex spec. D. Fab.*

**Lignorum, 22.** P. ( des bois ) plumbea, capite, thorace, pedibus furcaque pallidis.

*Hab.* in Europæ lignis antiquis.

*Desc.* Parva. *Caput* pallidum, ore antennisque nigris. *Thorax* subrotundus, pallidus, immaculatus. *Abdomen* plumbeum, furca nivea. *Pedes* pallidi.

*Ex Enum.*

**Monura, 23.** P. la monure ) albida, cauda indivisa conica.

*Hab.* cum fimetaria in terra prægnanti.

*Desc.* Habitu & statura poduræ *fimetariæ*, sed tantillo minor, & magis in cinereum colorem vergens. Præterea, si accurate inspicias, linea longitudinali in dorso capite ad abdominis apicem descendente magisque, quam reliquum corpus, fusca, insigne videbis. *Antennæ*, computata basi, articulis quatuor constant, articulo extimo ovali, sed reliquis proportionem majori. *Oculi* nigri, lineam nigram utrinque in capite constituunt. Partes omnes insecti satis pilosæ, præsertim corporis truncus, in quo pili longiores. *Cauda* partibus constat tribus, quarum prima, quæ

corpori adfixa est, in fuscum colorem leviter inclinat; pars altera pallida, uti totum insectum, summe diaphana, apicem versus angustior, apice ipso truncato; pars tertia aculei instar ex priori, tanquam ex vagina, progredi videtur, color ejus corneus. Hinc nomen *monuram* dixi, quod præterquam quod in hoc genere consuetum sit, caudam bifidam bipartitamque non habeat, sed simplicem, indivisam.

*Obs.* Inter poduras *fimetarias*, quæ, uti dictum est, in terra prægnanti & ollis hortulanorum habitant, & post irrigationem copiosæ superficiem petunt, invenire est aliam quandam hujus generis speciem priori multo minus numerosam, sed quam facile cum priori confundas; nec enim, si non anxie colores distinguas, habes, quod suspicionem diversitatis tibi injiciat. *Podura* prior, quam ill. *Linnaeus* secutus, *fimetariam* dixi, colore est prorsus albo, ebori candidissimo plane consimili; at illa, quam nunc descripturi sumus, in canum vehementer inclinat. Hoc jam admonitus discrimine, & si satis levi, si attentius spectes, facile aliud, & illud multo præstantius, sese tibi sponte offeret; salit hæc species, cum prior hujus effugii prorsus sit inscia; saltus tamen sunt breves rarioresque, quam in reliquis descriptis hucusque speciebus. Et hoc erat præcipuum illud, quod me in hanc speciem attentum reddidit; nec mora, prehensum, cum primum licuit specimen, microscopio subjeci, novo stupore attonitus, cum caudam nullam, cujus ope saltus illos perageret, deprehendissem.

Reliquæ species caudam habent plerumque albentem, cum reliquum *corpus* sit alterius coloris, aut certe in morte caudam a corpore recta protendunt. Nihil horum in præsentī specie contingit; ut instrumentum hoc, mirandorum saltuum productivum invenias, arte opus est; speculum microscopii contegere, nec insectum sub alio, quam reflexo radio intueri necesse est. Hoc ego demum artificio usus, qui faliat, intellexit. *Enum.*

*Ex Entom. Carn.*

Termifor- 24. P. ( la termiforme ) oblonga fusca ;  
mis, dorso piloso, antennis binodiis.

*Hab.* in Europa, sub corticefagi & circa hortos.

*Desc.* Habitus & statura termis *pulsatorii*. Dorsum gibbum, fasciculo pilorum, tanquam penicillo, cristatum. *Setæ* caudales pilosæ. *Pedes* pallidi, nigro annulati.

*Obs.* La podure approche un peu du pou pour la forme, & lui ressemble par le nombre de pattes & des yeux, & ses antennes sont tout-à-fait semblables à celles du pou, inf. paris. p. 605.

Outre la queue qui fait le caractère essentiel de la podure, elle en a encore un qui n'est pas moins remarquable quoiqu'il lui soit commun avec le genre précédent, c'est d'avoir tout son corps couvert de petites écailles, ainsi que le genre précédent. *ibid.* Poduræ oculi reipsa ex octo compositi, inde 16 oculi. Insuper non omnes squamosæ sunt, V.

## GENUS III.

TERMES. *Pedes* VI cursorii.

*Oculi* II.

*Antennæ*. setaceæ.

*Os* maxillis duabus.

Pulfatorium. I. T. ( le balancier ) abdomine oblongo,  
ore rubro, oculis luteis. \* t. II. f. 3.

*Scop. carn.* 1032.

*Derh. theol.* 119.

*Bradl. nat.* t. 27. f. 3.

*Raj. inf.* 8.

*Ad. Angl.* n. 270. p. 231. & n. 291.  
p. 1586. & n. 245. p. 376.

*Roland. ad. Stockh.* 1754. p. 52.

*Sulz. inf.* t. 22. f. 144.

— *his. inf.* t. 29. f. 3.

*Gcoff. parif.* 2. p. 601. pediculus 12.

*Schæff. elem.* t. 126.

*Fab. hemerobius* 15. apterus ore rubro,  
oculis luteis.

*Blank. belg.* t. 14. f. F.

*De Geer tom.* 7. p. 41. n. I. lignarium,  
oculis maculisque abdominalibus rufis.

An varietas. t. 4. f. 2.—t. 4. f. 3, 4.

*Faun. Fridr.* n. 797.

*Enum* n. 1019.

*Mill. Lin. Nat. cl.* v. p. 1024.

*Beytr. Zur. Nat.* p. 57. §. 11.

*Hab.* in Europa & America, frequens  
in domibus. Invisum vestibus, herba-  
riis, insectorum muscis. Fœmina horo-  
logii instar pulfatoria in ligneis festucis.

*Desc. Corpus* oblongum, pallidum. *Oculi*



flavi. *Antennæ* setaceæ, longitudine ( in plerisque, ) ipsius corporis. Macula fusca annularis intra abdomen & pone hanc versus anum punctum fuscum : segmenta abdominis ad latera punctis rufis singula notata sunt. *Os* rufum. *Faun.* 1937.

*Obs.* 1. Alarum in herbario Jamaicensi invenit celeb. *Schreber*.

*Obs.* 2. Ex hac & *D. Sparman*. observatione concludendum termes modo alatum modoque apterum esse & ad insecta neuroptera referendum.

*Obs.* 3. *Perla fusca* & *nasuta*. tom. 3. p. 567. t. 27. f. 4, 5, 6, a *D. de Geer*. descripta forsitan ad termes alata pertinent, ut ipse clar. *Entom.* indicavit.

Fatidicum. 2. *T.* ( le prophete ) abdomine ovato, ore pallido, oculis fuscis. \*

*Frisch. inf.* II. p. 2. t. 10.

*Fab.* hemerobius 16. apterus, ore pallido, oculis fuscis.

*Hab.* in Europa Australiori, nobis primum visum in plantis siccis a *Loeflingio* transmissis.

*Desc.* Simile præcedenti, sed duplo majus. *Oculi* fusci. *Os* pallidum. *Faun.* 1938.

*Ex Entom. Carn.*

Sylvarum. 3. *T.* ( des forêts ) ovatum album, antennis crassis uniarticulis.

*Hab.* in Europa. In terra sylvarum.

*Desc.* *Abdomen* pilosum, obtusum.

Florum. 4. *T.* ( des fleurs ) fulvum, antennis trinodiis.

*Hab.* in Europa. In flore allii ursini visum.

*Desc.* Oculi fufci. Corpus oblongum, agile. *Antennæ* albidæ, porrectæ, articulo ultimo fetula terminato.

*Obs.* 1. Hoc & prius infectum ob os maxillofum huc retulit *D. Scop.*; fed obfervat *D. Schrank.* differentias ab oris oculorumque colore fumtas in hoc genere nihil decidere. Hoc pofito, ad idem genus forfan non pertinerent. T. fupradicta. V.

*Obs.* 2. Inter fpecies hujus generis certe mirandum eft termes *capenfe*, a *D. Sparman.* accurate defcriptum. Moribus, induftria laboribusque fupendum animal. In fingula fpecie termes *operarium*, termes *miles*, termes *alatum*, mas vel fœmina, quæ nec certant nec laborant. *Voyage au Cap de Bonne-Efpérance.* tom. 2. p. 105.

*Obs.* 3. Formica alba Ind. Occ. infecta a *D. Adanfon.* memorata fub hoc genere ordinanda: *Rien ne m'a autant frappé que certaines éminences, qui par leur hauteur & leur régularité, me parurent de loin un affemblage de huttes de Negres & qui n'étoient que les nids de certains infectes; ce font des pyramides rondes, de 8 à 10 pieds de haut, fur une bafe à peu près de la même dimenfion, avec une furface unie, de la meilleure argille. Voyage au Sénégal.*



## G E N U S   I V.

PEDICULUS. *Pedes* VI ambulatorii.

*Oculi* II.

*Os* aculeo exferendo.

*Antennæ* longitudine thoracis.

*Abdomen* depressum, sublobatum.

Humanus. 1. P. ( de l'homme ) humanus!

*Mouff. inf. t.* 259.

*Ped. exp. t.* 18.

*Swamm. quart. t.* 7.

— *bibl. t.* 1. f. 3.-6.

*Alb. aran. t.* 42.

*Bonan. micr. f.* 55.

*Joblot. micr. I. pp. I. t.* 1!

*Baker. micr. t.* 13. f. 4.

*Schæff. elem. t.* 95.

*Sulz. inf. t.* 22. f. 145.

*Lederm. micr. 45. t.* 21.

*Fab. I. abdomine lobato cinereo.*

*De Geer tom. 7. p.* 62. n. 1. t. 1. f. 6.-10!

*Enum. n.* 1020.

*Faun. Fridr. n.* 798.

*Hab. in capite & vestimentis humanis ; occiditur seminibus veratri , staphisagriæ , menispermis , rutæ , apii , angelicæ , lauri ; croco , pipere , ledo , lycopodio , pinguicula , hydrargyro , gelu , æstu. Rodendo caput excutit achores apud puerulos voraces incarceratos indeque strumosos , sicque præservat a coryza , tussi , cæcitate ,*

Pediculi mammalium aviumque multo plures etiamnum non observati , minus descripti , multo minus differentia determinati existant.

*epilepsia, &c. Instante pluvia, descendit ad latera capitis.*

*Varietas capitis durior, coloratior; vestimentorum laxior, magis cinerea.*

*Problema qui solvat, cur aliæ ejusdem speciei familiæ mordicus capiti inhæreant, aliæ corporis vestimentis, is facile plurimum morborum contagiosorum naturam intelligat.*

Pubis. 2. P. ( le morpion ) pubis.

*Mouff. inf. 200.*

*Raj. inf. 8.*

*Schenck. obs. 676.*

*Red. exp. t. 19. f. 1.*

*Pet. gaz. t. 67. f. 9.*

*Fab. 2. abdomine postice emarginato, pedibus cheliformibus.*

*Enum. n. 1021.*

*Geoff. inf. tom. 2. p. 597. n. 2. pediculus inguinalis.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1028.*

*Hospitatur in hominis immundi pube, rarius in superciliis, pellitur oleo tabaci.*

*Antennæ articulis 5. Abdomen postice emarginatum pilosumque. Pedes 2 & 3 habent calcar & digitum cheliformem, quibus arte adhæret.*

Suis. 3. P. ( du cochon ) suis scrofæ.

*Enum. n. 1022.*

*Faun. Fridr. n. 800.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1030.*

*Hab. in Suibus.*

Porcelli. 4. P. ( du cochon-d'inde ) muris porcellis,

*Enum. n. 1023.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1030.*

*Hab. in mure porcello fatis copiosus.*

*Desc.* Facilius icone, quam verbis delineandus; inter majores sui generis. *Caput* ovatum, latere ultra medium versus abdomen crena instructum, ubi etiam oculi antennæque locantur. *Antennæ* moniliformes, articulo extremo maximo. Ante hanc crenam versus os crena utrinque alia, quo loco situm est corpusculum antenniforme. *Os* membro suctorio curvo prominente instructum. *Abdomen* fere cylindricum, oblongum, diaphanum, ita ut pedes transpareant. *Thorax*, angulis quatuor obtusis, irregulare format pentaedrum. Segmenta *abdominis* duo priora nonnihil reliquis obscuriora. *Pedes* ex partibus tribus constant, quas femur, tibiam, tarsum adpelles; hæ omnes satis magnæ; sed præterea in tarso apice articulus brevis, tenuis, unco mobili nullo instructus; hinc facile a pilo animalis cui adhæret, deteri potest. *Anus* corpuscula duo acuminata exerit, iis simillima, quæ in acaro *aphidiode* olim depinximus. *Enum.*

Cervi. 5. P. ( du cerf ) cervi.

*Frisch. inf.* 12. p. 15 t. 5.

*Red. exp. t.* 5.

*Fab.* 5.

*Faun. Fridr. n.* 801.

*Hab. in* cervo elapho, dama, capreolo.

Ovis. 6. P. ( de la brebis ) ovis arietis.

*Red. exp. t.* 22. f. 1 ?

*Enum. n.* 1025.

*Faun. Fridr. n.* 802.

*Hab. in* ovibus.

*Desc.* Inter majores sui generis. *Caput* orbiculare, apice seu ore instructo

suctorio instructum. Utrunque ad latera capitis oculi minuti, nigri; & ante hos antennæ, non nihil abludentes a forma in hoc genere consueta; constant articulis tribus, ultimo apice crassiusculo. Primum *abdominis* segmentum (thorax) angustissimum, subrotundatum, sed postice dilatatum & vix sensibilibiter trilobum; hoc excipit segmentum aliud latius, sed brevius priore, tum abdomen reliquum ovatum. *Pedes*, qui omnes primis paulo ante dictis segmentis adfixi sunt, articulis tribus constant, quorum postremus oblique truncatus apice uncum insignem habet. Insectum satis pilosum, sed nulli, saltem quos ego vidissem, in articulis duobus abdominis primis, præsertim ad latera singulorum segmentorum reliquorum abdominis pili duo sublongiores adproximati. Color, ut in hoc genere consuetus est, albidus. In capite macula palpitans (cor) obscuriuscula, subcordata, & præterea lineæ duæ longitudinales. *Abdomen* fasciis novem obscurioribus transversis. *Enum.*

Bovis. 7. P. (du taureau) bovis tauri, *abdomine lineis transversis octo ferrugineis.*

*Fab.* 7.

*Faun. Fridr.* n. 803.

*Hab.* in bobus. Pellitur decocto ledi & fedi acris.

*Desc.* Totus albus, minimus. *Caput* testaceum. *Pedes* testacei, apice albidiores. *Abdomen* album, lineis octo testaceis transversis in dorso, quinque fasciis transversis in ventre, quæ omnes lineæ non tangunt marginem seu latera; latera tamen obscuriora reliquo corpore



sive punctis octo ferrugineis notata.  
*Faun.* 1946.

Vituli. 8. P. ( du veau ) bovis tauri , *abdomine plumbeo.* \*

*Fab.* 8. *abdomine acuminato plumbeo.*

*Faun. Fridr. n.* 804.

*Hab. in bobus cum præcedenti.*

*Desc.* Præcedenti major. *Abdomen* ventricosum, acuminatum, cæruleo-fuscum. *Pedes* breves, crassi, grisei ut & *caput* & *thorax* grisea. *Faun.* 1947.

Equi. 9. P. ( du cheval ) equi caballi.

*Fab.* 9.

*Faun. Fridr. n.* 805.

*Hab. in equis.*

Asini. 10. P. ( de l'âne ) equi asini. †

*Fab.* 10. *capite porrecto obtuso*, *abdomine ovato fusco striato.*

*Alb. Aran.* 76. t. 51.

*Red. exp. t.* 22. f. 1.

— *Oper. t.* 25.

*Hab. in asinis.*

*Desc.* *Pedes* sex cheliformes.

Tinnuncu. 11. P. ( de crécerelle ) falconis tinnunculi. ‡  
 li.

*Red. exp. t.* 13.

*Frisch. inf.* 11. p. 24. t. 24.

*Fab.* 12. *capite sagittato*, *postice utrinque mucronato.*

*Alb. Aran.* t. 43.

*Hab. in falconibus*, *tinnunculis*, *milvis.*

*Conferantur aliæ species in falconibus.*

*Red. exp. t.* 1.

*Desc.* Inter omnium maximos pediculos, quos unquam vidi, hic erat. *Corpus* depressum, ovali-oblongum. *Caput* antice obtusum, versus aurium regionem

utrinque retrorsum obtuse sagittatum. *Thorax* marginatus fere ut in carabo seu cantharide. *Abdomen* in 9 sive 10 segmenta divisum, margine omnino integro, linea notato. *Palatum* prominet. Ungues solitarii, in vola manus spongiosum quid. *Femora* versus apicem introrsum quasi mutilata. *Faun.* 1949.

**Corvi. 12. P.** ( du corbeau ) corvi coracis. \*

*Fab.* 15. abdomine ovato, margine striato.

*De Geer tom.* 7. p. 76. t. 4. f. 11. ricinus cornicis albidus, fasciis dorsallibus tranversis fuscis, antennis brevissimis ad apicem capitis.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 600. n. 8. albo nigroque varius, abdomine ovato oblongo utrinque incisuris nigris.

*Red. exp. t.* 16. f. 2.

— *Oper. t.* 14.

*Faun. Fridr. n.* 806.

*Hab. in* corvis.

*Desc.* *Abdomen* ovali-oblongum, utrinque contractum, depressum, planum, cinereum, lineis ad incisuras duodecim vel decem nigris. *Collum* brevissimum. *Caput* minimum, nigrum. *Pedes* brevissimi. *Antennæ* brevissimæ, retrorsum flexæ. Substantia animalculi tenacissima, licet digitis validissime pressum tamen vivacissimum & cursitans. *Faun.* 1950.

**Infausti. 13. P.** ( du merle de roche ) corvi infausti. \*

*Fab.* 17. thorace angustato, abdomine ovato pallido diaphano.

*Hab. in* corvo infausto.

*Desc.* *Abdomen* ovatum, gibbum, diaphanum, pallidum, utrinque ab basin

squamula veluti ala spuria notatum. *Thorax* angustissimus, brevis. *Caput* minimum, subrotundum, obtusum. *Oculi* nigri. *Antennæ* longitudine corporis, tenuissimæ, albæ. *Pedes* tenuissimi, satis longi. Magnitudo minimi pediculi capitis, valde tener, facile solo tactu conquassandus. *Faun.* 1951.

*Picæ.* 14. *P.* ( de la pie ) corvi picæ. †.  
*Fab.* 18. capite obtuso fusco, punctis quatuor nigris.  
*Red. exp. t.* 5.  
*Alb. Aran.* 76. *t.* 45.  
*Geoff. inf. paris. tom.* 2. *p.* 603. *n.* 5.  
*Hab. in corvo pica.*

*Cygni.* 15. *P.* ( du cygne ) anatis cygni. †  
*Rcd. exp. t.* 8.  
*Fab.* 21. capite emarginato, abdomine ovato, margine nigro striato.  
*Alb. Aran.* 76. *t.* 58.  
*Geoff. inf. paris. p.* 603. *n.* 9. abdomine ovato, utrinque tinctis fuscis notato.  
*Hab. in cygno.*  
*Conferatur. Red. exp. t.* 9. *f.* 3.

*Anseris.* 16. *P.* ( des oies ) anatis anseris.  
*Red. exp. t.* 10.  
*Fab.* 22. filiformis pallidus, margine nigro punctato.  
*Alb. Aran.* 76. *t.* 58.  
*Geoff. inf. paris. p.* 603. *n.* 11. capite ovato, abdomine oblongo, incisuris utrinque maculatis.  
*Hab. in anseribus feris & mansuetis. Pel- litur pipere. Fab.*

*Moschatæ.* 17. *P.* ( du canard musqué ) anatis moschatæ, †

*Red. exp. t. 9 f. 1.*  
*Hab. in anate moschata.*

Querque- 18. P. ( de la farcelle ) anatis querque-  
 dulæ. †

*Red. exp. t. 12.*  
*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 604. n. 15.*  
*Hab. in querquedulis.*

Sternæ. 19. P. ( de la mouette ) sternæ Hirundis. \*

*Red. exp. t. 9. f. 2.*  
*Fab. 26. capite trigono , abdomine ovato*  
*pallido , dorso longitudinaliter nigri-*  
*cante.*  
*De Geer tom. 7. p. 77. t. 4. f. 12.*  
*ricinus lari griseo-albidus , oculis ma-*  
*culisque nigris , pedibus crassioribus.*  
*Faun. Fridr. n. 808.*  
*Hab. in sternis , laris.*

*Desc. Caput trigonum , latum , obtusum ,*  
*pallidum. Thorax brevissimus , angus-*  
*tissimus. Abdomen ovatum , longitudine*  
*anterioris corporis , in medio longitudi-*  
*naliter nigricans. Antennæ brevissimæ ,*  
*capillares. Pedes brevissimi , crassi ,*  
*quorum antici brevissimi sub capite.*  
*Abdomen subtrus concavum. Faun. 1953.*

Plataleæ. 20. P. ) de la spatule ) plataleæ leuco-  
 rodiaæ. †

*Red. exp. t. 4.*  
*Fab. 29. M.*  
*Hab. in leucorodiis.*

Ardeæ. 21. P. ( du héron cendré ) ardeæ cinereæ. †

*Red. exp. t. 6.*  
*Fab. 30. M.*

---

(\*) Signo crucis ubique notavimus animalia nobis nec viva , nec in  
 museis asservata visa , ut naturæ consulti ad eu attentius exami-  
 nanda incitentur.

*Geoff. inf. parif. p. 603. n. 6.*

*Hab. in ardeis.*

Gruis. 22. P. ( de la grue ) ardeæ gruis.

*Frisch. inf. 5. p. 15. t. 4.*

*Fab. 27. abdomine subclavato pallido ,  
spiraculis niveis.*

*Red. exp. t. 3.*

— *oper. t. 19.*

*Hab. in gruibus.*

Ciconiæ. 23. P. ( de la cicogne ) ardeæ ciconiæ.

*Frisch. inf. 8. p. 9. t. 6.*

*Fab. 28. elongatus filiformis , abdomine  
albo , lateribus nigro punctatis.*

*Faun. Fridr. n. 809.*

*Scop. carn. fronte macula argentea ,  
maxillis tridentatis ? 1046 ?*

*Hab. in ciconiis.*

*Desc. Oblongus, albidus. Caput cordatum,  
obtusum. Antennæ articulo terminali  
apice fusco. Oculi fusci. Maxillæ subrus  
fuscæ. Abdomen albidum, ovatum. Scop.*

Charadrii. 24. P. ( du pluvier verd ) charadrii plu-  
vialis. †

*Red. exp. t. 9.*

*Fab. 33. M.*

*Hab. in pluvialibus.*

Fulicæ. 25. P. ( de la morelle ) fulicæ atræ. †

*Red. exp. t. 4.*

*Fab. 34. M.*

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 603. n. 4.*

*Scop. carn. n. 1 44. capite rufo ano ;  
imprimis piloso , pilis parallelis.*

*Hab. in fulicis atris.*

Recurvi- 26. P. ( de l'avofette ) recurvirostræ avo-  
rostræ,           settæ. \*

*It. Œl.* 90.

*Fab.* 29. oblongus fuscus, capite trigono canaliculato.

*Hab. in recurvirostris.*

*Desc.* Corpus fuscum, oblongum. *Caput* obsolete triangulum, acuminatum, linea transversali excavata in medio. *Abdomen* oblongum, fere lineare in medio paullo latior, incisuris octo. *Pedes* breves, curvi. *Antennæ* breves, parvæ, capitatæ. *Faun.* 1956.

*Hæmatopi.* 27. P. ( de l'huitrier ) hæmatopi ostralegi. \*

*Fab.* 30. glaucus, thorace angustissimus, abdomine ovato, incisuris pallidis.

*Hab. in hæmatopis.*

*Desc.* Magnitudo pulicis. *Totus* glaucus. *Caput* subrotundum, glaberrimum, convexo-planum. *Abdomen* obverse ovatum, incisuris decem transversis, pallidis. *Pedes* breves. *Antennæ* brevissimæ. *Thorax* angustissimus. *Pili* ad latera posterioris abdominis. *Faun.* 1957.

*Pavonis.* 28. P. ( du paon ) pavonis cristati. †

*Red. exp. t.* 15.

*Fab.* 31. capite globoso maximo, corpore pallido fuscoque striato.

*Alb. Aran.* 76. t. 47.

*Enum. n.* 1028

*Hab. in pavonibus.*

*Pediculus pavonis Syst.* non facile determinatur.

*Red. exp. t.* 15. *Linn. Fab.*

— *oper. t.* 23. *Fab.*

— *exper. t.* 1. f. 2. accipitris. *Geoff.*

— *opusc. tom.* 1. t. 14. *Schrank.*

*Inf. paris. tom.* 2. p. 60. n. 9. citavit solus *D. Fab.* descriptio tamen melea-



gridis pediculo convenit ; insuper hunc ultimum pediculum *Syst.* expresse enumeravit *D. Geoff.* inde synonymiam sequentem conservavi. V.

Meleagri- 29. P. ( du dindon ) meleagridis gallo-  
dis. pavonis. \*

*Red. exp. t. 22?*

*Fab. 32.* capite trigono obtuso, abdomine ovato griseo.

*Geoff. inf. parisi. tom. 2. p. 620. n. 9.*

*Enum. n. 1029.*

*Faun. Fridr. n. 810.*

*Hab. in gallo-pavonibus.*

*Desc. Caput planum, antice rotundatum, postice dentato-angulatum, margine retrorsum subulatum. Thorax medio cordatus, utrinque angulatus. Abdomen griseum 8 vel 10 incisuris longitudinaliter in medio albis. Antennæ breves. Affinis pediculis caponis. Faun. 1958.*

*Ses antennes sont courtes. Sa tête est aplatie, arrondie sur le devant & forme par derriere des angles aigus, presque semblables à des dents pointues. Son ventre composé de huit ou neuf anneaux, est gris sur les côtés & blanc au milieu dans toute sa longueur. Geoff.*

*Obs. Nescio an hæc species eadem cum illa quam ill. Linn. eodem nomine insignivit. Vir hic celeberrimus laudat pro suo insecto Entomologiæ in Germania facile parentem, celeberrimum Frischium : sed hic ipse doctissimo equiti contradicit, quem laudato loco delineat pediculum, in ciconiis occurrere adferens. Laudat & *Redii* iconem ; sed quam huic iconi dissimillimum insectum, quod hic descripturi sumus ? Si quis conjecturæ locus, gallina illa Affricana,*

in qua diligentissimo *Redio* ibi delineatum insectum occurrit, non *meleagris gallo-pavo*, sed numida *meleagris* fuit. Cl. *Müllerus*, qui *Linnaei* *Systema naturæ*, quantum *Zoologicum* est, in Germanicam linguam transfudit, pediculum quendam, qui in *meleagride* habitat, delinavit; sed insectum illud, si tamen in hoc animali vivit (nam vir hic summus in parte *Entomologica* parum adcuratus est) multum a nostro diversum.

Huic *caput* antice rotundatum, postice sinuatum, sinu triplici; sinus utrinque dentem acutiusculum longum, & in medio duos alios formant. *Antennæ* moniliformes, satis longæ, dentes longiores setis tribus longis armantur. Ad capitis latera utrinque oculus obscurus, & ante illum seta brevior. *Caput* corpori ope thoracis angustii rhombici jungitur, post quem thorax alter cordatus, cordis lobis acutis, abdomini apice incumbente. *Abdomen* segmentis octo insruitur, quorum primum thoraci secundo sujicitur, postremum apice profunde emarginatum, lobis lanceolatis. In nonnullis hujus species insectis in hac emarginatura membrum lanceolatum fuscum cernitur. Segmenta sex intermedia utroque latere macula introrsum oblonga fusca, & fasce setarum longiusculo ex setis sex constante instructa. *Pedes*, ut fere in reliquis speciebus, unco duplici terminantur. *Enum.*

[ Gallinæ. 30. P. ( de la poule ) phasiani galli thorace capiteque utrinque mucronato. \*

Fab. 30.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 601. n. 11.

*Enum. n.* 1030.

*Beytr. Zur. nat. p.* 114.

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p.* 1036.

*Hab. in gallinis domesticis. Expellitur pipere.*

*Desc. Pediculo vulgari minor. Corpus pillis griseis adspersum. Abdomen oblongum, ovatum, 8 vel 9 incisuris. Caput lunatum, cruribus posteriora spectantibus. Antennæ brevissimæ. Thorax utrinque angulo acute recto mucronatus. Faun.* 1959.

Caponis. 31. P. ( du chapon ) phasiani galli abdominis margine nigro. \*

*Frisch. inf. II. t.* 24.

*Red. exp. t.* 16. f. 1.

*Fab.* 35.

*Geoff. inf. paris. tom. 2. p.* 601. n. 10.

*Faun. Fridr. n.* 811.

*Hab. in gallis domesticis.*

*Desc. Magnitudo ovi pediculi humani ( seu lendis ). Corpus depressum, caudam versus obtusum. Abdominis latera nigra, dorso albo diaphano; macula nigra versus caput, quæ cor transparens. Caput album. Antennas motitat. Faun.* 1960.

Tetraonis. 32. P. ( du coq de bruyere ) tetraonis tetricis. \*

*Red. exp. t.* 14. pulex pavonis ?

*Fab.* 42. M.

*Faun. Fridr. n.* 812.

*Hab. in tetraonibus.*

*Desc. Caput femiovatum; postice truncato-marginatum, angulis posticis emarginato truncatis, antice rotundatum, supra planum. Collum lunatum. Abdomen postice pilosum, ovatum,*

obtusum, margine ferrato, incisuris novem ferrugineis. *Antennæ* brevissimæ, obtusæ. *Faun.* 1961.

Lagopi. 33. P. ( de la gélinotte blanche ) tetraonis lagopi. \*

*Fab.* 43. M.

*Hab.* in lagopi.

*Desc.* Corpus depressum, utrinque obtusum. *Abdomen* antice angustatum, postice dilatatum, figura fructus bursæ pastoris aut veronicæ capsulæ, cinctum margine nigro introrsum ferrato. *Caput* absque thorace notabili adfixum, utrinque obtusum, lateribus emarginatum. *Faun.* 1962.

Columbæ. 34. P. ( du pigeon ) columbæ œnatis. †

*Red. exp.* t. 2. f. 1.

*Fab.* 36. corpore filiformi, ferrugineo, postice clavato.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 599. n. 7. oblongus filiformis, albicans, corporis lateribus utrinque ferrugineis.

*Alb. Aran.* t. 43.

*Enum.* n. 1031.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1037.

*Beytr. Zur. nat.* p. 114. 4. t. 5. f. 3.

*Hab.* in columbis.

*Desc.* *Antennæ* capitis fere longitudine. *Caput* elongatum. *Abdomen* basi angustatum, luteo-albidum, striga fusca utrinque laterali. *Geoff.*

Pari. 35. P. ( de la mésange ) pari majoris, cauda quadriseta. †

*Frisch. inf.* 8. p. 9. t. 1. f. 5.

*Fab.* 38.

*Enum.* n. 1052.

*Beytr. Zur. nat. Acarus ovatus* subhya-

linus, nigricans, nudus, pedibus sub-  
æqualibus, omnibus physapodibus.

*Hab. in paris.*

*Obs. Pedes octo numerat Schrank. forte  
potius acarus.*

Hirundinis. 36. P. ( du martinet ) hirundinis apode  
*pallefcens, abdomine obovato albo  
nigroque contaminato lateribus setosis,  
setis posticis majoribus. \**

*Fab. 40. pallefcens, abdomine albo nigro  
maculato.*

*Hab. in hirundine apode.*

Farionis. 37. P. ( de la truite faumonée ) *falmonis  
farionis. \**

*Hab. in falmone farione maris Norwegici.*

*Desc. Corpus album. Caput brevius,  
latius. Collare brevissimum. Thorax  
subquadratus. Abdomen ovatum, de-  
pressum. Pedes sex brevissimi. Supra  
caudam cylindri duo, corpore lon-  
giores; tuberculis obtekti. Faun. 1964.*

*Obs. Monoculi piscini videtur affinis ob  
corpora 2 cylindrica supra caudam. Syst.*

Apis. 38. P. ( de l'abeille ) apis. †

*Frisch. inf. 8. t. 16.*

*Fab. 42. filiformis, ferrugineus.*

*Hab. in apibus ad squamulam halterum.*

*Ex oper. D. de Geer.*

Fringillæ. 39. P. ( du pinçon ) ricinus *fringillæ* pal-  
lide fuscus, corpore oblongo margine  
nigro, capite magno, corniculis duobus  
obtusis flexibilibus.

*Hab. in fringillis.*

*Desc. Antennæ filiformes, articulis quin-  
que. Caput latum, depressum, postice*

emarginatum, antice porrectum, modo tumefactum, modo contractum. *Oculi* nigri hæmispherici. *Abdomen* incisuris octo aut novem, tenue, depressum.

*Emberizæ. 40. P. ( du bruant ) ricinus emberizæ* pallide fuscus, abdomine albescente, maculis lateralibus fuscis, capite magno triangulari.

*Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 599. n. 6.* subflavescens capite ovato, medio diaphano, macula fusca, lateribus punctato ferrugineis.

*Fab. 37.* pallide fuscus, abdomine albescente, maculis lateralibus fuscis, capite triangulo.

*Hab. in emberizis.*

*Desc. Antennæ* filiformes, articulis quinque. *Caput* fere trigonum, antice truncatum, postice utrinque tuberculo rotundato. *Oculi* nigri antennis inter & tuberculos positi. *Thorax* capite angustior, incisuris tribus. *Abdomen* longum, pilis albis longis, apice conicum. *Pedes anteriores* reliquis breviores.

*Mergi. 41. P. ( du plongeon ) ricinus mergi ferrati* albidus, capite flavescente, corpore elongato. *t. II. f. 4.*

*Hab. in mergis ferratis.*

*Desc. Antennæ* filiformes, articulis quinque. *Caput thoraxque* rufescentelutea. *Caput* magnum, elongatum, depressum. *Thorax* in duas partes divisus. *Abdomen* albescentis, lineolis nigricantibus lateralibus. *Pedes anteriores* brevissimi, sæpe sub capite occultati.

*Canis.*



**Canis. 42.** P. ( du chien ) ricinus *canis*, capite angulato flavescente, fusco punctato, abdomine ovato albido marginibus serrato, thorace brevissimo.

*Hab. in canibus. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Pediculo vulgari minor. Antennæ filiformes. Caput latum, magnum, lateraliter emarginatum, fusco-luteum. Thorax capiti concolor. Abdomen ovatum, incisuris denticulatis pilosis uti totum insectum.*

**Gallinæ. 43.** P. ( de la poule ) ricinus *gallinæ* albidus, abdomine ovato, capite semiorbiculato, postice setis quatuor longioribus.

*Scop. carn. n. 1037?*

*Hab. in gallinis. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Antennæ caput æquant. Caput semicirculari, postice angulatum, pilis duobus nigris, longis utrinque. Abdomen ovatum depressum, laminis lateralibus clavatis notatum. Pedes breves, crassi. Thorax non distinguitur.*

*Obs. Gallinæ pediculo Syst. differt; thorax hujus distinctus & angulatus. V.*

#### *Ex Entom. Carn.*

**Hæmato- 44.** P. ( de l'autour ) abdomine ovato albo; pus. margine pedibusque rubris.

*Fab. 14.*

*Hab. in falcone palumbrio & strige ulula.*

*Desc. Caput subcordatum, obtusum, antice declive, nudum, splendens, spadiceo-fulvum. Antennæ mobiles, capiti concolores. Abdomen linea dorsali nigra utrinque.*

*Obs. In strige idem prorsus, sed dorsum absque macula nigra.*

Maximus. 45. P. ( de la buse ) abdominis incisuris 9 marginatis, prope marginem punctatis. *Fab. n. 13.* abdomine marginato, segmentis utrinque punctis duobus impressis.

*Hab. in falcone buteone.*

*Desc.* Fuscescens. *Caput* Subcordatum, antice truncatum, postice in medio macula fusco-ferruginea, antice ad apicem punctis duobus fuscis. *Thorax* subrotundatus, lævis, lineis tribus fuscis longitudinalibus, media ad marginem posticum non protensa. *Abdomen* lanceolatum marginatum, margine obscuriore, punctis duobus impressis prope marginem in singulis segmentis.

Dolichoce-46. P. ( du loriot ) albus, capite longo. phalus. *Fab. 19.* albus abdomine linea dorsali fusca.

*Hab. in coracia oriolo.*

*Desc.* Glaber totus. *Abdomen* subtus marginatum, supra linea fusca dorsali. *Pedes antici* breviores.

Fasciatus. 47. P. ( du coucou ) abdomine albido, fasciis fuscis.

*Fab. 20.* abdomine oblongo albido, fusco fasciato.

*Hab. in cuculo canoro.*

*Desc.* Oblongus, depressus, nitens, linea brevior. *Caput* cordatum, thorace latius. *Abdomen* pilis longis raris adspersum. *Pedes* æque diffusi, pallidi, anticis pallidioribus. *Oculi* fuscii.

Ocellatus. 48. P. ( de la corneille ) abdomine maculis conicis lateralibus pallido puncto ocellatis fasciato.

*Fab.* 16. abdomine ovato pallido, maculis lateralibus nigris, pupilla alba.

*Hab.* copiosus in capite corvi coracis & cornicis.

*Desc.* Pilosus, lividus & albidus. *Caput* subcordatum, obtusiusculum, antice nitens. *Antennæ* quadrinodiæ, capite paullo breviores. *Oculi* nigri. *Pedes* nigro fasciati. *Ova* circa oculos corvi, in circulum disposita. Sub abdomine prope apicem, macula lanceolata transversa binis punctulis ocellata, rufa, uno latere plana, altero convexa.

*Auritus.* 49. P. ( l'auriculé ) ad basin antennæ singulæ nervulo auriforme.

*Hab.* in pico majore & martio.

*Desc.* *Caput* subcordatum, obtusum, dilute fulvum, *subtus* ad latera oris pilosum. *Antennæ* longitudine thoracis, valde mobiles. *Corpus* ovatum, lateribus albis. *Anus* setosus. *Pedes* antici antennis breviores.

*Dentatus.* 50. P. ( du canard ) abdominis incisuris sex, lateribus dentatis.

*Hab.* in anate.

*Desc.* Fusco-ferrugineus. *Caput* subtri-lobum; latere postico singulo tripili. *Thorax* lateraliter acuminatus. *Femora* crassiuscula.

*Crassicornis.* 51. P. ( du canard sauvage ) antennis crassis pedum instar, pedibus mediis anticis fere duplo longioribus, posticis a reliquis remotioribus.

*Enum.* n. 1026 ?

*Red. opusc. physiol. col. tom. I. f. 10.*  
figura superior ?

*Hab.* in anate boschate.

*Desc.* Longus valde, albus, fere linearis.  
*Caput* oblongum obtusum, basi rotundatum. *Os* & *caput* rufa. *Abdomen* lanceolatum, capite quadruplo longius, segmento primo longiore, superne canali medio, seu sulco exaratum. *Pedes antici* posticis triplo breviores.  
*Obs.* Descripsit hoc insectum præclarissimus *Redi*, ut videtur, delineavitque, sed minus adcurate. Maximorum sui generis unus. *Caput* ovatum, antrorsum angustius, extimo apice muris instar mistaces gerit; nullibi præterea pili videntur in toto capite. *Antennæ* ex articulis pluribus moniliformes, æquabiles. *Abdomen* elongatum & fere lineare; segmentum primum, quod cum secundo thoracis loco est, orbiculare, antice posticeque truncatum; secundum, cylindricum, longissimum, ita diaphanum uti manifeste transpareat segmentum tertium apici segmenti secundi insertum. Segmenta reliqua, quorum fere numerus septenarius est, breviora primo, sed, demto ultimo, tantillo latiora; latere segmenti quarti, si prima duo in segmentis non numeres, incipiunt brevissimi pili in conspectum venire, iique usque ad apicem continuantur. *Apex* acumine lanceolato instruitur. *Color* insecti albidus, linea a capite usque ad mucronem lanceolatum abdominis pallidiori decurrente. *Pedes* primorum duorum parium segmento primo, tertii paris segmento secundo inserti, constant partibus tribus, quarum prima brevis, secunda elongata cylindrica, tertia elongata cylindrica latere interno fetis tribus & apice unco duplici armata. *Enum.*

**Colymbi-** 52. P. ( du grebe de riviére ) abdomine  
nus. ovato , macula elliptica nigra dorsali.

*Hab. in colymbo aurito.*

*Desc. Caput postice angulatum , angulis posticis obtusis. Adultus rufescit.*

**Ovalis.** 53. P. ( du courly ) abdominis segmentis octo , corpore depresso , ovato.

*Hab. in scolopace arcuata.*

*Desc. Pediculo humano minor. Antennæ capite breviores , thorace longiores. Color rufo-brunneus.*

**Junceus.** 54. P. ( du vaneau ) thorace valde tenui ad initium abdominis.

*Hab. in tringa vanello.*

*Desc. Totus pallide brunneus , nitens. Caput margine subrubro , pubescente. Abdomen oblongum. Pedes primi & reliquis remotiores. Differt a pediculo crassicorni , quod brevior , pilosior , magis fuscus & lucidior , quod pedes antici non tam remoti a reliquis , quod abdominis futuræ fere æquales interfese , denique quod antennæ non sint pedibus anticis longiores.*

**Cuspida-** 55. P. ( du râle d'eau ) cuspidè recta ad basin  
tus. antennæ cujusque.

*Hab. in rallo aquatico.*

*Desc. Oblongus. Caput lucide rufum , nitidulum , læve , antice attenuatum , oblongum , depresso. Corporis latera pilosa. Pedes subæquali inter se distantia ; ergo non idem cum pediculo ralli creëis. Linn.*

**Bidentatus.** 56. P. ( du ramier ) capite hemisphærico , angulis posticis bifetis , thorace marginâ postice bidentato.

*Hab. in columba palumbo.*

*Desc. Caput* in medio foveam habet, lucidum, thorace latius. *Abdomen* ovatum, albidum, depressum, margine ciliatum. *Pedes* albi.

**Albiven-** 57. P. ( du roitelet ) capite rufo cordato, tris. oculis fuscis, abdomine albo attenuato.

*Fab.* 39.

*Hab. in* motacilla troglodyte.

*Desc. Caput* nitens, læve. *Abdomen* subovatum, latere ciliatum, supra convexum. An vere diversus pediculo passerum. Linn.?

**Rostratus.** 58. P. ( du taupe-grillon ) abdomine & thorace hemisphæricis rubris, pedibus albis, rostro nigro inflexo.

*Fab.* 41. sanguineus, pedibus albis.

*Hab. in* acheta gryllotalpa.

*Desc. Corpus* cinnaberinum. *Rostrum* non videtur nisi in obverso corpore, quod utrinque cavernosum est. *Pedes* postici a reliquis remoti sunt.

**Coccineus.** 59. P. ( des hémérobès ) corpore ovato coccineo, oculis fuscis, pedibus pallidioribus.

*Hab. in* hemerobiis, musca cynipsea, leptura melanura, phryganea bicaudata.

*Desc. Corpus* ovatum, postice obtusum & villosulum; antice puncta duo nigra. *Pedes* pallidiores, æque diffiti. *Situs quiescentis* vere singularis, insidet enim capiti pedesque retrorsum extensos gerit, quorum numerus fenarius genus indicat, licet habitu & figura *acaris* accedat.

**Ceramby-** 60. P. ( de l'abeille - violette ) antennis cinis, corpore longioribus,



*Hab. in api violacea.*

*Desc.* Albus, minutus, segnis. *Corpus* ovale. *Antennæ* assiduo & lente mobiles. *Pedes* sex breves, pilosi, æque diffiti.

*Ex spec. D. Fab.*

Phasiani. 61. P. ( du faisan ) capite ovato magno, abdomine globoso obtuso.

*Red. oper. I.*

*Hab. in phasiano motmot.*

*Desc.* *Corpus* medium. *Caput* magnum, ovatum, obtusum. *Thorax* brevissimus; *Abdomen* magnum, globosum.

*Ex Enum.*

Musculi. 62. P. ( des souris ) muris musculi.

*Hab. in muris musculi* varietate alba; bulbis pilosis sese adfigit fortissime, ore in bulbum inserto.

*Desc.* Minimus, ac quem lente destitutus vix reperiās, albus, lentissimus. *Corpus* ovatum lobatum. *Thorax* magnus, postice in lobos duos magnos uberiformes divisus. Reliqua *abdominis* segmenta, quæ mox leves in lateribus sinus, mox magnos anum versus curvatos dentes efformant, thorace angustiora, postremo fere rhomboide, in ejusque apice setæ duæ divergentes, longitudine corporis totius. Antice in loco capitis, in medio *corpusculum* lanceolatum, acutum; in cujus utroque latere *corpus* forcipiforme; *corpus* hoc basi angustius, apice nonnihil latius, latere interiori pollice fixo brevi, latere vero exteriori unco mobili instructum; si uncus iste apertus sit, potest enim insectum ejus apicem pro-

lubitu pollicis fixo admoveere, non inepte cultros hortulanorum purgandis noxiis furculis inservientium refert. Hoc maxime instrumento sese infectum istud muris pilis adfigit. Pilis corpus fere destituitur; in unco mox dicto breves sunt. *Totum* infectum adprime diaphanum, intestinis nullis visibilibus, corde excepto, quod in medio thorace conspicitur palpitare maculamque obscuriusculam constituit. *Antennæ* nullæ. *Nec oculos vidi. Enum.*

*Observavit* Cl. Goeze post ill. D. Geer, acaros nondum adultos pedibus tantum sex instruit; an ergo præsens animal acarus? sed cum pedes acarorum miris modis variant variasque in variis speciebus figuras repræsentent, quid, si putemus uncus illos falcatos pedes esse? Quidquid sit, rostrum acari est, *corpus* papillosum *thorax*que pediculi. *Enum.*

**Ortygome-63.** P. ( du roi de caille ) ralli crex.  
*træ.*

*Hab. in rallo crex dicto.*

*Desc.* Infectum oblongum. *Caput* cordatum, parte acuminata ab abdomine averfa. *Antennæ* breves, moniliformes. *Thorax* angustus, longus, apice latior, apicis medio productiore. *Abdominis* segmenta, demto thorace, octo setosa, utrinque spiraculis magnis maculatis instructa. *Pedes* thoraci affixi, articulis tribus elliptoidibus constant, articulo tertio acuto breviori. In capite varia transparent intestina, ejusque apices utrinque setam longiusculam emittunt. *Enum.*

**Alaudæ. 64.** P. ( de l'alouette des champs ) alaudæ arvensis.

*Beytr. Zur. nat. p. 115.*

*Hab. in alauda arvensi.*

**Curvirof-** 65. P. ( du bec croisé ) *loxia curvirostræ* :  
træ.

*Beytr. Zur. nat. p. 117.*

*Hab. in loxia curvirostra.*

**Chloridis.** 66. P. ( du verdier ) *loxia chloridis.*

*Beytr. Zur. nat. p. 118.*

*Hab. in loxia chloride.*

**Citrinellæ.** 67. P. ( de l'ortolan ) *imberizæ citrinellæ* :

*Beytr. Zur. nat. p. 116.*

*Hab. in imberiza citrinella.*

**Currucæ.** 68. P. ( de la fauvette babillarde ) *motac-*  
*cillæ currucæ.*

*Beytr. Zur. nat. p. 113.*

*Hab. in motacilla curruca.*

**Rubeculæ.** 69. P. ( de la rouge - gorge ) *motacillæ*  
*rubeculæ.*

*Beytr. Zur. nat. p. 115.*

*Hab. in motacilla rubecula.*

*Ex oper. D. de Geer.*

**Humanus** 70. P. ( de la tête ) *cinereus*, thorace  
*capitis.* abdomineque fascia interrupta nigra  
*marginatis.*

*Obs.* An species propria? An P. *humano*  
*species diversa.* Uterque prodigiose  
multiplicatur ; duæ enim pediculi fœ-  
minæ sobolem ultra decem millia per  
hebdomadas octo propagatam vident.



## GENUS V.

**PULEX.** *Pedes* VI saltatorii.

*Oculi* II.

*Antennæ* filiformes.

*Os* rostro inflexo, setaceo, aculeum recondente.

*Abdomen* compressum.

**Irritans.** 1. P. ( la puce ) proboscide corpore brevior. \* t. 11. f. 5.

*Scop. carn.* 1055.

*Raj. inf.* 7.

*Alb. man. t.* 41.

*Bonan. micr. f.* 56.

*Anon. Angl. p.* 204. f. 12.

*Hook. microgr.*

*Joblot. micr. I. pp. I. p.* 3.

*Frisch. inf. II. p.* 8.

*Vallisn. oper. I. t.* 25. f. 1.

*Leuwenb. epist.* 76. f. 1.-20.

*Baker. micr. t.* 13. f. 6.

*Lederm. micr. 4. t.* 20.

*Sulz. inf. t.* 22. f. 146.

*Schæff. elem. t.* 105.

*Fab. I. rostro corpore brevior.*

*Geoff. tom. 2. p.* 616. n. 1. t. 20. f. 4.

*De Geer tom. 7. p.* 8. n. 1. t. 1. f. 1.-4.

*vulgaris castaneus nitidus, proboscide corpore breviori.*

*Adam. microgr. t.* 27. n. 158.

*Ræf. inf. 2. musc. & cul. t.* 2, 3, 4.

*Enum. n.* 1040.

*Faun. Fridr. n.* 813.

*Hab. ubique in Europa, in America.*

*Kalm. pellitur satireja, pulegio*


*perficaria*, *cotula*, *alno*. *Oves* eo destituuntur; *lepores* maxime obnoxii ideoque ramento vestimenti leporini capitur & avertitur a *Dalekarlis*.

Larva apoda, cauda bifurca, net. Pupa, pedata, immobilis. Mas sub *fœmina* jungitur, affinis hemipteris.

*Desc.* *Antennæ* fere filiformes, capite vix longiores. *Caput* circulare, lateraliter depressum. *Oculi* in cavitate laterali positi. *Corpus* incisuris plurimis, quarum prima thoracis locum tenet. *Pedes anteriores* capiti ligati, quod huic insecto proprium. *D. de Geer*.

*Obs.* 1. Larva apoda erravit igitur *D. Geoff.* in nidis, imprimis columbarum, frequentissima. Ex ovo ad statum perfectum dies viginti quatuor tempore æstivo. Ad metamorphosin terra eget, inde in sordidis cubiculis abundat. *V.*

*Obs.* 2. Vidit etiam *D. Scop.* in tuguriis pastorum summis in Alpibus. Extirpatur frequenti scopatione, foliis alni eorumque decocto, lavando sæpe strata cubilium & lectorum lixivio cinerum saturatione. Vidit etiam in sciuris, sed sciurorum pulex longior, gracilior, attentis proportionibus.



## G E N U S VI.

ACARUS. *Pedes* VIII.*Oculi* II ad latera capitis.*Tentacula* duo, articulata, pediformia.Elephanti- 1. A. ( l'éléphant ) orbicularis depressus ;  
nus. macula baseos ovata.*Fab.* 1.*Enum. n.* 1041.*Beytr. Zur. nat.* 128. 29. t. 6. f. 14, 15.  
ovatus, macula baseos nigra, tri-  
loba, utrinque sulcis tribus longitu-  
dinalibus.*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1044.*Pall. spicil. Zool.* 9. 43. f. 12. an dis-  
tinctus ?*Hab. in* India. In testudine orbiculari.  
*Schrank.**Magnitudo seminis lupini albi, depressus,*  
*lividus, margine crasso, subtus utrin-*  
*que 3 sulcis. Macula baseos nigra*  
*ovata, trifida.*Enumeratus inter insecta Austriæ loco  
citato. V.Reduvius. 2. A. ( la reduve ) obovatus planus, macula  
baseos obovata.*It. Oeland.* 62. 126.*Raj. inf.* 9.*Fab.* 3.*De Geer tom.* 7. p. 101. n. 5. t. 6.  
f. 1. - 8. obovatus planus, corpore  
antice clypeo nigro rotundo, pedibus  
nigris.*Erisch. inf.* t. 19.



*Enum. n. 1043.*

*Hab. in bobus, canibus, in sylvis.*

*Desc. Corpus* depressum, magnitudine cimicis lectularii. *Abdomen* in dorso antèrius macula ovata, in medio pallida, cincta fuscedine strias retrorsum emittente.

*Obs. 1.* Variat colore: semper depressus & planus margine laterali prominente.

*Faun. 1966.*

*Obs. 2.* Lentus, cimici lectulario similis & concolor. *Corpus* depressum. *Pedes omnes* æquales, non crassi, articulis multis compositi apiceque pulvillo instructi ex quo unguis duo minuti prominent. Descripsimus in alio opere acaros quosdam pedibus apice vesicula instructis præditos; credibile est, vesiculas illas pulvillos esse unguiculis subtilissimis armatos, sed unguiculis eo minus utique visibilibus, cum ii in hac gigantea specie tam exigui sint. *Rostrum* breve, cui *antennæ* clavatæ adplicantur. *Color* non-nihil variat. *Alia* specimina basi macula cinerea & per reliquum corpus minutioribus aliis notata sunt; alia basi macula nulla, sed *corpus* totum ex fusco-testaceo cinereum, maculis quibusdam lineolisque nigris sparsis. Et hæc quidem nudo oculo videntur. Ad lentem puncta excavata sparsa comparent; *abdomen* antice crenatum, ex qua crena *rostrum* & *antennæ* prodeunt. Lineæ præterea duæ excavatæ divergentes in basi lateraque totius *abdominis* margine supra subtusque introrsum denticulato cincta. *Oculi* anusque etiam microscopio sese subducunt. *Enum.*

*Ricinus*. 3. *A.* ( la tique des chiens ) globoso-ovatus , macula baseos rotunda , antennis clavatis. \*

*Scop. carn.* 1057.

*Aldr. inf.* 550.

*Raj. inf.* 10.

*Frisch. inf.* 5. t. 19.

*Fab.* 2.

*De Geer tom.* 7. p. 98. n. 4. t. 5. f. 16.-19. *acarus ricinoides* violaceo-niger, capite pedibusque fuscis, corpore globoso-ovato.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 621. n. 1. lividus, antennis brevibus subclavatis, abdomine antice macula ovata fusca nitente.

*Enum. n.* 1042.

*Faun. Fridr. n.* 814.

*Hab. in* bobus, canibus. In canibus venaticis; etiam alia animalia diutius in sylvis morantia, ac per dumeta ambulantia infestat, ipsum adeo hominem.

*Enum.*

*Desc.* Corpus ovato-globosum, luteo-albidum, macula nigra rotunda ad basin abdominis in tergo. *Anus* infra abdomen. *Thorax* vix conspicuus. *Caput* minimum. *Os* bifidum. *Caput & pedes* nigri. *Antennæ* clavatæ, longitudine rostri. *Faun.* 1967.

*Obs.* Rostrum dentatum s. ferratum, inde canum pelli firma adhæsiō. Satiata lendis volumen æquat. *Pedes* vesicula flexibili terminati.

*Craffipes*. 4. *A.* ( la craffipede ) pedibus secundariis crassissimis. \*

*Fab.* 14.

*Enum. n.* 1049. corpore toto testaceo.

*Beytr. Zur. nat. p.* 123. 23. t. 6. f. 4.

*Faun. Fridr. n.* 816.

*Hab. in Europa.* Sub ollis hortulanorum, podurarum socius. *Enum.*

*Desc.* Magnitudo minoris pulicis. Color totius corporis castaneus. Femora secundi paris monstrose crassa, cheliformia, desinente tamen chela in tenuem pedem reliquis similem; hinc pes secundi paris juxta basin & femur valde crassus, quatuor denticulis five ramis aut spinis armatus; apex *chelæ* flexilis est, ut eo melius apprehendat; hoc pede tamen non incedit.

*Obs.* Huic ad anum adhærentem reperi alium acarum, *castanei coloris*, *minimum*, *testudinarium* sive depressum, margine undique acuto, pedibus brevissimis, æqualibus adeoque forte diversæ speciei, ni singularem aliquam metamorphosin subeat. *Faun.* 1969.

Vespertilio-5. A. ( des chauve-fouris ) thorace angulato - cruciato, pedibus unguiculatis, corpore longioribus.

*Scop. carn.* 1058. acarus vespertilionis.

*Frisch. inf.* 7. t. 7.

*Fab.* 15.

*Hab.* in vespertilione murino, insolitæ figuræ, phalangio similis, in plano non procedere videtur, haud a sequenti diversus. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Corpus rotundatum. Pedes æque diffiti, apice obtusi. *Scop.*

Passerinus. 6. A. ( des moineaux ) femoribus tertiis crassissimis. \*

*Red. viv. t.* 2. f. 4.

*Geoff. paris.* 2. p. 627. acarus vespertilionis.

*Baker. micr. t.* 15. pediculus vespertilionis.

*Fab.* 16.

*De Geer tom.* 7. *p.* 109. *n.* 7. pedibus  
tertii paris magnis & crassissimis. *t.* 6.  
*f.* 12.

— *Ad. Stockh.* 1740. *p.* 341. *t.* 1. *f.* 2.  
*Enum.* *n.* 1059.

*Beytr. Zur. nat.* *p.* 7.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. *p.* 1048.

*Hab.* in passeribus variis. In fringilla  
montifringilla. *Enum.*

*Conf.* acarum *vespertilionis*.

*Obs.* An *D. Geoff.* *tom.* 2. *p.* 627.  
*n.* 14? V.

*Desc.* Est minimus, punctum nigrum in  
dorso. *Pedes* tertii paris magni; *femora*  
enim hujus ambo simul mole ipsum  
corpus fere adæquant, reliquis mini-  
mis: his monstrosis pedibus non ince-  
dit, sed modo sese adfigit pennis  
vivacissimæ & agilissimæ avis, ne  
excutiat, vide plura in actis *Stockh.*  
*L. C.* Hunc male delineavit *Red.*  
egregie vero *D. de Geer. Faun.* 1970.

Motatorius, 7. A. ( la mobile ) pedibus primis longis-  
simis motatoriiis. \*

*Fab.* 17.

*Faun. Fridr.* *n.* 817.

*Schränk. Beytr.* 8. 4. *t.* 1. *f.* 8, 9. acarus  
rufus, pedibus primi paris longissimis,  
abdomine postice crenato.

*Hab.* in umbrosis. In fungis agilis, pe-  
dibus anticis vibrans. *Fab.*

*Desc.* Magnitudo lendis. *Color* cereus,  
exalbidus vel subflavus. *Pedes ante-*  
*riores* longissimi, hos erigit sæpe  
inter cursitandum & motitat instar  
antennarum, suntque hi corpore lon-  
giores & reliquis pedibus pallidiores.  
*Faun.* 1071.

Aphidioides,

**Aphidioi-** 8. A. ( l'aphidioïde ) pedibus primis longioribus cursoriis, abdomine postice bicorni. \*

*Fab.* 19.

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 625. n. 10.*  
petrarum ruber, pedibus anticis longitudine corporis.

*Enum. n. 1081.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1048.*

*Hab. in Europa. In plantis variis putrescentibus. Gregarius. Enum.*

*Desc.* Parvus ruber. *Pedes* primi paria reliquis longiores, quos non erigit, sed iis uti reliquis currit. *Abdomen* postice duobus corniculis instructum uti aphidum. *Faun.* 1972.

**Coleoptra-** 9. A. ( la coléoptere ) ater, lateribus nigro-subcoleoptratis. \*

*Fab.* 18. ater, lateribus angulato-acutis.

*De Geer tom. 7. p. 133. n. 20. t. 8. f. 6.*  
*marginatus* ovatus, crustaceus, fusco-castaneus, nitidus, corporis lateribus margine plano angulato.

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 626. n. 12.*  
ater, lateribus abdominis antrorsum acutis.

*Enum. n. 1069. integumento coleoptrato anguloso.*

*Beytr. Zur. nat. p. 12.*

*Hab. in Europa, sub arborum cortice.*

*Desc.* Minimus est, magnitudine vix seminis papaveris, octo pedibus, dorso glabro nitido. Latera versus caput acuta quasi coleoptra brevia nigra; hinc *abdomen* caput respiciens, quasi antrorsum bicornis & ad latera auctum membranula nigra, non tamen mobili, ut in coleoptratis. *Faun.* 1973.

**Telarius. 10. A.** ( la tisserand ) rubicundo hyalinus ;  
abdomine utrinque macula fusca.

*Scop. carn.* 1075.

*Geoff. paris.* 2. p. 629. acarus fuscus  
autumnalis textor.

*Fab.* 20.

*De Geer tom.* 7. p. 128. n. 18. t. 7.  
f. 20.-24.

*Enum. n.* 1077. elliptoideus , pedibus  
secundis tertiisque distantibus.

*Beytr. Zur. nat.* p. 35.

*Hab. in Europæ plantis , minus ventis  
expositis , caldario inclusis , tela ducens  
filis parallelis , quibus plantas suffocat  
hybernaculorum ; in tiliæ foliis aversis  
autumno frequens.*

*Desc.* Nudis oculis vix conspicuus. *Totus*  
hyalini coloris , utroque latere ferru-  
gineo.

*Obs.* Nent ut araneæ , foliorum superfi-  
ciem seta velant , inde foliorum deffi-  
catio. Vento rapræ setæ errant , inquit  
*D. Geoff.* sed in his fetis vagabundis  
araneæ sæpe reperiuntur harum setarum  
textores. *D. de Geer. V.*

**Siro. 11. A.** ( de la farine ) lateribus sublobatis ,  
pedibus quatuor posticis longissimis ,  
femoribus capiteque ferrugineis , abdo-  
mine setoso.

*Blank. inf. t.* 14. f. *A. B.*

*Lederm. micr.* 68. t. 33. f. 2.

*Bonan. micr.* f. 112.

*Leuw. epist.* 77. t. 370. f. 9 , 10.

*E. N. C. dec.* 2. ann. 10. ap. 34.

*Fab.* 21.

*De Géer tom.* 7. p. 97. n. 3. t. 5. f. 15.  
oblongus albus , capite rufescente ,  
pedibus conicis , crassioribus æqualibus.

*Enum. n.* 1056.



*Hab. in caseo, farinaque Europæ, Americæ. In Gallia Aust. V.*

*Inter sirones farinæ, scabiei, phthiræos, hemitritæi vix etiamnum reperiri alias differentias, quam a loco petitas. Amæn. acad. 3. p. 333.*

*Desc. Minimus, magnitudine vix lendis, subrotundus, capite vix conspicuo, ore, ut & pedibus rufis sive testaceis. Abdomen ovatum, hyalinum, in dorso duplici linea lunari s. pari linearum fuscæ recurvatarum notatum & quasi lobo utrinque. Faun. 1975.*

**Lactis. 12. A.** ( du lait ) abdomine ovato obtuso postice fetis quatuor longitudine corporis declinatis.

*Fab. 23.*

*Hab. in lactis cremore antiquo & in lactis vasis.*

*Desc. Corpus hyalinum, postice valde obtusum, fetis 4, quæ sub incessu repunt. Rostrum pedesque subtestacea.*

**Dysentericæ. 13. A.** ( la dysentérique ) pedibus fetis duabus, abdominis ovati postica parte fetis quatuor longitudine corporis horizontalibus.

*Fab. 24.*

*Enum. n. 1051.*

*Hab. in doliis cerevisia acida infectis; imprimis in stillicidio siphonis vasis; sæpe in cantharis ligneis ad rimas æstate, obambulans ab hora 10 noctis in diei 10 supra cerevisiam, ceterum latitans sub cerevisia in rimis. Amæn. acad. 57. p. 97.*

*Corpus hyalinum. Pedes singuli postice armati duobus pilis, altero in medio, altero ad plantam. Abdomen ovatum,*

*glabrum, terminatum setis 4 corpore fere longioribus distantibus, 2 superioribus, 2 inferioribus.*

*Obs.* Præfens insectum cum acaro *D. Schrank.* convenit, sed differt defectu setæ, quæ apici pedum insideat, quam nulla arte *D. Schrank.* videre potuit. Juniores hujus speciei acari hexapi sunt. *Enum.*

**Exulcerans. 14. A.** ( de la gale ) pedibus longissimis setaceis, anticis duobus brevibus. *t. II. f. 6.*

*Fab. 22.* albus, pedibus rufescentibus; posticis quatuor seta longissima?

*De Geer tom. 7. p. 94. n. 2. t. 5. f. 12.-15.* acarus *scabiei*, subrotundus albus, pedibus rufescentibus brevibus, posticis quatuor seta longissima, plantis quatuor anticis fistulatis capitulo terminatis.

*Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 622. n. 2.*

*Baker. microscop. chap. 18. p. 193. t. 13; f. 2. a, b, c.*

*AÆ. Angl. abbr. 5. 197. 283. t. 9. f. 127.*

*Bonaz. microsc. 113.*

*Rivin. prur. 18. f. A. B.*

*AÆ. Lips. 1682. p. 319.*

*Allen. comp. XI. 8.*

*Hab.* in scabie ferina. Sub cute hominis scabiem caussans, ubi vesiculum excavit, parum recedit, corporis rugas secutus, quiescit iterum & titillationem excitat; nudis oculis sub cuticula delitescens observatur ab asueto, acule facile eximitur, ungui impositus vix movetur, si vero oris calido halitu affletur, agilis in ungue cursitat.

*Obs.* Acaro *sirone* minor & distinctus & forte acaro *exulcerante* non diversus. *Fab.*

*Desc.* Albus diaphanus. Corpus rotundatum, scabrum, nigro non lineatum uti acarus siro.

*Obs.* 1. In Fauna Suec. edit. 1. acarum farinae & scabiei separaverat Linnaeus, postea conjunxit, sed DD. Geoff. Fab. de Geer pro diversis speciebus rite habuerunt; ergo vere distincti. V.

*Obs.* 2. Scabiei certe hic acarus causa est. In Encyclopedia parisi. edit. 1. legitur: *On peut, sans manquer à la Médecine ne pas se déclarer partisan de cette opinion, & regarder la gale comme une indisposition de la peau, par l'altération de l'humeur des glandes de cette partie, dont le vice se communique bientôt à toute la masse du sang. L'humeur cutanée peut être viciée par contagion en couchant avec un galeux ou dans le même lit où il a couché: on a même des exemples de personnes qui ont gagné la gale, parce que leur linge avoit été lavé avec celui d'un galeux.* tom. 7. art. Gale. Phenomena quæ Entomologorum opinionem confirmarent, etiam si insectum visum non fuerat. V.

Genicula- 15. A. ( la géniculée ) niger, femorum geniculis subglobosis.

*Fab.* 25.

*Enum.* n. 1071. femoribus omnibus clavatis.

*Beytr. Zur. nat.* p. 126.

*Hab.* in arborum ramis emortuis, subcorticibus, in foliis abietis pinique.

Aquaticus. 16. A. ( l'aquatique ) abdomine sanguineo; depresso, tomentoso, postice obtuso. *Geoff. parisi.* 2. p. 625. n. 8.

*Frisch. inf.* 8. t. 3.

*Ræf. suppl.* 1. t. 25.

*Sulz. inf.* t. 22. f. 147.

*Fab. trombidium* 7.

*De Geer tom.* 7. p. 141. n. 24 t. 9.  
f. 4.-6. forte t. 9. f. 7.-10. aquaticus  
ruber, corpore subglobofo, tentaculia  
longis, pedibus approximatis.

*Pod. gr.* p. 121.

*Enum.* n. 1063.

*Beytr. Zur. nat.* p. 12.

*Faun. Fridr.* n. 818.

*Hab.* in Europæ aquis dulcibus, velociter  
natans, ova rubra in nepis ponens.

*Desc.* Corpus ovatum, parum in dorso  
depressum, coccineum. *Faun.* 1978.

*Obs.* 1. Pedes ut araneorum pedes abdo-  
mini adfixi. *D. de Geer.*

*Obs.* 2. Dantur aquaticorum acarorum  
plurimæ species a *D. de Geer.* obser-  
vatæ, ut infra videbitur; sed quod  
fere incredibile, hujus speciei ova,  
teste eodem Entomologo, crescunt  
succumque animalis fugunt. V.

*Holoseri-* 17. A. ( la fatinée ) abdomine sanguineo  
*ceus.* depresso, tomentoso, postice retuso.

*Scop. carn.* 1068.

*Geoff. parif.* 2. p. 624. n. 7.

*It. El.* 84.

*List. Aran.* f. 38.

*Ræf. inf.* 41. n. 38.

*Blank. inf.* t. 14. f. J.

*Fab. trombidium* 2.

Acarum minini insectorum, fertilitate immensa ubicumque obviæ, plu-  
rium calamitatum causæ sunt.

M. A. C. D. gallus *Système d'un Médecin Anglois Paris.* 1726.  
8 malæ sapiens effinxit integram centuriam acarorum, ridens  
contagia, posteris ipse ridendus.

*De Geer tom. 7. p. 136. n. 22. t. 8.  
f. 14. - 17. terrestris ruber, ovatus,  
depressus, rugoso-tomentosus, pedibus  
posticis remotis.*

*Faun. Fridr. n. 819.*

*Enum. n. 1064.*

*Pod. gr. p. 121.*

*Müll. Lin. Nat. el. v. p. 1034.*

*Hab. in Europæ & Americæ siccis. In  
aqua perit.*

*Desc. Præcedenti quam ovum ovo simi-  
lior. Totus ruber, holosericeus & cocci-  
neus. Caput minimum: oculi duo.  
Pedes utrinque quatuor multis articulis.  
Abdomen magnum, depressum, pone  
& lateribus gibbum, postice fulcatum.  
Magnitudo antecedentis. Palpi duo  
apice desinentes in unguem & articu-  
lum ovatum. Faun. 1979.*

*Obs. Ill. Linnæus acarum hunc def-  
cripturus eum priori plane similem  
dicit, simillimus præcedenti; idem jam  
in Fauna sua dixerat de eodem, præ-  
cedenti quam ovum ovo similior. Etiam  
celeberrimus Scopoli tantum inter utrum-  
que differentię non statuit; & quam  
ponit, a re, quæ plerumque abest,  
& tantum in junioribus obtinet, de-  
sumit; ab aquatico, teste viro hoc  
clarissimo, differt lateribus pectoris  
cinereo veluti colore tinctis. Sed vereor  
ne uterque Vir clarissimus, dum ita  
loquitur, non parum hallucinetur.  
Ab ipso Linnæo non pauca insecta ut  
omnino sufficienter distinctę species  
enumerantur, quæ multo magis sibi  
invicem similes sunt, quam acari holo-  
sericeus aquaticusque. Data partium def-  
criptione brevem utriusque dabimus  
comparationem.*

Major præcedentibus, ac fere magnitudine acari *ricini*. *Corpus* rotundatum antice latius, subtruncatum, postice emarginatum, lateribus leviter sinuatum; *totum* lamellis rubris minutis pilorum loco iisque erectis vestitum, hinc infecto byssi rubri facies. *Pedes* utcumque longi, dense pilis seu lamellis rubris tecti, articulis sex constant; extimo articulo unguis duplex infixus est. Novit infectum hunc unguem retrahere, uti feles suum apicesque pedum crassiores reddere.

*Antennæ* seu potius tubi fustorii articulis quinque constant; ab infecto deorsum inflectuntur. Illud in illis singulare, quod articulo eorum tubulorum tertio subtus corpus ovatum rubrum affixum sit.

### COMPARATIO.

*A. Aquaticus.*

*A. Holofericeus.*

*Hab.* in aqua pura.

*Hab.* in terra, ac præsertim in humo nigra.

*Natat* celeriter.

*Incedit* lente; in vitro prorsus nescit ingredi.

*Pedes* natatorii.

*Pedes* ambulatorii.

*Oculi* duo nigri.

*Oculi* nulli visibiles.

*Antennæ* sine adpendiculo.

*Antennæ* adpendiculatæ.

*Corpus* globosum, læve, levissime depressum.

*Corpus* sinuatum, supra depressum, postice profunde emarginatum.

*Habitat* in terra, plerumque solitarius; primo vere, si terram vertas, passim,



sed fere semper solitarius occurrit.  
Clarissimus *D. Scopoli* unica vice  
gregarium deprehendit.

Color coccineus; incessus lentus; victus  
cadavera minuta putrescentia.

Varietas: pedibus longioribus, colore  
fuliginose rubro.

Visa hæc varietas Viennæ ad radices  
arborum verno tempore inter folia  
congesta; celeriter currit, cum prior  
lente gradiatur; vivit gregaria, cum  
prior solitaria. An vere varietas tan-  
tum. *Enum.*

**Baccarum. 18. A.** (des baies) abdomine distento rubro;  
lateribus obscurioribus. \*

*Scop. carn.* 1074.

*Fab.* 26.

*Schæff. icon. t.* 27. *f.* 1.

*Enum. n.* 1066. ovatus ruber, pedibus  
æqualibus verticillato-setosis.

*Beytr. Zur. nat. p.* 34.

*Hab. in baccis ribis aliisque frequenter  
cursitans.*

*Desc.* Præcedentibus multoties minor:  
minime dorso depresso, nec rugosus,  
nec sericeus s. villosus, sed glaber &  
undique tumidus. Punctum obscurum  
utrinque ad thoracem. Pili hinc inde  
enati. *Faun.* 1980.

**Muscarum. 19. A.** (des mouches) abdomine rufo;  
pedibus posticis longissimis filiformibus.

*Geoff. parif. 2. p.* 624. *n.* 6.

*Fab.* 28.

*De Geer tom. 7. p.* 114. *n.* 10. *t.* 7.  
*f.* 1.-3.

*Hab. in muscis.*

*Desc.* Rubellus. *Corpus* ovatum. *Pedes*  
quatuor primi crassiusculi, articulis

plurimis : *posteriores* filiformes, longissimi; *omnes* pilosi. Ante rostrum pili duo longiusculi. *D. de Geer.*

Gymnopte-20. A. (des gymnopteres) abdomine rubro, lateribus punctis binis coccineis.

*Reaum. inf. 5. t. 38. f. 1.-3.*

*Fab. 29.*

*De Geer tom. 7. p. 119. n. 14. t. 7. f. 9. - 11. acarus libellulæ globosus ruber, pedibus brevissimis, stigmate dorsali concavo.*

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 623. n. 5. ruber, punctorum coccineorum utrinque pari.*

*Faun. Fridr. n. 820.*

*Enum n. 1083? coccineus, corpore papilloso, postice setis aliquot, pedibus sex.*

*Hab. in apibus aliisque.*

*Desc.* Ruber, minimus, ut *oculi & pedes* nudo oculo distingui nequeant. *Abdomen* globosum, læte rubrum, pilis quibusdam hispidum. In anteriore abdominis parte, ad latera, utrinque par punctorum obscurius rubrorum, quorum punctum alterum anterius, alterum posterius. *Faun. 1082.*

*Obs. 1.* Pedes cum ætate explicantur, inde modo quatuor, modo sex, denique octo numerantur. V.

*Obs. 2.* Ex corporis formæ variatione a *D. Schrank.* observata, natum fuit synonymiæ dubium. Ea enim *D. de Geer.* incognita. V.

*Obs. 3.* *Corpus* oblongo-ovatum, illud privum habet, quod latera varie sinuare possit, unde, cum hoc facit, circumferentiam lobatam nanciscitur. Hinc inde ad latera corporis verrucæ niten-

tes minutissimæ. Pili fere nulli, vix lobus abdominis seu corporis quivis pilo unico instruitur; postice pili tres quatuorve longiores. *Pedes* moniliformes, utcunque pilosuli. Velox an tardum sit animal, non definitio, nec enim nisi in quiete vidi.

In actis Academiæ Scientiarum Parisinæ ad annum 1693. a cl. *de la Hire* infectum describitur, nostro apprimè simile; illud in infectis dipteris culiciformibus habitare dicitur, id est in tipulis: & nostrum in tipulis habitat; illud colore est lucido rubro flavescente; nostrum gaudet colore coccineo; illud magnitudine lendis, nec nostrum lende majus. Fors quam descripsimus speciem, larva illius est, quam *de la Hire* loco laudato descripsit. *Enum.*

Coleoptra-21. A. ( des coleopteres ) rufus, anq  
torum. albicante. \*

*Scop. carn.* 1064.

*Geoff. paris.* 2. p. 623. n. 4.

*Blank. inf.* t. 14. f. H.

*Frisch. inf.* 4. t. 10.

*Reaum. inf.* 6. t. 4. f. 13, 14.

*Ræf. inf.* 4. p. 26. t. 1. 10.-15.

*Fab.* 30.

*De Geer tom.* 7. p. 112. n. 4. *acarus fucorum* pallide fuscus, flavescens, macula dorsali triangulari obscura, pedibus anticis longioribus.

*Enum.* n. 1047. ano pallidiore, tarsis pedum intermediorum vesiculosus.

*Beytr. Zur. nat.* p. 10.

*Pod. gr.* p. 122.

*Schæff. icon.* t. 27. f. 2.

*Faun. Fridr.* n. 821.

*Hab.* in scarabæis & in apibus hirsutis

similibusque, sub pectore vel intra femora.

*Desc.* Corpus subrotundum, rufum, convexum, durum. Caput & collum vix manifesta; versus anum albicans. Pedes veloces, anteriore longiore. Sutura transversalis distinguit corpus supra. *Faun.* 1983.

Rupestris. 22. A. ( des pierres ) fuscus, linea dorsali bicolore. \*

*Fab.* 33.

*Hab.* in Europa. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Magnitudo & figura acari *aquatici*, sed *curfus* obscurus. Abdominis linea dorsalis longitudinalis utrinque dilatata, antierius in aliis alba, in aliis rubra, communiter antierius albida, posterius rubra; ceterum *abdomen* nebuloso - nigrum est. *Pedes* rubri. *Faun.* 1984.

Longicor- 23. A. ( la longicorne ) ruber, antennis bifidis rostro longioribus. \*

*Geoff. parif.* 2. p. 618. t. 20. f. 5. chelifer totus ruber, antennis extremo bifetis.

*Fab.* 34.

*Enum. n.* 1062. antennis longis, apice bifetis.

*Beytr. Zur. nat. p.* 9.

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p.* 1056.

*Desc.* Facile hic ab omnibus aliis dignoscitur *antennis* rostro longioribus; *antennæ* enim in reliquis vix manifestæ sunt; has *antennas* numero præter octo ordinarios *pedes* adeoque non *pedes* primores pro *antennis* habeo. Rostrium, *antennæ*, *pedes* corpore pallidiora sunt. *Faun.* 1985.

Littoralis. 24. A. ( des rivages ) fusco-rufus , pedibus sanguineis. \*

*Fab.* 35. ovatus ruber , rostro porrecto subulato.

*Hab.* in Europæ littoribus , in petris.

*Desc.* Corpus glabrum , ovatum. *Antennæ* filiformes quadriarticulatæ. *Caput & thorax* sanguinea. *Abdomen* valde obtusum , magis obscurum , utrinque punctis aliquot impressis. *Fab.*

Fungorum. 25. A. ( des champignons ) fusco-rufescens abdomine subglobofo glabro. \*

*Fab.* 37.

*Schrank.* *Beytr.* 127. 27. t. 6. f. 11, 12. abdomine glabriusculo , sub incessu globofo.

*Desc.* Magnitudo lendis. *Totus* ferrugineus s. triste rufescens , undique valde glaber , absque lateralibus maculis. *Faun.* 1987.

Tremellæ. 26. A. ( de la tremelle ) subglobofus atrocærulescens nitidus.

*Fab.* 38.

*Hab.* in tremella Juriperina.

Scaber. 27. A. ( la chagrinée ) cinereus depressus ; lateribus scabris. \*

*Hab.* in terra primo vere.

*Desc.* Est minimum animalculum. *Corpus* depressum , obscure cinereum. *Abdominis* latera a tergo punctis elevatis scabra. *Anus* depressus , bidentatus. Tergo impositus , pedes undique protendit. *Faun.* 1988.

Salicinus. 28. A. ( des saules ) ruber , linea dorsali duplici fusca , antice bifurca. \*

*Fab.* 39.

*Hab. in falicibus frequens, velox. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Aquatico simillimus magnitudine. Linea dorsalis duplex parallela longitudinalis fusca, versus thoracem bifurca. Faun. 1989.*

**Croceus. 29. A.** ( la safranée ) fulvus, thoracis lateribus puncto rufo. \*

*Fab. 40.*

*Hab. in falicis rosa monstrosa.*

*Desc. Corpus vix conspicuum nudis oculis, croceum sive dilute fulvum, thorace utrinque puncto rufo saturato. Faun. 1990.*

*Ex Entom. Carn.*

**Radiatus. 30. A.** ( des tortues ) corpore ovato fusco, margine fulvo postice striato, stris octonis unipunctatis.

*Hab. in testudine mida.*

*Desc. Paulo major aut æqualis cimici leclulario. Os ferrugineum, truncatum, bifidum. Macula dorsalis excavata, ferruginea. Corpus margine subtusque fulvum, postice lineis 8 marginalibus, in quarum qualibet punctum impressum. Verrucæ duæ postice, punctulo nigro notatæ. Pedes fusci, albo annulati. Posticis partibus testudinis alte infixus est ut acarus ricinus in canibus.*

**Cornicis. 31. A.** ( de la corneille ) pedibus æqualibus, abdomine postice bicorni, cornibus bifetis.

*Hab. in humeris corvi cornicis.*

*Desc. Magnitudo pulvisculi nicotianæ. Color dilute brunneus. Pilus plumosus*



ad latus abdominis utrinque unus.  
*Pedes* pilosi : *postici* & *medii* ab aliis  
 remotiores : *antici* filo brevi, apice  
 palmato. *Cornua* ani teretiuscula,  
 bifeta divergentia.

Locusta. 32. A. ( de la mēfange bleue ) abdomine  
 fetoso, lateribus sublobatis, pedibus  
 posticis longissimis.

*Schränk. Beytr. Zur. nat. p. 120.*

*Hab. in paro ceruleo.*

*Desc.* Albus, sed caput & femora ferru-  
 ginea. *Corporis* pars antica fere qua-  
 drata convexiuscula. *Abdomen* apice  
 valde fetosum, setis parallelis. *Pedes*  
*antici* sæpius palmati, *medii* longiores,  
 tenuiores minusque pilosi.

Collurio- 33. A. ( du lanier écorcheur ) rostro late-  
 ribus denticulatis palporum longitu-  
 dine, pedibus anticis & posticis lon-  
 gioribus.

*Hab. in lano collur.*

*Desc.* Lineam longus, rotundus. *Dorsum*  
 rufum, nitens. *Abdomen* glabrum,  
 supra cinerascens. *Pedes* rufi, æque  
 diffiti, vix villosi. *Palpi* porrecti.

Pici. 34. A. ( du pic moyen ) corpore oblongo,  
 acuminato, pedibus anticis remotis-  
 simis, posticis brevioribus.

*Hab. in remigibus pici medii.*

*Desc.* *Corpus* adolescens ovatum, adul-  
 tum lanceolatum. Seta una utrinque ex  
 apice thoracis.

Turdi. 35. A. ( du merle à collier ) corpore sub-  
 rotundo, antennis teretibus, obtusis,  
 villosis, extrorsum leniter dilatatis,  
 rostro crassioribus.

*Hab. in turdo saxatili.*

*Desc.* Fuscus, lucidus, depressus, glaber;  
*Rostrum* longum, acuminatum. *Pedes*  
æque diffiti. *Cursus* celer. *Statura* est  
tertia pars lineæ.

Coccinel- 36. A. ( des coccinelles ) thorace rufo,  
læ. abdomine albido, seriebus binis punc-  
torum impressorum longitudinalibus.

*Hab. in coccinella populi.*

*Desc.* Ovatus. *Pedes* æque diffiti, vil-  
losuli.

Muscarum. 37. A. ( des mouches ) ovatus nitidus ;  
ferrugineus, pedibus pallidioribus.

*Enum. n.* 1086.

*Hab. in muscis, sub ventre.*

*Desc.* *Palpi* longi. *Corpus* glabrum ;  
subtus pallidius. *Pedes* æque diffiti,  
*medii* & *postici* crassiores.

*Obs.* Ab acaro *muscarum* Linn. differt,  
nam *pedes* nec longissimi nec filiformes.  
*Scop.* V.

Formica- 38. A. ( des fourmis ) ovatus, albidus ;  
rum. superne villosus, antennis motatoriis.

*Hab. in formicis aratis.*

*Desc.* Junior albus, adultus obscurior est,  
agilis valde. *Antennæ* aut *palpi* abdo-  
mine longiores.

Nepæfor- 39. A. ( la cimicoïde ) totus punctis emi-  
nis, nentibus confertis scaber.

*Hab. inter muscos, ad fagorum radices.*

*Desc.* Oblongus, depressus instar folii  
coloris terrei, iners valde. *Antennæ*  
moniliformes. *Os* ovatum. *Pedes antici*  
& *medii* breviores, *secundi* & *postici*  
*corpore* longiores.

Muscorum;

Muscorum. 40. A. ( des mouffes ) ovatus , nitidus ,  
niger , pedibus ferrugineis.

*Schrank. Beytr. Zur. nat. p. 40.*

*Hab. inter muscos. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Duplo major acaro coleopratorum ;  
politissimus & longis villis instructus.*

Agarico- 41. A. ( des agarics ) ovatus , subfulvus ;  
rum. femoribus mediis crassioribus.

*Hab. in agaricis.*

*Desc. Statura A. coleopratorum.*

Lichenum. 42. A. ( des lichens ) albus , ellipticus ;  
postice obtusus , pedibus æqualibus  
pilosis.

*Hab. inter lichenes in arboribus.*

*Desc. Minor acaro coleopratorum. Thorax  
binis vel uti tuberculis. Abdomen pone  
pilosum , superne versus latera fusces-  
cens. Pedes æque diffiti.*

Figur. 43. A. ( du lichen des hêtres ) ferrugineus  
ovatus nitens , macula dorsali ovata  
fusca.

*Hab. in lichene crustaceo. In Galliæ Aust.  
montibus. V.*

*Desc. Valde splendet , tarde incedit ,  
dorso impositus vix se invertere potest ;  
irritatus caput inflectit , ut solent  
onisci. Pedes anticos inflexos gerit.  
Ovo pediculi humani minor est ; huic  
anus infra apicem abdominis fusces-  
cens pilique nonnulli ad apicem ventris.  
Pedes parvi & æque diffiti.*

*Ex op. D. de Geer.*

Domesti- 44. A. ( la domestique ) albus , maculis binis  
cus. fuscis , corpore ovato medio coarctato ,  
pilis longissimis , pedibus æqualibus.

*Insect. Tomus IV.*

E

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 622. n. 3.*  
casei antiqui. }

Synonymia ut in acaro *farinæ* Syst. nam  
acaros *farinæ*, *scabiei* & domesticos  
sub *A. firone* comprehendit Linn.

*Hab.* in caseo antiquo, pane diutius affer-  
vato, avibus, infectis muscorum, &c.  
In Gallia Aust. V.

*Desc.* Inter minimos oculisque nudis vix  
conspicuus. Agilis villosus, fusco-  
albidus, nitens. *Caput* inflectit. *Corpus*  
crassum, ovatum, in medio angusta-  
tum. *Pedes* fere æquales; sed *primi*  
quatuor vesicula modo contracta, modo  
tumescente. *Pili* mobiles, musculo  
igitur insident. Recens natus hexapos.

Avicula- 45. *A.* ( l'aviculaire ) elongatus albus,  
abdomine fetis quatuor longissimis,  
pedibus quatuor posticis remotis.

*Hab.* in aviculis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Diaphanus. *Caput* infra inflexum.  
*Caput*, *thorax*, *abdomenque* vix sepa-  
rata. *Pedes postici* ab intermediis re-  
moti: *primi* quatuor aliis crassiores.  
Nascens hexapos. In avicula mortua  
facile reperitur.

Squamosus. 46. *A.* ( l'écailleuse ) rubicundus, corpore  
pedibusque squamis albidis testis.

*Hab.* in cimice *betulæ*. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Inter minimos. *Caput* distinctum.  
*Corpus* ovatum, depressiusculum. *Pedes*  
æquales. Squamæ corpori pediculo  
adfixæ.

Phalangi. 47. *A.* ( des faucheurs ) ovatus ruber,  
rostro porrecto, pedibus longioribus.

*Fab.* 31.

*Hab.* in phalangiis araneisque, arcte pedibus

aliisque corporis partibus adhærens.  
In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Rostrum* porrectum. *Caput corpus-*  
*que* minime distincta. *Pedes* pilosi, pilis  
obtusis, hirsutis.

**Culicis.** 48. A. ( des cousins ) globosus ruber, capite  
porrecto lateribus inflato, pedibus  
longioribus.

*Hab.* in culicibus.

*Desc.* Ruber, globosus. *Corpus* antice  
truncatum, ibi *caput* elongatum, quod  
insectum curtat & elongat. Nascens  
sex pedibus diaphanis, rubeolis.

**Parasitus.** 49. A. ( la parasite ) oblongus ruber, rostro  
brevissimo sub capite pedibusque bre-  
vioribus.

*Hab.* intra pedes muscarum aliorumque  
insectorum. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Sanguineus. *Caput* indistinctum.  
*Rostrum* brevissimum. *Pedes* rubelli,  
articulis pilosis brevibus.

**Aphidum.** 50. A. ( des pucerons ) ovatus ruber;  
oculis nigris, pedibus anticis extremo  
clavatis.

*Hab.* in aphidibus. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Minimus, sanguineus, globosus.  
*Caput* distinctum, tuberculis lateralibus  
oculiformibus. *Rostrum* inflexum. *Pedes*  
*anteriores* aliis longiores, extremita-  
tibus crassiores.

**Corticalis.** 51. A. ( la corticale ) subrotundus crassa-  
ceus fusco-castaneus, nitidus, pedibus  
pallide fuscis.

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 626. n. II.*  
petrarum niger, abdomine globoso  
lucido, femoribus subclavatis.

*Hab.* sub cortice pyri.

*Desc.* Araneiformis. *Caput* horax & abdomen distincta. *Caput* conicum, antice acuminatum, pilis duobus supra. Thoracis longitudo latitudinem superat. *Abdomen* ovato-globosum. *Pedes* longi, femoribus crassis, unguibus tribus.

Phalangoi-52. A. ( la phalangiforme ) ovatus obscure ruber, macula dorsali oblonga, flavo-aurata, pedibus longissimis.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* *Pediculi vulgaris* magnitudine. *Caput* non distinctum. *Corpus* ovatum, lateraliter pilis brevibus. *Pedes* postici tenuissimi, longissimi, posteriores remoti. *Omnes* articulis sex.

Caudatus. 53. A. ( la prolongée ) aquaticus fuscus; rufo maculatus, abdomine caudato cylindrico.

*Fab.* trombidium 4. abdomine fusco, rufo maculato, postice porrecto cylindrico.

*Beytr.* Zur. nat. p. 5 ?

*Hab.* in Europæ aquis, celerrime natans.

*Desc.* Rufus supra, infra citrinus lagænæ inversæ similis. *Corpus* globuliforme, in medio supra ellipsi elevata. *Caput* non distinctum, punctis 2 nigris, forsan oculis. *Pedes* longi, flexiles, articulis plurimis; postici reliquis longiores crassioresque.

Aquaticus-54. A. ( l'aquatique ronde ) aquaticus rubro-fuscus, corpore globoso, tentaculis brevioribus, pedibus rubris approximatis.

*Fab.* trombidium 5. fuscum corpore globoso, pedibus rubris.

*Hab.* in Europæ aquis.



*Desc.* Magnitudo variat. *Corpus* fere sphaericum. *Caput* nec *thorax* distincta. *Pedes* pilosi, natatorii, articulis sex; anteriores reliquis breviores.

Aquaticus-55. A. ( l'aquatique tachetée ) aquaticus maculatus. fuscus macula rubra, corpore globofo, tentaculis brevioribus crassis, pedibus viridi-griseis approximatis.

*Hab.* in Europæ aquis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Præcedente minor. *Corpus* globosum, macula dorsali rubra maculaque ovali, scabrum, pilosum. *Pedes* viridigrisei; anteriores breviores.

*Obs.* Species certe propria. V.

Aquaticus-56. A. ( l'aquatique à ailerons ) aquaticus marginatus. subrotundus crustaceus niger, pedibus rufis, corporis lateribus marginatis.

*Hab.* in Europæ aquis.

*Desc.* Niger. *Caput* conicum antice acuminatum, pilis longis. *Corpus* squamosum, nitens, appendice utrinque laterali diaphano-rufa. *Pedes* rufi, articulis plurimis pilosis, anguibus tribus.

*Ex spec. D. Fab.*

Pallipes. 57. A. ( la pallipede ) ovatus fuscus, antennis pedibusque pallidis.

*Hab.* Kiliæ. D. Kerstens.

*Desc.* Magnitudo ferè A. ricini. *Corpus* totum ovatum, depressum, planum, fuscum, pilis rarioribus pallidis adpersum, antennis pedibusque pallidis.

Sanguisugus. 58. A. ( la sangsue ) ovatus planus niger, abdomine ferrugineo, antennis clavatis.

*It.* Norwag.

*Hab. in hominibus animalibusque Norwagiæ.*

Lipnensis. 59. A. ( la Saxonne ) ovatus fuscus , margine incrassato.

*Hab. Lipsiæ.*

*Desc.* Parvus , statura A. *Ægyptii* , at totus fuscus.

Zosteræ. 60. A. ( de l'algue marine ) subrotundus albidus , abdomine rufo.

*It. Norwag.*

*Hab. in fucis oceani Norwagici.*

Fucorum. 61. A. ( du varec ) pallidus , lineis duabus flexuosis nigris , pedibus posticis brevissimis incurvis.

*It. Norwag.*

*Hab. in oceani Norwagici fucis.*

Hispanus. 62. A. ( l'Espagnole ) ovatus niger , pedibus ferrugineis , peniculis albis.

*Hab. in Barbaria. D. Vahl. In Gallia Aust. prope Massiliam captus. V.*

*Desc.* Major A. *sanguifugo*. *Antennæ* breves , extrorsum crassiores. *Corpus* planum , ovatum , nigrum , pedibus omnibus ferrugineis , geniculis albis. *Mant. 5.*

Molfatus. 63. A. ( l'aplanie ) ovatus planus ferrugineus , thorace fusco.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc.* *Corpus* totum ferrugineum , thorace solo fusco. *Pedes* obscuriores. *Mant. 14.*

*Ex Enum.*

Natator. 64. A. ( la tique nageur ) globosus corneus , pedibus posticis natatoriis.

*Beytr. Zur. nat. p. 6.*

*Hab. in Europæ aquis.*

Lichenis. 65. A. ( du lichen de terre ) pedibus primi quartique paris longioribus , secundi crassiusculis.

*Beytr. Zur. nat. p. 40.*

*Hab. in lichenis canini facie averfa.*

Leucurus. 66. A. ( la blanchâtre ) pedibus secundis crassissimis , corpore testaceo , an pallidiore.

*Beytr. Zur. nat. p. 124.*

*Hab. in cadaveribus.*

Conservæ. 67. A. ( de la conserve ) fuscus ovatus ; pedum geniculo minimo , tertio seta longa armato.

*Hab. in conserva ; extra aquam moritur ; in aqua superficiem nunquam petit , nec vagatur , sed in filamentis conservæ sub finem Martii obambulat.*

*Desc.* Minimus , vix nisi ope lentis visibilis , fuscus , pedibus pallidioribus. Figura globosa , antice acuminata. *Pedes* æqualis longitudinis & structuræ. Si bases pedum non computes , articulis constant quinque ; primus , tertius quartus teretes , in apice tertii seta longa porrigitur. Articulus secundus brevis , fere globosus ; quintus itidem brevis , sed oblongus , apice unguiculis armatus. *Pedes omnes* pilis nonnullis brevibus sparsis leviter horrent , sed corpus nudum , nec nisi ad rostrum setis duabus , quasi antennis , brevibus instructum.

Cadave- 68. A. ( des cadavres ) corpore subbilobo ,  
rum. postice setis quatuor longioribus.

*Beitr. Zur. nat. p. 128.*

*Hab. in cadaveribus insectorum.*

**Destructor. 69. A.** ( la mite destructeur ) ovatus, an-  
fetis longis pluribus, pedum seta  
unica.

*Hab. in insectorum exuviis loco humido  
adservatis, veram inducens cariem.*

*Desc.* Minimus, oculo nudo prorsus in-  
conspicuus, hyalinus vitri instar, albens,  
sed sæpe ab esca transparente mire va-  
riegatus; hinc aliqui occurrunt albi, alii  
nubeculas obscuras gerunt, uti ille,  
quem depinximus, alii ferruginei. *Corpus*  
nitens totum, etiam pedibus, glaber-  
rimum, sed setis in utroque latere  
inter pedum par secundum & tertium  
duabus fere ad angulum rectum cor-  
pori insidentibus, setis duabus in sin-  
gulo pede, quarum una in medio ad  
angulum acutum prodit longior, altera  
basi insidet brevior; postice post se  
trahit setas plures inæqualis longitu-  
dinis. Antice ex corpore articulus  
angustior procedit & ex hoc rostrum,  
qui basi oculis duobus prominentibus  
instruitur, sed hyalinis, nec coloratis;  
supra oculos seta brevis antrorsum  
porrecta; setæ duæ aliæ breves in  
medio rostri, antennas mentientes,  
cum rostrum deflectitur.

*Insectum ptino fure* pertinacius ac magis  
pertimescendum; molliora, ac succu-  
lentiora insecta præsertim inquirat.  
Arcetur, si arcas, quibus insecta  
inclusa sunt, in loco sicco colloques,  
nec per hyemem in cubiculis calefactis  
ad muros communes cum cubiculis  
frigidis, aut quibus in altero latere  
aer externus inducit, adserves.

Quod nisi feceris, muro frigido communicatus a cubiculo calor humores in ejus superficie deponit, sensim in arcam penetraturos, ac primo mucori, paullo post acaro destructori viam paraturus.

Eruditus. 70. A. ( le bibliomane ) pedibus primi paris crassissimis chelatis, secundis longissimis, apice bifetis.

*Hab. in* libris humido loco adservatis. Insidiatur uti præcedens glutini biblioporum. Præsens species præsertim adest ad oras chartæ librorum integumento adglutinatæ, ore pedibusque suis cheliformibus glutini immensis illudque remouentibus. Non facile per libri superficiem discurret, nisi inquietata, tum vero currit celeriter.

*Desc. Abdomen* ovatum, pallidum; hyalinum, ut in acaro *firone*, sæpe transparente costæ figura. Hinc inde pili quidam minuti, & ad utrumque latus, inter par pedum alterum tertiumque seta brevicula curva fere ad angulos rectos corpori insidens. *Pedes* hinc inde fetis longioribus subtilissimis armantur, sed earum numerus magnus non est; fere cuius articulo una obtingit. *Pedes* quatuor posteriores mediocres, hyalini, graciles; primi paris vix postlicorum longitudine, sed mirum in modum crassi, ac structuræ peculiaris; non pectori affixi, sed lateri thoracis antice inserti videntur; hoc enim insectum contra morem generis peculiari thorace instruitur. *Pedes* ipsi genicula non habent, quod si illos insectum moveat, id tantum in basi fit, sed insecti non vidi; prorsus sunt teretes,

fed circa medium cubito quodam inftruuntur, poſt quem nonnihil anguſtiores evadunt, ac denique in acumen inflexum deſcunt, cui latere interiori pollex mobilis obvertitur. Intra acumen pollicemque duo treſve pili ſui ſinguli, apophyſibus ac bulbulis inſidentes digitoſque non inepte mentientes. *Pedes* hi curſui non inſerviunt, ſed ab infecto antrorſum protenduntur, dum currit; alius a curſu illorum finis eſt.

*Pedes* ſecundi paris, uti cæteri, abdomini inſerti, exiles, graciles, longiſſimi, diaphani, apice ſetis duobus armati & per totam longitudinem pilis nonnullis ſparſis.

*Thorax* abdomini inſertus, in illudque nonnihil retractilis, ſubrhomboidalis; ad latera, ubi in angulum ſolidum deſcunt, corpus utrinque minutum, rotundum, hyalinum, fors oculus; antrorſum in proborſcidem deſinit biſidam, acuminatam. Per medium thoracis lineæ tres longitudinales tenues mobiles decurrunt, inteſtinum fortaffe quoddam.

Cæterum infectum ita parvum, ut nudo oculo cerni prorſus nequeat; niſi forte in vitro, quod lumini obvertas, aut cui corpus atrum ſupponas.

Juniores recens ex ovo excluſi per omnia, etiam pedum numero, ac vix non magnitudine matribus ſimiles, contigit enim mihi ex ovis a matre me inſpectante poſitis, ſub meis prope oculis ut ſuboles prodierit propagatura hanc ſpeciem.

Alaudæ. 71. A. ( de l'alouette ) ano poſtice emarginato.



*Beytr. Zur. nat. p. II.*

*Hab. in alauda arvensi.*

**Graminum. 72.** A. ( des graminées ) rufus , pedibus  
primi paris longissimis , abdomine pos-  
tice crenato.

*Beytr. Zur. nat. p. 8.*

*Hab. in graminum foliis ; ea maculans.*

**Appendi- 73.** A. ( l'appendiculée ) subglobosus cine-  
cularis, reus , pedibus longis pallidioribus ,  
posticis longioribus.

*Hab. sub lichene pulmonario rarior.*

*Desc.* Inter majores sui generis , globosus , cinnabarinus , nitens. *Pedes* graciles , longi , corpore pallidiores ; *postici* reliquis notabiliter longiores. Huc usque , uti oculo inermi adparet.

*Ad lentem corpus* satis pilosum , antice *rostrum* , quod fere intra *abdomen* aliqua sui parte reconditum videtur ; ad latera rostri *antennæ* inæqualis structuræ , nec , ut in aliis insectis , secum similes. Earum una , tubo theatrâli non absimilis , articulis tribus constat , ex quibus primus articulus cylindricus , alter fusiformis , acutusque est ; *subtus* adfixus ei est tertius articulus , f. corpus ovatum , ut fere in A. *holosericeo*. *Antenna* altera claviformis est , f. *corpus* ovatum crassum petiolo angustiori insidens , subtus corpore illo ovato destitutum. *Antenna* utraque satis pilosa , pilis aculeos mentientibus , quod de pilis quoque pedum & de iis , qui per corpus sparsi sunt , valet. *Pedes* articulis sex constant , quorum duo priores breviores ovati : reliqui longiores , ac teretes ; par pedum quartum reliquis longius , articulo unico

ovato, reliquis longis teretibus, ex quibus penultimum omnium longissimum. *Pedes omnes* apice ungue duplici armantur.

Vitis. 74. A. (de la vigne) ovatus ruber fetosus, pedibus æqualibus sparsim fetosis.

*Hab.* in vite vinifera; currit, ut præcedens, celerrime.

*Desc.* *Corpus* ovatum, magnitudo grani milii. Color scarlatinus, pedibus tamen pallidioribus. *Pedes* extensi, longi, ut in araneis. *Corpus pedesque* pilis rectis longis horrent. Nec hæc species, nec ei simillima species prior thoracem habet, quem *Müllerus* in versione *Linnaei* Germanica describit. Differt insectum præsens a priori solum pedibus. Prior ad basin cujusvis articuli verticillo pilorum cingitur; hoc pilos temere sparsos gerit.

Denticula-75. A. (la dentelée) corpore antice denticulatus.

*Beytr. Zur. nat. p. 125.*

*Hab.* sub ollis hortulanorum.

Testudi- 76. A. (la tortue) abdomine glabriusculo; neus. sub incessu globoso.

*Beytr. Zur. nat. p. 127.*

*Hab.* in terra.

Rubens. 77. A. (le rougeâtre) ruber ovato-oblongus; pedibus subæqualibus.

*Beytr. Zur. nat. p. 40.*

*Hab.* sub musco.

Prægnans. 78. A. (la printanière) ruber globosus aterrimus pedibusque pallidioribus; anticis longioribus.

*Hab. in humo prægnañti primo vere.*

*Desc.* Minimus, invisibilis futurus, nisi late coccineus esset; totus lævis, nullis pilis nec in pedibus conspicuis, nec in antennis, nec in reliquo corpore. Color pedum & antennarum dilutior quam in reliquo corpore.

Musci. 79. A. (de la mouffe) corneus pilosus niger.

*Beytr. Zur. nat. p. 40.*

*Hab. in musco.*

*An Scop. 1071.*

Limacum. 80. A. (des limaçons) limacum.

*Beytr. Zur. nat. p. 13.*

*Reaum. aët. gall. 1710.*

*Hab. in helice pomaria.*

Foliorum. 81. A. (des feuilles) ovatus hyalinus fetosus, pedibus omnibus æqualibus.

*Beytr. Zur. nat. p. 33.*

*Hab. in variarum plantarum foliis per æstatem.*

Putrescen-82. A. (de la fermentation) ovatus hyalinus fetosus, pedibus subæqualibus.

*Beytr. Zur. nat. p. 34.*

*Hab. in terra prægnañte. Copiosus obtinetur, si fæces caffèz misceantur humo & humore excitetur fermentatio.*

Carduelis. 83. A. (du chardonnet) ovatus subhyalinus nigricans nudus, pedibus subæqualibus, omnibus physapodibus.

*Beytr. Zur. nat. p. 38.*

*Hab. in fringilla carduele.*

Coccineus. 84. A. (l'écarlate) ovatus, coccineus; pedibus sex, corpore simplici.

*Scop. carn. 1053.*

*Hab. in insectis variis.*

*Desc. Corpus* ovatum oblongum. *Pedes* longi, filiformes, æque distiti. *Antennæ* longiusculæ apice connivent, ut figuram cordis referant. *Oculi* prominuli, nigri. *Color* insecti scarlatinus, pedibus anticnisque pallidioribus. Magnitudo lendis. Corpus, pedes, antennæ pilis brevibus teguntur.

Observavit celeberrimus *D. Scopoli* insectum hoc, dum quiescit, capiti antennisque inniti; pedibus in partem averfam otiose protensis, quod & nos vidimus. Insecto huic *pedes* tantummodo sex, unde a *Corniolico Plinio* pediculis accenseri sustinuit; ego habitum secutus potius, ad acaros retuli. Et observat *cl. Gæze*, quosdam acaros juniores non nisi provecta aliquantulum ætate pedibus octo instrui. Forte tamen præsens species nunquam plures, quam sex nanciscitur. Vidit illam *cl. Scopoli* in hemerobiis variis, in phryganea quadam, & leptura; vidi ego illam in phryganeis variis & araneis nonnullis, nunquam pedum numerus senarium excessit.

**Sambuci. 85.** *A. ( du furcau ) ruber*, pedibus palpisque pallidioribus, corpore pedibusque fetis longiusculis conspersis.

*Hab. in foliis sambuci nigrae, rarus.*

*Desc. Oculi* duò nigri. *Motus* non festinus.

**Acarorum. 86.** *A. ( des mites ) acarorum.*

*Hab. in acaro crassipede* adulto. Specimen; cui infidebat hæc species magnitudine feminis cheiranthi annui fuit.

*Desc.* hemisphæricus, pallidus, glaber, pilis tantum in corpore aliquot brevibus, in pedibus nonnihil numerosioribus. In secundo *pedum* pari haud procul a basi seta longiuscula. *Pedes omnes* æquales, breviculi. Antice *corpus* minutum, cui setulæ duæ antrotrorsum porrectæ insident divergentes.

Enumerat *Linnaeus* acarum quemdam, quem scabrum vocat; an non eadem species ac *acarus crassipes* acaro *acarorum* infestatus? Certe minutus noster acarus in acaro majori quietissimus, numerosusque adest, ita ut fere duodecim infestum unicum obsideant; nec facile etiam a mortuo discedit, sed cum illo moritur.

**Vegetans. 87. A.** ( la végétante ) crustaceus fuscus marginatus, convexus, subtus planus.

*Lin. addit. ad Syst. n.*

*Hab. in variis coleopteris.*

*Obs.* Licet acari plerique oculis vix sint conspicui, aliis insectis periculosiores experientia constat. Vivipari sunt omnes. In quibusdam cibis diutius asservatis mirifice multiplicantur & non sine periculo cum alimentis in stomachum descendunt; hinc morbi nonnulli contagiosi forsan oriuntur. Scabiei enim, luis venereæ, cujusdam dysentericæ, pestis etiam causæ an injuste judicarentur? V.



# GENUS VII.

## PHALANGIUM. *Pedes* VIII.

*Oculi* verticis duo contigui, duo laterales.

*Frons* antennis pediformibus.

*Abdomen* rotundatum.

Grossipes. 1. P. ( le grossipede ) corpore minuto cylindrico humeris tuberculato, pedibus longissimis. †

*Strom. sondm.* 208. t. 1. f. 16. phalangium marinum.

*Hab.* in mari Norwegico: tardissimum, mytilorum testasque penetrat & exhaurit.

J. G. Konig.

Corpus cylindricum, minutum, articulatum, articulis antice supra tuberculo notatum. Antennæ capitis 2, setaceæ. Os palpis 2, biarticulatis, chelatis. Pedes 8, setacei, longissimi, ut in ph. opilione. Tentacula pectoris 2, filiformia, corpori parallelæ, pone anum patentia, in medio chelata ( unde cancris affinis videtur ). Cauda linearis, angusta. Mirum tam parvum corpus regere tam magnos pedes.

Opilio. 2. P. ( des murailles ) abdomine ovato; subtus albo.

*Scop. carn.* 1122.

*Mouff. inf.* 234. f. 4.

*Aldr. inf.* 602. f. 4.

*Gæd. inf.* 2. t. 49.

*List. Gæd. f.* 143.

— *Angl. t.* 1. f. 35.

*Hæffn. inf.* 2. t. 9.

*Raj. inf.* 39. n. 35.

Brady



*Bradl. nat. t. 24. f. 2.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 10. 3.*

*Sulz. inf. t. 22. f. 140.*

*Geoff. parif. 2. p. 629. t. 20. f. 6.*

*Fab. 2.*

*De Geer. tom. 7. p. 166. n. 1. parietinum*  
corpore ovato, supra griseo - fusco,  
subtus albo.

*Hook. microg. p. 198. t. 31.*

*Enum. n. 1088.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1060.*

*Faun. Fridr. n. 823.*

*Hab. in Europa, America. Nocte vagatur.*  
Oculi 2. Antennæ *Angulosæ. Tenta-*  
*cula 2 longa.*

*Obs. Mas minor. Abdomen brevius.*  
*Brachia pedesque longiora. Ubique*  
*errant, præsertim muros & umbram*  
*amant. V.*

**Cornutum. 3.** P. ( le cornu ) abdomine depresso,  
rostro bicorni, palpis pediformibus.

*Schæff. elem. t. 13. f. 9.*

— *icon. t. 39. f. 13.*

*De Geer tom. 7. p. 173. n. 2. t. 10.*  
*f. 12. - 15. corpore ovato, supra*  
*griseo - fusco fascia nigra, subtus*  
*albo, tentaculis longissimis, chelis*  
*cornutis.*

*Fab. 3. abdomine depresso, mandibula*  
*conica adscendente, palpis pedifor-*  
*mibus.*

*Enum. n. 1089.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1061.*

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 629. n. 1.*  
phalangium abdomine ovato subtus  
albo.

*Hab. in Germania. D. Schreber. In Galliæ*  
*Aust. hortis. V.*

*Corpus depressum. Pedes longissimi ut in*

*ph. opilion.* Rostrum cornibus 2 subulatis parallelis. Palpi pedibus similes, paullo breviores.

Obs. *L.D. Linn.* & *Schrank.* hoc phalangium *Geoff.* ad præcedens retulerunt; sed vere cornutum *Linn.* uti optime observaverunt *DD. Geer, Fabricius*que; a præcedenti brachiis & forcipibus manifeste differt. V.

**Cancroides. 4. P.** (faux-scorpion) abdomine obovato depresso, chelis lævibus, digitis pilosis. *Acarus cancroides. t. II. f. 7.*

*Scop. carn. 1067.*

*It. Œl. 84.*

*Seb. mus. I. t. 70. f. II.*

*Frisch. inf. 8. t. I.*

*Raf. suppl. t. 64.*

*Schæff. elem. t. 38.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 10. 1, 2.*

*Geoff. paris. 2. p. 618. chelifer abdomine lineis transversis.*

*Fab. scorpio 7. abdomine ecaudato, ovato, depresso, fusco.*

*De Geer tom. 7. p. 355. n. I. t. 19. f. 14, 15. chelifer obscure fuscus, corpore ovato depresso, chelis elongatis.*

*Hook. micogr. t. 33. f. 2.*

*Enum. n. 1090.*

*Pod. gr. p. 122?*

*Hab. in umbrosis suffocatis, cellulis mephiticis, victitat termetibus, acaris; retrogradus. Intrans curtim, inde pupula magnitudine pisi dolore summo.*

*Pedes 8 præter antennis cheliferas Syst.*

*Obs. phalangium hoc inter scorpiones ordinavit D. Fab. sed pectines desunt. Genus novum apud DD. Geoff. de Geerque.*

D. Geoff.

D. de Geer.

Chelifer.

Pedes octo.

Pedes 8.

Oculi duo.

Antennæ chelifor-  
mes rostro lon-  
giores.

Antennæ nullæ, che-  
læ 2 parvæ.

Palpi 2 chiliformes  
ad latera capitis.

**Balænarum.** 5. P. ( des baleines ) abdomine dilatato  
muricato, rostro subulato.

*Mart. Spitz.* 85. t. Q. f. d. pediculus ceti.

*Bajter. subf. v. 2. t. 3. p. 146. t. 12. f. 3.*  
pediculus ceti.

*Strom. fœndm.* 209. t. 1. f. 17. phalan-  
gium littorale.

*Brunnich. inf. t. 1. f. 17. . . .* pycnogonum.

*Fab.* pycnogonum 1. palpis duobus cor-  
pore ovato. *It.* Norwag.

*Hab.* in oceano Norwegio sub lapidibus  
*Konig.*

*Simillimus onisco ceti, sed pedes omnes  
pluribus articulis, omnes perfecti, nec  
plures quam octo. Dorsum rubrum plu-  
ribus segmentis; singulis 3 mucronibus.  
Cauda cylindrica, brevissima, trun-  
cata. Rostrum membranaceum, subu-  
latum, longitudine pedum. Genus du-  
bium, facie onisci ceti, rostro a reli-  
quis diversum. Cum solo rostro absque  
maxillis sit, forte aptius acaris aut  
proprio generi subjiendum.*

**Tricarina-** 6. P. ( la tricarene ) abdomine elliptico  
tum. depressio tricarinato, femoribus anticis  
subcristatis.

*Fab.* 6. fuscum abdomine depresso carinato, pedibus anticis ante apicem unidentatis. *Mantiss.*

*Hab.* Dresdæ-Saxonum. *D. Heise.*

Corpus ovale, fuscum, depressum, tricarinatum, incisuris quinque obsoletis: carina una media longitudinalis; una utrinque supra marginem lateralem. Pedes corpore duplo longiores. Femora primi pari sursum dilatata, carina subcrenata.

Corpus magnitudine *P. opilionis*, at depressum, planum, abdominis dorso carinato. Pedes octo mediocres, anterioribus fere palpiformibus ante apicem unidentatis. Reliqui inermes. *Mandibulæ* chelatae, nigrae. *Mantiss.*

*Ex spec. D. Fab.*

**Bilineatum.** 7. *P.* ( le rayé ) pallidum, lineis duabus dorsalibus punctatis atris. *It. Norwag.*

*Hab.* in Norwagiæ rupibus submarinis. Forte mera *ph. opilionis* varietas.

**Diadema.** 8. *P.* ( le diadème ) thoracis tuberculo dorsali elevato spinoso. *It. Norwag.*

*Stoem. aet. Hafn.* 9. 583. t. 6. phalangium corpore ovato, tuberculo thoracis spinoso.

*Müll. zool. dan. prodr. add.* 280. 192.

*Hab.* sub muscis rupium Norwagiæ.

*Desc.* tuberculum dorsale elevatum, apice spinosum, utrinque magno oculo instructum.

**Bimacula-** 9. *P.* ( le bimaculé ) abdomine atro, maculis duabus albis.

*Hab.* in Anglia, Norwagia.

*Desc.* Parvum. Corpus ovatum, atrum.

maculis duabus oblongis albis ad basin abdominis. Linea submarginalis tenuissima, alba. *Abdomen* ungit, *Pedes* elongati, atri.

**Araneoi-** 10. P. ( l'aranéoïde ) chelis dentatis villosis, corpore oblongo.

*Hab.* in Russia meridionali morsu venenato hominibus pecoribusque lethalis.

*Obs.* 1. Genus forte proprium insectum nondum rite examinatum.

*Obs.* 2. Ab araneis phalangia primus distinxit. primusque sub genere proprio condidit *Linn.* anno enim 1758, in edit. *Syst.* decima Holmiæ publicata genus hoc enunciatum fuit : definitio tamen emendanda videtur. Oculis tantum duobus gaudent phalangia, caput & thorax adeo indivisa, ut situs oculorum prorsus sit incertus. Veris antennis frons non armatur abdomenque potius ovale quam rotundatum iudicabitur. Definitio *D. Geoff.* non magis recipienda, ut patet ex *D. Fab.* definitione. *Antennæ*, quantum videre licet, omnino nullæ.

*Larva* octopoda, omnibus partibus completa, imagini simillima.

*Puppa* octopoda, agilis, currens, imagini simillima.

*Victus* & *larvæ* & *puppæ* & *imagine* e rapina aliorum insectorum vermiumque.

*Ova* in locis humidis deponunt.



## GENUS VIII.

ARANEA. *Peles* VIII.

*Oculi* VIII

*Os* unguibus & retinaculis duobus.

*Palpi* duo articulati, masculis genitalibus capitata;

*Anus* papillis textorius

*Diadema*. I. A. ( porte-croix ) abdomine subglobofo  
rubro-fusco, cruce albo-punctata.

*Scop. carn.* 1077, aranea *Linnæi*.

*Mouff. inf.* 233. f. 1.

*Aldr. inf.* 608. f. 9.

*Jonst. inf.* t. 18, f. 17, 16, 20.

*Raj. inf.* 18. n. 2.

*List. aran.* f. 2.

*Frisch. inf.* 7. t. 4.

*Clerck. aran.* 25. t. I. f. 4, 5.

*Fab.* 21.

*De Geer tom.* 7. p. 218. n. I. t. II. f. 4.-8.  
retiaria, abdomine rubro fusco s. rufo,  
tuberculis duobus, cruce dorsali tri-  
plici albo punctata.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 647. n. 10.  
livido rufa, abdomine cruce triplici  
lutea.

*Faun. Fridr.* n. 824.

*Enum.* n. 1091.

*Pod. gr.* 122.

*Hab.* in betulis.

*Desc.* Colore rufo & magnitudine & ovato  
abdomine ab omnibus differt, in dorso

---

*Aranea* insectis pascitur rapinaque vivunt; propriam in speciem  
etiam sibiunt; a sp. egibus & ichneumonibus plectuntur; senes  
tam exuunt; athera scandunt.



abdominis crux alba ex articulis tanquam diadema. *Faup.* 1993.

*Obs.* Araneam à croix papale solus *D. de Deer.* synonymam hujus credidit; in enumeratione contra, aranea diadema ad araneam porte-feuille refertur. In *Systemate* autem uti in *D. Fab.* speciebus *ins. parif.* non citata fuerunt. Ex consensu fere omnium Entomologorum aranea diadema est illa quæ a *Listero* descripta fuit *tit.* 2. *f.* 2. *araneus rufus*, sive *avellaneus*, cruciger cui utrinque ad superiorem alvi partem quasi singula tubercula eminent; pro aranea autem dumetorum, à feuille coupée *D. Geoff.* *list.* t. 1. *f.* 1. *Fab.* citavit. *Araneus subflavus*, alvo præcipue in summa sui parte & circa latera albicante plena, oculis nigris pellucidis in capite albicante t. 1. *f.* 4. & 5. *Clerck.* citaverunt *DD. Linn.* & *D. de Geer*; sed *D. Fab.* t. 1. *f.* 2. ejusd. sed ibi certe error typographicus, ut patet citatione t. 21. *f.* 2. insuper in t. 4. t. 35, 36. *Raf.* delineata picta fuit; aranea igitur diadema *Syst.* & aranea papalis à croix papale *D. Geoff.* una eademque species mihi videtur. *Abdomen* colore, macularum numero, cruce minus magisve distincta variat. In omnibus oculi nigri situ quadragono, oculis lateralibus contiguus. *Brachia pedesque* spinosa, fusco interscita. *Thorax* aqueus, lineola nigricante in medio. V.

Reticulata. 2. A. ( la réticulée ) abdomine globoso reticulato, supra purpurascente fusco-nebuloso. \*

*Hab. in hortis.*

*Desc.* *Corpus* albicans. *Thorax* hyalini coloris; a tergo macula oblonga nigricans; lateribus puncta nigra. *Abdomen* tenuissime reticulatum album, vasis nigricantibus, in dorso nebulosum e fulco & versus latera obscure purpurascens. *Peaes* nigris maculis. *Faun.* 1994.

*Cucurbitina.* 3. A. ( la cucurbite ) abdomine subglobofo flavo, punctis quibusdam nigris. \*

*Raj. inf.* 20. n. 8.

*List. aran.* f. 5.

*Clerck. aran.* 44. t. 2. f. 4.

*Enum.* n. 1092.

*Faun. Fridr.* n. 825.

*De Geer tom.* 7. p. 233. n. 8. t. 14.

f. 1, 2. viridis, punctata, abdomine subglobofo viridi, punctis aliquot nigris, postice macula rufa.

*Schæff. icon.* t. 124. f. 5.

— *icon.* t. 196. f. 6.

*Hab.* in arboribus foliatis, adfidens reti laxo ova obvolventi. In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Thorax* & *pedes* pallidi, linea nigra ad thoracis latera utrinque. *Pedum* articuli spinosi, ad apices omnes nigricantes. *Abdomen* ovatum, viride, utrinque versus unum punctis quatuor nigris & in disco abdominis, versus ejus basin, punctorum 3 paria nigricantia excavata, *Anus* sæpe fulvus. *Faun* 1995.

*Calycina.* 4. A. ( la fleuriste ) abdomine globofo pallido flavescente. \*

*Scop. carn.* 1099. aranea kleynii.

*Faun. Fridr.* n. 826.

*Hab.* in calicibus florum, a corolla

decidua vacuis, apes muscasque mel  
collecturas jugulans.

*Dejc.* Media. *Abdomen* albidum vix mani-  
feste flavescens, supra punctis exca-  
vatis; 1 ad basin; dein 2 pa.va; tum  
2 media. *Thorax* lateribus linea viref-  
cente. *Pedes* longi, ad latera protensi.  
*Faun.* 1996.

**Octopunc-** 5. A. ( la huit ponctuée ) abdomine sub-  
**tata.** rotundo flavo, stigmatibus utrinque  
quatuor nigris, ano rufo.

*Enum. n.* 1102.

*Hab. in* Suecia rete horizontali geometrico.

*Corpus pallidum, excepto abdomine.*

*Obs.* In enumeratione describitur aranea  
quæ in fenestris rete parat perpendicu-  
lare, eadem species videtur. V.

*Desc.* *Abdomen* ovatum. *Thorax* obsolete  
castaneus. *Pedes* albo nigroque varie-  
gati, spinosi. *Abdomen* flavescens,  
punctis impressis octo, per paria dis-  
positis; puncta primi paris subapproxi-  
mata: postremi minutula. Pectus abdo-  
minisque medium subtrus nigra.

**Bipunctata.** 6. A. ( la bipunctuée ) abdomine globoso  
atro, punctis duobus excavatis. \*

*De Geer tom.* 7. p. 255. n. 16. t. 15.

f. I. textoria, nigro-fusca nitida;  
abdomine globoso, punctis excavatis,  
anterior fascia grisea.

*Blanck. inf.* t. 13. B. A.

*List. aran. tit.* 11. f. 11. araneus pullus,  
glaber, domesticus.

*Enum. n.* 193.

*Pod. gr. p.* 3.

*Hab. in* fenestris rete disperso.

*Obs.* A numero punctorum hæc species mi-  
nime est determinanda. *Pedes anteriores*

longiores, quatuor intermedii breviores.  
*Oculi* duo lucidi, alii nigri. V.

*Desc.* *Tota* atra. *Pedes* testacei. *Abdomen* globosum, glabrum, nitidum, punctis duobus non coloratis a tergo in medio impressis notatum, & si probe attendas, aliis adhuc duobus, paullo anterioribus, sed minoribus. A capite per *thoracem* & *abdomen* ducitur linea inter punctorum paria ad anum usque fortissime testacea. *Faun.* 1997.

*Obs.* *Oculi* subæquales in quadrum dispositi sunt duoque utrinque laterales conspicuuntur. V.

**Arundinea** 7. A. ( des roseaux ) abdomine subgloboso albo, maculis dilute fuscis. \*

*Faun. Fridr. n.* 827.

*Hab.* in arundinum paniculis.

*Desc.* Est inter minores generis sui. *Abdomen* albidum maculis fere ut domesticæ, sed dilutioribus & magis distinctis. *Thorax* lividus sive griseus. *Caput* supra canum. *Faun.* 1998.

**Angulata** 8. A. ( l'angulaire ) abdomine ovato, antice lateribus angulato-acuto. \*

*It. Gotl.* 216.

*Clerck. aran.* 22. t. 1. f. 1.

*Fab.* 20. abdomine ovato, antice lateribus angulo acuto, thoracis centro excavato.

*De Geer tom.* 7. p. 221. n. 2. t. 12.. f. 1, 2. retiaria, abdomine ovato nigro, supra tuberculis magnis conicis. *Enum. n.* 1094.

---

*Penes* in palpis, vulvæ ad axillas, ancipitia conjugia, ubi repulsa & peracta, cum periculo vitæ fiant. Palpis clavatis mares sunt, adeoque sexus, nec speciei differentia.

*Scop. carn. n. 1094. aranea Rolandri an?*

*Hab. in arboribus rete perpendiculari.*

*In Gallia Aust. V.*

*Desc.* Maxima, ut pote ultimum articulum pollicis sæpe æquans. Differt ab omnibus figura abdominis, quæ antice quasi bicornis, prominentiis valde distantibus, differt etiam colore abdominis maculato ex albo, luteo & atro. *Pedes* albo & nigro variegati. Rubedo in toto corpore nulla. *Faun. 1999.*

*Obs. 1.* Visum insectum prius perlustrat, it, redit; tandem torrente filorum illud dense involvit; involucrum relinquit quietem captura. Capta nonnulla in recessu quiete; prædam exfugit. *Enum.*

*Obs. 2.* Oculis quadratis, lateralibus distantibus. *V.*

**Domestica. 9. A.** ( la domestique ) abdomine ovato fusco, maculis nigris quinque subcontiguis, anterioribus majoribus. \*

*Scop. carn. 1104. aranea Derhamii.*

*Raj. inf. 27. n. 17.*

*List. aran. 59. f. 17.*

*Clerck, aran. 76. t. 2. f. 9.*

*Fab. 13.*

*De Geer tom. 7. p. 264. n. 10. t. 15.*

*f. 11, 12. vestiaria griseo-fusca, abdomine ovato tomentoso, maculis nigris marmoratis.*

*Enum. n. 1095.*

*Faun. Fridr. n. 828.*

*Hab. in fenestris & domibus frequens.*

*In foribus laxos suspendit aranea casset*  
*Virg.*

*Desc.* Caput & thorax pellucida. Abdomen pallidum, maculis oblongis, transversalibus, longitudinaliter digestis, nigris, quinque, fere contiguis, anticis



latioribus, versus posteriora sensim angustioribus factis. *Faun.* 2000.

3-Lineata. 10. A. ( la trirayée ) abdomine ovato albidō, lineis tribus longitudinalibus punctorum nigricantium. \*

*Faun. Fridr. n.* 829.

*Hab. in nemoribus.*

*Desc. Pedes* lividi, annulis nigris. *Thorax* lividus, linea longitudinali & lateribus nigra. *Abdominis* tres lineæ longitudinales ex punctis nigricantibus concatenatæ. *Faun.* 2001.

Riparia. 11. A. ( des rivages ) abdomine ovato nigro-æneo, ano subluteo bicorni.

*It. Œl.* 145.

*Hab. in littoribus fabulosis, rete horizontali.*

Labyrin- 12. A. ( la dédale ) abdomine ovato fusco;  
thica, linea exalbida pinnata, ano bifurco. \*

*It. Œl.* 251.

*Raj. inf. 27. n.* 18.

*List. aran. 60. f.* 18.

*Clerck. aran. 79. t. 2. f.* 8.

*Fab. 30.*

*Schæff. icon. t. 19. f.* 8.

*Hab.* super terram, tela horizontali cum puteo cylindrico. In Gallia Aust. V.

*Obs.* Rete extendit super gramina pratorum, horizontale, album, margine puteo cylindrico excraffiore rete contexto, in cujus fundo occultatur aranea ab avibus secura radiisque solis minus exposita; quam primum quis tangit rete, mox ex spelunca exit in spem prædæ.

*Desc. Thorax* griseus, lineis tribus pallidis longitudinalibus. *Abdomen* fuscum,



nitidum, linea dorsali exalbida, longitudinali, minima, strias albas oppositas pinnatim utrinque exserens. *Anus* sive cauda duplici furca seu mucronibus, superioribus inferioribus brevioribus, sub abdomine fasciis tribus longitudinalibus pallidis. *Faun.* 2003.

4-Lineata. 13. A. ( la quadrirayée ) abdomine subrotundo flavo, punctis quatuor lineaque utrinque purpurascens.

*Hab.* in Suecia. In Europæ domibus. In Gallia Aust. V.

*Magnitudo media.* Corpus hyalinum. Frons s. area oculorum lutea. Abdomen pallide flavissimum, in medio punctis 4 in quadrangulum dispositis, purpurascens; ad latera utrinque plaga s. linea ferrugineo - purpurea, abdomine brevior.

Redimita. 14. A. ( la couronnée ) abdomine oblongo-ovato flavo, annulo ovali dorsali rubro. \*

*Raj. inf.* 24. f. 12.

*List. aran.* 51. f. 12.

*Frisch. inf.* 10. t. 4.

*Clerck. aran.* t. 3. f. 9.

*Faun. Fridr. n.* 830.

*De Geer tom.* 7. p. 242. n. 11. t. 14.

f. 4.-12. textoria, abdomine oblongo-ovato albo, annulo dorsali rubro.

*Schæff. icon.* t. 64. f. 8.

*Clerck. pl.* 3. t. 9.

*Hab.* in hortis. In foliis arborum plicatis Gallix Aust. V.

*Desc.* *Magnitudo muscæ.* Pedes satis longi, albi, diaphani, anterioribus geniculis nigris instructis. Thorax aqueus. Abdomen sulphureum, a tergo

macula annulari ovata sanguinea, intra quam linea oblonga, fusca, longitudinalis. *Faun.* 2004.

*Obs.* Nidorum amore insignis.

**Corollata.** 15. A. ( des fleurs ) abdomine ovato nigro, annulo dorsali ovali albo. \*

*It. Œl.* 126.

*Clerck. aran.* 124. t. 5. f. 18 ?

*Faun. Fridr. n.* 831.

*Hab.* in plantis.

*Desc.* Tota nigra. Abdomen ovatum; linea alba bifurca includens spatium ovale a tergo abdominis, margine inferiore variis denticellis picto. *Faun.* 2005.

**Fumigata.** 16. A. ( l'enfumée ) abdomine ovato fusco; basi punctis duobus albis. \*

*Clerck. aran.* 104. t. 5. f. 6.

*Fab.* 9.

*Enum. n.* 1098.

*Pod. gr. sp.* 2.

*Faun. Fridr. n.* 832.

*Hab.* in campis; ante nidum larvarum incubans, ad exitum capit unam post alteram, ex fugit, rejicit, aliam prehendit, &c. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Aranea mediæ magnitudinis. Pedes longi. Abdomen oblongum. In dorso, versus basin abdominis, puncta duo alba ovata apicibus longius a se invicem dehiscencia. *Faun.* 2006.

Species araneorum variant ætate sæpe & sexu; senectam exuunt; difficillime perfectæ in museis asservantur; plures itaque videndæ apud Listerum, Albium, Clerckium ( aranei Suecici Holm. 1757. quart.) qui ultra 60 habet. Videas, quam nulli mortalium imitabilis sit illa araneæ textura? quanti operis fila disponere; alia in rectum immissa firmamenti loco; alia in orbem currentia! Nasciitur ars ista, non discitur: Senec.

Montana. 17. A. ( la renversée ) abdomine ovato albo maculis cinereis. \*

*List. aran.* 36. f. 6?

*De Geer tom.* 7. p. 251. n. 13. *resupinæ domestica* textoria, abdomine ovato, maculis lateralibus flavo-albidis, pedibus nigro maculatis.

*Clerck. aran.* t. 3. f. 6.

*Hab.* in arboribus. In domibus Galliarum Aust. V.

*Desc. Abdomen* ovatum, lateribus niveis in dorso e cinereo & albo nebulosum, subtus abdomen cinereum est totum. *Thorax & pedes* pallidi; *anteriores* longi, quos dum tranquille sedet, recta protendit. *Faun.* 2007.

*Obs.* Oculi in quadratum dispositi.

Sanguino- 18. A. ( la sanguinolente ) abdomine ovato lento, coccineo, linea longitudinali atra.

*Hab.* in Hispania. *Fr. Logie.*

*Corpus mediocre, nigrum.* Palpi antice cinerei. Oculi 4 anteriores albidii. Abdomen totum saturatissime coccineum, excepta linea longitudinali & an- nigris.

Notata. 19. A. ( la fasciée ) abdomine ovato fusco; lineis albis transversis arcuatis. \*

*Hab.* in Europa.

*Desc. Abdomen* subglobosum, magnitudine feminis erucæ, supra fuscum, macula ad basin alba subrotunda, dein ovali, tum lineari, demum lineari; utrinque lineæ 4 albæ, recurvæ. *Corpus & pedes* pallidi. *Faun.* 2008.

Rufipes. 20. A ( la rufipede ) abdomine fusco, pedibus rufis.

*Faun. Fridr.* n. 833.

*Hab.* frequentius in urticis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Magnitudo media ; an maior facta colores mutet, me fugit? *Faun.* 2009.

Nocturna. 21. A. ( la nocturne ) abdomine nigro , punctis duobus albis basique lunula alba. \*

*Enum. n.* 1096.

*Hab.* in Europa. In domibus rara.

*Desc.* Magnitudo mediocris. *Tota corpore & pedibus nigra.* In medio dorso *abdominis* puncta duo alba minima vix conspicua, in singulo latere singula ; gibbum anteriorem abdominis lineola alba anterieus cingit in modum lunulæ. *Anus* prominens, compressus. *Faun.* 2010.

Extensa. 22. A. ( la patte-étendue ) abdomine longo argenteo-virescente , pedibus longitudinaliter extensis. \*

*Geoff. parif.* 642. n. 3.

*Raj. inf.* 19. n. 3.

*List. aran.* f. 3.

*Fab.* 1.

*De Geer tom.* 7. p. 236. n. 10. t. 19. f. 1.-4. retiaria , abdomine elongato , griseo-fusco , pedibus longitudinaliter extensis.

*Faun. Fridr.* n. 834.

*Enum. n.* 1097.

*Scop. carn. n.* 1095 aranea *Solandri* an?

*Hab.* in uliginosis , pedibus ad ramos arcte & longitudinaliter extensis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Pedes* lividi. *Abdomen* subtus linea longitudinali atra , utrinque flava , extus grisea , a tergo vero venis nigris. *Faun.* 2011.

*Obs.*

*Obs. 1. Pedes 4 anteriores* antrorsum ,  
*posteriores retrorsum recta* extendens,  
 inde positio singularis valdeque elon-  
 gata.

*Obs. 2. Setæ in aerem fluctuantes* ex his  
 araneis oriuntur.

*Obs. 3. Abdomen sæpe* luteo-virescens. V.

**Fimbriata. 23.** A. ( des marais ) abdomine oblongo  
 nigro, linea utrinque laterali alba,  
 pedibus fuscis. \*

*Clerck. aran. 102. t. 5. f. 9.*

*Fab. 40. nigra* linea laterali alba.

*De Géer tom. 7. p. 278. n. 23. t. 16.*  
*f. 9.-12. aranea lupus,* corpore oblongo  
 fusco, thorace abdomineque fascia  
 utrinque laterali alba, pedibus fuscis.

*Scop. carn. n. 1118. Knorrii?*

*Enum. n. 1098.*

*Pod. gr. sp. 2.*

*Hab. in aquis,* super aquas currens.

*Desc.* Satis magna est. *Pedes* subgrisei  
 sive ex pallido fusci. *Thorax & abdo-*  
*men* nigra, utrinque linea lata nigra,  
 quæ coit ad caudam. *Anus* bifurcus.  
*Palpi* apice globosi & valde magni,  
 hinc mas procul dubio. In *abdomine*  
 supra lineam lateralem albam utrinque  
 ordo longitudinalis punctorum minu-  
 tissimorum alborum. *Faun. 1012.*

*Obs. Inf. paris. n. 15.* solus citavit *D.*  
*Fab.* de synonymia dubitandum aut  
 variat hæc aranea. In *aranea fimbriata*  
 oculi diverse dispositi ac in *aranea*  
*D. Geoff.* insuper puncta abdominis alba  
 non prætermisisset *D. Geoff.*

**Sexpunctata. 24.** A. ( la 6 ponctuée ) abdomine oblongo,  
 punctorum excavatorum paribus tribus. \*

*Fab. 35.*

*Enum. n. 1100.*

*Pod. gr. p. 123.*

*Faun. Fridr. n. 835.*

*Hab. in sylvis acerosis. In Galliæ Aufst. foliis pini abietisque. V.*

*Desc. Inter majusculas numeranda est. Thorax cinereus. Abdomen ovato-oblongum, teretiusculum, pilis glaucis, aliis rarioribus nigris; in tergo abdominis tria paria punctorum excavatorum conspiciuntur. Faun. 2013.*

**Bimacula-25. A.** ( la bimaculée ) abdomine subrotundo castaneo, punctis duobus albis.

*Hab. in Europa.*

*Corpus pulice minus, totum castaneum s. obscure testaceum. Abdomen ovatum, depressiusculum, inæquale, maculis 2 albis, anteriore majore ex binis punctis albis connatis; posteriore fere minore, etiam e binis punctis albis conflatis.*

**Quadri-26. A.** ( la quadripunctuée ) abdomine oblongo nigro, punctis quatuor excavatis. \*

*It. Œl. 34.*

*Fab. 23. abdominis dorso plano nigro, punctis excavatis quatuor.*

*Hab. in fenestris. In Gallia Aufst. V.*

*Desc. Thorax fuscus. Abdomen nigrum, pilis cinereis. Pedes ferrugineo-fusci. Anus appendiculis 5 vel 6 subulatis truncatis. Faun. 2014.*

**Holoferi-27. A.** ( la fatinée ) abdomine ovato-oblongo holofericeo, basi subtus punctis duobus flavis. \*

*Raj. inf. 31. n. 23.*

*List. aran. 71. f. 23.*

*De Geer tom. 7. p. 266. n. 20. t. 15.*



f. 13.-16. griseo - murina, abdomine ovato oblongo villoso, basi subtus maculis binis flavescens.

*Faun. Fridr.* n. 836.

*Enum.* n. 1101.

*Hab.* in Europa, infra folia convoluta plantarum. In Galliæ Aust. domibus subque arborum cortice.

*Desc.* Corpus totum, caput, pedes, thorax fusco-livida, hirsuta; pedes insuper pilis adspersi. Forceps oris robusta. Abdomen ovato-oblongum, atrum; holosericeum s. impalpabili hirsutie tectum, apice duobus appendiculis truncatis; sub abdomine juxta basin duo tubercula flava adeoque A. aquaticæ simillima, sed dimidio minor & terrestris longeque minori forcicula oris. *Faun.* 2015.

*Obs.* Fœmina mare major pedesque longiores.

Senoculata, 28. A. (à fix yeux) oculis tantum senis.

*Lisl. aran.* 74. f. 24.

*Raj. inf.* 32. n. 24.

*Fab.* 49. abdomine virescente, lateribus flavis.

*Scop. carn.* 1119. Hombergii?

*De Geer tom.* 7. p. 258. n. 18. t. 15.

f. 5.-10. textoria, abdomine ovato-oblongo griseo, fascia longitudinali laciniosa fusca, thorace fusco.

*Faun. Fridr.* n. 837.

*Hab.* in Europa. In Germaniæ & Galliæ Aust. hortis. *Fab.* V.

*Desc.* Caput, thorax & pedes pallide ferruginea. Pedes tertii paris breviores, reliqui æquales. Abdomen virescens, linea laterali flavicante, punctis quinque nigris. Puncta quatuor nigra

dorso impressa & infra hæc maculæ quatuor pallidæ, obsoletæ. *Anus sanguineus. Fab.*

*Obs.* Singulare quod sex oculis tantum gaudeat hæc aranea. Primus hanc observavit *Lister*. Similem aut eandem memoravit *Homberg ađ. acad. parisi.* 1707. Hujus speciei forceps longa crassaque. *Mas* fœmina minor pedesque longiores.

\* \*

*Tarentula.* 29. *A.* ( la tarentule ) subtus atra, pedibus subtus atro fasciatis.

*Bagliv. Tarentula ( monographia ).*

*Bocc. mus.* 1. p. 101. t. 2. tarentula.

*Bradl. nat.* t. 24. f. 10.

*Olear. mus.* 21. t. 12. f. 4.

*Fab.* 45. abdominis dorso maculis trigonis nigris, pedibus nigro maculatis.

*Hab.* in Italia, imprimis in Apulia, Barbaria, Oriente.

*Corpus cinerascens.* Oculi 8 : horum 2 majores, rubri, frontis; 4 ordine transverso sub prioribus versus os; 2 remotiores in tergo. Thorax cinereus, divisus in areas nigras, ad centrum concurrentes. *Maxillæ, pectus, femorum basis ventrisque anterior pars subtus atra. Tibiæ omnes cinereæ, subtus nigro fasciatæ. Abdomen helvolum, supra nigro fasciatum.*

*Rabida sub canicula morfu excitat famosum tarantismum musica medendum.*

*Species hujus plures sistunt auctores; quæ accuratius inquirendæ, & distinguendæ, cum colore diversæ forte etiam specie differant.*

---

*Aranæe sua nent, plurimæ retia, diversa diversis, nec simplicia, quibus piscantur insecta, imprimis teneiora; at ultima \* \* sua ducunt tantum prout incedunt per integram vitam.*

*Obs.* Quot de hujus araneæ morfu fabulæ narrantur ! V.

Scenica. 30. A. ( la parée ) faliens nigra , lineis semicircularibus tribus albis transversis.\*

*List. aran.* f. 31.

*Raj. inf.* 37. n. 31.

*Bradl. nat.* t. 24. f. 5

*Clerck. aran.* 117. t. 5. f. 13.

*Geoff. paris.* 2. p. 650. n. 16.

*Fab.* 42.

*De Geer tom.* 7. p. 287. n. 27. t. 17.

f. 8. - 10. aranea - phalangium ( albo fasciata ) nigra , abdomine oblongo , fasciis tribus transversis semicircularibus.

*Schæff. icon.* t. 44. f. 11.

*Enum.* n. 114.

*Faun. Fridr.* n. 838.

*Hab.* in parietibus. In arborum truncis , prope Lugdunum frequens. V.

*Desc.* Supra nigra , grisea infra. *Thorax* linea alba marginatus , maculis tribus albis in triangulum dispositis. *Abdomen* tribus fasciis albis transversis fere semicircularibus , in dorso fere interruptis. *Pedes* nigri pilis albis , inde grisei apparent. Saltat saltuque prædam rapit. Oculorum unum par ita minutum , ut vix ope lentis visibile.

*Obs.* Nidum ovale construit.

Truncorum. 31. A. ( des troncs ) faliens nigra , dorso punctis albis.

*Scop. carn.* 1115. an ? Olearii ?

*Enum.* n. 1105.

*Hab.* in parietibus , truncis.

*Desc.* *Saltatrix.* Oculorum par tertium minutissimum. *Oculi* primi paris magni , iride lutea. Supra insectum coloris est

cinerei. *Pedes primores*, crassi. *Antennarum* clavæ subtus adpendiculatæ.  
Enum.

Rupestris. 32. A. ( des pierres ) saliens , abdominis macula nigra , margine rubra , medio alba. \* 1106.

Enum. n. 1106.

Hab. in parietibus , lignis.

Desc. Macula dorsalis ovalis nigra margine rubra & in centro sive medio alba. Faun. 2019.

Aquatica. 33. A. ( l'aquatique ) livida , abdomine ovato , linea transversa punctisque duobus excavatis. \*

Clerck. aran. 143. t. 6. f. 8.

Geoff. parif. 2. p. 645. n. 7.

Fab. 32. fusca , abdomine ovato cinereo , dorso fusco , punctis duobus impressis.

De Geer tom. 7. p. 303. n. 33. t. 19. f. 5.-13. aquatica f. nigro-fusca.

Mémoires pour servir à l'histoire des araignées aquatiques. Paris , 1749.

Faun. Fridr. n. 839.

Hab. in aquis Europæ dulcibus , urinaria. Hybernat in vacuis cochleis , quas rete artificioso claudit. In Gallia Aust. V.

Desc. Est inter maximas generis sui. Tota livida sive fusco-pallida. Abdomen ovato-oblongum , cinereum , ano obtuso seu truncato , duobus appendiculis ; a tergo gibbum , versus basin linea excavata transversa notatum & sub hac duobus punctis excavatum. Pedes longi ; tibiæ versus basin velut geniculatæ. Oris forceps omnium araneorum nostrarum maxima , nigra , dura , hians , sæpe mordens , at arripiens objecta ; verbo ,

oris forcipe omnino tarentulam referens. Hinc si quæ alia, hæc certe venenata, ex colore, structura, figura oris, &c. *Faun.* 2020.

*Obs.* 1. Non supra aquam sed in & sub aqua habitat. *Linn.*

*Obs.* 2. *Mas* foemina major. Dum natat, argentea adparent thorax abdomenque, atmosphæra enim aerea has partes tegit. Campanulam sericeam in aquis habitat; sed aeream & in qua non pervenit. Artificio mirabili anum extra aquas extendit, bullam aeream ano adhærentem in aquas ducit, dein in campanam ex qua aqua necessario egreditur. *D. de Geer.*

**Saccata.** 34. A. ( la porte-fac ) abdomine ovato ferrugineo fusco.

*List. aran.* 82. f. 28.

*Frisch. inf.* 8. t. 2.

*Fab.* 38.

*Enum.* n. 1107.

*Scop. carn.* 1116. aranea Lyonetti.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 650. n. 15.  
tota cinereo villosa, thoracis linea triplici alba.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1084.

*Hab.* in terra, circumferens ubique saccum suum ovorum.

*Desc.* Color multum variat, sed *thorax* supra longitudinaliter pallidior est. Ad angulum basæos *abdominis* superne fasciculus pilorum alborum antrorsum porrectus. *Enum.*

**Palustris.** 35. A. ( des prés marécageux ) abdomine oblongo nebuloso, lineis lateralibus albis. \*

*Fab.* 31. fusca, thorace abdomineque utrinque linea nivea.

*Scop. carn.* 1093. aranea Listeri an?

*Faun. Fridr. n.* 844.

*Hab.* in paludibus cespitosis exsiccatis, affinis *A. jaccata*. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Thorax aliis niger, aliis utrinque linea alba longitudinaliter notatus. Abdomen nigrum, maculis nigerrimis quasi nebulosum. *Faun.* 2023.

*Obs.* Affinis *A. fimbriata*, at oculorum situ omnino differt. Apex thoracis ante oculos terminatur linea nivea. *Fab.*

Virescens. 36. *A.* ( la verdâtre ) abdomine oblongo flavo-viridi, lineis lateralibus albis. \*

*Jonst. inf. t.* 18. f. 42.

*Enum. n.* 1108.

*Faun. Fridr. n.* 841.

*Hab.* in hortis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Oculi octo nigri viridesve, æquales, parvi. Color virescens; linea diaphana longitudinalis per totum corpus aut obscurior. Sæpe hæc species candida est. Objecta insecta absque filis necat & devorat. *Enum.*

Viatica. 37. *A.* ( la voyageuse ) abdomine subrotundo plano obtuso, pedibus quatuor posticis brevissimis. \*

*Raj. inf.* 35. n. 29.

*Frisch. inf. 7. t.* 5.

*Clerck. aran.* 128. t. 6. f. 5.

*List. aran.* f. 29.

*Geoff. paris.* 2. p. 641. n. 1.

*Fab.* 12.

*De Geer tom.* 7. p. 301. n. 31. t. 18.

f. 23, 24. *cancroides*, grisea s. fusca, abdomine ovato plano, fascia laterali nigro-fusca lineaque albida.



*Schaff. icon. t. 189. f. 7.*

*Enum. n. 1109.*

*Faun. Fridr. n. 842.*

*Hab. in arboribus, lignis, ovis incubans.*

*Desc. Corpus* breve, depressum. *Maris abdomen* griseum, maculis fuscis, *fœminæ* luteo-fuscum, in utroque sexu linea alba lateraliter marginatum. *Oculi* nigri.

**Lævipes. 38.** A. ( la tigrée ) abdomine rhombeo depresso, pedibus transversaliter extensis variegatis. \*

*Frisch. inf. 10. t. 14.*

*Fab. 16.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 3.*

*De Geer tom. 7. p. 302. n. 32. t. 18.*

*f. 25. cancröides*, abdomine obtuso plano albido, maculis nigris, pedibus quatuor posticis brevioribus.

*Hab. in truncis, parietibus.*

*Desc. Cinerea*, mediæ magnitudinis. *Abdomen* rhomboides s. depressum, pone rotundatum, ano acutiusculo. *Pedes* transversim expanduntur, remotiusculi, fusci; annulis albis; filum sæpe post se trahit. *Pedes* 2, 1, 3, 4 longitudine se excipiunt. *Faun. 2025.*

*Ex Entom. Carn.*

**Reaumurii. 39.** A. ( la Réaumur ) abdomine subrotundo, turgido valde, albido, lateraliter flavescente, supra tredecim paribus punctorum nigrorum impressorum, subtrus unico.

*Hab. in Europa, in folio inulæ helenii convoluto.*

*Desc. Maxima*, ventricosa, ventre crasso post mortem crepante, subviloso.

*Papillæ* nigræ. *Thorax* lineis tribus fuscis.

*Pedes* pallidi, geniculis nigris. Immerfa spiritui vini, vixit decem minuta.

*Palpi* A. *diadematis*.

Swammer-40. A. (la Swammerdam) fuscescens, thorace abdomineque albis pilis marginatis, pedibus longis, tibiis testaceo-fasciatis.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* Facies aranæ *Frisch. inf. 12. t. 13*, sed oculi laterales non disjuncti. *Abdomen* ovatum cum thorace villosum, margine linea repanda albida, in medio foveis rotundis nitidis binis. *Femora antica* longiora tota fusca; alia basi testacea. *Pedes* *antici* unicam & lineam unam longi.

Raji. 41. A. (la Rai) abdomine ovato fusco; maculis didymis dorsalibus & quinque aliis in singulo latere flavis.

*Hab.* in Europæ arboribus.

*Desc.* Rete laxum obliquum, cui loco putei est folium ab aranea convolutum. *Palpi* articulis pluribus. *Thorax* fulvus. *Abdomen* quatuor fere lineas longum, tres crassum; basi subtus arcu flavescente maculisque duabus flavis clavatis. *Pedes* fulvo fuscoque varii.

Leuwen-42. A. (la Leuwenhoeek) fusco-rufa, hoekii, abdomine ovato, supra ad basin macula ovata fusca, subtus ibidem pari uno punctorum albidorum.

*Hab.* in Europæ gramineis, primo vere.

*Desc.* *Palpi* æquales. Corpus totum lineas  $3\frac{1}{2}$  longum. *Thorax* fuscescens. *Pedes* fusco-rufi.

Aldrovan-43. A. ( l'Aldrovande ) fulva, abdomine  
di. subrotundo, fovearum paribus quinis,

fasciis quatuor fuscis, una interrupta.

*Hab.* in Europæ collibus, inter frutices.

*Desc.* *Palpi* æquales. *Abdomen* lin. 2  
longum, prope basin lineis binis  
arcuatis, obliquis, oppositis, albidis.  
Puncta impressa infident fasciis inte-  
gris, quibus contiguum est punctum  
luteum.

Redii. 44. A. ( la Redi ) rufa, abdomine ovato,  
fasciis sex fuscis, primis duabus remo-  
tioribus punctoque albo in medio  
signatis.

*Hab.* in Europæ sylvis.

*Desc.* *Palpi* æquales. *Abdomen* lig. 1  $\frac{1}{2}$   
longum, basi lineam latum, *subtus*  
punctis duobus albis posticis.

Merianæ, 45. A. ( la Mérian ) fusca, abdomine  
ovato, pedibus pallidioribus, fusco  
fasciatis punctatisque.

*Hab.* inter Europæ muscos, præsertim  
hypnum complanatum.

*Desc.* *Abdomen* lineam cum dimidia lon-  
gum, parvis villis pubescens. *Thorax*  
pedibus concolor. *Palpi* æquales, fusco  
fasciati vel punctati. *Femora* versus  
genua fasciis duabus, versus basin  
nonnullis punctis fuscis. *Tibiæ* fasciis  
quatuor fuscis.

De Geeri. 46. A. ( la de Geer ) abdomine albido el-  
liptico, fasciis arcuatis flavis lineisque  
tribus nigris.

*Hab.* in Europæ plantis.

*Desc.* *Thorax* cornei coloris, margine  
laterali fusco. *Palpi* æquales. *Abdo-*  
*men* duas lineas vix longum, superne

lineolis tribus parvis anticis quatuor-  
que lateralibus obliquis, *subtus* nigro-  
flavoque varium. *Pedes* pilosi, colore  
thoracis.

Frischii. 47. A. ( la Frisch ) flavicans, abdomine  
ovato, punctorum nigrorum paribus  
quinque sub marginalibus.

*Hab.* inter Europæ corylos, Majo M.

*Desc.* *Thorax* concolor pedibus sordide  
flavescentibus. *Palpi* clavati. *Abdomen*  
viridi-luteum, punctis binis pallidio-  
ribus in dorso medio, *subtus* apice  
macula rubra notato. *Variat* thorace  
lateribus margine fusco, *pedibus* fulvis  
articulis nigris, *tibiis* fascia nigra.

Rœselii. 48. A. ( la Rœsel ) thorace rufescente,  
linea media dorsali & lateribus albidis,  
abdomine oblongo supra nigricante,  
punctorum albidorum albescentium ob-  
soletorum paribus quatuor.

*Hab.* in Europæ graminibus.

*Desc.* *Palpi* æquales. *Paſilla* textoriæ  
superiores longiores. *Pedes* fusces-  
centes.

*Obs.* Rete parat horizontale, puteo obli-  
quo longo ad terram usque producto,  
cui cadavera concredit.

Gœdartii. 49. A. ( la Gœdart ) fusca, abdomine  
ovato, lateribus albidis, pedibus rufis  
fusco fasciatis.

*Hab.* in Europæ pratis.

*Desc.* Non confundenda cum A. *hypno-*  
*rum*, hujus enim rete perpendicu-  
lare est.

Albini. 50. A. ( l'Albin ) abdomine ovato nigro,  
linea alba laterali, pedibus rufis.

*Hab. in Europæ ericetis.*

*Desc. Palpi æquales, punctum rufum ad basin abdominis inter extremitates linearum albarum lateralium conniventes. Rete horizontale, sparsum, absque puteo. Aranea sub reti in medio quiescente.*

*Obs. Aranearum species luridæ, ingratae nec adhuc rite determinatæ. Varietates, metamorphosis & sexus plures adhuc reducendæ, at nomen viri de scientia bene meriti in Entomologia deleatur; nomina enim hæc trivialia minime placent. Fab.*

Clerckii. 51. A. ( la Clerck ) abdomine subrotundo, duobus paribus punctorum impressorum.

*Hab. in Europa, inter folia plantarum.*

*Desc. Duas lineas longa. Palpi æquales. Abdomen villosulum, subtus ad lentem sublividum.*

Malpighii. 52. A. ( la Malpighi ) palpis clavatis petiolatis, petiolo abdominis longitudine, maxillis longis, falcatis, tenuibus.

*Hab. in Europæ domibus.*

*Desc. Oculi medii antiqui protuberantes. Abdomen ovatum fuscum, villosum, punctis 4 albidis, obsolete, longitudinalinem facientibus. Pedes villosi, pallidiores, geniculis fuscis.*

Schæfferi. 53. A. ( la Scheffer ) fusco-rufa, thoracis abdominisque lateribus albidis.

*Hab. in Europæ gramineis.*

*Desc. Palpi æquales. Abdomen oblongum, subtus fusco-ferrugineum, superne paullo obscurius, linea albida a basi ad apicem excurrente. Pedes fuscescentes, pilosi; postici lineas 8.-9*

longi. *Oculi* seriei posticæ majores omnes.

Mouffeti. 54. A. ( la Mouffet ) abdomine cylindrico subargenteo, linea media fusca, lateribus luteis.

*Hab.* in Europa, inter frutices.

*Desc.* *Thorax*, *pedesque* testacei. *Palpi* clavati. *Maxillæ* longæ, crassæ. *Abdomen* pallide argenteum, lineis lateribus repandis aquosissime luteis: idem in medio lineam impressam habet, cui antice incumbit alia transversa crucem faciens.

Forskælii. 55. A. ( la Forschael ) cinerascens, abdomine ovato, macula lanceolata nigra, thorace antice rugis tribus.

*Hab.* in apricis collibus Carniolæ Superioris.

*Desc.* *Oculi* medii seriei posticæ valleculis plicarum impositis. *Palpi* æquales.

Petiverii. 56. A. ( la Pétiver ) nigra, abdomine ovato.

*Hab.* in Europæ herbidis sylvestribus. Martio M.

*Desc.* *Palpi* æquales. *Abdomen* basi planiusculum foveola notatum.

Osbekii. 57. A. ( l'Osbek ) albida aut lutea, abdomine punctorum impressorum paribus duobus & tribus cum impare majore ad basin.

*Enum.* n. 1110.

*Hab.* in umbellis angelicæ - archangelicæ & heraclei sphondylii.

*Desc.* Hæc deorsum se demittens, *pedes* longiores expansos & deflexos tenet, cæteros vero contractos; eadem vitæ



adeo tenax, ut acu transfixa vixerit a die 27 Julii ad 6 Septembris. Habitus A. *Calycinæ*, sed colores diversi. *Abdomen* subtus inter papillas & basin sex paribus punctorum exiguorum impressorum.

Kalmii. 58. A. ( la Kalm ) fuscescens, abdomine ovato, lateribus fasciisque abruptis albis.

*Hab. in Europæ sylvis.*

*Desc. Palpi clavati. Dorsum lineis duabus albidis postice coeuntibus. Irritata retroit ut cancer.*

Hasselqui- 59. A. ( l'Hasselquist ) virens, abdomine  
tii. albo-luteo, lateribus fuscescentibus.

*Hab. in Europa, in cortice pruni hortensis, M. Aprili.*

*Desc. Palpi æquales. Oculi nigri. Abdomen ovatum. Tibiæ punctis nigris piliferis.*

Udmani. 60. A. ( l'Udmann ) flava, abdomine fulvo.

*Hab. in Europa. Inter frutices; rarior.*

*Desc. Abdomen ovatum lineam longum.*

Jonstoni. 61. A. ( la Jonston ) thorace pedibusque testaceis, maxillis longis, crassis nigris, abdomine oblongo subfusco.

*Hab. in sylvestribus Carniolæ.*

*Desc. Oculi medii antici majores. Abdomen villosum, subtus pallidius, supra punctis binis impressis.*

Wilkii. 62. A. ( la Wilkes ) cinereo nigroque varia, pedibus cinereis, nigro annulatis.

*Enum n. IIII.*

*Hab. in Europæ herbidis collibus ;  
Aprili M.*

*Desc. Thorax* antice macula laterali utrinque nigra. *Palpi* nigro annulati, æquales. *Abdomen* ovatum, paribus tribus punctorum nigrorum & fulco antice exaratum.

Roberti. 63. A. ( la Robert ) abdomine oblongo villoso fusco-rubro, basi subtus punctis binis flavescens.

*Hab. in Europæ pratis.*

*Desc. Palpi* æquales.

Sloanii. 64. A. ( la Sloane ) nigra, abdomine subrotundo rubro, macula media lanceolata nigra.

*Pod. gr. p. 123. aranea chrysops.*

*Hab. in Europa, circa hortos & agros.*

*Desc. Palpi* clavati. *Abdomen* petiolo brevissimo nitido. *Tibiæ* supra obscuro quodam rubore tinctæ, subtus nigræ. Statura A. *saccijeræ*. Hæc una cum fororibus, palpos continuo movet, inquieta, antice retroque incedens, saltu ab hoste fugiens, rete non extruens; in saxosis habitat.

Catesbæi. 65. A. ( la Catesby ) tota cinerea pubescens, thoracis dorso fusco, abdomine ovato fusco, lineis dorsalis binis longitudinalibus albis.

*Hab. in muris siccis, s. saxosis prata sepientibus.*

*Desc. Stratura* prioris. *Palpi* æquales. *Abdomen* subtus fordide flavum. *Papillarum* regio nigra.

Rumphii. 66. A. ( la Rumphius ) griseo fuscoque varia, abdomine elliptico, linea albida

albida dorsali , margine utrinque dentata.

*Hab. in Europæ truncis arborum.*

*Desc. Caput* inter oculos fulvum, subtus fulvis pilis. *Abdomen* barbatum subtus ad latera fuscum.

Margravii. 67. A. ( la Margrave ) corpore fusco ; palpis pedibusque nigris, lineis duabus transversis albis palpos inter & oculos.

*Hab. in Europæ plantis.*

*Desc. Minor prioribus. Palpi* clavati. *Oculi* virore aliquo tincti. *Abdomen* ovatum, immaculatum, absque foveis.

Blancardi. 68. A. ( la Blancard ) thorace abdomineque pallide rufescentibus, utriusque margine albo, pedibus albo nigroque variis.

*Hab. in Europæ sylvis.*

*Desc. Thorax* antice & lateribus albus ; postice niger. *Abdomen* ovatum, subtus ad latera nigricans.

Joblotii. 69. A. ( la Joblot ) nigra, abdomine fascia femoribusque rufis.

*Hab. in Europa.* In convolutis foliis latet per totam hiemem. Reperi etiam in cotyla glandis tela tecta sub qua latebat.

*Desc. Statura & habitus formicæ minoris. Palpi* clavati, clava pilosa oblonga. *Abdomen* oblongum lucidum subtus fascia pallidiore villosa. *Femora* pallide rufescentia.

Podæ. 70. A. ( la Poda ) fusco - rufa, maxillis crassis, nitidis, nigricantibus, abdomine ovato, in uno sexu superne albido maculato.

*Hab. in Europa. Currit per herbida loca, non infrequens.*

*Desc. Stratura A. Saccata. Palpi æquales. Corpus villosum. Abdomen subtus pallidum.*

*Ex oper. D. de Geer.*

Aurantio- 71. A. ( l'orangée ) retiaria, abdomine  
maculata. globoso flavo, venis fuscis maculisque aurantiis magnis foliaceis. *tom. 7. p. 222. n. 3. t. 12. f. 16, 17.*

*Clerck. aran. t. 1. f. 6.*

*Hab. in falice.*

*Desc. Oculi quadrati, duobus utrinque separatis. Caput, thorax, pedes, brachia griseo-alba, maculis strigisque obscuris. Thorax subtus niger. Abdomen aurantium, lineolis fuscis hastatum, macula rubro aurantia longitudinali laterali maculisque rubris dorsalibus.*

Quadrima- 72. A. ( la quadrimaculée ) retiaria, abdomine  
culata. globoso, virescente f. rufo, dorso maculis quatuor magnis plurimisque minoribus niveis. *tom. 7. p. 223. n. 4. t. 12. f. 18.*

*List. aran. t. 27. f. 8.*

*Clerck aran. t. 1. f. 3.*

*Hab. in Europa. Frequens in Junioribus pinis. Rete verticali.*

*Desc. Caput, thorax pedesque grisea, nigro maculata. Thorax supra fasciis tribus longitudinalibus nigris. Abdomen virescens vel cinereo-Margaritaceum, maculis quatuor albis in quadrum dispositis, anterioribus propioribus. Inter has maculas, aliæ minores albæ longitudinaliter ordinatæ. Oculi nigri in quadrum dispositi, lateralibus fere con-*

tiguis. *Pedes* intermedii breviores ;  
*antici* omnibus longiores.

Cicatrico- 73. A. ( la cicatrisée ) retiaria , abdomine  
 fa. globofo , nigro-fusco , punctis griseis ,  
 dorso maculis excavatis nigris. *tom.* 7.  
*p.* 225. *n.* 5. *t.* 12. *f.* 19.

*Hab.* in Europæ muris.

*Desc.* Inter maximas numeranda. *Thorax*  
 fuscus. *Abdomen* maculis excavatis ni-  
 gris , macula postica nigra diffecta ,  
 subtus in medio macula magna nigra ,  
 strigis lateralibus griseis nigrisque. *Pedes*  
 albido nigroque alternatim maculati.

Tubercu- 74. A. ( la tuberculée ) retiaria , abdomine  
 lata. fusco , nigro alboque variegato , tuber-  
 culis binis dorsalibus convexis. *tom.* 7.  
*p.* 226. *n.* 6. *t.* 13. *f.* 1.-15.

*Hab.* in Europa. In Gallia Aust.

*Desc.* *Abdomen* supra tuberculis magnis  
 duobusque minoribus , tubercula inter  
 & anum plicatum. Nidi ovato-globosi ,  
 filo sericeo suspensi.

Conica. 75. A. ( la conique ) retiaria grisea , tho-  
 race nigro , abdomine postice conico ,  
 maculis binis laciniatis fuscis. *tom.* 7.  
*p.* 231. *n.* 7. *t.* 13. *f.* 16.-20.

*Hab.* in Europæ sylvis.

*Desc.* *Thorax* nitidus , niger. *Abdomen*  
 maculis undisque fuscis , in parte antica  
 gibbum , postice acuminatum. *Oculi*  
 nigri , lateralibus non contiguis. *Papillæ*  
 textoriæ nigræ ultra conum positæ.

Fusca. 76. A. ( la brune ) retiaria fusca , maculis  
 nebuloso - nigris , abdomine ovato ,  
 pedibus longissimis maculatis. *tom.* 7.  
*p.* 235. *n.* 9. *t.* 11. *f.* 9.

*Hab. in Europa. In latrinis Galliæ Aust. non rara. V.*

*Desc. Abdomen marmoratum subtus, fasciis duabus longitudinalibus sulphureis. Pedes fulvo nigroque variegati, primi quatuor longissimi; postici minus longi; 5 & 6 breviores. Tacta, pedes abdomen contra applicat. Maris abdomen parvum & elongatum. Oculi æquales.*

Refupina- 77. A. ( la renversée sauvage ) textoria, sylvestris. abdomine ovato, maculis fasciisque angulatis fuscis albisque, pedibus im-maculatis. *tom. 7. p. 244. n. 12. t. 14. f. 13.-22.*

*Hab. in Europæ cespitibus, pinis, juniperis. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Parva. Thorax rufescens, linea longitudinali nigra antice furcata, aliaque utrinque laterali nigra. Abdomen ovato-globosum, maculis fasciisque dissectis albis fuscisque, subtus nigricans, lateraliter album maculis fuscis irregularibus. Pedes anteriores omnibus aliis longiores. Oculi ut in præcedentibus; quinque in macula nigra positi. Mas foemina diversus.*

Viridissima. 78. A. ( la verte ) textoria viridis, abdomine oblongo, flavescente. *tom. 7. p. 252. n. 14. t. 18. f. 6.-16.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 4.*

*Hab. in Europa, in foliis betulæ capta. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Tota, abdomine excepto, viridis. Thoracis latera luteo marginata. Abdomen luteo-virescens, linea longitudinali viride laminaque squamosa nigra in foeminæ genitalibus. Oculi*



pilis albis cincti, transverse positi duas lineas formant. *Posteriores* anterioribus majores.

Atrox. 79. A. (l'atroce) textoria, abdomine ovato fusco, supra macula nigra oblonga flavedine cincta. *tom.* 7. *p.* 253. *n.* 15. *t.* 14. *f.* 24.

*List. aran. tit.* 21. *f.* 21. nigricans prægrandi macula nigra in summis clunibus, cæterum iisdem imis oblique virgatis.

*Hab. in* Europæ murorum cavitatibus. In Gallia Aust. V.

*Desc. Thorax* fuscus. *Abdomen* basi macula nigra parallelogrammatica sulfureo-albido cincta. *Pedes antici* longiores; 5, 6 breviores. *Oculi* lunares, lunula inferiori sex composita, duobus aliis superioribus. *Mas* fœminæ fere similis.

Albo- 80. A. (la 8-maculée) textoria, nigro-  
Maculata. fusca, abdomine globofo, fascia angulata maculisque octo albis. *tom.* 7. *p.* 257. *n.* 17. *t.* 15. *f.* 2.-4.

*Hab. in* Europa. In ripis maris Baltici sub lapidibus capta.

*Desc. Abdomen* fere sphæricum, maculis octo albis inæqualibus; 3, 4 majores, lateribus albo dentatis.

Rufo- 81. A. (la fasciée) abdomine elongato,  
fasciata. griseo-fusco, fascia longitudinali undata rufa, pedibus longissimis. *tom.* 7. *p.* 269. *n.* 21. *t.* 16. *f.* 1.-8.

*Schæff. icon.* t. 172. *f.* 6.

*Hab. in* Europæ sylvis.

*Desc. Caput* fere trigonum. *Thorax* rotundatus, antice truncatus, cinereus,

linea longitudinali flava lateraliter marginata. *Abdomen* obtuso-conicum, in medio macula elongata undata, luteo-fulva, striga fusca marginata. *Tota* pilosa. *Pedes* longissimi. *Oculi* 4 in quadrum inæquale dipositi. Quatuor alii lineam ante quadrum formant. Non textoria.

Littoralis. 82. A. ( des rivages ) abdomine ovato nigro pedibusque griseo maculatis. *tom.* 7. *p.* 274. *n.* 22. *t.* 15. *f.* 17.-23.

*List. aran. t.* 25. *f.* 25.

*Clerck. aran. t.* 4. *f.* 7.

*Hab.* in Europæ locis humidis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Nigra. *Thorax* abdomenque maculis griseis punctisque albis pilosis. *Thorax* lineis tribus longitudinalibus griseis. Saccus ovorum ano ligatus.

Marginata. 83. A. ( la bordée ) corpore oblongo fusco, pedibus viridibus, thorace abdomineque fascia utrinque laterali alba. *tom.* 7. *p.* 281. *n.* 24. *t.* 16. *f.* 13.-15.

*Clerck. aran. t.* 5. *f.* 1.

*Hab.* in Europæ plantis arboribusque.

*Desc.* *Thorax*, *abdomen* elongato-ovatum, fascia alba lateraliter nigra, marginata. *Pedes* crassi griseo virides.

Ruricola. 84. A. ( la campagnarde ) corpore ovato griseo-fusco obscuro, thorace abdomineque antice fascia longitudinali rufescente. *tom.* 7. *p.* 282. *n.* 25. *t.* 17. *f.* 1, 2.

*Clerck. aran. t.* 4. *f.* 11.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* *Thorax* lateraliter rufescens. *Fascia*

rufescente in medio. *Abdomen* antice simili fascia acuminata, lateraliter maculis parvis rufescentibus marmoratum. *Pedes* fusci, *femoribus* fasciatis. *Papillæ* textoriæ acuminato-elevatæ.

Pini. 85. A. ( du pin ) aranea-phalangium, griseo-nigra, abdomine punctis duobus albis, pedibus fuscis nigro maculatis. *tom.* 7. *p.* 285. *n.* 26. *t.* 17. *f.* 3.-7.

*List. aran. tit.* 32. *f.* 32.

*Clerck. aran. t.* 5. *f.* 11.

*Hab. in Europæ pinis.*

*Desc.* Griseo-nigra. *Thorax* caputque fere quadrata. *Abdomen* ovatum, hirsutum, subtus fasciis tribus longitudinalibus nigris. *Pedes* breves, crassi.

Grossipes. 86. A. ( la crassipede ) nigra, capite antice lineis transversis albidis pilosis, pedibus anticis crassioribus. *tom.* 7. *p.* 290. *n.* 28. *t.* 17. *f.* 11.-14.

*List. aran. tit.* 33.

*Clerck. aran. tit.* 6. *f.* 1.

*Hab. in Europæ sepibus.*

*Desc.* Nigra. *Caput thoraxque* ovata supra depressa. *Abdomen* lateraliter fuscorufum. *Pedes* antici aliis longiores, *femoribus* crassis, *tibiis* crassiusculis.

Formica- 87. A. ( la fourmi ) aranea - phalangium, rufa, capite magno nigro, abdomine oblongo rufo, fasciis nigris maculisque binis albis. *tom.* 7. *p.* 293. *n.* 29. *t.* 18. *f.* 1.-5.

*List. aran. tit.* 34.

*Hab. in Europa.*

*Desc.* *Caput* prominens, nigrum. *Thorax* fuscus capitis longitudine; sed minus latior. *Abdomen* petiolatum, fusi-

forme. *Pedes posteriores* longiores ; 4 & 5 breviores. *Oculi* nitentes parabolicam lineam formant.

Citrea. 88. A. ( la citronée ) aranea-cancroides , lutea , abdomine subrotundo plano , fascia utrinque rubra , pedibus quatuor posticis brevissimis. *tom.* 7. *p.* 298. *n.* 30. *t.* 8. *f.* 17.-22.

*Geoff.* *tom.* 2. *p.* 642. *n.* 12. *t.* 21. *f.* 1. citrino-lutea , pedibus quatuor posticis brevissimis , abdomine utrinque fascia ferruginea.

*Clerck.* *aran.* *t.* 6. *f.* 5.

*Schæff.* *icon.* *t.* 19. *f.* 13.

*Hab.* in Europæ arboribus.

*Desc.* Incessus cabronum. Luteo-citrina. *Abdomen* breve rotundatum , supra depressum , striga rubra laterali non ultra medium protensa. *Pedes* quatuor posteriores aliis tenuiores brevioresque. *Oculi* ignei in lunula positi.

*Obs.* Variat. *Abdomen* aliquoties totum citreum s. absque strigis rubris.

*Ex spec. D. Fab.*

Latens. 89. A. ( la cachée ) atra , abdomine cinerascens , linea dorsali atra interrupta. *Hab.* in Anglia , latitans sub parvo reticulo in foliorum pagina superiori.

*Desc.* Parva. *Caput* & *thorax* atra pubescentia. *Abdomen* basi gibbum , ovatum , tomento cinereo vestitum , linea dorsali atra , postice latiori , interrupta. *Pedes* atri. *Oculi* in duas lineas ordinati.

Signata. 90. A. ( la marquée ) virescens , thoracis lateribus abdominisque lineis duabus nigris.

*Hab. in nemoribus Kiloniensibus.*

*Desc.* Parva. *Caput* virescens, atomis aliquot nigris. *Thorax* itidem virescens, lateribus superne late nigris. *Abdomen* globosum virescens, utrinque linea lata e maculis quatuor transverse nigris, quæ tamen lineæ nec basin nec apicem abdominis attingunt. *Papillæ* textoriæ prominent. *Pedes* virides, punctis nigris.

Nigrita. 91. A. ( la négresse ) atra, abdomine subtus punctis duobus testaceis.

*Hab. in Saxonia.*

*Desc.* Media. *Corpus* atrum, nitidum, glabrum. Puncto duo testacea *subtus* ab basin abdominis. *Pedes* apice pallidi. *Oculi* ut in priori.

Globosa. 92. A. ( la globuleuse ) nigra, abdomine lateribus sanguineis.

*Hab. in pratis Lipsiensibus.*

*Desc.* *Corpus* parvum, nigrum. *Abdomen* globosum, lateribus sanguineis, dorso nigro, in medio fascia interrupta alba.

Horrida. 93. A. ( l'horrible ) abdomine subtriangulari, apice truncato, retuso, pedibus quatuor anticis longioribus.

*Hab. in Lipsiæ hortis.*

*Desc.* Major, singularis structuræ. *Latera frontis* parum elevata. *Corpus* fuscum. *Thoracis* dorsum argenteum cingitur linea alba. *Abdomen* triangulare, basi angustum, apice multo latius, truncatum & valde retusum. *Anus* subabdomine elevatus, albus. *Latera abdominis* rugosa. *Pedes* quatuor anteriores duplo longiores, fusci, *tibiis* albo annulatis; *postici* virescentes.

Dorsata. 94. A. ( la hâlée ) viridis , abdominis dorso fulco.

*Hab. in nemoribus Kiloniensibus.*

*Desc.* Parva. *Caput* , *thorax* & *pedes* viridia , immaculata. *Abdomen* ovatum , subtus pallidum , supra fuscum , limbo pallescente.

Impressa. 95. A. ( l'imprimée ) nigra , abdomine ovato , punctis sex impressis , subtus punctis duobus flavis.

*It. Norwag.*

*Hab. in Norwagiæ rupibus.*

Tricuspi- 96. A. ( la convergente ) virescens , abdomine albo , ano rufescente.

*Hab. in Lipsiæ hortis.*

*Desc.* *Caput* , *thorax* & *pedes* virescentes. *Oculi* , imprimis laterales , elevati. *Abdomen* ovatum , album , ano rugoso , rufescente. Linea longitudinalis abbreviata & duæ obliquæ laterales rufæ , quæ in medio abdominis fere coeunt.

Marmora- 97. A. ( la marbrée ) fusca , abdomine ovato fusco , alboque variegato.

*Clerck. aran. t. I. f. 2.*

*Hab. in Europa* , nidum in fruticibus & graminibus struens attractis insectorum cadaveribus.

*Desc.* A. *diademati* valde affinis. *Corpus* magnum fuscum. *Abdomen* glabrum , variegatum. *Pedes* fusci , geniculis nigris.

Trigutata. 98. A. ( la triponctué ) flavescens , abdomine nigro , maculis tribus albis.

*Hab. in Alsatia* , capta tempore autumnali in foliis Viburni. *Prof. Hermann.*

*Desc.* *Caput* & *thorax* flavescencia , im-



maculata. *Abdomen* ovatum, postice acutiusculum, subholofericeum, nigrum, in medio tribus punctis albis, quæ fere fasciam constituunt. *Pedes* flavi, tertii paris brevissimi.

Scorpifor- 99. A. ( la scorpiforme ) nigra, abdomine albicante, lineis duabus, pedibus quatuor anticis longissimis.

*Hab. in* Lipsiæ hortis laterigrada.

*Desc.* Parva, nigra. *Frons* parum rufescit. *Abdomen* ovatum, glabrum, albicans, lineolis duabus sinuatis, abbreviatis, nigris. *Pedes* antiqui quatuor reliquis duplo longiores, nigri, albo annullati. *Postici* brevissimi, virides.

Carnifex. 100. A. ( la meurtrière ) ferruginea, abdomine cinereo, linea dorsali fusca.

*Hab. in* Angliæ nemoribus.

*Desc.* Media. *Caput* ferrugineum, maxillis atris. *Thorax* ferrugineus, lævis, glaber, margine parum flavescens. *Abdomen* subrotundum, cinereum, linea dorsali lata, fusca. *Subtus* utrinque macula baseos flava. *Pedes* pallidi.

Dorsalis. 101. A. ( la dorsale ) atra, thorace linea dorsali alba.

*Hab. in* Anglia.

*Desc.* Parva, atra. *Thorax* compressus, linea dorsali alba. *Abdomen* ovatum, atrum, basi parum albicans. *Pedes* lividi.

Pubescens. 102. A. ( la cotonneuse ) abdomine ovato fusco, maculis quatuor cinereis, posticis majoribus.

*Hab.* Lipsiæ.

*Desc.* Media. *Corpus* pubescens, fuscum,

cinereo variegatum. *Abdomen* ovatum, dorso fusco, maculis quatuor cinereis distinctis, posticis majoribus. *Palpi* pilosi. *Oculi* secundi paris minutissimi.

**Cinerea.** 103. A. ( la cendrée ) abdominis dorso fusco, punctis octo cinereis.

*Hab.* ad littora sinus Kiloniensis.

*Desc.* Media. *Maxillæ* cineræ, unguibus nigris. *Oculi* quatuor inferiores minutissimi, quatuor superiores multo majores. *Thorax* cinereus, immaculatus. *Abdomen* ovatum, dorso obscuro, punctis quatuor parium cinereis, minutissimis. *Pedes* cinerei fusco annulati, *femoribus* immaculatis.

**Myopa.** 104. A. ( la myope ) virescens, abdominis dorso sanguineo.

*Hab.* in prædio Eckhoff. prope Keel.

*Desc.* *Caput & thorax* pallide virescentia, maxillis apice nigris lineisque duabus dorsalibus thoracis obscurioribus. *Abdomen* ovatum, pubescens, supra dorso sanguineo, punctis aliquot nigris, lateribus flavescens, immaculatis. *Papillæ* textoriæ apice nigræ, virescentes, *tibiis anticis* apice nigris.

**Longipes.** 105. A. ( la longipede ) atra, abdomine cylindrico fusco, punctis sex impressis, pedibus longissimis.

*Hab.* in Australasia. *Mus.* D. Banks.

*Desc.* *Corpus* magnum, atrum. *Mandibulæ* dentatæ, apice unguiculatæ. *Palpi* basi ferruginei, apice nigri. *Abdomen* cylindricum fuscum, punctis trium parium dorsalibus impressis nigris. *Pedes*, imprimis anteriores, elongati nigri.

Scopulo- 106. A. ( des écueils ) abdomine fusco, linea dorsali pinnata alba.

*It. Norwag.*

*Hab. in rupibus Norwagiæ submarinis.*

*Ex Enum.*

Goezenii. 107. A. ( la Goézen ) saltatoria nigra, abdomine ovato, fronte alba.

*Hab. frequens in arbuſtis.*

*Desc.* Abdomini ovato duo puncta impressa. *Pedes antici* cæteris crassiores & longiores; reliqui successive crassiores & longiores gracilioresque evadunt. Oculorum situs parabolicus.

*Ex Faun. Fridr.*

Chelata. 108. A. ( la chéliforme ) abdomine thoraceque nigro linea dorsali alba, brachiis cheliformibus nigris.

*Hab. in Europa passim.*

Brachia- 109. A. ( la difforme ) abdomine oblongo obscuro, thorace luteo, brachiis capitatis, pedibus anticis longis.

*Hab. in Europa, in fruticibus.*

*Ex Inf. paris. Entom.que paris.*

Fasciata. 110. A. ) la fasciée ) fusca, thorace lineis quatuor obliquis fuscis, abdomine tribus transversis albis.

*Hab. in Europæ hortis.*

*Desc.* *Corpus* fuscum hirsutiusculum. *Thorax* lineis quatuor duabus mediis prope caput divergentibus, lateralibus obliquis. *Abdomen* fuscum, tribus lineis albis, transversis, undatis a medio

ad apicem. Quatuor *pedes anteriores* posterioribus duplo longiores.

**Intersecta. III. A.** ( l'entrecoupée ) nigra , abdomine ferrugineo-flavo lineis transversis contiguis nigris , pedibus fusco ferrugineoque intersectis.

*Hab. in Europæ agris.*

*Desc.* Nigra. *Abdomen* luteo-rufum , subtus fasciis nigris transversis approximatis , in medio coeuntibus. *Pedes* 5 , 6 breviores fusco rubroque variegati.

**Foliata. II2. A.** ( la porte-feuille ) pallida , abdomine folium longitudinaliter extensum pallide nigrum referente.

*Hab. in Europæ pratis.*

*Desc.* Pallida. *Thorax* pallidior. *Abdomen* fascia longitudinali nigricante , marginibus undata foliumque referente , subtus linea longitudinali nigra lineaque lutea utrinque. *Pedes* quatuor anteriores , longiores ; 5 , 6 breviores.

**Dumeto- II3. A.** ( des buissons ) livido-rufa , abdominis pictura foliacea nigra , luteo intersecta , pedum annulis nigris.

*List. aran. t. I. f. I.* araneus subflavus , alvo præcipue in summa sui parte & circa latera albicante plena , oculis nigris pellucidis in capite albicante.

*Hab. in nemoribus.*

*Desc.* Pallido-rufa. *Abdomen* folio nigro marginibus piceato , superne maculis plurimis luteis , in medio lutescente albido intersecto , subtus nigrum , lunulis duabus flavis cornubus sese invicem spectantibus anumque involventibus. *Pedes* annulis nigris. *Oculi* octo , licet sex primo intuitu conspiciui.

Longipes. 114. A. ( la longipede ) pallido-rufa , abdomine palleſcente , punctis nigris.

*Hab. in Europæ arboribus.*

*Deſc. Thorax* pallide fulvus , lateribus obſcurioribus. *Abdomen* ovatum , luteum , baſi punctis nigris , apice faſciis tranſverſis. *Pedes* longi , tenues , ſpinoli ; 5 , 6 breviores.

Vittata. 115. A. ( la bandelette ) pallida , abdomine ovato flavo , faſcia longitudinali coccinea.

*Hab. in horti regii cupreſſo.*

*Deſc. Thorax pedesque* pallidi. *Abdomen* citreo-luteum ſupra faſcia longitudinali coccinea , ſubtus ſtriga nigra longitudinali nigro medio anguſtata.

Phalan- 116. A. ( la phalangiöide ) fuſco-flaveſcens ,  
gioides. pedibus longis corpore triplo longioribus.

*Hab. in Europæ domibus.*

Marmora- 117. A. ( la déchiquetée ) livido-rufa , abdominis pictura foliacea ſæpius interrupta , pedibus nigro maculatis.

*Hab. in Europæ plantis , filum horizontale conſtruit.*

*Deſc. Fœminæ abdomen* luteſcens , ſupra folium nigrum referens ſuperne truncatum apice lineis tranſverſis ſectum. *Oculi* inæquales. *Maris abdomen* medio ruſum , folio integro , luteo marginato , lineis duabus tribuſve luteis ſecto. *Oculi* æquales. In utroque ſexu *pedes* pallidi , annulis nigris.

Lupus. 118. A. ( le loup ) tota fuſca fuliginea.

*Liſt. aran. p. 78. t. 1. f. 26.*

*Hab. in arvis. Non textoria.*

*Desc.* Fuliginosa. *Pedes posteriores* aliis longiores. *Oculi* 4 majores, 4 minores nigri uti forceps.

*Ex nost. Mus.*

Monilige-119. A. ( la porte-anneau ) nigra, abdomine supra croceo, pedibus annulis albis. t. II. f. 8.

*Hab. in agris.*

*Desc.* Singularis hæc species. *Thorax* niger scaber, gibbus. *Abdomen* supra croceum, punctis quatuor f. maculis 4 ovatis nigris impressis. *Pedes* quatuor primi atrii, nitido-sericei, annulis albis variegati. *Postici* quatuor rubescentes, annulis albis interfecti. *Oculorum* situs parabolicus. Affinis A. *Sloanii*. Saltat.

Punctoria. 120. A. ( la dangereuse ) rufa, pedibus pallidis, forcipe punctoria. t. II. t. 9.

*Hab. in Europa.*

*Desc.* *Oculi* nigri. *Thorax* nitido-rufus. *Abdomen* subtus basi flavum. *Pedes* pallidi: *antici* longiores. *Forceps* nigra valida, valde punctoria. Antidotum alkali-fluor. *Oculi* quatuor in quadratum, duo laterales utrinque obliqui, coaliti.

Annularis. 121. A. ( l'annulaire ) rubra, abdomine hirsuto, lineis duabus undatis nigris, tibiis nigro annulatis.

*Hab. in Europa.*

*Desc.* Inter maximas nostratum. *Thorax* rubellus, pilis incumbentibus tectus. *Abdomen* pilis griseis densis vestitum, lineis duabus nigris undatis longitudinalibus. *Pedes* in hac specie crassissimi. *Anteriores* & *postici* longiores; 5 & 6 breviores.



breviores. *Femora omnia* livida, annulo nigro lato versus apicem cincta.

**Furcata. 122. A.** ( la fourchue ) thorace linea furcata nigra lineolisque duabus nigris, abdomine basi luteo.

*Hab.* in Europæ sepibus.

*Desc.* *Thorax* diaphanus, linea furcata nigra basi versus oculos protensa, lineola nigra utrinque ante oculos laterales. *Abdomen* basi virescente luteum, rubro maculatum, postice rugosum. *Subtus* linea lata fusca, a brachiis ad anum extensa; pars abdominalis luteo marginata. *Pedes* 4 anteriores longiores: omnes punctis nigris variegati.

*Obs.* Nec est *D. de Geer. aranea resupina sylvestris*.

**Umbratica. 123. A.** ( la délicate ) abdomine margaritaceo, punctis sex impressis.

*Clerck. aran. t. 1. f. 7.*

*Hab.* in Europæ umbrosis. In carpinis circa Lugdunum.

*Desc.* *Magna. Thorax* in medio fuscus. *Abdomen* margaritaceum, spatio in medio lato, linea nigra undata circumdato, punctis sex impressis excavatis; *subtus* linea lata nigra quæ sub thorace fere furcata est. *Pedes* 5, 6 breviores.

**Lineata. 124. A.** ( la rayée ) nigra, thorace nigro, abdomine nigro tribus lineis albis, pedibus rufis.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* *Tota*, exceptis pedibus, nigra. *Thorax* lucidus. *Abdomen* duabus lineis lateralibus unaque in medio albis,

punctis sex excavatis longitudinalibus.  
*Pedes* rufi.

*Obs.* In plurimis speciebus puncta sex reperiuntur excavata; nomen igitur triviale *sex-punctata*, non characteristicum. *Oculi* quadrati, lateralibus contiguus; nec est aranea *trilineata* Syst.

**Formosa. 125.** A. ( la belle ) capite thoraceque sericeo-argenteis, abdomine supra flavo, argenteo nigroque cincto, pedibus variegatis. t. II. f. 10.

*Hab.* in Europa. In Gallia Aust.

*Desc.* Inter magnas numeranda. *Caput*, *thorax*que sericeo-argenteo alba. *Abdomen* ellipticum fasciis lineisque versicoloribus supra cinctum: 1°. area argentea antica linea nigra in duas areas divisa; 2°. fascia lutea antice posticeque nigro marginata; 3°. area argentea, lineola nigra in medio; 4°. semiannulus luteus utraque parte nigro marginatus; 5°. area argentea; 6°. fascia lateraliter attenuata; 7°. fascia lutea; 8°. fascia argentea quam sequitur argus niger, dein fasciola nigra. In parte postica lineolæ quatuor a medio abdominis ad anum divergentes. *Anus* lateraque abdominis sericeo atra. *Abdomen* subtus rufescens, in medio nigrum, fasciis duabus longitudinalibus luteis. *Oculi* quadrati, nigri lucidi, lateralibus coalitis. *Pedes* pallide flavescens, nigro variegati. Nidus ellipticus, petiolatus, mira arte constructus, follium inutiliter in aere suspensum non in fauste imitans.



## GENUS IX.

SCORPIO. *Pedes* VIII, insuper *Chelæ* 2 frontales.

*Oculi* VIII, horum 3 ad latus utrumque thoracis ;  
2 in tergo.

*Palpi* II, cheliformes.

*Cauda* elongata, articulata, terminata mucrone arcuato.

*Pectines* duo subtus, inter pectus & abdomen.

Europæus. 1. S. ( l'Européen ) pectinibus 18-dentatis ;  
manibus angulatis. *M. L. U.* 429. \*  
t. II. f. II.

*Mouff. inf.* 204.

*Aldr. inf.* 577.

*Raj. inf.* 9.

*Ræf. inf. suppl.* 66. f. 1, 2.

*Schæff. elem. t.* 113.

*Sulz. inf. t.* 23. f. 150.

*Fab.* 5.

*De Geer tom.* 7. p. 344. n. 5. t. 41.  
f. 5. - 8. octonoculus fuscus, pecti-  
nibus octodecim dentatis, manibus  
elongatis, digitis filiformibus, cauda  
corpore longiore, aculeo basi mucro-  
nato.

*Scop. carn.* 1122.

*Enum. n.* 1113.

*Pod. gr. t.* 122.

*Maupertuis. Mém. de l'Acad. des Scienc.*  
ann. 1731. t. 16. f. 3.

---

*Scorpiorum arma foraminibus 3 scatent.*  
*Genere hoc unica Suecia feliciter caret.*

*Hab.* in Europa, maxime Australi: Tergesti innocuus *Enum.* In Gallia Aust. in Italia, &c.

*Desc.* Oculi duo crassi elevati nigri; sex alii transverse dispositi. Chelæ supra angulatæ, ad modum angustæ. Caudæ nodii sex supra concavi, subtus convexi, ultimo ovali pungente. Cauda sub aculeo mucronata.

*Obs.* 1. Scorpionum oculorum numerus variat, nempe modo 8, modo 6. Pectines in eadem specie numero variant. Cauda in omnibus articulis sex, quorum quinque primi membranis juncti, caudam mobilem flexibilem reddunt. Aculeus curvus, acutissimus sextum articulum terminat. Prope apicem duo foramina lente conspiciuntur, e quibus liquor diaphanus in plagam jaculatur. *Fæminæ* viviparæ. Insectum ferox in progeniem sævit. Vulnus vitandum, licet antidotum vulgare. V.

*Obs.* 2. Pectines huic tantum generi proprii inter abdomen & pectus adhærent. Numero dentium differunt, sed usus adhuc plane latet. *Fab.*



## GENUS X.

CANCER. *Pedes* VIII, ( 10 f. 6 raro ) insuper manus 2 chelata.

*Oculi* II, distantes, plerisque pedunculati, elongati, mobiles.

*Palpi* II, cheliferi.

*Cauda* articulata, inermis.

\*a\* BRACHYURI *Thorace lævi lateribus integerrimo:*

Mutus. 1. C. ( le muet ) brachyurus, thorace lævi integerrimo, margine antico transverso brunneo.

*Fab.* 2.

*Hab.* in Mari Mediterraneo. An Europæus?

*Testa* lævis, antice truncata, margine brunneo, postice complanato-truncata; lateribus integra. *Chelæ* læves, carpis unidentatis, brachiis subtus denticulatis.

Pisum. 2. C. ( l'orbiculaire ) brachyurus, thorace orbiculato lævi integerrimo obtuso, cauda corporis amplitudine.

*Fab.* 5.

*Pennant. brit. zoot.* 4. t. 4. f. 1.

*Herbst. cancr.* 2. 95. 15. t. 2. f. 21.

*Hab.* in Barbaria. E. Brander. In Mari Mediterraneo. *Fab.* An Europæus?

*Corpus* magnitudine pisi, undique læve, convexum. *Rostrum* nullum nulla que crenatura. *Cauda* obtusissima, ad os usque tegit totum abdomen. *Chelæ*

*oblongiusculæ digitis æqualibus. Pedes inermes, laves, ungue acuto.*  
*Obs. Corpus fere orbiculatum.*

Hexapus. 3. C. ( l'exapode ) brachyurus, thorace orbiculato lævi integro, pedibus senis, antennis corpore longioribus.

*Baster. subsf. . . p. 26. t. 4. f. 3. cancer thorace lævi orbiculato subdepresso, chelis validioribus, antennis longissimis, pedibus posticis minutioribus.*

*Fab. 14.*

*Herbst. cancer. 98. 19. t. 2. f. 40.*

*Hab. in Oceano Europæo.*

*Thorax convexiusculus, antice inter oculos 3-fidus medio emarginato. Chelæ laves. Pedes præter chelas tantum sex.*

Minutus. 4. C. ( la nourrice ) brachyurus, thorace lævi integerrimo subquadrato, margine acutiusculo, antennis brevissimis. *Mus.*

*Ad. Fr. 1. p. 8.*

*It. Wgoth. 137. t. 3. f. 1.*

*Sloan. Jam. 2. t. 245. f. 1.*

*Gron. zoop. 962.*

*Balm. iter. 2. p. 143.*

*Osbeck. iter. 307.*

*Baster. subsf. 2. p. 26. t. 4. f. 12. cancer thorace lævi orbiculato, pedibus hirsutis.*

*Scop. carn. 1133. cancer nutrix.*

*Fab. 8.*

*Pennant. brit. zoot. 4. t. 1. f. 2.*

*Herbst. cancer. 2. 110. 30. t. 2. f. 32.*

*Hab. in Oceano Europæo & pelagi fucos natante, super aquam cursitans.*

*Desc. Cancris hujus descriptionem hanc communicavit R. P. Wulsen. Si expansus, non longior quam latitudo unguis humanis pollicis; si caudam supra*



ventrem incurvet, uti solet, vix dimidiam latitudinem unguis humani pollicis æquat, & tunc fere rotundus est. Cauda reipsa reliquo corpore longior, sed supra ventrem reclinata, more cancrorum brachyurorum, quibus etiam habitu similis. *Cauda* est ellip-toidica, futuris sex, mediis latioribus & longioribus; subtus concava, supra convexiuscula, rotundata, obtusa, mollis, apice non foliaceo, sed circulariter fere rotundo. *Thorax* subrotundatus, lævis, supra convexiusculus, magnitudine lentis. *Pedes* utrinque tres tantum numeravi. *Manus* chelatae, *chelis* inflatis, latere interiore prope basin villosis. *Digit*i subæquales, latere interiore prope sinum uno dente instructi. *Oculi* sunt puncta duo parva nigra in anteriore thoracis margine. *Antennæ* minimæ capillaceæ. Infra caudam, quæ totum subtus tegit corpus, utrinque sex setæ, versus basin longiores. Autoptæ affirmant ostreis majoribus cibum offerre, admitti a concha apertis valvis. *Scop.*

Longicornis. 5. C. ( la longicorne ) brachyurus, thorace orbiculato lævi chelis minore, antennis longissimis.

*Gron.* 100p. 968. *AÆ. helv.* 5. p. 363. t. 5. f. 447.

*Baster. subf.* 2. p. 26. t. 4. f. 3.

*Seb. mus.* 3. p. 42. t. 17. f. 14.

*Fab.* 13.

*Pennant.* 100t. brit. 4. t. 1. f. 3.

*Herbst. cancer.* 2. 89. 20. t. 2. f. 23.

*Hab. in* Zealandia. In Oceano Europæo, Australi. *Fab.*

*Ex Mantiss. D. Fab.*

Granarius. 6. C. ( le grain ) thorace ovato lævi integerrimo, fronte cuspidata, oculis cylindricis. *Mantiss. tom. 1. n. 13.*

*Herbst. cancr. 2. 107. 18. t. 2. f. 28.*

*Slabbers. microsc. t. 18. f. 1.*

*Hab. in Europæ aquis.*

*Desc. Minutus, vix granum tritici magnitudine superat. Antennæ longæ.*

Puillus. 7. C. ( le nain ) thorace lævi quadrato integerrimo tarsi unidentatis.

*Herbst. cancr. 2. 112. 31.*

*Hab. in Oceano Boreali. An Europæus?*

*Desc. Statura omnino C. minuti, at quadruplo minor. Totus pallidus depressus.*

\*b\* *Brachyuri thorace lateribus inciso.*

Rhomboi- 8. C. ( le rhomboïde ) brachyurus, thorace des. lævi lateribus antice unispinosis, fronte truncata.

*Barrel. rar. t. 1287. f. 1.*

— t. 1286. f. 1, 2.

*Fab. 20.*

*Herbst. cancr. 1. 84. 5. t. 1. f. 12.*

*Sulz. hist. inf. t. 31. f. 4.*

*Hab. in Mari Mediterraneo. An Europæus?*

Pelagicus. 9. C. ( de l'Océan ) brachyurus, thorace lævi utrinque unispinoso, fronte sex-dentata, manibus multangulo-prismaticis. \*

*Obs. iter. 307. C. manuum articulis omnibus dentatis, extimo heptagono.*

---

Canceri perennes, quotannis deponunt crustam senectamque exuunt laboriose. Resupinata femina coeunt genitali duplici. Branchias sub thorace elevando fovant, ut monoculi. Ova sub cauda adherentia racematim gerunt, visitant plantis, cadaveribus, vivisque animalibus.

*Gron. zoop.* 956. \*

*Rump. mus. t.* 7. *f.* R.

*Brown. Jam.* 421. *t.* 41. *f.* 2.

*Seb. mus.* 3. *t.* 20. *f.* 9.

*Fab.* 22.

*Herbst. cancr.* 161. 68. *f.* 56. 57. vix tamen differre videtur.

*De Geer tom.* 7. *p.* 427. *t.* 26. *f.* 8. thorace lato utrinque unispinoso, lateribus utrinque octo dentatis, fronte dentata, manibus elongatis multangulis, pedibus posticis dilatato foliaceis.

*Valent. ind. vet. & nov. tom.* 3. *p.* 417. *n.* 226.

*Hab. in pelagi universi orbis fuco natante.*

*Desc. Thorax* magnitudine insignis, latior quam longus, lævis, punctis minimis, pallido maculatus, dentibus utrinque 8 inter oculos & spinam lateris. *Rostrum* inter oculos brevissimum, dentibus 5, intermedio depresso. *Cauda* inflexa aphylla, articulis 4, quorum 1 brevissimus, latissimus, 2 maximus basi utrinque dilatatus. *Brachia* thorace longiora, latere antico aculeis validis angulata, subprismatica. *Manus* angulata, prismatica, basi spina unica, ad digitum duabus. *Digitus* rectus, longitudine manus, introrsum inæqualiter dentatus. *Pollex* similis digito. *Pedes* inermes octo. *Digit*i solitarii (3 primorum parium) ensiformes s. lanceolati, stria 1. s. 2. *Digitus* ultimi s. 4ti. paris ovatus, membranaceus, reliquis latior. *M. L. U.* 434.

**Nucleus. 10. C.** ( la noix ) brachyurus, thorace lævi globofo, antice utrinque unidentato, postice rostroque bidentato.

*Fab.* 24.

*Herbst. canc.* 2. 87. t. 2. f. 14.

*Hab.* in M. Mediterraneo ad littora Barbariæ. *E. Brander.* E littoribus Hispaniæ nobis missus. V.

*Statura* C. craniolaris, magnitudo glandis, color flavus. Thorax rostro bidentato, & ad postica thoracis margo obsolete bidentatus, at supra pedes posticos dens validior conicus. Cauda glaberrima. Brachia antica punctis eminentibus adspersa. Ungues acuti. Cauda subrotunda, glaberrima. Manus læves, digitis longis, filiformibus, æqualibus, ciliatis.

Mœnas. II. C. ( le fou ) brachyurus, thorace leviusculo utrinque quinquedentato, carpis unidentatis, pedibus ciliatis, posticis subulatis. *M. L. U.* 436. \*

*Scop. carn.* 1123.

*It. Wgoth.* 173.

*Rumph. t.* 6. f. 0.

*Pet. amb. t.* 1. f. 5.

*Baster. subs.* 2. p. 19. t. 2.

*Gron. zoop.* 955. \*

*Fab.* 25.

*Hab.* in Oc. Europæo, Asiatico.

*Desc.* Thorax convexus, subinæqualis, suborbiculatus, postice angustior, scaber. Margo anticus rotundatus acutus. *Serratulæ* 5, validæ, subæquales, utrinque pone oculos. *Rostrum* inter oculos oblitteratum, dentibus quinque. *Cauda* inflexa, aphylla articulis sex, quorum omnes lineares, nec tertius litteram T refert ut in C. *pelagi.* *Brachia* brevia, inermia. *Carpi* unidentati. *Manus* ovata, lævis, convexa. *Pollex* latere angulis duobus

obtusis. *Digiti* recti. *Pedes* teretiusculi, inermes. *Digiti* subulati, striati. Postremus digitus lanceolatus, acuminatus, nec ovatus. *M. L. U.* 436.

Depurator. 12. C. ( l'élargi ) brachyurus, thorace lævi utrinque subquingudentato, manibus apice compressis, pedibus posticis ovatis.

*Mus. Ad. Fred.* 1. p. 85. cancer caninus. \*

*Scop. carn. n.* 1124.

*Gron. zoop.* 954.

*Barr. ic.* 1287. f. 2. cancer ramipes.

*Rond. pisc.* 565. cancer latipes.

*Planc. conch.* 34. t. 3. f. 7.

*Seb. mus.* 3. t. 18. f. 9.

*Fab.* 26.

*Hab. in Oc. Europæo.* In M. Adriatico.

*Frons inter oculos dentibus tribus. Digitus fixus chelarum valde compressus. Apex digitorum posticorum ovatus, membranaceus.*

*Obs.* Differt a priore 1°. thoracis crusta molliore, antice tridentata, postice obtusiore; 2°. pedibus posticis lamina ovali, unguis loco, terminatis. *Scop.*

Granulatus. 13. C. ( le granulé ) brachyurus, thorace lævi crenulato angulis posticis dilatato, quingudentatis posticeque subtruncato, manibus cristatis.

*Seb. mus.* 3. t. 19. f. 13.

*Catesb. car.* 2. p. 36. t. 36. C. chelis crassissimis.

*Fab.* 30.

*Hab. in America. Mus. de Geer.* ex Algeria mihi. In M. Mediterraneo.

*Fab.* an Europæus?

*Testa convexa, subtuberculata, margine postico laterali dilatato-quinquedentato,*

*reliquo crenulato. Rostrum bilobum, obtusum. Chelæ truncatæ, cristatæ, ad basin spina armatæ.*

Pagurus. 14. C. ( l'officinal ) brachyurus, thorace utrinque obtuse novemplicato, manibus apice atris.

*Faun. Suec. 1. n. 1244.*

*It. Wgoth. 173.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 85.*

*Scop. carn. 1125.*

*Gron. 100p. 967. \**

*Bell. aquat. 368.*

*Rond. pisc. 560.*

*Gesn. aquat. 155.*

*Aldr. exsang. 186.*

*Jonst. exsang. t. 5. f. 2.*

*Brald. nat. t. 3. f. 4.*

*Rumph. mus. t. 11. f. 4.*

*Fab. 29. thorace lævi utrinque quadridentato fronte fissa, manibus apice atris.*

*Pennant. 100t brit 4. t. 3. f. 7.*

*Hab. in Oceano Europæo, Indico.*

*Desc.* Huic brachia crassa valde. *Manus* tumidæ, supra tuberculis subacutis vilisque interjectis hispidæ, qui in adultis decidunt; aculei vero obtusi fiunt. *Digiti* castanei, ac demum nigri. *Scop.*

*Ex Entom. Carn.*

Ifirianus. 15. C. ( l'Istrien ) thorace suborbiculato lævi, utrinque bidentato, apice inter oculos dentibus tribus, medio majore.

*Hab. in sinu Liburnico.*

*Desc.* In meo specimine testa cimice *lectulario* paullo major. Cancris totius color obscure rufus. *Corpus* neque pilosum,



neque tuberculosum. *Thorax* glaber-  
 rimus, modice convexus, ambitu fere  
 circulari; postice marginatus, antice  
 rotundatus, latere singulo, ubi testa  
 convergit, dentibus duobus. *Dens*  
 anticus major truncatus, denticulatus.  
*Sternum* subrotundum, basi minime  
 excavatum, fulcis transversis parallelis,  
 palati in modum, exaratum. *Cauda*  
 brevis, fere conica. *Brachia* pedibus  
 multo crassiora, articulo primo magno  
 dente terminali, secundo subtus biden-  
 tato. *Manus* lanceolatae, brachio lon-  
 giores, compressae, subancipites, punc-  
 tatae, digitis rectis, mobili longiore.  
*Pedum* articulus ultimus subtus spinoso-  
 dentatus, ungue parvo concolore.

*Ex Mantiss. D. Fab.*

- Angulatus. 16. C. ( l'anguleux ) thorace lævi utrinque  
 bidentato, manibus longissimis. *Mantiss.*  
*tom. I. p. 319. n. 37.*  
*Herbst. cancr. I. 85. 6. t. I. f. 13.*  
*Pennant. zoot. brit. 4. t. 5. f. 10.*  
*Hab. in Oc. Anglico, prope Wegmouth.*  
*Mus. D. Banks.*  
*Desc. Manus* corpore triplo longiores.  
*Obs. Similes in M. Mediterraneo. V.*

- Pygmaeus. 17. C. ( le pygmée ) thorace læviusculo,  
 utrinque quinque dentato, fronte in-  
 tegerrima, carpis unidentatis. *Mantiss.*  
*ibid.*  
*Hab. in Oc. Anglico. D. Hudson.*  
*Desc. Statura omnino C. manatis &*  
*minutis. Thorax* antice integerrimus,  
 lateribus quinque dentatis, postice  
 angustatus. *Manus* lævis, digitis in-  
 er-  
 mibus.

Depressus. C. 18. ( l'aplati ) thorace sublævis , utrinque quadridentato , femoribus unidentatis , unguibus subtus ferratis. *Fab.* 33.  
An Europæus ?

*Herbst. cancr.* 2. 117. 36. t. 5. f. 35.

*Hab.* in Mari Mediterraneo , in Jamaica.  
An Europæus ?

*Desc.* Parvus. Statura præcedentis , depressus , griseo fuscoque varius. *Frons* quadrisfida. *Thorax* dentibus utrinque quatuor acutis. *Femora* apice unidentata , medio dorsali macula nigra. *Ungues omnes* valde ferrati. *Chelæ* parvæ.

\* c \* *Brachyuri thorace supra hirto aut spinoso.*

Lanatus. 19. C. ( le velu ) brachyurus , thorace hirto rugoso utrinque unidentato , rostro bidentato.

*Planc. conch.* 36. t. 5. f. 1.

*Fab.* 37.

*Herbst. cancr. fig.* 81. An ?

*Hab.* in M. Mediterraneo. An Europæus ?

*Testa depressa , inæqualis , lacunosa , antice truncata cum dentibus 2 inter oculos , 1 extra oculos , in medio lateris utrinque dens prominens. Chelæ læves. Brachia ciliata. Pedes 2 , 3 longi ; 4 , 5 dorsales , breves , apice adunco.*

Araneus. 20. C. ( l'araignée ) brachyurus , thorace hirsuto ovato tuberculato , rostro bifido , manibus ovatis. \*

*Iter. Scanic.* 312.

*Jonst. exsang.* t. 5. f. 13.

*Fab.* 40.

*Pennant. foot. brit.* 4. t. 9. f. 16.

*Hab.* in Oc. Europæo.

*Desc.* Affinis *C. rostrato*, *lanato*, *tribulo*.  
*Testa* ovata convexa, subinæqualis,  
 adspersa punctis inæqualibus promi-  
 nentibus. *Dens* compressus pone oculos.  
*Rostrum* prominens instar forcicis,  
 ovatum, bipartitum. *Brachia* inermia,  
 teretia. *Manus* ovatæ, basi restrorsum  
 bidentatæ. *Pedes postici* paullo lon-  
 giores, adspersi pilis. *Digitus* subula-  
 tus rubens. *M. L. U.* 439.

*Rostratus.* 21. *C.* ( le museau ) brachyurus, thorace  
 pubescente obcordato, dorso spinis  
 duabus erectis, manibus oblongis com-  
 pressis. \*

*Fab.* 41.

*Hab.* in Oc. Europæo.

*Desc.* Parvus, sordidus. *Thorax* obcor-  
 datus supra inæqualis, in medio ar-  
 matus spinis duabus erectis, validis,  
 quarum altera anterior, altera poste-  
 rior; antice protensus est *thorax*  
 in rostrum. *Antennæ* fetis armatæ.  
*Manus* oblongæ, læves, digitis linea-  
 ribus, canaliculatis, compressis. *Basis*  
*chelæ* quasi spinis duabus obsoletis &  
 obtusis instructa. *Faun.* 2027.

*Hirtellus.* 22. *C.* ( le hérissé ) brachyurus, thorace  
 hirtu utrinque quinquedentato, mani-  
 bus extus muricatis. \*

*Hab.* in Oc. Asiatico.

*Desc.* Minutus. *Thorax* rotundatus, læ-  
 vis, sed utrinque margine spinis quin-  
 que dentatus; antice integer, tenuis-  
 sime denticulatus. *Manus* læves, sed  
 extus muricatæ & pilosæ. *Pedes poste-  
 riores* acuti & villosi. *Faun.* 2029.

*Muscosus.* 23. *C.* ( l'enveloppé ) brachyurus, thorace

villosa utrinque tridentata, rostro bidentata, lateribus unidentata.

*Hab. in M. Mediterraneo. E. Brander.*

An Europæus?

*Magnitudo glandis. Testa obovata, villis mollissimis incurvis hirsuta, ad utrumque latus spinis 3 subulatis. Rostrum spinis 2 subulatis parallelis cum dente compresso ad utrumque latus rostri. Ungues pedum subulati, curvi, introrsum dentati. Chelæ laves, lineares, carpo utrinque dente obtuso retrorsum spectante.*

Tribulus. 24. C. ( le tribule ) brachyurus, thorace spinis octo, pedibus filiformibus, rostro bifido.

*Fab. 42.*

*Hab. Gades. F. Logie.*

*Testa cordata, convexa gibbositatibus 4, quorum 2 laterales; 1 inter laterales, minor; 1 anterieus versus dorsum; harum singula spina erecta armatur; adsunt insuper postice spinæ 2; etiam spinæ 2 versus rostrum. Rostrum bifidum connivens. Pedes filiformes, longi, inermes.*

Personatus. 25. C. ( le caché ) brachyurus, thorace hirta inæquali utrinque quinquedentato, rostro quadridentato.

*Hab. in M. Mediterraneo. An Europæus?*

*Testa magnitudine pomi, rubra, uti totum corpus hirta. Rostrum bipartitum subulatum hirtum cum dente ad utrumque latus antico ciliato, brevior. Seta utrinque ad basin caudæ. Pedes duo postici quasi supra reliquos collocati. Thorax ovatus, margine aculeis 5, disco tuberculis*

*tuberculis variis. Manus laeves, retro bidentes.*

*Obs.* Cancrorum divisiones in brachyuros thorace supra spinoso, thorace inæquali non admisit *D. Fab.* omnes igitur hos cancros hujus celeb. Entomologi post divisionem 4 & quintam *Syst.* odinavi. V.

\*d\* *Brachyuri thorace supra spinoso.*

**Dodecos. 26. C.** ( le formidable ) brachyurus, thorace pubescente, spinis duodecim, rostro bifido. *t. II. f. 12.*

*Fab.* 46. thorace aculeato porrecto adscendente, rostro acuto bifido, pedibus longissimis?

*Hab. in Hispania.*

Thorax rotundatus, obovatus, acuminatus, parum pubescens, magnitudine grylli domestici. Spina 1 erecta, ad basin; spina 1 erecta in medio; spinæ 4 obsoletæ ad utrumque latus; spina 1 brevis ad marginem. Rostrum attenuatum, bifidum, subconnivens. Oculi exserti. Cauda ovata, obtusa, hirsuta. Chelæ ovato-oblongæ, utrinque carina ciliatæ. Differt a C. araneo corpore non obcordato depresso, sed obovato convexo.

**Hastatus. 27. C.** ( le militaire ) brachyurus, thorace rugoso nudo, margine utrinque octodentato, postico maximo, planis posticis ovatis.

*Hab. in Mare Adriatico. D. Wilke.*

*Desc.* Palmæ antice bidentatæ. Chelæ angustatæ.

*Obs.* In spec. *D. Fab.* cancr. etiam hastatus reperitur, sed ut optime

*Insect. Tomus IV.*

K

observavit clar. Entomologus in *Mant.*  
*tom. I. p. 319. n. 34. Cancer. n. 23.*  
 specierum nullo modo cancer *hestatus*  
*Linn.*

Puber. 28. C. ( le cotonneux ) brachyurus , tho-  
 race rugoso villoso utrinque quinque-  
 dentato , palmis posticis ovatis.

*Fab. 49. thorace hirtio cordato utrinque*  
*quinquedentato , manibus unidentatis ,*  
*apice nigris.*

*Hab. in Mare Adriatico. D. Wilke.*

Maja. 29. C. ( le Maja ) brachyurus , thorace  
 aculeato , manibus ventricosis spinosis ,  
 digitis penicillato-hirsutis. \*

*Scop. carn. 1126.*

*Iter. scanic. 327.*

*Matth. diofc. 229. maja.*

*Jonst. exsang. t. 5. f. 5.*

*Gesn. aqu. 152. maja foemina.*

*Aldr. crust. 184. mea alia.*

*Gron. zoop. 973. \**

*Fab. 50.*

*Seb. musf. t. 18. f. 12.*

— *t. 22. f. 1.*

*Hab. in Oc. Norwagico.*

*Desc. Thorax cordatus , undique spinis*  
*muricatus , margine vero majoribus.*  
*Rostrum subulatum , apice bidentatum ,*  
*dentibus horizontalibus æqualibus. Chelæ*  
*spinis muricatæ , sed ipsi digiti læves*  
*præter quam margine , adpersæ fasci-*  
*culis pilorum. Faun. 2031.*

Cornutus. 30. C. ( le cornu ) brachyurus , thorace  
 aculeato , rostro spinis corniformibus  
 barbatis , manibus teretibus. *M. L. U.*

445. \*

*Fab. 45.*



*Hab. in Oc. indico. In Mari Mediter-  
raneo & Norwagico. Fab.*

*Desc. Thorax ovatus, adspersus punctis  
acuto-spinosis; latera utrinque ciliata,  
spinis 6 validis. Disci spinæ 3 trans-  
versales & una anterior; omnes erectæ,  
reliquis æquales spinæ 2 minores, erec-  
tiusculæ ad basin thoracis.*

*Rostri loco spinæ 2 inter oculos, reliquis  
maiores, erectiusculæ, distantes, subtus  
barbatæ. Rostrum subtus, inter oculos,  
acutum, reflexum & duæ spinæ coadu-  
natæ juxta oculos. Cauda inflexa  
ovata, articulis 7 linearibus. Brachia  
teretia, lævia, glabra, nuda. Manus  
pedibus reliquis minores, basi extror-  
sum bidentatæ. Pedes toti hirsuti,  
pilosi. Digitus hirsutus.*

Germanus. 31. C. ( l'Allemand ) brachyurus, thorace  
inæquali, spina altera frontis, altera  
supra caudam. †

*Fab. 58.*

*Hab. ad maris Germanici insulam Fanoe.  
D. Brunnike.*

*Corpus vix pediculo majus, glabrum.  
Frons inter oculos prominens, lamina  
dilatata, ovata, concava, terminata  
spina porrecta, valida. Antennæ spina  
frontali paullo longiores. Thorax inæ-  
qualis, e cujus medio spina valida,  
horizontalis, supra caudam extensa.  
Cauda teres, articulis 5 gibosis. Chelæ  
manuum ovatæ, læves.*

\*e\* *Brachyuri thorace inæquali.*

Cruentatus. 32. C. ( l'ensanglanté ) brachyurus, tho-  
race tuberculoso sanguineo, rostro  
lineari truncato.

*Scop. carn.* 1134. \*

*Hab. in M. Mediterraneo. E. Brander.*  
An Europæus?

*Testa statura & magnitudine C. aranei,*  
*supra admodum nodosa tuberibus inæ-*  
*qualibus, apice maculis albis. Rostrum*  
*lineare, truncatum, cum dente utrin-*  
*que juxta basin. Chelæ oblongæ,*  
*læves, ad corpus retrorsum bidentes.*  
*Pedes omnes varicoso-tuberculati.*

*Grapsus.* 33. *C. ( le tacheté ) brachyurus, thorace*  
*frigis lateralibus, fronte retusa. Amæn.*  
*acad. 4. p. 1252. t. 3. f. 10. \**

*Catesb. car. 2. t. 36. f. 1. pagurus*  
*maculatus.*

*Seb. mus. 3. t. 18. f. 5.*

*Gron. zoop. 966.*

*Fab. 34. thorace lævi utrinque triden-*  
*tato subrugoso, corpore variegato.*

*Hab. in America, insula Adscensionis. In*  
*Mari Mediterraneo. Fab. An Europæus?*

*Desc. Frons integra. Thorax lateribus*  
*& antice subrugosus, utrinque den-*  
*tibus tribus acutis. Color supra fuscò*  
*flavescenteque varius, subtus flaves-*  
*cens. Fab.*

*Ex spec. D. Fab.*

*Nafutus.* 34. *C. ( le prolongé ) thorax undique acu-*  
*leato, rostro bifido, subtus dente unico,*  
*supra duobus. Canc. 35.*

*It. Norwag.*

*Hab. in Oc. Norwegico.*

*Condylia-* 35. *C. ( le crochu ) thorace ovato acu-*  
*tus. leato, supra caudam spinis tribus erec-*  
*tis, chelis muricatis. Mantiss. tom. I.*  
*n. 65.*

*Herbst. cancr. f. 91.*

*Hab. in M. Mediterraneo. An Europæus?*

*Desc. Statura fere C. aranei. Thorax inæqualis, multispinosus. Linea dorsalis postice tubercula gerit tria magna, primo granulato, secundo bi- & tertio minori trispinosa. Femora ante apicem aculeo armata. Chelarum spinæ obtusæ.*

Scorpio. 36. C. ( le scorpion ) thorace pubescente, spinis quatuor erectis, pedibus anticis longissimis. *Cancr. 47.*

*It. Norwag.*

*Pennant. zoot. brit. 4. t. 9. f. 17.*

*Hab. in Oc. Norwagico.*

*Desc. Statura C. phalangii.*

Chiragra. 37. C. ( le chiragre ) thorace nodoso inæquali, rostro plano retuso, pedibus octo nodulosis. *Cancr. 52.*

*Hab. in M. Mediterraneo. In sinu Lugdunensi. V.*

*Desc. Statura C. horridi, at triplo minor. Rostrum exsertum, planum, apice valde retusum. Ante oculos tuberculum obtusum. Thorax nodis plurimis, imprimis quatuor dorsalibus majoribus & tribus utrinque ad marginem posticum. Pedes omnes incurvati.*

Auritus. 38. C. ( l'auriculé ) thorace antice utrinque unispinosa, dorso canaliculato molliusculo. *Cancr. 59.*

*Hab. in Islandia. D. Koenig.*

*Desc. Parvus. Antennæ brevissimæ. Testa antice pone oculos spina parva, erecta, acuta. Dorsum impressum, molliusculum. Brachia basi apiceque unispinosa.*

Mascaro- 39. C. ( l'aplani ) thorace sublævi ovato  
ninus, mutico, rostro bifido, lobis dentatis.

*Mantiss. tom. I. n. 60.*

*Herbst. cancer. f. 62.*

*Sulz. ins. t. 13. f. 1.*

*Hab. in M. Mediterraneo. An Europæus?*

*Desc. Statura omnino C. lanati, at magis  
ovatus. Rostrum breve, bifidum, lobis  
duobus obtusis, bidentatis. Thorax  
planus, lævis, hinc inde impressus.  
Pedes rotundati, omnes unguiculati.*

\*f\* *Parasitici cauda aphylla.*

Bernardus. 40. C. ( Bernard - l'hermite ) macrourus  
parasiticus, chelis cordatis muricatis,  
dextra majore. \*

*Scop. carn. 1130.*

*Matth. diosc. 230.*

*Rond. pisc. I. p. 553.*

*Bellon. aquat. 362.*

*Gensf. aquat. 161.*

*Aldr. exsang. 218.*

*Jonst. exsang. t. 7. f. 6.-12.*

*Swammerd. bibl. t. 11. f. 1, 2.*

*Baster. subsf. 2. p. 71 t. 10. f. 3, 4.*

*Gron. zoop. 682.*

*Fab. pagurus 2. parasiticus, chelis muri-  
catis, dextra majore.*

*De Geer tom. 7. p. 405. n. 4. t. 23.  
f. 5. - 13. astacus Bernhardus cauda  
molli recurvata, thorace lævi, pedibus  
chelisque muricatis scabris, dextra  
majore.*

*Pennant. zoot. brit. 4. t. 17. f. 38.*

*Reaum. acad. paris. ad. 1710. t. 10.  
f. 19, 20.*

*Hab. in Oc. Europæo, intra varias testas  
cochlearum, quas vacuas intrat tra-  
hitque, mutatas prout adolescit; hinc*

semper eam secum ducit ut Diogenes suum dolium.

*Desc. Antennæ* corpore longiores tenues, setaceæ, basi spina magna armatæ. *Oculi* duo, pediculis cylindricis longisque adfixi. *Caput*, *thorax*, *pedes* ut in astacis aliis. *Corpus* semper inflexum. *Caput* lamina squamosa tectum, a thorace infura separatum. *Chelæ* margine anteriore versus basin barbatae. *Pedes* 10 forcipe terminati, articulis 5, quorum duo ultimi aliis crassiores tuberculisque scabri. *Pedes* 7, 8, 9, 10 depressi, breves, pilosi, angulo terminati. *Cauda* subtus inflexa, membrana tecta. *Ova* sub cauda. In Buccinis frequens.

Eremita. 41. C. ( l'hermite ) macrourus parasiticus, chelis scabris subæqualibus, anterioribus sex-pollicatis.

*Fab.* pagurus 4.

*Hab.* in M. Italico, intra tophum suberosum, subrotundum, apertura transversa ovali, in cuius centro cochlea latitat. *D. Vandyli.*

*Desc.* *Pedes* sex antici, porrecti, extra tophum.

*Similis* Bernhardus s. Diogeni, sed minor. *Chelæ* æquales, scabræ & præterea *Pedes* utrinque 2 alii, porrecti extra tophum.

Tubularis. 42. C. ( le tubulaire ) macrourus parasiticus subcylindricus, testa punctis excavatis.

*Fab.* pagurus 8.

*Hab.* intra serpulæ glomeratæ testam maris Mediterranei.

*Magnitudo & facies scolopenderæ* forficatæ. *Testa* brevis subovata, punctis

*excavatis, antico utrinque retusa. Pedes 4 utrinque primi chelati; par 5tum. muticum, reliqua tantum rudimenta. Cauda longa mollis.*

Caput 43. C. ( la tête de mort ) brachyurus tomentum. tofus obtectus pileo hemisphærico fuberofo.

*Fab. pagurus 9.*

*Hab. Algiriæ. E. Brander. In mari Mediterraneo. Singularis aspectuque horridus, referens caput humanum diu sepultum. An Europæus?*

Corpus magnitudine castaneæ, griseum s. sordidum, totum tomentosum pilis brevissimis confertissimis, exceptis solis digitorum apicibus. Rostrum obsoletum, vix emarginatum. Manuum digiti æquales. Pedes unguibus acutis. Testa semiglobosa, inermis. Pileus hemisphæricus, quasi ex argilla vel corio antico confectus, distinctus a corpore, tegit totum corpus ad oculos usque, enatus ? pedibus postremi paris supra dorsum relexis & in pileum dictum terminatis.

\*g\* *Macroui thorace lævi.*

Gammarus. 44. C. ( la langouste ) macrourus, thorace lævi, rostro latebus dentato, basi supra dente duplici.\*

*Scop. carn. 1127.*

*It. Westrogoth. 174.*

*Mus. Ad. Fr. 87.*

*Math. diofc. 227.*

*Rond. pisc. 1. p. 538.*

*Gensf. aquat. 91.*

*Jonst. exsang. 112.*

*Aldr. exsang. t. 71.*

*Baster. subs. 2. p. 6. t. 1.*



*Fab. astacus* 1.

*Pennant. zoot. brit.* 4. t. 10. f. 21.

*Hab.* in Oc. imprimis Norwagico ; in America septentrionali. *Kalm.* mutans secundum anni tempus loca.

*Desc.* Similis sequenti, profunde cæruleus. *Thorax* lævis, semicylindrico-conicus, sulco transverso ut in *C. astaco*. *Corporis* latera & caudæ maculis albis inordinatis. *Pedes* crassitie digiti humani, prope apicem villosi : *antici* duo apice bipartiti f. sub cheliformes. *Antennæ* longitudine thoracis una cum cauda, ad latera corporis retrorsum projiciendæ, basi bicuspidatæ. *Tentacula* bipartita duo supra antennas. *Cauda* futuris 5 ; apex foliaceus, lobis 5, pulchre cæruleis. *Ent. carn.*

*Astacus.* 45. *C.* ( l'écrevisse ) *macrourus*, thorace lævi, rostro lateribus dentato, basi utrinque dente unico.

*Scop. carn.* 1128.

*Schæff. elem.* t. 32.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 87.

*Gron. zoot.* 977. \*

*Ræf. inf. app.* 1. t. 54, 55.

*Matth. diosc.* 228.

*Rond. pisc.* 2. p. 210.

*Bellon. aquat.* 355.

*Gesn. aquat.* 104.

*Aldr. exsang.* 129.

*Jonst. exsang.* t. 4. f. 1.

*Sulz. inf.* t. 23. f. 151.

*Geoff. paris.* 2. p. 667. n. 1.

*Fab. astacus* 2. antennis posticis bifidis, reliqua ut in *Syst.*

*Pennant. zoot. brit.* 4. t. 15. f. 27.

*De Geer tom.* 7. p. 365. n. 1. t. 20.

f. 21, 22. *astacus fluviatilis*, thorace lævi, rostro supra dentato, basi utrinque dente unico, chelis maximis papilloso-scabris.

*Enum n.* 1114.

*Faun. Fridr. n.* 847.

*Hab.* in Europæ lacubus, fluviis. Nutritur in domibus hepate bovis; urticæ foliis conservatur diutius vivus aceto adperso. S.

*Desc.* Omnibus cognitus est cancer *astacus*; ætate variat magnitudine. *Oculi* duo, postice anticeque mobiles. *Palpi* numerosi basi mobiles. *Pedes* 10, brachiis computatis; *anteriores* s. brachia crassa, apice forcipata; *posterorum* maris articulus primus excavatus. Infra *corpus* membranaceum foratum ad feminis dispersionem. Semen per foramen ovale pedum 5 & 6, juculatur ovaque foeminæ ad caudam transeunt subque cauda occultantur. *Cauda* natatoria. Pellem quotannis exuit, sed quod singularius, novus tunc formatur stomachus. Instante vernationis tempestate, lapides duo ad stomachi latera reperiuntur: earum usus ignotus, licet uti cancri *astaci* oculi dignoscantur. *Pedes*, antennæ, brachia fracta, denuo crescunt.

*Pennaceus*. 46. C. ( l'arlequin ) *macrourus*, thorace lævi cylindrico, rostro ensiformi, margine superiore ferrato.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 87.

*Fab.* *astacus locusta* 19. antennis posticis trifidis, thorace lævi, rostro porrecto supra ferrato, subtus lævi digitis elongatis filiformibus. *Mantiss. ast.* 21. An Europæus?

*Hab. in calidioribus regionibus.*

*Desc. Rostrum* elongatum supra ferratum, subtus læve. *Thorax* lævis margine utrinque unidentato. *Pedes antici* elongati, filiformes. *Manus* ovatæ breves, digitis elongatis, linearibus, acutis. *Fab.*

Squilla. 47. C. ( la squille ) macrourus, thorace lævi, rostro supra ferrato subtus tridentato, manuum digitis æqualibus. \*

*Scop. carn.* 1229.

*Matth. diofc.* 229.

*Klein. dub.* 35. f. A.

*Rond. pisc.* 549.

*Seb. musf.* 3. t. 21. f. 9, 10.

*Baster. subf.* 2. p. 30. f. 5. squilla fusca.

*Gron. zoop.* 986. \*

*Fab. astacus* 18. antennis posticis trifidis, thorace lævi, rostro supra ferrato, subtus tridentato, thoracis margine quinque dentato.

*Pennant. zoot. brit.* 4. t. 16. f. 28.

*Sulz. hist. inf.* t. 23. f. 4.

*Hab. in mari Balthico, Oc. Europæo.*

*Desc. Rostrum* lanceolatum, perpediculare, acutum, supra octo crenis, infra tribus ferratum. *Manus*, quæ tercio pedum pari insident, digitis sunt æqualibus. *Faun.* 2037.

*Obs.* Variat rostro recto & incurvo. *Fab.*

Crangon. 48. C. ( crangon ) macrourus, thorace lævi, rostro integerrimo, manuum pollice longiore. \*

*Baster. subf.* 2. p. 27. t. 3. f. 1. - 4. squilla marina.

*Gron. zoop.* 975.

*Seb. musf.* 3. t. 21. f. 8.

*Ræf. inf.* 3. t. 63. n. 1, 2.

*Fab. astacus* 20. antennis posticis trifidis,

thorace lævi, rostro brevi integerrimo, manuum pollice longiori.

*Pennant. zoot. brit. 4. t. 15. f. 30.*

*Hab. in mari Balthico.*

*Desc. Rostrum integerrimum, absque crenis aut spinis, brevissimum. Pollex in manibus, qui mobilis, chela longior, & ejus apice quasi infixus, chela tamen terminatur mucrone opposito breviori. Hisce chelis & rostro integerrimo facile distinguitur a sequenti, cum quo mixtus venum exponitur & editur pro una eademque specie. Magnitudo dein hujus sequentem parum superat. Olim etiam in Belgio sequenti mixtum sæpe vidi. Faun. 2038.*

\*h\* *Macrouri thorace inæquali.*

Carabus. 49. C. ( le carabé ) macrourus, thorace strigis imbricatis oblongiusculo antice ciliato, rostro bidentato mobili.

*Hab. in M. Mediterraneo. E. Brander. An Europæus?*

*Testa magnitudine extimi pollicis, supra lævis, sed rugis antrorsum imbricatis, margine antice denticulis ciliata. Rostrum dentibus 2 parallelis mobilibus depressis. Antennæ corpore longiores villis ciliatæ. Chelæ latissimæ compressæ cordatæ, anticæ truncatæ, pilis ciliatæ. Pedes unguibus falcatis. Cauda articulis 3 latis, deinde 3 angustis, extremo articulo ovato parvo, basi utrinque pedibus 2 parvis & postice setis aliquot longissimis.*

---

*Chelæ didactylæ gammaro, astaco, Norwagico, pennaceo.*

Strigofus. 50. C. ( le strié ) macrourus, thorace antrorsum rugoso spinis ciliato, rostro acuto septemdentato.

Cancer macrourus thorace chelisque angulatis hispidis. *Mus. Ad. Fr.* 87. \*

*Column. aquat.* 8. t. 6. astacus marinus. *Jonst. exsang.* t. 2. f. 7. astacus similis pediculo marino.

*Gron. aët. helv.* 4. p. 23. t. 2. f. 1, 2. & *zoo.* 980.

*Barrel. rar.* t. 1288. f. 1.

*Seb. mus.* 3. t. 19. f. 19, 20.

*Fab. pagurus* 10.

*De Geer tom.* 7. p. 393. n. 2. t. 23. f. 1.-4. thorace depresso rugoso lateraliter aculeato, rostro acuto septemdentato, chelis spinosissimis, pedibus posticis filiformibus.

*Aldrov. crust.* p. 123.

*Rondel. pisc. tom.* 1. p. 542. leo.

*Hab. in Oc.* Atlantico, Mediterraneo, Norwagico.

*Affines inter se sunt* strigofus, carabus, symnista & dorsipes ob thoracem antrorsum imbricatum.

Rostrum 7-dentatum, acutissimum. Thorax obovatus, antice transverse imbricatus, striis ciliatis antrorsum spectantibus. Statura arcuata anteriora thoracis distinguunt. Brachia introrsum aculeata. Chelæ oblongæ, margine aculeatæ, latere superiore antrorsum imbricatæ scabritie ciliari. Pedes præterea 3 utrinque; quartum par minutum, apice muticum, villosum.

Symnista. 51. C. ( le secrétaire ) submacrourus, thorace subcylindrico ciliato - ferrato, chelis cordatis, antennis ciliato-pilosis. *M. L. U.* \*

*Fab. hippa* 2. thorace utrinque quadri-  
dentato, manibus chelatis. *Mantiss.*  
*tom. I. p. 329?*

*Pennant. 1001. brit. 4. t. 7. f. 13.*

*Hab. in Asia. In Oc. Europæo. Mus.*  
*D. Banks. Fab.*

*Desc. Thorax* semicylindricus, oblongiusculus, rugis transversis inæqualibus: latera inæqualia, aucta spina antrorsum spectante. Margo anticus obtusissimus, ferratus, quasi ciliatus spinis minimis cum emarginatura ab utroque latere. *Folia* 2 (simul ovata) intra emarginaturam antrorsum spectantia. *Antennæ* corpore longiores, utrinque ciliatæ pilis. *Cauda* articulis 6, quorum 2 reliquis latiores; 1 & 4 lateribus brevissimi. *Brachia* inermia. *Manus* cordatæ, pilosæ. *Pollex* subulatus, arcuatus, inermis, acuminatus ad basin anteriorem. *Pedes* octo. *Plantæ* bifidæ, ciliatæ. *Lobus* anterior brevissimus, obtusus: posterior longior, falcatus. *M. L. U. 453.*

\*1\* *Macrouri thorace aculeato.*

Norwagi- 52. *C. (le Norvégien) macrourus*, thorace antrorsum aculeato, manibus prismaticis, angulis spinosis. \*

*It. scanic. 307.*

*Mus. Ad. Fr. I. p. 88.*

*Gron. 100p. 979.*

*Seb. mus. 3. t. 21. f. 3.*

*Aldr. exsang. 113. astacus mediæ magnitudinis prior.*

*Fab. astacus 17.*

*De Geer tom. 7. p. 398. n. 3. t. 24.*  
thorace convexo, capite aculeato,



chelis prismaticis elongatis, seriebus quaternis spinosis.

*Hab. in M. Norwagico.*

*Desc. Thorax* oblongus, teretiusculus, marginibus integris, antice a tergo adpersus spinis parvis antrorsum spectantibus. *Rostrum* thoracis subulatum, acuminatum, recta protensum, ad latera supra spinosum, sub apice notatum spinis duabus. *Cauda* thorace longior, articulis 6, lateribus acutangulis, pentaphylla, subæqualis. *Foliola* angulo dentata, margine ciliata. *Brachia* dentata. *Chelæ* thorace longiores, tetragonæ, angulis antrorsum obtuse dentatis serie fere duplici. *Pedes* octo inermes, teretes. *Digit*i duo ciliati. *M. L. U.* 456.

\*k\* *Mucrouri* manibus adauctylis, thorace oblongo.

*Arctus*. 53. *C.* (l'étroit) macrourus, thorace antrorsum aculeato, fronte diphylla, manibus subadauctylis.

*Margr. bras.* 186. poliquiquyixe.

*Jonst. exsang.* t. 4. f. 4, 8, 12.

*Barrel. ic.* 1288. f. 2.

*Rumph. mus.* t. 2. f. C. D.

*Brown. Jam.* t. 41. f. 1.

*Seb. mus.* 3. t. 20. f. 1.

*Eab. scyllarus* 1. antennarum squamis ciliato-aculeatis.

*Hab. in M. Europæ, Asiæ, Africæ, Americæ.*

*Frons* retusa, aculeis inter oculos circum 10, inæqualibus. *Folia frontis* 2 duplici articulo, anteriore lato, obtuso, 7-fido, ciliato, posteriore acuminato, 7-dentato, subciliato. *Antennæ* longitudine foliorum, articulis 4, ultimo

*bifido, altero obtuso brevior. Thorax oblongus, inæqualis, quinquefariam antrosum aculeatus. Caudæ articuli triplici area, prima lævi, secunda rugosa, tertia rugosa postice trifariam emarginata; apex pentaphyllus, obtusus. Manus crassiores, læves, longitudine foliorum frontis pollice terminali, digito brevissimo. Pedes læves, unguibus acutis.*

\*1\* *Macrouri manibus adaetylis, testa thoracis brevissima, nec thoracem totum tegente.*

Mantis. 54. C. (la mante) *macrourus* *articularis*, manibus *adaetylis* compressis falcatis ferrato-dentatis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 86.*

*Scop. carn. 1135.*

*Rumph. mus. t. 3. f. E. C. arenarius.*

*Margr. bras. 186. t. 187. tamaru-guacu.*

*Seb. mus. 3. t. 20. f. 2, 3.*

*Gron. zoop. 984.*

*Fab. squilla 1. manibus adaetylis compressis, falcatis, ferrato-dentatis.*

*De Geer tom. 7. p. 533. n. 5. squilla mantis marina, corpore elongato, cauda lata depressa spinosa, pedibus anticis chelatis dentatis.*

*Sulz. hist. inf. t. 32. f. 2.*

*Hab. in M. Asiatico, Indico, Mediterraneo, Italis esculentus. spec. p. 514.*

*Thoracis testa membranacea. Pedes utrinque 3. Pollex ferrato-dentatus, terminalis. Daetyli sub abdomine trium parium. Antennæ trifidæ, lamina ovata ad oculos.*

---

*Species 76-87. ob thoracem lorica destitutum & singularem structuram corporis adeo a reliquis canceris recedunt, ut facile genus distinctum constituerent.*

*Obs.*

*Obs.* Genus omnino distinctum, inquit  
*D. Fabricius*, cujus descriptio sequens.  
*Desc.* *Os* mandibulis palpisque abique  
 maxillis. *Palpi* sex inæquales. *Ante-*  
*riores* laterales, elongati, compressi,  
 arcuati, filiformes, quinquearticulati,  
 articulo secundo longissimo, ultimo  
 brevissimo, rotundato, ciliato. *Medii*  
 breves, lati, compressi, os obte-  
 gentes, quadriarticulati, articulis sub-  
 æqualibus; ultimo acutiusculo, ciliato.  
*Posteriores* breves, filiformes, triarticu-  
 lati, articulis subæqualibus, compressis;  
 mandibulæ dorso adhærentes. *Mandi-*  
*bula* crassa, cornea, apice compressa,  
 concava, dentata, processu laterali  
 elongato, subulato, lateribus dentatis.  
*Labium* duplex: *exterius* breve, cor-  
 neum, bifidum, laciniis concavis,  
 fissis, laminis æqualibus, exteriore  
 subulata, acutissima, interiori apice  
 latiori, truncata, ciliata; *interius* breve,  
 subcorneum, bifidum laciniis distan-  
 tibus, quadratis, angulatis, obtusis.  
*Clypeus* rotundatus, concavus, forni-  
 catus, integer. *Antennæ* quatuor,  
 subæquales; *anteriores* pedunculatæ,  
 setacæ, multiarticulatæ, articulis  
 brevissimis, pedunculo triarticulato;  
 extus lamina ovata ciliata basi articu-  
 lata suffultæ; *posteriores* pedunculatæ  
 pedunculo quadriarticulato, setacæ  
 multiarticulatæ, trifidæ.

Grossipes. 55. C. ( le grossipede ) macrourus articu-  
 laris, manibus adactylis longitudine  
 corporis. †

*Gron. zooph.* 989. astacus muticus, pede  
 antico subulato edentulo longissimo  
 crassissimo.

*Fab. gammarus* 4.

*It. Norwag.*

*Pall. spicil. zool. fasc. 9. 59. t. 4. f. 9.*

*Hab. in Belgii aquis stagnantibus.*

**Pulex.** 56. **C.** ( la puce ) *macrourus articularis* ,  
manibus quatuor adactylis pedibus de-  
cem. *t. II. f. 13.*

*It. Œl. 42. 96. \**

*Frisch. inf. 7. t. 18.*

*Raj. inf. 44. pulex fluviatilis.*

*Ræf. 3. app. t. 62.*

*Baster. subs. 2. p. 31. t. 3. f. 7. pulex  
marinus.*

*Geoff. parif. 2. p. 667. t. 21. f. 6.*

*Gron. zooph. 990.*

*Fab. gammarus.*

*Scop. carn. 1137.*

*De Geer tom. 7. p. 525. n. 4. t. 33.  
f. 1.-10. squilla pulex aquatica* , cor-  
pore compresso , pedibus quatuor an-  
ticis chelatis , cauda setis sex bifurcis  
terminata.

*Enum. n. 1115.*

*Hab. ad maris littora* , etiam in fontibus  
& fossis , dorso innatans , consumitur  
a recurvirostra.

**Antennæ** 4. **Pedes** 7 *parium* , quorum  
*paria 4 antrorsum versa* ; horum duo  
*paria antica chelifera digito mobili* ,  
*absque pollice. Paria 3 posteriora re-*  
*trorsum versa.*

**Obs. 1.** Saliens , piscibus infestus , in  
branchiis aliera caussans. Destruit retia  
piscatoribus invisus. *Fab.*

**Obs. 2.** *La crevette des ruisseaux a cinq  
pattes de chaque côté.* *D. Geoff. tom. 2.  
p. 667. Si cet insecte n'avoit réellement  
que cinq pattes de chaque côté , il pour-*  
*roit être placé ou avec les crabes*

ou avec les écrevisses ; mais il en a réellement sept paires. D. de Geer. tom. 7. p. 531.

Obs. 3. Nec D. Fab. nec D. Schrank. inf. parif. tab. que Ræf. citaverunt ; cancer tamen *pulex* Syst. astacusque n. 2 D. Geoff. synonymi. V.

Locusta. 57. C. ( la sauterelle ) macrourus articularis, manibus quatuor adactylis, pedibus quatuordecim. \*

It. Gotl. 260.

Ræf. inf. 3. t. 62.

Klein. miss. 5. t. 6. f. A, B, C.

Sulz. inf. t. 23. f. 152.

Fab. gammarus 5, manibus quatuor adactylis, pedibus quatuordecim, femoribus simplicibus.

Pall. spicil. zool. fasc. 9. 57. t. 4. f. 8 ?

Hab. in Europæ maritimis, etiam in fontibus & fossis.

Desc. Præcedenti major. Totus cæruleus. Rostrum nullum prominens. Corpus 14 articulis. Cauda trifaria, intermedio subulato. Faun. 20042.

Antennæ 4. Corpus articulis 4. Rostrum obtusum. Manus duorum parium, adactylæ, breves. Pedes dein 7 parium, angusti. Spurii pedes sub cauda 3 parium, apice setacei. Pediculi unius paris caudæ lateribus adstant, bidigitati. Cauda acuta, brevis.

Linearis. 58. C. ( le linéaire ) macrourus articularis, manibus quatuor monodactylis, pedibus decem:

Nartensf. spit. 56. t. P. f. I.

Fab. gammarus. 8.

Pall. spicil. zool. fasc. 9. t. 4. f. 15.

Bast. Sulz. 1. 32. t. 4. f. 2.

*Hab. in Oc. Europæo. Konig. In insula Terra-Nova. Mus. D. Banks.*

*Corpus lineare, articulis 6 præter caput. Antennæ duorum parium. Oculi sessiles. Pedes decem chelis ovato oblongis, monodactylis, s. in articulo corporis (excepto capite) primo; secundum par proximum, sub articulo corporis secundo. Paria 3, 4, 5 prope caudam sita, chelis similibus.*

Atomos. 59. C. ( l'atome ) macrourus linearis articularis, manibus adactylis, pedibus undecim. †

*Baster. subs. 1. 32. t. 4. f. 2.*

*Fab. gammarus 8 a præcedenti vix differt.*

*Hab. in Europæ aquis fluctuantibus dulcibus, nudis oculis vix visibilis, præcedenti affinis.*

Salinus. 60. C. ( des salines ) macrourus articularis, manibus adactylis, pedibus patentibus, cauda subulata.

*Matii. diar. britann. 1756.*

*Fab. gammarus 9, pedibus viginti patentibus, cauda subulata.*

*Hab. in Angliæ Limingtonianis. D. Schlofferus.*

*Corpus pediculo majus, oblongum. Oculi distantes, laterales, pedunculati. Antennæ setaceæ, corpore breviores. Cauda filiformi-subulata, exserta, longitudine corporis. Pedes utrinque 10 patentes & quasi pinnatim digesti.*

Stagnalis. 61. C. ( des étangs ) macrourus articularis, manibus adactylis, pedibus patentibus, cauda cylindrica bifida. \*

*Schæff. monogr. . . . Apus.*



*Fab. gammarus* 10.

*Hab.* in Europæ aquis dulcibus, in fissuris rupium retentis. (An larva cujusdam ephemeræ.)

*Desc.* *Facies* piscis minimi, longitudo pollicis transversæ. *Caput* depressum. *Oculi* parvi, fusci, laterales, distantes. *Antennæ* capillares. *Frons* obtusa. *Rostrum* obtusum, inflexum ut in cicada, angustum, obtusiusculum. *Dorsum* convexum, subincarnatum. *Cauda* teretiuscula, articulata, longitudine fere corporis, pinna horizontali bifida acuta. *Globulus* magnitudine seminis sinapios ad regionem ani, coccineus, auro nitens, splendens ad latera flavus. *Pedes* multi (12 circiter) ad latera corporis, ab utroque latere imbricatim dispositi. Natat in dorso uti notonecta. *Fœmina* solo globulo instruitur, quod forte ovarium, ut perfecta metamorphosi, præsto sint ova. *Faun.* 2043.

*Ex spec. D. Fab.*

Oculatus. 62. C. (l'oculé) pagurus parasiticus, chelis muricatis æqualibus, oculorum pedunculis longitudine thoracis.

*Hab.* in murice brandaris.

*Desc.* Statura C. *Bernhardi*. *Corpus* totum ferrugineum. *Oculorum* pedunculi porrecti, cylindrici, basi dente armati. *Brachia* utrinque macula sanguinea. *Chelæ* scabræ.

Alatus. 63. C. (l'ailé) pagurus parasiticus, manibus lævibus trialatis; dextra majore.

*Hab.* in Islandiæ bullis.

*Desc.* *Chelæ* articulo penultimo scabro,

ultimo five manu lævi, alis tribus prominentibus acutis.

Araneifor- 64. C. ( l'aranéiforme ) pagurus parasiticus, chelis scabris, cauda apice callosa unguiculata.

*Hab. in fissuris rupium maris Edimburgi, intrans helices & turbines.*

*Desc.* Parvus, obscure cinerascens; margo supra oculos spinis duabus parvis. *Chelæ* ovatæ, scabræ. *Pedes* quatuor postici breves, obtusi, reflexi, unguiculo brevissimo. *Cauda* cylindrica, mollis terminatur callo globofo, unguiculato.

Rugosus. 65. C. ( le ridé ) pagurus thorace rugoso, antice ciliato spinoso, rostro tridentato, manibus filiformibus. *Astacus* 8.

*Hab. in mari Mediterraneo.*

*Desc.* Affinitas summa C. *strigosi*, cujus forte varietas. Loco rostri dentes tres acutissimi, intermedio majori. Ad basin dentes duo elevati, oculi. Margo thoracis anticus spinosus.

Narval. 66. C. ( le narval ) astacus antennis posticis bifidis rostro longissimo, adscendente, compresso, utrinque ferrato.

*Mantiss. tom. I. 331. n. 5.*

*Herbst. canc. f. 134.*

*Hab. in mari Mediterraneo.*

*Desc.* Statura & magnitudine C. *crangonis*. Rostrum valde porrectum, utrinque subtilissime ferratum. *Cauda* lamellis quinque, intermedia subulata.

Homari. 67. C. ( du homar ) astacus antennis posticis bifidis, corporis segmentis dorso

subspinosis , cauda fasciculata , stylis ferratis. *Astacus* 7.

*It. Norwag.*

*Stroem. act. Hafn. \* p. 5. t. 2.*

*Müll. Zool. Dan. 197. 2358.*

*Hab. in Oc. Norwagico. Minutus.*

Harengum. 68. C. ( des harengs ) *astacus* antennis posticis bifidis porrectis , rostro subulato , oculis globosis prominentibus. *Astacus* 8.

*It. Norwag.*

*Hab. in Oc. Norwagico copiosissime , harengum & gadorum esca.*

*Desc. Minutus. Marum* articulus primus & secundus pedunculi antennarum posticarum apice interiori articulati , forte genitalis.

Histro. 69. C. ( l'arlequin ) antennis posticis bifidis , thoracis margine bidentato , rostro lanceolato ferrato , corpore variegato. *Astacus* 10.

*Hab. in Groelandia.*

*Desc. Statura & magnitudo C. crangonis. Palpi* apice spinosi. *Rostrum* porrectum , subtus in medio dilatatum , unidentatum , supra ferratum. *Thorax* cylindricus , margine antico tridentato. *Corpus* rufo cinereoque variegatum. *Cauda* foliolis quinque , intermedio lineis duabus spinis.

Boreas. 70. C. ( le Boréal ) *astacus* antennis posticis bifidis , thorace aculeato , pedibus secundi tertiique paris filiformibus. *Astacus* 12.

*Phipps iter. Boreal. 190. t. 12. f. 1.*

*Hab. in Oc. Boreali. Mus. D. Banks.*

An Europæus ?

*Desc.* *Rostrum* breve depressum, utrinque canaliculatum, acutum subtrus dente valido.

Groenlan- 71. C. ( le Groenlandois ) *astacus* antennis  
dicus.

posticis bifidis, thoracis margine antico rostroque dentatis, palpis apice spinosis, corpore fusco. *Astacus* 14.

*Hab.* in M. Groenlandico.

*Desc.* *Rostrum* porrectum, supra tribus bidentatum. *Palpi* *antici* spinis apice ciliati. *Antennæ* *anticæ* longissimæ, albo rubroque variegatæ. *Thoracis* margo anticus tridentatus & dorsum carinatum dentibus quatuor. *Abdominis* segmenta inæqualia utrinque spina terminantur. *Cauda* quinque phylla, foliolo intermedio lineis duabus dentatis.

Varius. 72. C. ( le varié ) antennis posticis bifidis, thoracis margine unidentato, rostro utrinque ferrato, corpore variegato. *Astacus* 15.

*It.* Norwag.

*Hab.* in Norwagico.

*Desc.* *Antennæ* posteriores breves. *Pedes* secundi paris filiformes, reliquis longiores.

Tettigo- 73. C. ( l'Islandois ) *astacus* antennis posticis bifidis, thorace spinoso, pedibus quatuor anticis filiformibus. *Astacus* 21.

*Hab.* in Islandia. *Dr.* Koenig.

*Desc.* *Rostrum* breve, inflexum, bidentatum. *Thorax* carinatus, carina bidentata. Margo unidentatus. *Manus* adactylæ, subcylindricæ, spina unica, rigida, acuta & ungue falcato, mobili.

*Obs.* 1. Affinis. *C. Boreæ*.

*Obs.* 2. Varietas minor carina thoracis tridentata vix distincta.

**Nugax. 74.** *C.* ( le dilaté ) manibus adactylis , pedibus quatuordecim , femoribus sex posticis compresso-dilatatis. *Gammarus* 2. *Phipps iter. Boreal.* 192. t. 12. f. 2. cancer nugax macrourus , articularis , pedibus quatuordecim simplicibus , laminis femorum sex posteriorum dilatatis , subrotundo cordatis.

*Hab.* in Oc. Boreali. *Mus. D. Banks.*

*Desc.* *Antennæ* quatuor , posterioribus seta minori suffultis.

**Cancellus. 75.** *C.* ( le Sibérien ) manibus quatuor monodactylis pedibus sedecim. *Gammarus* 3. *Pall. spicil. zool. fasc.* 9. 53. t. 3. f. 18.

*Hab.* in Sibiriae aquis.

*Desc.* Major *C. locusta*. *Antennæ* anticæ incurvæ.

**Corniger. 76.** *C.* ( le porte-corne ) manibus adactylis , rostro incurvo subulato , thoracis lateribus cornu duplici. *Gammarus* 7.

*It. Norwag.*

*Hab.* in Oc. Norwagico.

**Gibbosus. 77.** *C.* ( le bossu ) oblongus gibbus , antennis plicatis longissimis. *Mantiff.* *Gammarus* 11.

*Oniscus gibbosus* spec. 15.

*Hab.* in Oc. Lusitanico. Fig. pict. in *Mus. Bankiano*.

*Desc.* *Corpus* parvum , glabrum , læve , flavescens , punctis fuscis irroratum. *Caput* crassum , obtusum , oculis duobus maximis approximatis , macula magna

viridi. *Antennæ* duæ fetaceæ, sub corpore inflexæ & plicatæ, corpore triplo longiores. *Thorax* gibbus, segmentis septem, primo brevissimo. *Abdomen* segmentis quatuor. *Cauda* foliolis tribus acuminatis. *Pedes* 14, intermediis sublongioribus.

*Eſca.* 78. C. ( l'utile ) manibus adaſtylis, cauda articulata apice fiſſa.

*It.* *Norwag.*

*Hab.* in Oc. Norwagico, harengum cibus gratiſſimus.

*Meduſa-* 79. C. ( des médufes ) manibus quatuor monodaſtylis, capite obtuſiſſimo. *Mant.*

*Gammarus* 12.

*Oniſcus quadricornis*, oblongus, ſtylis caudalibus ſenis, antennis quatuor. *ſpec. n.* 16.

*Hab.* in mari Atlantico. *Muf. D. Banks.*

*Deſc.* *Corpus* parvum, gibbum, glabrum.

*Caput* retuſum. *Oculi* maximi, macula magna lunata viridi. *Antennæ* quatuor fetaceæ, longitudine corporis. *Corpus* ſegmentis duodecim, ultimo planiuſculo, ovato, integro. *Cauda* exſerta, ſtylis ſex acutis, integris. *Abdomen* ſubtus foliatum. *Pedes* 14 ſubæquales.





## G E N U S   X I.

MONOCULUS. *Pedes* natatorii.

*Corpus* crusta tectum.

*Oculi* approximati, testæ innati.

Piscinus. 1. M. ( le plumet ) testa cordata plana.

*Læst. act. Ups.* 1750. p. 42. t.

*Baster. subf.* 2. p. 137. t. 8. f. 9, 10.

*Stroen. sondm.* t. 1. f. 4, 5, 6.

*Geoff. parif.* 660. t. 21. f. 3. binoculus.

*Fab.* 2.

*Hab.* in Oceano.

*Hujus duo distincta sunt individua, sexu an specie diversa. Stylatus duabus antennis corpore longioribus. Muticus absque exsertis antennis. Confer. Cl. Basteron.*

*Desc.* Affinis monoculo foliaceo. Clypeus patens, subrotundus, convexus, subtus concavus. Corpus posticum obcordatum, gibbum. Cauda cylindrico-fubulata, longitudine corporis postici, apice bifida. Cylindri duo ad caudam, subarticulati, obtusi, in quibusdam corpore longiores. *Pedes* sub clypeo sex, at inter clypeum & corpus duo longiores. *Faun.* 2045.

Apus. 2. M. ( l'armé ) testa subcompressa antice retusa postice truncata, cauda bifeta. \*

*Scop. carn.* 1138.

*Frisch. inf.* 10. t. 1.

*Act. Angl.* 40. p. 150. t. 1. f. 2.

*Schæff. monogr.* 1756. t. 1.-6.

— *elem.* t. 29. f. 1.

*Sulz. inf. t. 24. f. 153.*

*Geoff. paris. 660. n. 1. t. 21. f. 4.*

*Fab. 3. antennis trifidis, cauda bifida,*

*Faun. Fridr. n. 848.*

*Hab. in Europæ fossis, piscinis.*

*Desc. Corpus subvirefcens, magnitudine glandis. Oculi bini approximati in vertice. Pedes multi, ramosi. Cauda setis duadus, validis, interjecta lamella.*

*Faun. 2046.*

*Obs. 1. Oculi 2. Antennæ simplices. Geoff.*

*Obs. 2. Æstate deficcati, reviviscunt affluente aqua. Fab.*

*Pulex. 3. M. ( la puce-branchue ) antennis dichotomis, cauda inflexa. \**

*Geoff. paris. 659. n. 1.*

*Swamm. quart. 66. t. 1.*

*— bibl. t. 31. f. 1, 2, 3.*

*Schæff. monogr. 1755. t. 1. f. 1.-8.*

*— elem. t. 29. f. 4.*

*Joblot. micr. 1. pp. 2. t. 13. f. P. Q. R.*

*Lederm. micr. 146. t. 72. f. 2.*

*Fab. 4.*

*De Geer tom. 7. p. 442. n. 1. t. 27. f. 1.-8. ramosus, brachiis dichotomis, cauda appendiculata inflexa, testa postice unispinosa.*

*Redi obs. t. 16. f. 5.*

*Trembley mém. des Polyp. t. 6. f. 3.-11. puceron-branchu.*

*Merret. pen. 207. Vermes minimi rubri aquam stagnalem colore rubro inficientes, unde vulgus dira protendit.*

*Sulz. hist. inf. t. 30. f. 10.*

*Faun. Fridr. n. 849.*

*Enum. n. 1115.*

*Frisch. inf. deut. part. 7. p. 26. §. 18.*

*Scop. carn. n. 1117.*

*Hab.* ubique in aquis dulcibus, tanta sæpe in copia, ut aqua appareat sanguinea. *Aman. acad.* 3. p. 320.

*Desc.* Caput infra rostriforme, licet ore gaudeat. *Oculus* mobilis in capitis vertice & non duo oculi coaliti. Animal totum crustaceum; crusta ovali postice subulata. *Brachia* duo ramosa natatoria, ad lentem conspicienda. *Pedum* numerus structuraque non facile determinanda. *Cauda* mobilis, apice bifurcata.

*Pediculus.* 4. M. (le pou-branchu) antennis dichotomis, cauda reflexa.

*Geoff. paris.* 656. n. 2.

*Fab.* 7.

*Sulz. hist. inf.* t. 30. f. 8.

*De Geer tom.* 7. p. 467. n. 4. t. 28.

f. 9. - 13. *pediculus ramosus* brachiis dichotomis, cauda bifida, rectiuscula, exserta, pedibus nudis.

*Hab.* in Europæ aquis dulcibus.

*Desc.* Caput ovatum utrinque convexum.

*Pedes* octo natatorii, pilis mobilibus celeriter natat.

*Quadricor-* 5. M. (le quadricorne) antennis quaternis; nis. cauda recta bifida. \*

*Scop. carn.* 1129.

*Geoff. paris.* 656. n. 3. t. 21. f. 5.

*Baker. micr.* t. 9. f. 1, 2.

*Blank. inf.* 149. t. 13. f. B.

*Joblos. micr.* 1. pp. 2. t. 14. f. C. D.

*De Geer aët. Stockh.* 1747. t. 6. f. 2.

*Aët. Angl. abbrev.* 2. p. 258. t. 20. f. 5, 6.

*Ræf. inf.* 3. 98. f. 1, 2, 4.

*Leuvenh. arc.* 142. f. 1.

---

*Monoculi* pariunt & ova & vivos fetus; exsiccati æstate reviviscunt affluente aqua.

*Fab.* 8.

*De Geer tom.* 7. p. 483. n. 7. t. 29.  
f. 11, 12. - t. 30. f. 1.-9. cornubus  
quaternis mobilibus setaceis, corpore  
ovato, cauda longa, recta, cylindrica,  
bifida.

*Enum.* n. 1117.

*Faun. Fridr.* n. 850.

*Hab.* in aquis Europæ.

*Desc.* *Antennarum* duo paria. *Cauda* tenuis, longiuscula, duplex, setis instructa versus apicem; subcauda utrinque racemus ovorum, hinc cancris valde affinis. *Corpus* fuscum est, at ovaria, quæ juxta caudam utrinque extenduntur ovata, sunt lutea, simul sumpta magnitudine fere totum corpus æquant & tanquam uvæ binæ petiolatæ adhærent. *Faun.* 2049.

Conchaceus. 6. M. ( l'ovale ) antennis capillaribus multiplicibus, testa bivalvi. \*

*Geoff. paris.* 657. n. 4.

*Fab.* 9.

*Enum.* n. 1118.

*Müll. Lin. Nat. cl.* V. p. 1114.

*De Geer tom.* 7. p. 476. n. 2. t. 29.  
f. 5. - 10. ovato - conchaceus, testa ovata bivalvi, brachiis apice capillaceis multiplicibus intra testam.

*Hab.* in aquis dulcibus, ubi volitat uti pullus conchæ.

*Curiosis micrographis examinandum commendo animalculum monoculo conchaceo simile, sed minus, latitans solitarium intra pellucidos utriculos utriculariæ vulgaris, tantum non omnes, cujus motus extus conspicuus, observatum 1766. Jun. 11. a Car. Linné, filio : Prof. Bot. Ups.*

*Desc.* Testa femine brassicæ major, ovata, oblonguiscula, utrinque æqualis, antice gibba & parum retusa adeoque similis concha, sed in conchis apertura est a latere tenuiore & cardo ubi gibba magis est; contra vero in hac; hæc extracta ex aquis tota clauditur, ut crederes semen cujusdam plantæ; in aquis dum hiat, jures concham esse. Celeriter fertur per aquas, uti reliqui monoculi, testa cinerea impura est. Dum aperit testam, exferit multos capillos æquales, albidos, in altera extremitate aperturæ; hos capillos motitando fertur agilis per aquas, non quiescit antequam vel cochleam vel aliquod terrestre reperit, hic confedit cum fociis lubenter & pedibus supra hoc corpus incedit & affigitur. Totum corpus intra testam latet, dum quiescit. *Faun.* 2050.

*Obs.* Ætate variat magnitudo, color magis minusve viridis.

Lenticularis. 7. M. ( le lenticulaire ) testa compressa lentiformi. \*

*Hab.* in Filandia. *Uddman.*

*Desc.* Testa valde compressa margine acuto, pellucida. Latitudo extimi articuli digiti. *Faun.* 2051.

*Ex oper.* D. de Geer.

Bispinosus. 8. M. ( l'épineux ) brachiis dichotomis; capite rostrato, cauda inflexa, testa postice spinosa. *tom.* 7. *p.* 463. *n.* 3. f. 3, 4.

*Fab.* 6. Antennis dichotomis, cauda inflexa, testa postice bidentata, capite acuminato.

*Hab. in aquis dulcibus.*

*Desc. Caput* sæpius apice conico prolongatum. Similis *M. pulici*, sed testa differt. *Cauda* mobilis. *Pedum* numerus incertus.

Elongatus. 9. *M.* ( l'alongé ) corpore elongato, brachiis dichotomis, fetis plurimis, cauda lateraliter exserta. *tom.* 7. *n.* 5. *t.* 11. *f.* 14.

*Hab. sub Nymphææ foliis.*

*Desc. Diaphanus. Testa* bivalvis. In parte antica capitis supra tuberculum angulare, infra rostrum angulare. *Brachia* duo ramosa in parte corporis antica, quibus natat & foliis *Nymphææ* adhæret. *Corpus* elongatum. *Cauda* mobili terminatum.

*Obs. Insecta phosphorica in celeb. & infelicis Cookii itineribus memorata ad hoc genus pertinent; saltem ex observationibus D. Godchen Derville constat quædam insecta hujus generis phosphorica esse. Mémoire des Savans étrangers. tom. 3. p. 169. t. 10. f. 1, 2, 3.*

Exspinofus. 10. *M.* ( le foible ) brachiis dichotomis, cauda simplici inflexa, testa postice rotundata non spinosa. *tom.* 4. *p.* 457. *t.* 27. *f.* 9.-13. - *t.* 28. *f.* 3.-8.

*Schæff. Abb. von. Inf. t. 1. p. 299. t. 1. f. 9.*

*Hab. in aquis stagnantibus.*

*Desc. Corpus* ovatum utrinque depressum. *Caput* supra convexum, antice truncatum. *Brachia* ramosa. *Abdomen* cauda recurvata mobili terminatum.

*Ex*



*Ex Enum.*

Infusorius. II. M. ( l'imperceptible ) rostratus , testa bivalvi , oculis duobus in rostro fetis.

*Hab.* copiosus in stagnis ; congenerum forte minimus.

Gasterof- 12. M. ( du gasterofte )  
tei.

*Geoff.* binoculus 3.

*Hab.* in pisce gasterofteo.

*Obs.* 1. Oculus inter hujus generis characteres jure ac merito non admisit *Linn.* licet enim punctum nigrum capitis , ut unus oculus , a nonnullis Entomologis judicatum fuerit , forsan tamen ex duobus oculis coalitis oculus hic constat. V.

*Obs.* 2. Ex hoc genere quasdam species eruit *D. Geoff.* quas sub novo binoculi genere condidit. Novum hoc genus omnino inutile videtur ; omnes enim notæ characteristicae monoculis *Syst.* & binoculis *inf. paris.* conveniunt. V.



## GENUS XII.

ONISCUS. *Pedes* XIV.*Antennæ* setaceæ.*Corpus* ovale.

*Afilus*. 1. O. ( l'afille ) abdomine oliis duobus  
obtectō, cauda semiovali.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 88.

*Gron. zooph.* 997.

*Bell. aquat.* 443. *afilus* f. oestrum.

*Rond. pisc.* 576. *pediculus marinus*.

*Fab.* 3.

*Planc. de conch. minus notis.* t. 5. f. *A. B.*

*Pall. spicil. zool. fasc.* IX. p. 71. t. 4. f. 12.

*Hab. in Oceano Europæo.* Viviparus.

*Oestrum*. 2. O. ( l'oestre ) abdomine foliis sex ob-  
tectō, cauda retusa.

*Mus. Reg.* 89.

*Margr. bras.* 155. f. 3, 4. *animalculum*  
*crustaceum*.

*Stroem. sondm.* 165. n. 2. t. 1. f. 2, 3.

*Fab.* 3.

*Pall. spicil. zool. fasc.* IX. p. 74. t. 4.  
f. 13.

*Seb. mus.* 1. t. 90.

*Hab. in Oceano Europæo.*

*Pfora*. 3. O. ( l'anti - galeux ) abdomine subtus  
nudo, cauda semiovali acuta. \*

*Fab.* 3.

*Hab. in Oceano Norwagico.*

*Desc.* Magnitudo præcedentium. *Thorax*  
segmentis 7 æqualibus. *Cauda* segmentis  
quinque angustioribus, præter ultimum

quod semiovale, sed acutum. *Antennæ*  $\frac{1}{4}$  totius longitudinis. *Pedes* XIV, quorum 6 primi antrorsum versi digito incurvo & affixi corpori articulo arcuato. *Abdomen* nudum. *Cauda* obtecta foliolis angustis non excidentibus. *Ovarium* externe contra scabiem specificum Norwagis. *Solander. Faun.* 2054.

Phyfodes. 4. O. ( la quadricorne ) abdomine subtus nudo, cauda ovata.

*Fab.* 13. abdomine subtus nudo, cauda ovata, antennis quaternis.

*Sulz. hist. inf. t.* 30. f. 11.

*Hab.* in Oceano. In terra del Fuego. *Mus. D. Banks.*

*Corpus*, præter caput & caudam ultimam, ex 7 segmentis trunci, & 5 caudæ. *Antennæ* utrinque 2, breves. *Caudæ* folium terminale omnino ovatum; ad latera utrinque subtus audum duobus petiolis diphyllis, foliolis lanceolatis, obtusis, cauda brevioribus; caudæ articuli subtus obtekti numerosis vesiculis longitudine caudæ.

Entomon. 5. O. ( Entomon ) abdomine subtus nudo, cauda subulata. \*

*Raj. inf.* 43. asellus marinus cornubiensis alius.

*Pet. gaz. t.* 1. f. 4.

*Gron. zooph.* 992.

*Baster. subsf.* 2. p. 143. t. 13. f. 2.

*Klein. dub.* 38. f. 1, 2. Entomon pyramidale.

*Fab.* 5.

*De Geer tom.* 7. p. 514. n. 2. t. 32. f. 11. - 14. Iquilla marina, cauda longa, subulata, crustacea.

*Pall. spicil. zool. fasc.* IX. p. 64. t. 5. f. 1.

*Hab. in Mari Balthico.*

*Desc.* Magnitudo extimi articuli pollicis ; supra convexus, infra planus, margine undique acuto. *Capitis* clypeus undique incisus est. *Pedes anteriores* utrinque tres, minores, glabri ; *posteriores* utrinque quatuor, majores, ciliati. *Antennarum* in fronte bina paria. *Corpus* septem incisuris, præter caput & caudam. *Cauda* duas tertias partes corporis longitudine æquat, indivisa, tereti-triangularis, subtus vestita radiis duobus convexus, parallellis. *Totum* animal, exceptis oculis, album. *Faun.* 2055.

*Obs.* Natat velocissime, victitat cancris, piscibus, piscatoribus invisus. *Fab.*

Ceti. 6. O. ( de la baleine ) ovalis, segmentis distinctis, pedibus tertii quartique paris linearibus ovaticis.

*Mus. Ad. Fred. 1. p. 89. \**

*Fab. 17.*

*De Geer tom. 7. p. 541. n. 6. t. 42. f. 6.-10.* Squilla *balæni*, corpore ovali depresso, segmentis distinctis, pedibus cheliferis, tertii quartique paris linearibus muticis.

*Martens it. Spitzb. t. 8. f. D.*

*Pall. spicil. zool. fasc. IX, 76. t. 4. f. 14.*

*Eged. Groenl. t. 37.*

*Hab. in balænis, distinguendus a phalangio balænarum, simili.*

*Desc.* Corpus ovale, 7 articulis distinctis. *Caput*, quod primus articulus, minimum. *Pedes* 1, 2, 5, 6, 7, *chelis* crassis ungue mobili acuto terminatis. *Pedes* vero 3, 4, paris filiformes mutici ; primum par sub corpore situm est. *Corporis* articuli magis remoti &

distincti, quam in reliquis speciebus.  
*Faun.* 2056.

*Obs.* Ab hoc genere hunc oniscum separavit *D. de Geer* & sub genere squillarum uti plurimos alios ordinavit. Ab oniscis differre videtur & ulterius examinandus; *antennæ* enim quatuor. V.

Marinus. 7. O. ( le marin ) femicylindricus, cauda ovato-oblonga integra.

*It. Wgoth.* 190.

*Gron. zooph.* 996. t. 17. f. 3?

*Fab.* 7. femicylindricus, cauda ovato-oblonga acuminata.

*De Geer tom.* 7. p. 522. n. 3. t. 32.

f. 11. - 14. squilla marina, corpore elongato femicylindrico, cauda oblonga æquali, apice truncata.

*Bast. opusc. subf. tom.* 2. p. 143. t. 13. f. 2.

*Pall. spicil. zool. fasc.* IX, 66. t. 4.

f. 6. oniscus Balthicus.

*Hab.* in Oceano Norwagico.

*Desc.* Caput corporis latitudine, antice quadratum. *Antennæ* quatuor; *exterior*es setacæ, longæ, articulis plurimis. *Corpus* cylindraceum, incisuris 11, septem aliis majoribus. *Pedes* 14, brevès, conici; singuli articulis sex. *Cauda* supra convexa, apice truncata, lunata.

2-Caudatus. 8. O. ( la double queue ) femicylindricus, caudis duabus longitudine corporis. \*

*Fab* 10.

*Hab.* in Oceano Norwagico.

*Desc.* *Corpus* femicylindricum, fuscum, 12 articulis. *Pedes* utrinque 7 albi, quorum solitarii *postici* reflexi. *Caudæ* 2 protensæ, longitudine corporis, §

articulis, quorum tertius major, longior & crassior; primus & secundus breves; quartus & quintus angustiores. Inter has caudas, *caudæ* 2 aliæ, breves, subulatæ. *Faun.* 2062.

Scopulorum. 9. O. ( des écueils ) luteus frigis fuscis,  
*It. Wgoth.* 190.  
*Stroem. fœndm.* 166. n. 3.  
*Fab.* II.  
*Hab.* in Oceano Norwagico.

Aquaticus. 10. O. ( l'aquatique ) lanceolatus, cauda rotundata, stylis bifurcis. \*  
*Raj. inf.* 43.  
*Frisch. inf.* 10. t. 5.  
*Geoff. paris.* 672. t. 22. f. 2. asellus I.  
*Schæff. elem.* t. 22.  
*Fab.* 6. cauda rotundata, stylis bifurcis, antennis quaternis.  
*Faun. Fridr.* n. 853.  
*De Geer tom.* 7. p. 496. squilla asellus aquatica, cauda rotundata stylis binis bifurcis.  
*Enum.* n. 1120.  
*Müll. Lin. Nat. cl.* V. p. 1151.  
*Hab.* in aquis puris.  
*Confer. Entomon. hieroglyphicum.* Klein, *dub.* f. 5, sed maximum.  
*Desc.* Constat articulis septem, præter caudam & caput. *Caudæ* articulus reliquis, ut & ipso capite major, planus, subrotundus, e quo prodeunt duo styli, singuli bifidi. *Pedes* utrinque septem, quorum *postèriores* semper longiores antecedentibus. *Antennæ* sericeæ, articulis tribus. *Faun.* 2061.  
*Obs.* I. Novum genus sub nomine aselli apud *D. Geoff.* squilla I *D. de Geer.* In genere oniscorum conservavit *D. Fab.*



hujusque celeb. Entomologi *Squilla* genus ab eodem *D. de Geer.* genere omnino diversum. Hinc tyronum ambages. V.

*Obs.* 2. Mas, ut in astacis, foemina major. Post copulam crescit hæc species, sed metamorphosin nullam subit. Ubique & in omni tempestate reperitur. Non natat. V.

*Obs.* 3. Pulli intra folliculum sexfidum matris. *Fab.*

Oceanicus. 11. O. ( l'océanique ) ovalis, cauda bifida stylis bifidis.

*Stroem. fœndm.* 202. t. 1. f. 14, 15, oniscus stylis caudæ utrinque binis.

*Baster. subf.* 26. p. 145. t. 13. f. 4.

*Ad. helv.* 5. p. 371. t. 5. f. 463. O. corpore lato, pedibus natatoriis, cauda utraque bifida.

*Gron. zooph.* 994. t. 17. f. 2.

*Fab.* 18.

*Hab.* in Oceano Europæo.

*Simillimus* O. afello, ut, nisi locus dissuaderet, facile idem judicaretur.

Affimilis. 12. O. ( l'analogue ) ovalis, cauda obtusa mutica.

*Baster. subf.* 2. p. 144. t. 13. f. 3.

*Fab.* 19. ovalis, cauda obtusa mutica, corpore cinereo.

*Raj. inf.* 43. afellus marinus vulgari brevior & latior.

*Pall. spicil. zool. fasc.* 1X, 70. t. 4. f. 18? Oniscus *globator*.

*Hab.* in Oceani Europæi fucis.

*Simillimus* O. afello, sed absque stylis.

Afellus. 13. O. ( le cloporte ) ovalis, cauda obtusa, stylis simplicibus.

*Scop. carn.* 1142.

*Matth. diofc.* 257.

*Raj. inf.* 41. n. 1.

*Aldr. inf.* 632.

*Mouff. inf.* 202.

*Schæff. elem.* t. 92.

*Gron. zooph.* 993.

*Sulz. inf.* t. 24. f. 154.

*Geoff. parif.* 678. t. 22. f. 1. oniscus 2,  
le cloporte ordinaire.

*Fab.* 22.

*Faun. Fridr.* n. 852.

*De Geer tom.* 7. p. 547. oniscus ovalis,  
subdepressus, flavo maculatus, cauda  
stylis duobus conicis articulatis.

*Enum. n.* 1121.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1152.

*Pod. gr.* p. 126.

*Hab. in* domibus, muris, hybernaculis,  
lignis putridis.

*Desc.* Ab omnibus cognitus est. Variat,  
1°. Colore fuscescente, macula albida  
semicirculari prope caput.

2°. Colore subferrugineo, corpore im-  
maculato.

3°. Corpore lineis maculisque parvis for-  
didis variegato, quali in fylvis hab.  
intra truncos cariosos.

*Obs.* Recens natus, pedes 13, 14 incisu-  
raeque una abdominis defunt. *D. de Geer.*

Armadillo. 14. O. ( l'armadille ) ovalis, cauda obtusa  
integra. \*

*It. Goth.* 298.

*Scop. carn.* 1144.

*Raj. inf.* 42. A. lividus.

*Geoff. parif.* 670. oniscus 1.

*Fab.* 23.

*Sulz. hist. inf.* t. 30. f. 13.

*Enum. n.* 1122.

*Pod. gr. p.* 726.

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p.* 1153.

*Hab. in Europa, sub lapidibus.*

*Desc. Totus niger, marginibus segmen-  
torum albis; macula alba sub femoribus  
posterioribus in singula incisura. Cauda  
obtusula, integra, nec bifurca. Tactus  
se contrahit in globum immobilem,  
durum, uti armadillo, quietus diu  
jacet, ut ignoto pro pilula vel puppa  
ichneumonis omnino haberetur. Pedes  
plures quam quatuordecim, segmenta  
corporis 10, præter caudam & caput.  
Syst. Faun. 2059.*

*Ex spec. D. Fab.*

Chelipes. 15. O. ( le porte-pince ) oblongus, cauda  
tridentata, pedibus subcheliformibus. 9.

*Pall. Micell. 194. t. 14. f. 16, 17. de-  
pressus oblongus, pedibus omnibus  
subcheliformibus.*

— *spicil. 1700. fasc. IX, 69. t. 4. f. 17.  
oniscus linearis.*

*Bast. subsf. 2, 143. t. 13. f. 2. med.*

*Hab. inter Maris Atlantici fucos.*

Spinosus. 16. O. ( l'épineux ) oblongus, corpore spi-  
noso pellucido 14.

*Hab. in Oceano Atlantico. Mus. D. Banks.*

*Desc. Corpus medium, gelatinoso-  
membranaceum, pellucidum. Caput  
magnum, rotundatum, obtusum,  
marginibus spinosis. Oculi maximi,  
contigui. Antennæ duæ simplices  
ferratæ. Segmenta corporis undecim  
sensim angustiora, carinata, carina  
spinulosa. Abdomen subtus foliolis sex  
ovatis obtegentibus. Cauda brevis,  
foliolis quatuor bifidis. Pedum septem*

paria , 1, 2, brevia , chelata , approxi-  
mata ; 3, 4, 5, 6 longiora , angu-  
lata , angulis spinulosis , articulo ultimo  
subulato , simplici , 7 breve , articulo  
ultimo clavato , unguiculato.

**Albicornis. 17.** O. ( l'albicorne ) oblongus fuscus ,  
cauda pallida , nigro punctata. *Mantiss.*  
*tom. 1. n. 16.*

*Hab. in* Mari Hispanico , pisces confu-  
mens. *D. Vahl.*

*Desc.* Minor O. *Oceanico.* *Antennæ* corpore  
duplo breviores. *Corpus* fuscum , seg-  
mentorum marginibus subpallidioribus.  
*Cauda* foliolis quinque pallida , atomis  
sparsis nigris. *Pedes* pallidi.

**Serratus. 18.** O. ( le dentelé ) ovatus fuscus , cauda  
foliolis quinque , exterioribus extus  
ferratis. *Mantiss.* 19.

*Hab. in* Oceano Hispanico. *D. Vahl.*

*Desc.* *Corpus* parvum , ovatum , breve ,  
totum fuscum. *Cauda* foliolis quinque ,  
intermedio majori ovato , obtuso , la-  
teralibus angustioribus externe ferratis.

**Macillatus. 19.** O. ( le tacheté ) ovalis , cauda obtusa  
mutica , corpore plumbeo , lineis punc-  
tatis albis.

*Hab. in* Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia  
Aust. V.

*Desc.* Statura O. *armadillo* , at triplo  
major. *Color* totius corporis plumbeus ,  
lineis septem longitudinalibus , punctis  
albis , extimis marginalibus.

**Pustulatus. 20.** O. ( le pustulé ) ovalis ater , segmento  
primo punctis quatuor , reliquis duobus  
rubris 21.

*Scop. carn.* 1114. oniscus armadillo.

*Hab. in Lusitania. D. Gray.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Differt manifeste ab *O. armadillo*. primum segmentum atrum, nitidum, punctis quatuor rubris, reliqua segmenta pallidiora punctis duobus.

*Obs.* In nostris puncta lutea, sed eadem species videtur. V.

*Ex Ent. Carn.*

Muscorum. 21. *O.* ( des mouffes ) oblongus, antennis quadrinodiis, cauda lamellis parvis lanceolatis binis acuminatis.

*Hab. in Europa*, non rarus in sylvis inter muscos, imo & circa hortos sub saxis.

*Desc.* Corpus fuscum, luteo maculatum. Segmenta corporis 7, caudæ 6. *Antennæ* attenuatæ. Caudæ futura ultima mucronem effert, sub quo alius bifidus, segmentis pilo terminatis. Lamellæ duæ posticæ huic uni propriæ.

*Ex oper. D. de Geer.*

Convexus. 22. *O.* ( le voûté ) ovalis convexus immaculatus, cauda stylis duobus convexis articulatis.

*Hab. in Europa, Suecia.* In Gallia Aust. Lugdunum prope.

*Desc.* *O. asello* affinis, sed magis convexus. *Totus* murinus, immaculatus. Tactus, ut *O. armadillo*, globosus evadit. *O. aselli* forsan variatas.

*Ex nost. Mus.*

Marginatus 23. *O.* ( le bordé ) niger, segmentis corporis luteo marginatis. t. II. f. 15.

*Hab. in Europa. In Gallia Australiori. V.*  
*Desc. Parvus, niger. Segmenta omnia,*  
*luteo nitido marginata. Tactus se con-*  
*trahit ut O. armadillo.*

Variegatus. 24. O. ( le varié ) niger , segmentis cor-  
 poris nigris , albo marginatis , in  
 medio variegatis. t. II. f. 16.

*Hab. in Europa. In Gallia Aust. prope*  
*Nemaufum.*

*Desc. O. asello paullo minor. Segmenta*  
*corporis antice & postice albo margi-*  
*nata ; pars posterior nigra , anterior*  
*albido , flavo griseoque variegata.*  
*Colores ita distributi , ut spatium cur-*  
*vum unicuique proprium , constituent.*  
*Tactus se contrahit , sed non omnino*  
*in globum immobilem. Macula flava in*  
*medio segmentorum.*

*Obs. Varietas singularis in nostro mus.*  
*Quatuor segmenta antica ut in des-*  
*criptione : reliqua alba.*

Bicolor. 25. O. ( le bicolor ) murinus , corporis  
 segmentis 6 murinis , reliquis nigris.

*Hab. in Europa. In Gallia Australiori.*

*Desc. Medius. Caput & corporis segmenta*  
*sex murina , lineolis aliquot nigris.*  
*Septimum nigrum lateraliter primis*  
*concolor. Reliqua nigra , griseo mar-*  
*ginata ; subtus totus griseus. Rarissimus.*





## GENUS XIII.

SCOLOPENDRA. *Pedes* numerosi totidem utrinque quot corporis segmenta.

*Antennæ* setaceæ.

*Palpi* duo, articulati.

*Corpus* depressum.

Lagura, 1. S. ( le pinceau ) pedibus utrinque XII, corpore ovali, cauda penicillio albo.\*

*Scop. carn.* 1153.

*Geoff. paris.* 2. p. 677. t. 22. f. 4.

*Ad. paris. miss.* 1. p. 532. t. 17. f. 4.-10.

*Fab.* 1.

*De Geer tom.* 7. p. 571. n. 1. f. 1.-18.  
julus penicillatus, fasciculis squamosis,  
cauda penicillo albo, pedibus utrinque XII.

*Faun. Fridr. n.* 854.

*Hab.* in Suecia, sub muscis.

*Desc.* Magnitudo pediculi : utrinque *pedes* 12, a tergo penicillus expansus supra singulos pedes, dein in medio dorso transversalis fasciculus. *Cauda* constat penicillo majori pilorum conniventium majorum. *Faun.* 2063.

*Obs.* Hanc scolopendram inter julos numeraverunt *DD.* de *Geer* *Scopolique*; cur ad scolopendras retulerit *Linn.* Non video inquit *D. de Geer*; characteres enim huic generi proprii, scolopendræ *laguræ* defunt.

*Corpus* depressum articulatum.

*Pedes* numerosi totidem quot segmenta corporis.

*Antennæ* setaceæ.

*Oculi* plures, distincti, hemisphærici.

*Dentes* 2 curvati.

*Palpi* 2 articulati sub capite.

---

*Julus*. Corpus cylindricum, articulatum.

*Pedes* numerosi, segmentis utrinque duplo plures.

*Antennæ* filiformes, breves.

*Oculi* 2 reticulati.

*Dentes* 2.

Hanc scolopendram optime descripsit *D. de Geer*, ipsaque descriptio forsan dubium solvet. *Pedes* 24, utrinque 12, singulum par, singulo abdominis incisuris, quæ nota scolopendris convenit. Recens nata hæc species omnibus pedibus abdominis incisuris minime gaudet; sed hanc *D. de Geer* observationem toto scolopendrarum generi applicavit *D. Geoff.* hocque insectum, uti *D. Fab. Schrank*, &c. ad scolopendras retulit. V.

Coleoptrata. 2. *S.* ( la coléoptère ) pedibus utrinque XIV, thorace coleoptrato.

*Fab.* 2. pedibus utrinque 14, elongatis, thorace scutellato.

*Pall. spicil. zool. fasc.* 9. 85. t. 4. f. 16.

*Hab.* in Hispania. *D. Z. Hallman.* In Europa Australi. *Fab.* In Galliæ Aust. domibus. V.

*Antennæ* flavæ, longitudine corporis.

Corpus figura *S.* forficatæ, sed longius, segmentis 8, singulis testis clypeolo semiorbiculato, postice emarginato. Elytron simplex, tanquam ex duobus coadunatum, postice emarginatum, incipiens ad 4tum. segmentum

*corporis , tegens unum tantum alterumve segmentum. Alæ sub elytro angustæ , simplices. Pedes 14 paribus , ultimis longitudine ferme corporis. Femora aculeata. Tibiæ scabræ. Digitus articulis innumeris.*

*Obs.* Singulare insectum , tempore pluviæ frequenter in nostris domibus obvium. *Corpus* tribus lineis longitudinalibus nigris e lineolis nigris compositis. *Femora & tibiæ* flavescencia , nigro variegata. V.

Forficata. 3. S. ( la forchue ) pedibus utrinque XV.

*Scop. carn.* 1146.

*Raj. inf.* 45.

*Mouff. inf.* 199.

*Aldr. exsang.* 635.

*Sulz. inf. t.* 24. *f.* 155.

*Geoff. paris. t.* 2. *p.* 674. *t.* 22. *f.* 3.

*Schæff. elem. t.* 111. *f.* 1.

*Fab.* 3.

*De Geer tom.* 7. *p.* 557. *n.* 1. *t.* 35.

*f.* 12 - 16. rufo-fusca , pedibus utrinque XV.

*Enum. n.* 1123.

*Pod. gr. p.* 126.

*Faun. Fridr. n.* 855.

*Hab. in Europa , in America septentrionali. Kalm.*

*Desc.* Rubra est , vix digitum transversum longa. *Pedes* antici crassi & validi , ultimi longissimi ; hinc cauda quasi cauda bifurca. *Corporis* articuli alterni reliquis dimidio breviores. *Faun.* 2064.

Morsitans. 4. S. ( la mordante ) pedibus utrinque XX.

*Amæn. acad.* 1. *p.* 325 , 506. *t.* 11.

*f.* 17. - *f.* 18. junior.

*Mus. Ad. Fr.* 1. *p.* 89.

*Olear. mus. t. 12. f. 5.*

*Pet. gaz. t. 13. f. 3.*

*Leuwenh. epist. 102.*

*Brald. nat. t. 25. f. 4.*

*Seb. mus. 1. t. 81. f. 3, 4.*

— 2. t. 25. f. 3, 4.

*Frisch. inf. 11. t. 2. f. 7.*

*Catesb. car. 3. p. 2. t. 2.*

*Gron. zooph. 1002.*

*Margr. bras. 253. japuruca.*

*Fab. 5.*

*De Geer tom. 7. p. 563. n. 1. t. 43.*

f. 1.-4. pedibus utrinque XXI, posterioribus spinosis.

*Sulz. hist. inf. t. 30. f. 14.*

*Schoet. abhand. 1. t. 3. f. 2.*

*Hab. in Indiis. In Gallia Aust. circa Massiliam. V.*

*Oculi utrinque quaterni. Articuli corporis 22, antennarum 20.*

*Obs.* Licet hæc scolopendra ab omnibus Entomologis, ut exotica, indicata fuerit, in Europa indigena hodie videtur. Statura oculorum, articulorumque corporis numerus, posteriorum spinæ, nostræ conveniunt; sed pedes 21; computatis posterioribus. Variat magnitudine; dantur enim quæ 5 pollices longæ, dum alia 3 vel quatuor; nec est scolopendra *ferruginea*, quæ adhuc circa Massiliam indigena est. V.

*Ferruginea. 5. S. ( la ferrugineuse ) pedibus utrinque XXII.*

*Fab. 6.*

*De Geer p. 568. n. 2. t. 43. f. 6. pedibus utrinque XXIII, posterioribus longiusculis bispinosis.*

*Hab. in Africa. In Gallia Aust. circa Massiliam. V.*

Corpus

*Corpus rufum f. ferrugineum segmentis*  
20, præter caput. Pedes lutei.

An varietas præcedentis? An species? Nec  
statura nec forsan pedum numerus  
species hujus generis satis distingunt  
optimeque animadvertit *D. Schrank* in-  
fundamentum præbere pedum nume-  
rum in hac & sequenti specie; forficata  
enim scolop. occurrit pedibus utrinque  
13, 15, 22, nec verum, inquit idem  
doctus Entomologus, hanc varietatem  
ætatis esse; minores possideo species quæ  
pedes plures habent, dum multo  
majoribus pauciores obtigerint. Insuper  
variat numerus spinarum pedum poste-  
riorum, sed si duæ species, ambæ  
in Gallia Aust. V. Faun. 2064.

Gabrielis. 6. S. ( la Gabriele ) pedibus utrinque  
CXLVIII.

Fab. 9.

Hab. in Gallia Fr. Gabriel Baro, Massi-  
liensis Capucinus.

Facies S. electicæ, sed quadruplo major.  
Antennæ breves articulis 14. Cauda  
semiovalis cum appendiculo & tentaculis  
2 vix cauda longioribus.

Electica. 7. S. ( l'électrique ) pedibus utrinque  
LXX. \*

Aldr. inf. 636. f. 8.

Frisch. inf. 11. t. 8. f. 1.

Raj. inf. 45.

Geoff. paris. 2. p. 676. n. 2.

Fab. 10.

De Geer tom. 7. p. 561. n. 2. t. 35.

f. 17. - 20. flava, capite pedibusque  
utrinque LIV rufis.

Enum. n. 1124.

Pod. gr. p. 126.

Insect. Tomus IV.

N

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1159.*

*Faun. Fridr. n. 856.*

*Hab. in Europæ terra, in tenebris manifeste scintillat vel per se lucet.*

*Pedes numeratu difficiles, 46 ad 54.*

*Solander.*

*Desc. Rubra est, plana, filiformis, serpentis instar flexuosæ. Pedes 54 a singulo latere Frischius numerat, nostra 70 vel 78 obtinet. Faun. 2065.*

Marina. 8. S. ( la marine ) pedibus utrinque. . . .  
corpore pallido, linea dorsali rufa.

*It. W'goth. 191.*

*Fab. 13.*

*Stroem. fundm. I. 160.*

*Hab. in Oceano Atlantico, Norwagico.*

*Corpus rubrum ( unde Rødaat ), Norwagis frequentissimum, Clupearum Harengarum esca, unde abdomen piscium rufescit & corpus brevi pubescit, nisi saltem per biduum relinquuntur pisces retibus illaqueati in mari. Stroem.*





## GENUS XIV.

JULUS. *Pedes* numerosi, duplo utrinque plures,  
quam corporis segmenta.

*Antennæ* moniliformes.

*Palpi* duo, articulati.

*Corpus* semicylindricum.

Ovalis. 1. J. ( l'ovale ) pedibus utrinque XX.

*Amœn. acad.* 4. p. 253. n. 36. t. 3.

f. 4. \*

*Gron. zooph.* 995. t. 17. f. 4, 5. \* oniscus.

*Fab.* 1.

*Hab.* in Oceano Europæo.

*Segmenta corporis oblongo ovalis* 10,  
*præter thoracis & caudæ.*

Terrestris. 2. J. ( le terrestre ) pedibus utrinque C. \*

*Scop. carn.* 1152.

*Mouff. inf.* 30.

*Raj. inf.* 46. n. 4.

*Aldr. inf.* 636. f. 4.

*Frisch. inf.* 11. t. 8. f. 3.

*Jonst. inf.* t. 23.

*Geoff. paris.* 67. n. 1.

*Gron. zooph.* 1007.

*Fab.* 4.

*Sulz. inf.* t. 24. f. 156.

— *hist. inf.* t. 30. f. 15.

*De Geer tom.* 7. p. 578. n. 2. t. 36.

f. 9.-12. nigro-fuscus, lineis binis longitudinalibus rufis, pedibus utrinque C.

*Enum.* n. 1125.

*Pall. spicil.* 700. fasc. 9. p. 85.

*Beytr. Zur. nat.* p. 97. §. 70.

N ij

*Faun. Fridr. n. 857.*

*Hab. in Europa, sub terra.*

*Desc. Corpus* subcylindricum, fuscum :  
dorsum linea longitudinali duplici fer-  
ruginea notatum. *Antennæ* 5 articulis,  
quorum ultimus subglobosus. Datur &  
*niger totus* & minor simul. *Faun. 2066.*

Complana- 3. J. ( l'aplati ) pedibus utrinque XXX,  
tus. corpore planiusculo, antennis cla-  
vatis. \* *t. II. f. 19.*

*Scop. carn. 1150.* scolopendra julacea.

*Pod. inf. 127.* julus scolopendricus.

*Fab. 5.* pedibus utrinque 30, corpore  
planiusculo.

*De Geer tom. 7. p. 586. n. 3. t. 36.*  
*f. 23. - 26.* fuscus, pedibus utrinque  
XXXI, segmentis corporis clypeolis  
planiusculis marginatis.

*Enum. n. 1127.*

*Faun. Fridr. n. 858.*

*Geoff. inf. tom. 2. p. 675. n. 3.* scolo-  
pendra fusca, pedibus utrinque tri-  
ginta, teste *D. Fab.*

*Hab. in Europa. In Anglia frequens Fab.*  
*In Gallia. Aust. V.*

*Desc. Corpus* longitudine unguis, pla-  
niusculum, lineare, lateribus angula-  
tum, supra pallidum, subtus albes-  
cens, segmentis 20, tectum clypeolis  
supra planiusculis, tuberculatis, margi-  
natis, subquadratis, ad latera ferrulatis,  
angulatis, posticis acutis, extra cor-  
poris segmenta parum extantibus. *Pri-*  
*imum* segmentum est *caput* ovatum  
depressum; *secundum* s. collum tectum  
clypeo antice rotundato, postice trun-  
cato s. lunato; *tertium* & *quartum*  
segmentum reliquis breviora & fere  
linearia, *Segmentum* 20 s. cauda,

triangulare f. acuminatum leve. *Pedes* utrinque 30, scilicet sub singulo segmento duo paria, at segmento 3, 4, 18, 19 unicum tantum par pedum. *Antennæ* capite triplo longiores, sex articulatae; 5 articulus, subglobosus, obscurior; 6tus. minimus est. *Faun.* 2068.

*Obs.* 1. *Julus* hic ab omnibus Entomologis descriptus fuit; sed nec *D. Linn.* nec *D. de Geer*, nec *D. Schrank* scolopendram n. 3. *D. Geoff.* citaverunt. Solus *D. Fab.* synonymiam admisit. In *Enum.* descriptio deest, observat tantum magnitudinis variationem *D. Schrank.* *Parvus plerumque, possideo tamen specimen 10 lineas longum, 1 ½ lin. crassum.* Noster ejusdem est magnitudinis. Color margaritaceus, nitidus. *Corpus* annulis viginti. Primus duoque ultimi pedibus carent; sub segmento 2, 3, 4 unicum tantum par pedum; pedes igitur 62 f. 31 in utroque latere. *Corpus* infra complanatum ut supra. *Antennæ* 7 articulis, articulo sexto crassiore, ultimo minimo. V.

*Obs.* 2. Ex his patet *julum complanatum* esse scolopendram n. 3. *D. Geoff.* etli tantisper differt; synonymiam igitur *D. Fab.* bono jure conservavi. V.

Sabulosus. 4. *J.* ( du fable ) pedibus utrinque CXX.  
*It. Goth.* 280.

*Geoff. paris.* 679. n. 2. t. 22. f. 5.

*Raj. inf.* 47.

*Schæff. elem.* t. 73.

*Fab.* 7.

*Hab.* in Europæ fabulosus.

*Desc.* Longitudo pollicis tranversi; crassities 8 pennæ columbinæ. Glaber cinereus, lineis duabus longitudinalibus.

dorsalibus ferrugineis, pallidis. *Corpus* segmentis 50, substriatis, segmento ultimo acumine prominente. *Antennæ* 5 articulis. *Pedes* exalbidi. Tactus in spiram planam, pedibus tamen spectantibus, contrahitur. *Faun.* 2067.

*Obs.* Lineæ horizontales minime constantes. V.

Varius. 5. J. ( le varié ) pedibus utrinque 78, segmentis basi nigris apice albis. *D. Fab.*

*Hab.* in Italia. *Dr. Allioni.*

*Desc.* Medius. *Caput* nigrum, fascia media alba. Segmenta corporis albiba; basi nigra. Margo tenuissime ferrugineus. *Pedes* nigri.





## INSECTORUM

## ILLUSTRATIONES.

## SCARABÆUS.

Lunaris- 2. *S. Variat minor*, cornubus minoribus,  
*Obs.* Varietas hæc circa Lugdunum.

Cylindricus- 3. *S. Sulz. inf. t. 1. f. 2.*  
*Laichart. inf. 4. 4.*  
*Scop. introduc. hist. nat. 5. 75.*

Mobilicor- 4. *S. Jablonsk. coleopt. 1. t. 8. f. 6, 7.*  
*Laichart. inf. t. 1. f. 11.*  
*Obs.* Fœmina omnino mutica. *Corpus*  
*nigrum. Elytra striata.*

Hispanus. 7. *S. Voet. scar. t. 24. f. 13.*

Silenus. 19. *S. Desc. Statura & summa affinitas scar.*  
*naxicornis. Totus piceus. Capitis cornu*  
*parvum subulatum, valde recurvum.*  
*Thorax antice valde excavatus. Elytra*  
*lævia.*

Scybala- 20. *S. Desc. Caput & thorax atra, nitida,*  
*rius. tuberculis capitis tribus, intermedio*  
*acutiori. Elytra striata testacea, ma-*  
*cula marginali nigra.*  
*Herlst. arch. 6. scarabæus foetidus.*  
*Obs.* Variat elytris immaculatis.

- Terrestris. 21. *S. Desc.* Affinis *scar. fossori*, at triplo minor. *Tubercula capitis* minora, breviora, obtusiora. *Elytra* striata.
- Testaceus. 22. *S. Desc.* Statura *scar. vernalis*, at triplo minor. *Totus* pallide testaceus. *Tubercula* duo parva in fronte. *Thorax* convexus, punctis vagis plurimis adspersus. *Elytra* striata, striis punctatis. *Subtus* hirtus.
- Bicolor. 23. *S. Desc.* *Corpus* parvum ovatum, gibbum. *Caput* nigrum, ore *antennisque* rufis. *Clypeus* subrotundus, integer, in medio tuberculo elevato reflexo. *Thorax* ater, glaber, punctatus, in medio canaliculatus, utrinque puncto parvo prominulo. *Elytra* atra, striata, *Subtus* uti & *pedes* rufi.
- Sordidus. 24. *S. Desc.* Statura *scar. conspurcati*, at paullo major. *Clypeus* rotundatus, integer, niger, macula utrinque pallida tuberculisque tribus, intermedio subcornuto. *Thorax* lævis, glaber, ater, margine omni pallido; punctum utrinque nigrum in margine pallido. *Elytra* striata grisea, futura obscuriori. *Subtus* nigro griseoque variagatus, *pedibus* pallidis.
- Luridus. 25. *S. Desc.* *Caput* & *thorax*, atra, nitida, mutica. *Elytra* striata, grisea, lineolis maculisque nigris.
- Vitulus. 26. *S. Desc.* Magnitudo & statura *scar. vacca*. *Clypeus* rotundatus ater, medio linea transversa elevata, postice corniculis duobus elevatis brevibus. *Thorax* antice quadridentatus, denticulis æqualibus



brevibus, postice rotundatus absque scutello. *Elytra* brevica, atra. *Pedes* atrii.

Verticicor. 27. S. Desc. Statura & summa affinitas scar. nuchicornis, at minor. Capitis clypeus rotundatus æneus, cornu brevissimo recurvo. Thorax rotundatus inermis, griseus, punctis duobus anticis & unico ad latera nigris. *Elytra* lævia grisea. *Pedes* pallidi.

Lemur. 28. S. Desc. Statura omnino scar. nuchicornis, at distincta species. Capitis clypeus antice rotundatus, integer, postice carinis duabus, transversis elevatis. Thorax rotundatus, cupreus, antice dentibus quatuor brevibus, intermediis approximatis. *Elytra* testacea. Corpus nigrum.  
Ad. nat. cur. hall. 237.

Ater. 29. S. Desc. Niger. Caput tribus tuberculis transversalibus. Thorax concavo punctatus. *Elytra* striis punctatis vix conspicuis.

Pillularius. 32. S. Pall. icon. t. A. f. 3. scarabæus mopsus.  
Sulz. icon. t. I. f. 7.

Fullo. 40. S. Pall. itin. 2. 718. 4. scarabæus albus?  
— icon. I. 19. t. B. f. 21. scarabæus hololeucos vix distinctus.

Agricola. 41. S. Variat interdum fascia obsoleta.

Morio. 62. S. Cetonia morio potius quam cetonia funesta D. Fab.

**Testudina-** 63. S. *Desc.* Parvus, statura scar. *fulcati-*  
*rius*. Capitis *clypeus* rotundatus, vix tuber-  
 culatus. *Thorax* scaber ater. *Elytra*  
 profunde fulcata picea, punctis ferru-  
 gineis per paria dispositis adspersa.  
*Pedes* picei.

**Merdarius.** 64. S. Deleatur. Mera scar. *quisquillii* varietas  
 videtur.

**Porcatus.** 65. S. *Desc.* Statura & magnitudo scar.  
*asper*. Totus obscure fuscus. *Elytra*  
 porcata vel profunde fulcata, sulcis  
 transversim striati.

**Asper.** 66. S. *Desc.* Magnitudo & statura scar.  
*testudinarii*. Capitis *clypeus* emarginatus.  
*Pedes* rufescentes.

**Flavipes.** 67. S. *Desc.* Statura omnino scar. *cincti*.  
*Clypeus* integer, niger. *Thorax* rotun-  
 datus, niger, margine omni pallido  
 laterali puncto impresso. *Elytra* obscure  
 pallescentia. *Pedes* flavi.

*Laichart.* I, 24, 17:

**Ruficornis.** 68. S. *Desc.* Caput nigricans, antennis  
 rufis. *Thorax* & *pectus* villis densis  
 tecta. *Elytra* testacea immaculata. *Ab-*  
*domen* albidum, ano nigricante. *Pedes*  
 nigri.

**Oblongus.** 69. S. *Desc.* Minor scar. *vulgari*. Totus  
 niger glaber. *Oculi* testacei. *Elytra*  
 striis per paria approximatis, subpunc-  
 tatis, obsoleti.

**Frischii.** 70. S. *Desc.* Simillimus scar. *horticolæ*, at  
 duplo major. Caput & thorax obscure

ænea, glabra, nitida. *Scutellum* rotundatum, æneum. *Elytra* testacea, sutura virescente.

Vitis. 71. *S. Desc.* Nimis præcedenti affinis. *Corpus* viride, *thoracis* lateribus flavis. *Pedes* nigri.

Arvicola. 72. *S. Desc.* Nimis affinis scar. *horticola*, at color totius corporis niger.

Praticola. 73. *S. Desc.* Affinis scar. *agricola*, at clypeus haud reflexus. Variat colore uti scar. *agricola*. *Thorax* mox magis flavus, mox magis niger. *Scutellum* nigrum. *Elytra* pallide testacea, interdum facia media nigra.

Ruricola. 74. *S. Desc.* Statura scar. *horticola*. *Clypeus* rotundatus integer. *Caput*, *thorax* & *abdomen* atra, holosericea, immaculata. *Elytra* rufo-testacea, undique cincta margine nigro holosericeo.

Variat rarius elytris obscuris, margine tamen super obscuriore.

Humuralis. 75. *S. Desc.* Parvus. *Caput* atrum, clypeo reflexo truncato integro. *Thorax* ater immaculatus. *Elytra* substriata, basi pallida, puncto nigro. Punctum parvum pallidum in medio elytrorum. *Pedes* nigri.

Hirtus. 76. *S. Desc.* *Caput* & *thorax* viridia, nitida, pilis albis elongatis hirta antennisque piceis. *Scutellum* viride. *Elytra* fusca, pilis albis hirta margineque pilis erectis nigris ciliato. Sutura parum virescit. *Subtus* pilis albis densioribus testata. *Pedes* virides, nitidi.

*Pall. icon. t. A, f. 15. scarabæus alopecias.*

**Vulpes. 77.** *S. Desc. Clypeus brevis integer, aureus, margine nigricante. Thorax aureus, pilis fulvis elongatis densissimis tectus. Elytra magis testacea, itidem pilis elongatis fulvis tecta. Abdomen rufum basi nigrum apice pube, forte maris, cornea, inflexa, bidentata. Pedes aurei.*

**4-Punctatus. 78.** *S. Desc. Magnitudo & statura scar. morionis, at puncta quatuor minutissima alba in thorace.*

**Villosus. 79.** *S. Desc. Statura & magnitudo scar. vulgaris. Clypeus major quam in reliquis, apicibus reflexis. Thorax rotundatus niger, ferrugineo pubescens, imprimis macula laterali. Scutellum albo villosum. Elytra testacea, rarius fusca. Subtus corpus lana alba densa tectum.*

**Abdominalis. 80.** *S. Desc. Nimis affinis scar. M. horticola. Antennæ testaceæ. Pedes nigri.*

**Copris. 81.** *S. Desc. Caput clypeatum nigrum. Palpi nigri. Thorax nitide ater, basi rufa, margine flavescenti. Elytra ferruginea, sutura margineque nigris. Abdomen pedesque nigra. Tibiæ anticæ tridentatæ.*

**Chrysomeloides. 82.** *S. Desc. scutellatus. Tibiæ anticæ bidentatæ.*

*Habitus prorsus chrysomelæ, ni pedes & antennæ vetarent. Melolontha 75. Mant. Hab. in Europa, in ligno putrescente.*

**Alpinus. 83.** *S. Desc. exscutellatus. Elytra fusco-nigra, uti lucanicervi, apice in magis rubentem*

colorem definunt, longitudinaliter decem lineis exarantur. Cætera ater. *Tibiæ anticæ* tridentatæ.

Variegatus. 86. S. Desc. Caput nigrum. *Antennæ* nigræ, capitulo trifido. Caput postice denticulo marginali utrinque, occipite transversa villorum linea barbato. *Thorax* albidus, villosus; in medio plicis duabus, binisque punctis atris in latere quolibet. *Elytrum* nigrum, striatum, planiusculum, abdomine brevius, basi & in medio punctis albis contiguis variegatum. *Abdomen* cinereum. Punctum album trigonum, sub quolibet elytro inter pedes posticos mediosque. *Pedes* nigri. *Tibiæ anticæ* 5-dentatæ. *Femora postica* fasciis duabus albis. Accedit *hemiptero* Linn. Sed idem non est.

Minimus. 87. S. Desc. Omnium minimus, coccinellæ saltatoriæ L. facie. *Antennæ* clava trifida. *Caput*, *thorax* punctatus & *corpus* nigri coloris. *Elytra* subpunctata, obsolete striata.

\* *Thorace cornuto.*

Dispar. S. ( le dispar ) scutellatus thoracis cornu subulato protenso, capitis subulato subrecurvo, scutello cordato. M. 7.

*Jablonsk. coleopt. I. tab. 2. f. 3, 4.*

*Pall. icon. inf. I. t. A. f. 8. A. B. scarabæus. Ammon.*

*Hab. in regionibus Russiæ Australioribus.*

Camelus. S. ( le chameau ) exscutellatus thorace quadridentato, clypeo postice subbicorni, corpore atro. M. 128.

*Hab. in Germania, D. Heiff.*

*Desc.* Distinctus omnino a scar. *lemur*.  
*Clypeus* rotundatus, integer, lineis duabus transversis, carinatis, elevatis, posteriore majore bicorni. *Thorax* elevatus, rotundatus antice dentibus quatuor, mediis approximatis. *Elytra* vix striata. *Corpus* atrum. *Fœmina* thorace quadridentato ut clypeo tantum linea duplici transversa carinata, posteriore majore.

*Candidæ. S.* ( le Candida ) scutellatus rufus, thorace excavato antrorsum cornuto, tibiis anticis tridentatis.

*Hab.* in speciosum hoc animal in Calabria ulteriore, in Lacinio promontorio, vulgo *capo delle Colonne*, a Julio Candida fuit inventum.

*Desc.* *Corpus* rufo-testaceum, supra læve, nitens, subtus pilosum villo concolore. *Clypeus* rotundatus. *Thorax* sellæ instar concavus, margine elevato, antice cornutus. *Elytra* abdomine longiora, apicibus nigricantibus, punctis obsoletis striata. *Femora* breviora, incrassa. *Tibiae* anteriores uniarticulatæ, tridentatæ: posteriores biarticulatæ, bispinosæ.

*Vinc.* *Petagnæ specim. inf. Ulter. Calabria.* n. 9.

\*\* *Thorace inermi, capite cornuto.*

*Fœtens. S.* ( le puant ) scutellatus thorace inermi, capite tuberculis tribus, medio acuto, elytrorum limbo ferrugineo.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Caput* atrum, tuberculis tribus elevatis, intermedio majori acuto. *Thorax* lævis, ater, nitidus, macula marginali



ferruginea. *Elytra* striata nigra, limbo, imprimis baseos, ferrugineo. *Abdomen* atrum, ano rufo. *Pedes* atri.

Bimacula- S. ( le bimaculé ) scutellatus thorace inermi;  
tus. capite subtrituberculato, elytris striatis  
macula baseos rufa.

*Hab.* in Germania. D. Hybner.

*Desc.* Statura & magnitudo scar. terrestris. *Caput* atrum tuberculis minutissimis. *Thorax* lævis, glaber, ater, immaculatus. *Elytra* striata, atra, macula baseos oblonga rufa. *Corpus* atrum.

Inquina- S. ( le fouillé ) scutellatus capite tuberculato, elytris griseis fusco maculatis.

*Herbst. arch.* 6. 16. scarabæus inquinatus.

*Hab.* in Saxoniae stercore. D. Hybner. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum, tuberculis tribus elevatis. *Thorax* ater, lævis, nitidus, margine subrufescente. *Elytra* striata, nitida, grisea, maculis variis fuscis.

Sphinx. S. ( le sphinx ) exscutellatus thorace inermi, punctis quatuor impressis, capite subcornuto, tarsis anticis nullis.

*Drury. inf.* 1. t. 35. f. 8.

*Ad. soc. berol. phys.* 4. t. 7. f. 10.

*Pall. icon.* 1. 4. t. A. f. 4.

— *iter.* 1. 462. 25.

*Hab.* in America Meridionali, in Gallia Meridionali. D. Brouffenet.

*Desc.* Statura & magnitudo scar. bisonis. *Totus* depressus niger, æneo-nitens. *Clypeus* rotundatus integer, in medio cornu recurvo, brevi, acuto, basi utrinque unidentato. *Thorax* glaber, lævis, basi rotundatus, in medio utrinque

puncto unico & postice duobus approximatis impressis. *Scutellum* minimum. *Elytra* striata. *Pedes* *antici* constant duobus tantum articulis, femore crasso, compresso, & *tibia* porrecta, arcuata dentata apice acuta. *Pedes* *secundi* paris, femoribus incrassatis, tibiis clavatis dentatis, *tarsis* brevissimis. *Fæmina*, capitis *clypeo* tuberculato.

Capra. S. ( la chevre ) exscutellatus thorace inermi, occipite spina erecta gemina, corpore nigro obscuro.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Statura & magnitudo scar. *vaccæ*. Capitis *clypeus* rotundatus, postice corniculis duobus elevatis. *Thorax* elevatus, rotundatus, niger, immaculatus. *Elytra* sublævia, nigra, immaculata.

Nutans. S. ( le trembleur ) exscutellatus thorace antice impresso, occipite spina erecta apice nutante, corpore nigro.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo scar. *nuchicornis*. Capitis *clypeus* rotundatus, niger, occipite spina erecta basi latiori, apice nutante. *Thorax* gibbus, rotundatus, antice impressus. *Elytra* vix striata.

Furcatus. S. ( le fourchu ) exscutellatus thorace inermi rotundato, capite cornubus tribus erectis approximatis, medio breviori. *Laichart. inf.* 26. 20. t. 1. f. 90. scarabæus vitulus.

*Hab.* in Arabia. *P. Forschæl. Mus. D. Banks.* In Gallia Meridionali.

*Obs.* *Fæmina* loco cornuum, linea transversa elevata.

*Desc.*

*Desc.* Minor scar. *nuchicorni*. *Clypeus* antice emarginatus, postice cornubus tribus basi approximatis erectis, in-termedio breviori. *Thorax* muticus, lævis, glaber, postice rotundatus. *Elytra* striata, fusca. *Pedes* nigri.

\*\*\* *Mutici capite & thorace inermi.*

Ærugino-S. ( le bronzé ) scutellatus muticus auratus, fus. supra viridis.

*Gronov. mus. 424. t. 15. f. 7.*

*Vincent. Petagn. specim. n. 14.*

*Hab.* in regno Tunetano. In ulteriore Calabria. *Vinc. Petagn.*

*Desc.* *Statura* scar. aurali, sed thorax elytraque viridia. *Scutellum* ovatum, obtusum. *Pectus* non pilosum. *Syst.*

2-Puncta-S. ( le biconctué ) scutellatus muticus, thorace nigro rubro marginato, elytris rubris punctulis duobus nigris magnis.

*Lepech. itin. 2. 324. t. 10. f. 7.*

*Laxmann. nov. comment. petr. 14. 593. t. 24. f. 1.*

*Pall. inf. 1. 22. t. A. f. 12.*

*Hab.* sub fimo equino Russiæ.

*Desc.* *Thoracis* margo rufus, puncto nigro.

Sus. S. ( le cochon ) scutellatus muticus oblongus obscure rufus, elytris testaceis nigro maculatis.

*Herbst. arch. 8. 22. scarabæus fus.*

*Hab.* in Germaniæ stercore. In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Statura* parva scar. 4-maculati. *Corpus* glabrum, nitidum, obscure rufum. *Elytra* testacea, atomis nigris.

Scrofa. S. ( la truie ) scutellatus muticus oblongus niger, elytris fuscis substriatis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura parva scar. testudinarii.

*Caput & thorax* mutica nigra. *Elytra* magis fusca, obscura, substriata.

Arenarius. S. ( du fable ) scutellatus muticus ater, elytris striatis, tibiis piceis.

*Hab.* in Sueciæ arena mobili. *D.* de Pay Kull.

*Desc.* Paryus. *Totus* ater, tibiis solis piceis. *Elytra* striata.

Variolosus. S. ( le variolé ) exscutellatus muticus, clypeo sexdentato, thorace elytrisque nigris, punctis impressis variolosis.

*Hab.* in fiume austrorum. *D.* Saldoner.

*Desc.* Statura omnino præcedentium, at paullo minor. *Clypeus* porrectus, rotundatus, sexdentatus, lævis. *Thorax & elytra* punctis innumeris variolosis impressa. *Thorax* ciliatus. *Tibiæ* anticæ valde dentatæ, reliquæ quatuor pilosæ.

Arenarius. S. ( des sablonnières ) thorace subcanaliculato, elytris striatis, corpore obscuro.

*Trox.* 2. *Mantiff.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura omnino scar. *Sabulosi*, at duplo minor. *Corpus* totum obscure fuscum. *Antennæ* testaceæ. *Elytra* striata.

Erythroce-S. ( la tête rouge ) glaber pallidus, capite rufo basi nigro. *Melol.* 34.

*Vincent. Petagn. specim. n.* 18. t. f. XXXV.

*Hab.* in Coromandel. *Mus.* *D.* Banks.

In ulteriore Calabria. *Vinc. Petagn.*

*Desc.* Affinis scar. *melanocephali*, at duplo

minor. *Corpus* totum glabrum, læve, immaculatum, capite solo obscure rufo, basi nigro.

*Obs.* In Calabria. *Totus* rufescens. *Antennæ*, ut in *scar. vulgari*, trilamellatæ, hinc vel idem cum Coromandeliano observatus, vel nova species. *D. Petagn.*

*Holofericeus*. S. ( le soyeux ) supra viridis holofericeus, subtus cupreus, elytris lineis elevatis quatuor. *Melolont.* 39.

*Hab.* in Russia Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *scar. Frischii*. *Corpus* totum supra viride holofericeum, subtus cupreum.

*Fruticola*. S. ( le moissonneur ) capite thoraceque cæruleo pilosis, elytris lividis, clypeo apice reflexo. *Melolont.* 56.

*Schæff. icon. tab.* 65. f. 1.

*Voet. scarab. t.* 8. f. 67.

*Herbst. arch.* 9. *scarabæus* segetum.

*Hab.* in Europæ spicis secalinis.

*Desc.* Fæmina macula quadrata coleoptorum nigra *scutellum* cingens.

*Herbst. arch.* 9. vix Differt. *Scarabæus campestris*.

*Succinctus*. S. ( le mandarin ) niger tomentoso cinereus, elytris nigris, fasciis duabus flavis. *Trich.* 2.

*Pall. icon. t. A.* f. 19.

*Hab.* in Germania. *D. Hybner.* In Gallia Aufst. V.

*Desc.* Statura omnino *scar. fasciati*, at duplo minor. *Clypeus* niger, integer. *Thorax* niger, cinereo-tomentosus. *Elytra* nigra, in medio fasciis duabus approximatis flavis. *Abdomen* tomentoso-cinereum.

*Lucanus.*

**Tenebroides. L.** ( le ténébroïde ) mandibulis lunatis unidentatis, ater, thorace marginato, elytris substriatis.

*Hab. in Novogrod inferiori Russiæ. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino *L. caraboides*, at paullo major, totus ater, nitidus. *Caput* antice retusum, maxillis porrectis, lunatis, basi inferiori unidentatis. *Thorax* glaber, nitidus, immaculatus. *Elytra* substriata. *Abdomen* magis piccum.

[ **Capriolus** ] **L.** ( le chevreuil ) scutellatus, maxillis exsertis, apice tantum furcatis.

*Amæd. acad. 6. p. 391. n. 4.*

*Mus. lud. ulr. 30.*

*Merian. Europ. 168. quoad figuram.*

*Fab. 4. mandibulis exsertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transversa elevata interrupta.*

*Sulz. hist. inf. t. 2. f. 1.*

*Vincent. Petagn. specim. inf. n. 1.*

*De Geer tom. 4. p. 336. t. 19. f. 11', 12.* fusco - castaneus, femoribus flavis, maxillis minimis corniformibus, apice simplicibus, latere unidentatis.

*Hab. in America. In Europa. In Calabria ulteriori. Vincent. Petagn. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Corpus & tota structura L. cervi, sed minor, forte quod quercus in America septentrionali minores sint. Differt unice & tantum a L. cervo, quod 1°. Americanus hic sit triplo minor; 2°. colore totius ferrugineo minusque nigro.*

*Obs. 1. Varietatem observo, forte solo*



sexu diversam, corpori simillimam, sed capite distinctam; *caput* enim non gaudet angulis. *Maxillæ* longitudine capitis, incurvæ, apice simplici, margine interiore denticulo unico instructæ.

*Obs.* 2. Non mirum hoc Americanum insectum in nostro regno habitare, cum plurima adhuc sint, quæ in reliquis orbis partibus inveniuntur. *Ulterioris Calabriae specim.* p. 1.

*Obs.* 3. Hujus foemina simillima est foeminae *L. cervi*: masculo major est. *Ibid.*

# Cephalotes. L. ( le capitaine )

*Scop. introd. in hist. nat.* 439.

*Acharvis. act. Suec.* 1681. 246. t. 5.  
f. 3.-12.

*Pall. icon. inf.* 1. t. A. f. 1. *Lucanus apterus.*

— *itin.* 1. app. 461. 22. scar. cephalotes.

*Laxman. nov. comm. Petrop.* 14. 59. 4.  
t. 24. f. 1.

*Hab.* in *Russiæ*, *Tartariæ*, *Hungariæ* desertis, aridis monogamus, sub terra degens.

*Desc.* *Corpus* subrotundum, apterum, læve, nigrum, subopacum. *Caput* maximum, antice posticeque rotundatum, lateribus angulato-subauriculatis. *Clypeus* emarginato-bilobus. *Mandibula* exserta, adunco falcata, intus denticulata, subtus ramo prominente, incurvo. *Maxilla* cornea, labio duplo longior, in medio unidentata, apice truncata. *Palpi* quatuor cylindrici, *anteriores* quadriarticulati, inserti medio dorso maxillæ; *posteriores* triarticulati adhærentes labii apice. *Labium* rotundatum, integrum. *Antennæ* 12

articulatæ, articulis quinque 2, 3, 4, 5, 6 subcylindricis, 1, 7, 8, 9 subglobosis, ultimis tribus denique majoribus, obconicis, clavam formantibus, oblique truncatis, tunicatis. *Thorax* lævis, marginatus. *Elytra* connata, gibba, brevia, glabra, marginata. *Pedes* fossorii.

*Dermestes.*

Typogra- 6. D. *Obs.* Variat valde & colore & phus. magnitudine.

Calcogra- 7. D. Variat colore. Dantur nigri & testacei, vix tamen distincti.

Micogra- 8. D. *Fab.* host. 7. ferrugineus, elytris phus. integris testaceis.

20-Gutt- 27. D. *Desc.* Statura omnino & magnitudine tatus. D. *undati.* Corpus atrum, glabrum: punctum e pilis albis utrinque ad basin thoracis & novem in singulo elytro. *Abdomen* nigrum, certo situ albicans.

Testaceus. 29. D. *Desc.* Statura & magnitudo omnino D. *murini*, cujus forte varietas; differt tamen colore minus nigro & albo, abdomine omnino fusco.

Tomento- 30. D. *Desc.* Statura omnino D. *fumati*, phus. cujus forte varietas. *Totus* supra villis cinereis tectus. Puncta duo fusca, elevata in fronte. *Pedes* dilutiores.

Testaceus. 31. D. *Desc.* *Totus* lævis, glaber, testaceus, solis oculis & abdominis basi subtus fuscis.

Minutus- 34. *D. Desc. Corpus minutum, totum atrum*  
 striatus. *immaculatum. Elytra postice pallidiora.*

Varius. 35. *D. Desc. Statura D. piniperdæ, sed paullo*  
*minor & corpus variegatum. Bost. 8.*  
*& non 9.*

Minutus 36. *D. Desc. Corpus minimum, atrum, gla-*  
 lævis. *brum, immaculatum. Antennæ clava*  
*solida obtusa. Elytra lævia glabra,*  
*integra. Pedes nigri.*

Hæmor- 37. *D. Desc. Ovatus, scarabæiformis, ater,*  
 rhous. *nitens. Elytrum quodvis ad marginem*  
*internum prope apicem macula cocci-*  
*nea. Color iste elegans post insecti*  
*mortem vehementer obscuratur.*

Calthæ. 39. *D. Desc. Niger nitidissimus. Pedes,*  
*antennæ maculaque postica elytrorum*  
*rufa.*

Tomento- 40. *D. Desc. Niger est tenuis pilo hirsutus,*  
 fus. *unde cano punctatus adparet per*  
*elytra. Thorax est sat latus, margi-*  
*natus. Caput depressum. Elytra punc-*  
*tato-striata, striis decem.*

Chrysome- 41. *D. Desc. D. Psyllo affinis, si non varietas.*  
 loides. *Caput intra thoracem fere retractedum.*  
*Thorax latus, fere quadratus, margi-*  
*natus. Elytra marginata. Thorax elytra-*  
*que lævia, nec punctata, nec striata.*  
*Pedes, cum antennis, fusco-testacei.*  
*Antennarum clava solida videtur,*  
*aut est.*

Quercus. 44. *D. Desc. Fuscus. Thorax fere margi-*  
*natus. Elytra fusca, fasciis duabus*  
*undulatis pallidis, una ad basin, ut*

tamen ipsa basis fusca, altera ultra medium.

- Tomento- 45. D. *Desc.* Parvus. Corpus elongato-ovatum, supra convexum. Caput, thorax elytraque villis griseis tecta. Oculi nigri. Antennæ pedesque rufo-testacei.
- Fornica- 46. D. *Desc.* nigro-fuscus. Thorax elytraque lævia. Pedes tenues elongati, posteriores corpus æquant.
- Armadel- 48. D. *Desc.* Pulice minor, nitidus ater. Caput magnum, convexiusculum, lateraliter angulatum. Abdomen retractile. Elytra dehiscentia. Antennæ pilosæ.
- Pallidus. 49. D. *Desc.* D. lardario affinis, fusco-niger. Elytra fascia transversa pallide flavescenti nigro punctata.
- Oblongus. 50. D. *Desc.* Castaneo-fuscus. Corpus tenue, longum. Thorax marginatus. Elytra longitudinaliter dense striata.
- Contrac- 51. D. *Desc.* Ferrugineus. Thorax elongatus. Elytra punctato-striata.
- Auricula- 52. D. *Desc.* Caput auriculatum. Corpus læve griseo-fuscum. Thorax subtus spinis quatuor armatus.
- Variega- 53. D. *Desc.* Caput prominens. Antennæ fulvæ. Thorax rugosus. Elytra fulvescentia, lente striata.
- Striatus. 54. D. Præcedenti affinis, at thorax elytraque valde sulcata, sulcis 7 in thorace, in elytro singulo quatuor.

Langicornis. 55. D. An filpha? An dermestes?

Variegatus. 67. D. Desc. Caput nigrum, deflexum, punctulis rubellis lateralibus. Antennæ clava nigra ovata, stipite, si luci oppositus fuerit, rubello. Thorax in medio niger, linea dorsali longitudinali punctis albis facta, inter hanc & latus punctum rubellum utrinque; margo posticus rubellus, sed anguli ibidem albidii. Elytrum nigrum, margine, præsertim inferiore, rubro, fasciis 2 dimidiatis albis, basi punctis pluribus, apice unico, coloris albi. Alæ hyalinæ, puncto ad costam ferrugineo. Corpus supra nigrum, subtus pallide roseum nigroque varium. Femora eodem modo variegata. Variat defectu rubri coloris.

Cellaris. 68. D. Desc. Linea paullo longior est, dimidiam crassus, villosulus, rufo-ferrugineus. Oculi fusci. Antennæ articulis 10 lateraliter acuminatis & pilo ibidem terminatis. Thorax marginatus, angulis acutis parvoque dente in medio marginis lateralis. Elytra lucidiora, ad lentem subrugosa, minime striata. Alæ breves, debiles.

Brassicæ. 69. D. Desc. Thorax & elytra marginata, punctata, punctis exiguum villum proferentibus.

Ciliatus. 70. D. Desc. Linea paullo longior. Caput inclinatum. Elytrum striis 10.

Lepturoi- 71. D. Desc. Vix lineam longus, nigricans.  
des. Thorax & elytra marginata, subvillosa.  
Antennæ ferruginæ.

**Lycoperdi.** 72. *D. Desc.* Parvus, vix linea longior.  
*Caput* intra thoracem modice retractile.  
*Elytra* marginata, substriata.

**Cærulef-** 73. *D. Desc.* Lineam longus, subovatus,  
 cens. nitens. *Thorax* glaber.

**Plicatus.** 74. *D. Desc.* *Antennarum* articuli tres ultimi.  
*Pedesque* rufi.

**Hamatus.** *D.* ( l'hameçon ) elytris ante apicem  
 unispinosis, thoracis margine antico  
 bihamato denticulato. *Mantiff.* apate 2.  
*Hab.* in Saxoniae lignis. *D. Prof. Leske.*  
 Prope Lugdunum. V.

*Desc.* Statura omnino *D. muricati*, at  
 paullo minor. *Caput* fuscum, ore fer-  
 rugineo pubescente. *Thorax* rotundatus,  
 subtus antice scaber, margine antico  
 utrinque hamo valido denticulato ca-  
 pitis basin tegente. *Elytra* fusca,  
 punctata, ante apicem dente valido,  
 porrecto, obtuso. *Abdomen* & *pedes*  
 picea.

**Limbatus.** *D.* ( le bordé ) ater, elytris integris pal-  
 lidis, margine omni nigro. *Mantiff.*  
 apate 7.

*Hab.* sub cortice fagi Kiliae. *D. Daldorf.*  
*Desc.* Parvus. *Caput* atrum, nitidum,  
 immaculatum. *Thorax* gibbus, ater,  
 ferrugineo - hirtus. *Elytra* lævia,  
 substriata, pallida, margine omni  
 nigro.

**Marginatus.** *D.* ( le marginé ) thorace villoso, elytris  
 integris fuscis, margine punctisque  
 ferrugineis. *Mantiff.* apate 8.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*



*Desc.* Parvus. *Maxillæ* exsertæ, forcipatæ. *Thorax* elevatus, postice rotundatus, integer, villosus, fuscus. *Elytra* integra, obscura, substriata, fusca, margine punctisque aliquot ferrugineis, raro in strigam undatam medii connatis. *Abdomen* fuscum, margine ferrugineo. *Pedes* fusci.

Trifasciatus. D. ( le trifascié ) ovatus niger, elytris fasciis tribus undatis cinereis. *Mantiss.* dermest. 7.

*Geoff. inf. tom. 1. p. 112. n. 5. byrrhus* fuscus, fasciis elytrorum transversis cinereis.

*Hab. in Europa Australiori. D. de Schestedt.*

*Desc.* Magnitudo & statura D. undati.

*Caput* nigrum. *Thorax* niger, margine baseos cinereo. *Elytra* nigra, fasciis tribus undatis punctoque apicis cinereis. *Corpus* nigrum.

*Obs.* An dermestes? An ptinus Linn.? V.

Sanguinicol-D. ( le paré ) elongatus hirtus violaceus, thorace abdomineque rufis. *Mantiss.* dermest. 18.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner. In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Antennæ* perfoliatæ hujus generis. *Thorax* hirtus, rufus, immaculatus. *Elytra* cyanea, nitida. *Abdomen* rufum. *Pedes* nigri.

Fuscus. D. ( le brun ) oblongus villosus fuscus, immaculatus. *Mantiss.* dermest. 21.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner, Kilix Daldorf.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino D. tomentos, villosus, fuscus, immaculatus.

**Picipes.** D. ( le picipede ) oblongus nigricans ,  
pedibus piceis. *Mantiss.* dermest. 23.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo *D. tomentos.*

*Corpus* totum nigrum , immaculatum.

*Pedes omnes* picei.

**Elongatus.** D. ( l'alongé ) elongatus ater , pedibus  
ferrugineis. *Mantiss.* boft. 3.

*Hab.* in Upfalix ligno antiquo. *D. de Pay. Kull.*

*Desc.* *Corpus* medium , elongatum , fili-  
forme. *Antennæ* breves , perfoliatæ.

*Thorax* glaber , ater , nitidus , lineis

tribus impressis intermedia altiori. *Elytra*

crenato - striata. *Pedes* ferruginei.

**Bidentatus.** D. ( l'armé ) niger , coleoptris testaceis  
apice retusis bihamatis. *Mantiss.* boft. 8.

*Herbst. arch.* 24. 6. t. 10. f. 10. dermestes  
bidentatus.

*Hab.* in Saxonia. *D. Hybner.* In Gallia  
Aust. *Mus. D. Blain.*

*Desc.* Magnitudo *D. polygraphi.* *Caput*  
& *thorax* nigra , immaculata. *Elytra*  
obscura testacea , postice retusa , den-  
ticulo elongato hamato nigro ad sutu-  
ram. *Pedes* testacei.

**Crenatus.** D. ( l'entaillé ) glaber , ater , elytris inte-  
gris piceis crenato - striatis. *Mantiss.*  
boft. 10.

*Hab.* in Germania *D. Schneider.* In Gallia  
Aust. V.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *D.*  
*scholyti* , at distinctus. *Caput* & *thorax*  
lævia , atra , immaculata. *Elytra* in-  
tegra , picea , crenato - striata. *Pedes*  
picei.

Pygmæus. D. ( le pygmée ) ater nitidus , elytris integris rufis , abdomine retuso. *Mantiff.* boft. 11.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & summa affinitas *D. scolyti* , at triplo minor , & *elytra* rufa.

Ligniperda. D. ( le Charpentier ) villosus testaceus , corpore nigricante , tibiis quatuor posticis ferratis. *Mantiff.* boft. 12.

*Hab.* in Germaniæ ligno. *D. Hybner.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Paulo major *D. piniperda*. *Caput* nigricans , antennis testaceis , articulo primo longiori , crassiori , incurvo , ultimo clavato. *Thorax* , *elytra* , abdomen villosa , testacea , immaculata. *Elytra* striata. *Pedes* breves , validi , testacei , *tibiis* quatuor posticis ferratis.

Testaceus. D. ( le testacée ) glaber testaceus , elytris lævibus longitudine abdominis. *Mantiff.* boft. 14.

*Hab.* in pini truncis. *D. Zschuck.*

*Desc.* *Antennæ* clava solida. *Corpus* testaceum , immaculatum , glabrum læve.

*Obs.* Variat rarius corpore nigricante.

Vittatus. D. ( l'orné ) subvillosus fuscus , elytris vitta abbreviata cinerea. *Mantiff.* boft. 16.

*Hab.* in truncis arborum. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino *D. varii* , at duplo minor. *Caput* nigrum. *Thorax* fuscus , immaculatus. *Elytra* fusca , vitta a basi usque ad medium futuræ ducta cinerea.

Pallipes. D. ( le pallipede ) oblongus planus , ater , nitidus , antennis pedibusque testaceis. *Mantiff.* app.

*Hab. in Sueciæ floribus. D. de Pay Kull.*  
*Desc. Minutus, totus ater, nitidus. Thorax*  
*lævis. Elytra firiata. Antennæ & pedes*  
*testacei.*

Lunatus. D. 12. ( le Turc ) oblongus niger , elytris  
 lunula dorsali cinerea. *Mantiss. app.*  
*Hab. in Suecia sub arborum corticibus.*  
*D. Pay Kull.*  
*Desc. Totus niger , obscurus. Coleoptra*  
*lunulis duabus connatis communibus*  
*in medio dorsi cinereis.*

*Ptinus.*

Longicornis. 7. P. *Desc. Magnitudo pt. furis. Antennæ*  
*filiformes corpore longiores. Corpus*  
*atrum , nitidum , immaculatum. Pedes*  
*flavi , plantis nigris.*

Latro. 8. P. *Desc. Statura & magnitudo omnino*  
*pt. furis, cujus forte varietas. Antennæ*  
*filiformes longitudine corporis. Thorax*  
*angustus, rotundatus, dentibus duobus*  
*dorsafalibus. Elytra punctato-striata ,*  
*testacea , immaculata.*

Scotias. 9. P. *Desc. Antennæ porrectæ, albo villosæ.*  
*Caput parvum reconditum , cum tho-*  
*race glabrum , læve , piceum. Elytra*  
*connata , lævia nitida , obscure testa-*  
*cea , immaculata. Pedes villoso-albi.*  
*Jaqu. miscell. aust. t. 23. f. 1.*

Semilunum. 10. P. *Desc. Fere sphæricus. Totus nitenti-*  
*testaceus. Elytra , quæ fere totum*  
*abdomen tegunt , valde convexa ,*  
*diaphana , ita ut corpus animalis trans-*  
*pareat , cui non incumbunt , sed am-*  
*plum super illud fornacem constituunt.*

*Oculi* minime nigri. *Caput*, *thorax*, *elytra* testacea, s. testudineo - rufi coloris. *Antennæ*, *pedes* & exigua abdominis pars, quam *elytra* non tegunt, ex subtilissimo & denso tomento sulphureo. *Antennæ* filiformes, articulis omnibus æqualibus.

Rufo- villosus. 11. P. *Desc.* Statura pt. *pertinacis*, at paullo major. *Totus* rubello-fuscus. *Oculi* nigri. *Elytra* scabra & uti totum animal, griseo vellere tectum.

Punctatus. 12. P. *Desc.* Pt. *pertinaci* simillimus, at multo minor, griseo-fuscus. *Thorax* in medio gibbosus. *Elytra* longitudinaliter punctato-fulcata.

Testaceo- villosus. 13. P. *Desc.* Omnibus congeneribus major. *Antennæ* filiformes lutescenti-rufæ. *Caput*, *thorax* nigra, villis fulvo-luteis tecta. *Elytra*, quæ lævia, antennis concoloria, at tomento rufescente lutea. *Thorax* convexus, postice angulatus, margine laterali prominulo.

Striatus. P. ( le strié ) thorace gibbo bituberculato, coleoptris globosis striatis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. *Hybner*.

*Desc.* Statura omnino pt. *scotias*. *Antennæ* porrectæ filiformes. *Thorax* elevatus, gibbus, griseis tuberculis duobus elevatis obtusis. *Elytra* connata, striata, grisea. *Pedes* grisei.

Rugosus. P. ( le ridé ) fuscus, thorace inæquali, elytris striatis. *Anobium* striatum.

*Mantiss.* I.

*Hab.* Kilix.

*Desc.* Duplo major pt. *pertinaci*. *Corpus* totum fuscum, immaculatum. *Thorax* inæqualis, vel potius rugis duabus dorsalibus abbreviatis impressus. *Elytra* striata.

Planus. P. ( le plan ) fuscus thorace plano, elytris crenato-striatis. *Anob.* 4. *Mantiss.*

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* *Antennæ* fuscae, clava elongata, ferruginea. *Caput* & *thorax* fusca, immaculata, thoracis margine parum reflexo. *Elytra* crenato-striata subpicea. *Corpus* fuscum.

### Hister.

Brunneus. 6. *Desc.* Simillimus H. *unicolori*, at color totus brunneus.

Æneus. 7. *Desc.* Æneus nitens. *Elytra* abbreviata, in medio lævia, apice irregulariter punctata, basi striis quatuor arcuatis.

Scaber. H. ( le chagriné ) niger, punctis elevatis scaber.

*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.*

*Desc.* Magnitudo H. *unicolor*. *Corpus* nigrum. *Thorax*, *elytra* & *abdomen* prominulum.

Depressus. H. ( l'aplati ) depressus ater, nitidissimis elytris substriatis.

*Herbst. arch.* 20. 7. hister compressus.

*Hab.* sub betulæ corticibus. *Mus. D. Zschuck.*

*Desc.* Differt manifeste a H. *pigmeo*, magis depressus & nitidissimus. *Elytra* substriata.

Gyrinus.



*Gyrinus.*

Bicolor. G. ( le bicolor ) niger, subtus ferrugineus, pedibus posticis compressis.

*Hab. in Sueciæ aquis. Prof. Leske.*

*Desc. Major G. natatore. Totus supra niger, subtus ferrugineus. Pedes postici valde compressi.*

*Byrrhus.*

Varius. 7. B. *Desc. Statura & summa affinitas B. pilulæ. Corpus subtus nigrum. Caput æneum, antennis extrorsum crassioribus nigris. Thorax ovatus obscure æneus, immaculatus. Elytra fusca, striis tribus nitentibus, dorsalibus, viridibus, fusco maculatis, quæ tamen apicem elytrorum non attingunt. Pedes nigri, tibiis compressis.*

Ater. 8. B. *Desc. B. pilulæ affinis, minor. Totus ater & lævis. Elytra obsolete striata.*

Nitens. 9. B. *Desc. Parvus. Thorax elytraque lævia, sed ad lentem irregulariter punctata.*

Gigas. B. ( le géant ) niger, elytris punctatis ferrugineis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Zschuck.*

*Desc. Major B. pilula. Corpus nigrum, elytris solis punctatis, ferrugineis immaculatis. Pedes nigri, tibiis compressis, incurvis. Fœmina aculeo ani.*

Dorsali. B. ( le dorsal ) nigricans, coleoptris macula transversa ferruginea.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc. Statura & summa affinitas B. atri;*

*Insect. Tomus IV.*

P

at paullo minor. *Corpus* nigrum obscurum. *Thorax* maculis aliquot obsoletis. *Elytra* nullo modo striata, nigricantia, macula communi transversa ferruginea. Forte mera *B. atrī* varietas.

*Silpha*.

Bipustulata 3. *S. Laichart.* I. 106. 3. ostoma bipustulata.

Littoralis. 8. *S. Fab.* S. 8.

*Bergst. nomencl.* I. 24. 6. t. 3. f. 6.

Atrata. 9. *S. Laichart.* I. 98. 10. *silpha tyrolensis*.

Ferruginea. 16. *S. Laichart.* I. 102. I. ostoma rubicunda.

Reticulata. 17. *S. Fab.* II. *Mantiss.* 17. An *reticulata*. Syst. ?

Grossa. 18. *S. Fab.* *S. lunata*, atra, elytris punctatis, lineis elevatis tribus, thorace emarginato. *Mantiss.* 14.

Scabra. 20. *S. Fab.* *S. dentata* oblonga nigra, elytris scabris, thorace subemarginato.

*Desc.* Statura & magnitudo *S. oblongæ*. *Corpus* nigrum. *Thorax* fuscus, valde marginatus, marginibus depressis, rotundatis, subciliatis. Margo anticus emarginatus, in medio bidentatus. *Elytra* nigra, lineis duabus valde elevatis, postice bidentatis. *Corpus* & *pedes* nigra.

Colon. 24. *S. Laichart.* I. 107. 4. ostoma colon.

Grisea. 33. *S. Desc.* *Corpus* supra cinereum, im-

maculatum, subtus fuscum. *Thorax* planus, margine parum elevato. *Elytra* striis tribus elevatis, abbreviatis, postice dentatis.

- Gibba. 34. *S. Desc.* Magnitudo omnino *S. fabulosa*, at magis oblonga & postice magis gibba. *Elytra* obsoleta, lineis elevatis striata.
- Tibialis. 35. *S. Desc.* *Corpus* parvum. *Capitis clypeus* emarginatus. *Caput* & *thorax* lævia, nigra, immaculata. *Elytra* lineis elevatis obsoletis rugosa. *Tibiae* antice basi bidentatae, apice triangulares, compressae.
- Marginata. 37. *S. Desc.* Statura *S. 2-postulatae*. *Corpus* subtus piceum. *Thorax* niger, margine late ferrugineo. *Elytra* marginata, nigra, margine punctisque aliquot disci ferrugineis.
- Varia. 38. *S. Desc.* Statura *D. ferruginei*. *Corpus* fuscum. *Thorax* marginatus, variegatus margine ferrugineo. *Elytra* striata, marginata, variegata, margine ferrugineo. *Pedes* ferruginei.
- Bicolor. 39. *S. Desc.* *Antennae* rufae, clava solida. *Caput* & *thorax* ferruginea, immaculata. *Elytra* glabra, nigra, fascia lata baseos punctoque versus apicem ferrugineis. *Abdomen* fuscum. *Pedes* ferruginei.
- Hæmorrhoidalis. 40. *S. Desc.* Statura *S. colon*, at duplo minor. *Thorax* marginatus niger, margine ferrugineo. *Elytra* lævia, nigra, apice late ferruginea. *Pedes* nigri.

Dioscoidea. 41. *S. Desc.* Statura & magnitudo *S. bipustulata*. Caput atrum. Thorax inæqualis, marginatus, margine obscure ferrugineo. Scutellum nigrum. Elytra nigra, macula magna orbiculata, communi, ferruginea. Pedes nigri.

Ænea. 42. *S. Desc.* Statura *S. bipustulata*, at duplo minor. Corpus totum viride-æneum, læve, glabrum.

Pubescens. 43. *S. Desc.* Antennæ clava solida. Corpus parvum, supra griseum, nitidum, pilis erectis brevibus adpersum.

*Obs.* An silpha? An dermestes?

Nubila. 46. *S. Desc.* Statura omnino *S. aquatica*, at paullo minor. Antennæ clavatae. Thorax griseus, fasciis quinque exaratus. Elytra fulcata, obscure grisea. Pedes concolores.

Picea. 48. *S. Desc.* Major *S. 4-pustulata*. Caput nigricans, ore antennisque piceis. Elytra lævia, nigra, basi fasciaque postica lunata ferrugineis. Corpus & pedes picei. *Ips. Fab.*

4-Guttata. 49. *S. Desc.* Præcedenti multo minor. Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra lævia, atra, maculis duabus transversis margines haud attingentibus albis, anteriore bisinuata. Pedes nigri. *Ips. Fab.*

Crenata. 50. *S. Desc.* Statura omnino *S. quadri-pustulata*, at quadruplo minor. Thorax longitudinaliter rugosus, obscure niger. Elytra striis crenatis nigra, basi apiceque macula magna ferruginea. *Ips. Fab.*

Rufifrons. 51. *S. Desc.* Magnitudo præcedentis. *Antennæ* nigræ, clava ferruginea. *Caput* nigrum, *fronte* ferruginea. *Thorax* glaber, ater, lævis, nitidus, immaculatus. *Elytra* lævia, nitida, punctis duobus ferrugineis, altero ad basin, altero ad apicem.

Excavata. 52. *S. Desc.* Nimis affinis *S. atrata*, a qua tamen differt elytris lævibus nec striis tribus elevatis.

Testacea. 53. *S. Desc.* Statura & magnitudo *S. atrata*. *Corpus* totum obscure testaceum, elytris tamen paullo pallidioribus. *Elytra* lævissima, punctata, lineis tribus elevatis, obsoletis. Ultimi tres articuli *antennarum* nigri.

Villosa. 54. *S. Desc.* fusca. *Thorax* latus, minime marginatus. *Elytra* lævia tomentosa.  
*Obs.* An silpha?

Tomentosa. 58. *S. Desc.* *Antennæ* capite thoraceque breviores. *Caput*, *thorax* & *elytra* tomentosa. *Elytra* striis tribus elevatis quarum exterior major prominet.

Rufipes. 59. *S. Desc.* Minuta, vix pulice major. *Antennarum* clava perfoliata. *Caput* supra nigrum. *Elytra* lævia, vix marginata.

Obscura. *S.* (l'obscure) ovata nigra obscura, pedibus piceis.

*Hab.* in Germania. *D. Haltorf.*

*Desc.* Statura omnino *S. rufipennis*, at paullo minor. *Corpus* supra obscure nigrum, minime nitidum. *Elytra* lævia, immaculata. *Pedes* picei.

**Marginata. S.** ( la bordée ) lævis atra , elytrorum margine pedibusque ferrugineis. *Mantiff. sphær. 5.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *S. glabrata* ; at *antennæ* nigræ & margo *elytrorum* tenuissime ferrugineus.

**Ferruginea. S.** ( la rouillée ) ferruginea elytris striatis. *Mantiff. sphær. 6.*

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis. *Corpus* totum ferrugineum , immaculatum.

**Ruficollis. S.** ( l'esclave ) atrum nitidum , thorace pedibusque anticis rufis. *Mantiff. sphær. 10.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura parva , gibba *S. hæmorrhoidalis*. *Caput* , *elytra* , *corpus* atra , glabra , nitida. *Thorax* glaber , rufus , nitidus. *Pedes* *antici* rufi , *postici* nigri.

**2-Punctata. S.** ( la biponctué ) atra elytris rufis , macula magna atra. *Mantiff. Ips. 2.*

*Hab.* in Europa Australiori. *D. Saldoner.*

*Desc.* Magna. *Corpus* totum atrum. *Elytra* fola rubra , macula magna nigra. *Anus* rufus.

**2-Pustulata. S.** ( la bipustulée ) atra elytris macula baso rufa. *Mantiff. Ips. 3.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* *Antennæ* perfoliatæ rufæ. *Corpus* nigrum , elytris macula magna basos rufa. *Pedes* rufi.

**Dorsalis. S.** ( la dorsale ) oblonga supra pallida , coleoptris macula media nigra. *Mantiff. Ips. 4.*



*Hab. in Europa Australi. D. Vahl. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Paulo major S. 4-pustulata. Antennæ perfoliatæ. Caput & thorax pallide testacea, immaculata. Elytra striata, pallida, macula magna, communi, lunata, nigra.*

**Humeralis. S.** ( l'épaulette ) nigra, capite, thorace elytrorumque puncto baseos pedibusque rufis. *Mantiff. Ips. 7.*

*Thunb. nov. sp. dermestes 2-pustulatus.*

*Hab. in Suecia. D. de Pay Kull.*

*Desc. Nimis affinis S. rufipes. Caput cum antennis obscure rufum. Thorax lævis, rufus, nitidus. Elytra nigra, nitida, puncto baseos rufo. Corpus nigrum, pedibus rufis.*

**4-Maculata. S.** ( la quadrimaculée ) rufa, thorace elytrisque nigris, his maculis duabus rufis. *Mantiff. Ips. 8.*

*Aç. Hall. I. 236. silpha 4-maculata.*

*Hab. in Germania. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Media. Antennæ ferrugineæ ante apicem fuscæ. Caput rufum. Thorax niger, immaculatus. Elytra striata nigra, macula baseos aliaque ante apicem rufis. Corpus rufum.*

**Atomaria. S.** ( l'atome ) oblonga nigra, elytris punctis fasciaque postica fulvis. *Mantiff. Ips. 9.*

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc. Corpus parvum, oblongum. Caput & thorax nigra. Elytra striata, nigra, macula majori ad basin, punctis quinque in medio, fascia postica undata punctoque apicis fulvis. Pedes nigri.*

Sanguini- S. ( le collier ) atra, thorace elytrorumque  
collis. maculis duabus pedibusque rufis. *Mantiff.*

*Ipf.* 10.

*Añ. Hall.* 1. 255. silpha glabra.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Media. *Caput* atrum, antennis apice  
cinerascentibus. *Thorax* glaber, rufus,  
nitidus, immaculatus. *Elytra* glabra,  
lævia, nigra, maculis duabus rufis.  
*Corpus* nigrum. *Pedes* rufi.

Nigricornis. S. ( la nigricorne ) flava, antennis nigris.  
*Mantiff.* *Ipf.* 12.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* S. *ænea* paullo major. *Antennæ*  
moniliformes, extrorsum crassiores,  
nigræ. *Corpus* totum flavescens, im-  
maculatum.

Ænea. S. ( la bronzée ) coccinea, elytris æneis  
immaculatis. *Mantiff.* *Ipf.* 13.

*Añ. Hall.* 1. 254. silpha ænea.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* *Corpus* medium totum coccineum,  
immaculatum. *Antennæ* nigræ. *Elytra*  
ænea, nitida lævia, immaculata.

Bifasciata. S. ( la bifasciée ) nigra, elytris fasciis  
duabus punctoque apicis ferrugineis.  
*Mantiff.* *Ipf.* 17.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Minuta. *Corpus* totum nigrum.  
*Elytra* concoloria, fasciis duabus puncto-  
toque apicis rufis. *Pedes* nigri.

Nigra. S. ( la noire ) oblonga nigra immaculata.  
*Mantiff.* *Ipf.* 18.

*Hab.* in Uplandiæ boletis. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Parva, tota nigra, immaculata.

Livida. S. ( la livide ) fusca , thorace elytris pedibusque lividis. *Mantiff. S.* 3.

*Herbst. arch.* silpha livida.

*Hab. in Germania. D. Hybner.* In Gallia Auf. V.

*Desc.* Statura omnino *S. littoralis* , at duplo minor.

Reticulata. S. ( la reticulée ) nigra , thorace lævi , elytris rugosis , lineis elevatis tribus. *Mantiff. S.* 17.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Statura & summa affinitas *S. obscuræ* , at *elytra* inter strias elevatas rugosa.

Undata. S. ( l'ondée ) nigra nitida , elytris fasciis duabus undatis punctoque apicis albis. *Mantiff. S.* 26.

*Hab. in Saxonia* , sub arborum corticibus. *D. Romanus.*

*Desc.* Statura & magnitudo fere dermestes undati , at *antennæ* omnino hujus generis. *Caput & thorax* atra immaculata. *Elytra* lævia , nigra , fascia ante medium alteraque pone medium punctoque parvo apicis albidis. *Corpus & pedes* fusca.

Agricola. S. ( la campagnarde ) nigra , thorace lævi , elytris striatis. *Mantiff. opatr.* 8.

*Herbst. arch.* 30. opatrum agricola.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* *Corpus* parvum , totum obscure nigrum , elytris striatis.

Strigata. S. ( la striée ) ovata fusca , thoracis margine , elytri margine lineola baseos strigaeque apicis fulvis. *Mant. nitidula* 7.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Media. *Caput* fuscum. *Antennæ* clavatæ, clava apice ferruginea. *Thorax* lævis, fuscus, margine pallide fulvo. *Elytra* lævia, nitida, margine lineola baseos lunata strigaeque apicis incurve fulvis. *Corpus* nigrum. *Pedes* fulvi.

Limbata. S. ( l'entourée ) nigra, thoracis margine elytrorumque limbo ferrugineis. *Mant.* nitidula II.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Parva. *Caput* & *thorax* nigra, thoracis margine ferrugineo. *Elytra* lævia, nigra, limbo omni, imprimis. ad basin, ferrugineo. *Pedes* ferruginei.

Litura. S. ( l'arquée ) testacea, elytris litura arcuata nigra. *Mantiss.* nitidula 15.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Parva. *Caput* & *thorax* testacea, immaculata, nitida. *Elytra* lævia, nitida, testacea, litura una alterave arcuata nigra. *Abdomen* nigrum. *Pedes* testacei.

2-Punctata. S. ( la baponctuée ) testacea, coleoptris maculis quinque nigris. *Mantiss.* nitidula. 16.

*Herbst.* arch. 58. 32. tab. 23. f. 20. chrysomela scutellata.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* *Antennæ* clava solida, nigra, hujus generis. *Caput* & *thorax* rufo-testacea, nitida immaculata. *Elytra* lævia, nitida, rufo-testacea, puncto communi baseos duobusque in medio oblique positis, nigris. *Corpus* testaceum, abdomine basi nigro.

Viridiscens. S. ( la verdâtre ) viridi-ænea, thorace

marginato, pedibus folis rufis. *Mantiff. nitidula* 18.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino *S. ænea*. *Tota* ænea, pedibus folis rufis.

Hæmorrhoi-*S.* ( l'hémorroïdale ) rufa, elytris nigris, dalis. apice rufis. *Ipf. Mantiff. app.*

*Hab. in Suecia. D. Pay Kull.*

*Desc.* Statura & summa affinas *S. rufipes*, at corpus totum rufum, exceptis elytris folis nigris apice rufis.

Lutea. *S.* ( la jaune ) lutea, elytris pubescentibus lævibus. *Sphær. Mantiff. app.*

*Desc.* Corpus totum fuscum, elytris pubescentibus, haud striatis.

*Obs.* An filpha? An dermestes? Non vidi. *V.*

### *Cassida.*

Tigrina. 7. *C.* *Desc.* Caput, corpus infra, femora, antennarum apex, nigra. Thorax diaphano-viridis, maculis duabus albis elevatis. *Pedes* virescentes.

*Hab. in chenopodio hybrido.*

Affinis. 8. *C.* *Desc.* Nimis. *C. maculata* affinis. Corpus atrum. Thoracis *clypeus* omnino flavescens, immaculatus. *Elytra* grisea, punctis numerosis nigris. Margo flavescens, antice immaculatus, postice punctis quatuor nigris.

Equestris. *C.* ( la chevaliere ) viridis, elytrorum basi argentea, abdomine atro margine pallido. *Mantiff.* 2.

*Hab. in mentha aquatica* Halæ. *D. Hybner.*

*Desc.* Major *C. viridi* & distincta. Supra

late viridis, elytris striga bascos late argenta, quæ vero cum vita perit. *Corpus* atrum, *abdominis* margine pallido. *Pedes* flavescentes.

*Atrata*. C. ( la noircie ) atra, clypeo antice sanguineo. *Mantiss.* 7.

*Hab.* in Austria. D. *Saldoner*.

*Desc.* Statura C. *nebulosæ*, at minor & atra. *Clypeus* rotundatus, integer, lævis, niger, margine antico in medio sanguineo. *Elytra* rugosa, atra immaculata.

*Limbata*. C. ( la bordée ) capite thoraceque pubescentibus, obscure æneis, margine pubescente. *Mantiss.* 8.

*Hab.* in diantho Carthusianorum Halæ. D. *Hybner*.

*Desc.* *Thorax* æneus, margine obscure rufescente. *Elytra* punctata obscure viridia, margine obscure rufo. *Corpus* rufescens.

*Margarita*- C. ( la perlée ) virens, elytris viridi-argenteis nitidis, capite pectoreque nigris.

*Mantiss.* 22.

*Schall. ac̃ hali.* 259. *cassida margaritacea*.

*Hab.* Halæ, sub lapidibus. D. *Hybner*.  
In Gallia Aust. V.

*Desc.* Statura & summa affinitas C. *nebulosæ*. Color perit cum vita.

### *Coccinella*.

2-Punctata. C. *Obs.* Cum 6-pustulata copula junctam vidit *Cavolinus*. *Vincent. Petagn.* pag. 8.

Unifasciata. 30. C. *Desc.* Media. *Caput* & *thorax* atra, immaculata, *Elytra* rubra, fascia media



testa, atra, quæ futuram tamen haud attingit & ad marginem punctis duobus parvis terminatur. Lineola parva obliqua nigra ad *scutellum*. *Corpus* atrum.

6-Lineata. 31. C. Desc. Magna. *Corpus* nigrum. *Caput* punctis duobus baseos albis. *Thorax* ater, punctis duobus baseos albis. Margo exterior albus, macula nigra. *Elytra* flava, lineis tribus atris, quæ tamen nec basin nec apicem attingunt, exterioribus duabus ante apicem coeuntibus. Punctum præterea oblongum versus apicem & commune, bifidum.

Flexuosa. 32. C. Desc. *Corpus* atrum, immaculatum. *Thorax* ater, macula laterali apicis albida. *Elytra* lutea, puncto baseos orbiculato, fascia in medio flexuosa & macula apicis transversa, clavata, nigris.

7-Macula- 33. C. Desc. Magnitudo & statura oblonga  
ta. C. 13-punctata. *Caput* atrum. *Thorax* lævis, ater, margine antico & laterali albo. *Elytra* rubra, punctis nigris tribus, primo baseos rotundato, secundo in medio transverso, tertio versus apicem rotundato. Punctum denique commune trilobum. *Corpus* nigrum.

8-Punctata. 34. C. Desc. Magnitudo. C. 2-punctata. *Caput* albicans, punctis quinque nigris ad basin & unico utrinque ad marginem.

13.-Macu- 35. C. Desc. Distincta sane a C. 13-punctata,  
lata. tota fere orbiculata. *Thorax* albus, maculis quatuor nigris.

16-Punctata. 36. C. Desc. Major, oblonga. *Caput* albi-

dum, punctis quatuor nigris. *Thorax* albidus, punctis plurimis approximatis.

20-Punctata. 37. *C. Desc.* Parva. Statura *C. hieroglyphicæ*. *Caput* nigrum. *Thorax* flavus, punctis quinque baseos nigris.

Subpunctata. 38. *C. Desc.* *Thorax* flavus, punctis quinque nigris, tribus posterioribus, omnibus rotundis. *Caput* flavum. *Oculi* nigri. *Elytra* rubra aut fulva; ad marginem externum, in singuli elytri medio, punctum nigrum minutum.

Obverse-punctata. 39. *C. Desc.* *Thorax* niger, basi margineque utroque, nec non linea longitudinali in medio & utrinque puncto, flavis. *Caput* nigrum, *fronte*, *antennisque* flavis. *Elytra* rubra ad angulum scutelli flavicant habentque punctum commune nigrum; aliud punctum nigrum prope basin singuli elytri & duo sub medium.

11-Punctata. 40. *C. Desc.* Magnitudo. *Thorax*, *caput* habitusque *C. 9-punctatæ*. *Elytra* rubra ad angulum scutelli flavicant, post quem majusculo puncto communi nigro notantur; præterea citra medium singuli elytri puncta minuta duo nigra, ultra medium duo majora, ac tandem unum solitarium, quod jam majusculum, jam minutum est.

*Obs.* Qui speciem præsentem cum *C. 9-punctata*, *6-punctata* ac *obverse-punctata* eandem existimat, vix erraverit.

15-Guttata, 51. *C. Desc.* *Corpus* majusculum, rotundatum, *Thorax* luteus, margine laterali

albo, puncto medio luteo. Macula obsoleta albida ad basin thoracis. *Elytra* lutea, punctis septem rotundatis albis. Punctum commune fere obsoletum fere in medio dorsi.

11-Guttata. 52. *C. Desc.* *Tota* lutea. *Oculi* atrii. *Thorax* luteus, margine utroque albo, ita diaphanus, ut oculi nigri, si caput intra thoracem retrahatur, transluceant. *Elytra* lutea; in singulo maculæ sex lacteæ.

Hæmorrhoidalis. 60. *C. Desc.* *Corpus* rotundatum. *Caput* obscure rufum. *Thorax* rufus interdum basi, interdum punctis tribus baseos nigris. *Elytra* atra apice rufa, fascia nigra quæ tamen futuram haud attingit.

Variabilis. 61. *C. Desc.* Differt manifeste a *C. bipustulata*. *Corpus* oblongum, immarginatum. *Caput* album. *Thorax* ater, margine albo. *Elytra* lævia atra, puncto rubro. Variat junior elytris luteis puncto flavescente, at ætate *elytra* nigra & puncta rubra evadunt.

12-Pustulata. 62. *C. Desc.* *Media*. *Caput* albidum, puncto frontali nigro. *Thorax* ater, margine antico & laterali pallido. *Elytra* atra, punctis sex albis 2, 3, 1, tribus exterioribus margine connatis. Punctum ultimum lunatum.

Austriaca. 63. *C. Desc.* Nigra, nitida. *Thorax* niger, lateribus pallide rubris. *Caput* nigrum, fronte rubra. *Elytra* nigra, tenuissime punctata. Basi a margine exteriori introrsum macula procedit in modum fasciæ, quæ tamen marginem

interiorem minime attingit. *Abdomen* nigrum, lateribus rubrum. *Pedes* rubri.

Obs. *Scop. carn.* 250. coccinella 4-maculata hujus est varietas?

Minutiffi- 64. *C. Desc.* *Corpus* totum aterrimum, ut byffus atra, tomentosulum. *Frons* rubra. *Thorax* ater, latere utroque macula rubra notatus. *Elytra* atra, maculis duabus rubris, colore sanguinis concreti apicibusque similiter coloratis. Maculæ elytrorum fasciam formare videntur, quod latiusculæ sint. *Pedes* ex rubro nigri.

Obs. Hæ duæ coccinellæ ad enumerationem *Inf. Austriæ* pertinent; errore igitur *D. Fab.* attributæ fuerunt tom. I. p. 115.

Pygmæa. 65. *C. Desc.* Nigra, lævis, villosula. *Thorax* utrinque macula laterali rubra.

Pardalina. 69. *C. Desc.* Magna. *Corpus* atrum, maculis duabus baseos albis. *Thorax* ater, fascia media valde sinuata margineque laterali albis. *Elytra* margine sinibus tribus albo punctata in disco quinque 1, 2, 1, 1. *Corpus* atrum.

Margine- *C.* ( le bord ponctué ) coleoptris flavis, punctata. margine albidio, punctis utrinque duobus nigris. *Mantiff.* 8.

*Adæ Hall.* I. 260. coccinella margine punctata, thorace albo multipunctato, elytris rufis luteo maculatis, margine albidio, 4-punctato.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Magna. *Caput & thorax* albida, punctis

punctis plurimis sparsis nigris. *Elytra* flava, maculis obsoletis pallidis. Margo albidus, semper punctis duobus distinctis nigris.

Oblongo- punctata. C. ( l'oblongue ponctuée ) coleoptris flavis ; lineis quatuor abbreviatis punctis , sex atris. *Mantiss.* 13.

*Hab.* in Russia Australiori. D. Boeber.

*Desc.* Magna. *Caput* nigrum, punctis duobus baseos albis. *Thorax* niger, margine albo puncto nigro. *Elytra* flava, lineis duabus, exteriori abbreviata, interiori basi incrassata atris. Ad futuram puncta tria nigra. *Corpus* nigrum.

Rivularis. C. ( la sinuée ) coleoptris luteis , fasciis duabus dorsalibus sinuatis punctisque sex nigris, thorace atro flavo bipunctato. *Mantiss.* 19.

*Thumb. nov. sp. coccinella transversalis.*

*Hab.* in Suecia. D. Pay Kull.

*Desc.* Media. *Caput* atrum, punctis duobus baseos flavis. *Thorax* ater, margine antico punctisque duobus flavis. *Elytra* flava, fasciis duabus marginem anteriorem haud attingentibus ; altera baseos valde sinuata, altera in medio. Præterea puncta tria submarginalia, postico majori.

4-Notata. C. ( la quadripunctuée ) coleoptris rubris ; punctis quatuor baseos nigris, thoracis marginibus albidis. *Mantiss.* 29.

*Hab.* Kiliæ. D. Daldorf. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Differre a reliquis videtur. *Caput* & *thoracis* margo anticus & lateralis obscure albidus. *Elytra* rubra, basi punctorum duorum pari nigro. *Pedes* testacei.

4-Maculata. C. ( la quadrimaculée ) coleoptris rubris ; punctis quatuor nigris , thorace atro , macula marginali alba. *Mantiff.* 30.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Differt manifeste a C. 4-punctata.

*Caput* nigrum , punctis duobus baseos pallidis. *Thorax* niger , nitidus , macula marginali , magna , alba. *Elytra* rubra ; punctis duobus 1 , 1 nigris. *Corpus* nigrum.

5-Maculata. C. ( la 5-maculée ) oblonga , coleoptris flavescentibus , punctis nigris quinque , thorace atro , margine antico triradiato albo. *Mantiff.* 32.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Differre videtur a C. 5-punctata.

*Corpus* magis oblongum. *Caput* antice album , punctis duobus nigris. *Thorax* ater , margine antico & laterali albis. Margo anticus ramos tres exferit. *Elytra* flava , puncto baseos communi duobusque in medio nigris.

11-Maculata. C. ( la 11-maculée ) coleoptris rubris punctis nigris undecim , corpore ferrugineo. *Mantiff.* 47.

*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Differt manifeste a C. 11-punctata , duplo fere major. *Corpus* ovatum , rufum. *Elytra* punctis quinque 1 , 2 , 2 oblique positis & baseos communi.

Chrysomeli- C. ( la chrysomeline ) coleoptris rufis , na. punctis nigris duodecim , thorace immaculato.

*Vincent. Petagn. specim. n.* 35.

*Desc.* Major. *Caput* & *thorax* rubra ,



immaculata, margine paullo pallidiora. *Elytra* rufa, punctis sex nigris per paria dispositis, 2, 2, 2. *Pedes* flavescens.

*Obs.* Huic respondet nostra in Acropoli reperta, e majoribus est, rubra. *Antennæ* apice fuscae. *Oculi* nigri. *Thorax* & *elytra* rubra, pube albescens. Singulum *elytrum*, punctis sex nigris grandiusculis, per paria distributis. *Abdomen* subrus nigricans, margine rubescens. *Pedes* flavescens.

14-Maculata. C. ( la 14-maculée ) coleoptris luteis ; futura punctisque quatuordecim nigris distinctis. *Mantiss.* 57.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Distincta omnino a C. 14-punctata, major. *Caput* album. *Thorax* albus, nigro punctatus. *Elytra* lutea, punctis 3, 3, 1, anterioribus in semicirculo positis. *Sutura* nigra.

16-Maculata. C. ( la 16-maculée ) coleoptris rubris ; punctis nigris sedecim, capite immaculato. *Mantiss.* 60.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* *Corpus* majusculum, oblongum. *Caput* album immaculatum. *Thorax* albus, punctis septem nigris 2, 5. *Elytra* rubra punctis octo 2, 2 approximata, 1, 3 oblique posita; puncta rarius connexa.

8-Guttata. C. ( les 8-gouttes ) coleoptris obscure rufis, punctis octo albis. *Mantiss.* 71.

*Hab.* in Kamtschatka. *Mus. D. Banks.*

*Desc.* Media. *Caput* atrum. *Thorax* ater, margine late albo; macula cordiformis

alba ad basin. *Elytra* obscura, puncta  
baseos ad futuram, duobus in medio  
versus futuram lineolaque apicis albis.  
*Corpus* atrum.

2-Guttata. C. ( les 2-gouttes ) coleoptris rufis ;  
punctis duobus flavis. *Mantiss.* 72.

*Hab.* Mus. D. Hunter.

*Desc.* Parva. *Thorax* glaber ater, nitidus ;  
margine laterali flavo. *Elytra* glabra,  
rufa. Macula baseos transversa flava.

Analís. C. ( l'enflammée ) coleoptris atris apice  
rubris immaculatis. *Mantiss.* 81.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* Nimis C. hæmorrhoidali affinis, at  
duplo minor. *Caput* rubrum, immacu-  
latum. *Thorax* rufus, basi in medio  
niger. *Elytra* lævia, atra, apice late  
rufa. *Abdomen* & *pedes*, rufa.

Frontalis. C. ( la frontale ) coleoptris nigris, punctis  
duobus rubris, fronte pedibusque an-  
ticis rubris. *Mantiss.* 86.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* Differt sane a reliquis. *Caput* fer-  
rugineum, immaculatum. *Thorax* niger,  
margine antico parum rufescente. *Elytra*  
nigra, puncto medio rufa. *Pedes* *antici*  
rubi, *postici* nigri, *tibiis* rufis.

*Desc.* Variat capite nigro & punctis *ely-  
trorum* quatuor.

Erythroce- C. ( l'érythrocéphale ) coleoptris atris :  
phala. punctis rubris sex, capite thoracif-  
que margine pallide rufescentibus.  
*Mantiss.* 82.

*Hab.* Kiliæ. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Differt manifeste a C. 6-punctata.  
*Corpus* multo minus. *Caput*, *thoracis*

margo pedesque pallide rufescentia;  
*Elytra* atra, nitida, punctis tribus  
 rubris 2, 1. *Abdomen* nigrum.

*Obs.* *Coccinella* 3-punctata Linn. sub  
 eodem nomine in *Mantiss.*

*Chrysomela.*

Linnaëana. 37. *C. Desc.* *Statura* chryf. *politæ*. *Caput*,  
*thorax*, *femora*, *abdomen* nigra. *Antennæ*, *tibiæ*, *elytra* rubra; *thoraci*  
 quoque maculæ duæ sanguineæ insident,  
 permanentes, una ad quemvis margi-  
 nem exteriorem prope basin.

Bulgaren- 38. *C. Desc.* nigra. *Antennarum* primus &  
 sis. secundus articulus, rubri. *Antennæ* ipsæ  
 filiformes. *Thorax* marginatus. *Elytra*  
 nigro-viridi-ænea punctata, quæ puncta  
 fatis profunda lineas decem constituunt.  
*Pedum* unguiculi rubri.

Erythro- 39. *C. Ovata*, atra, vix nitens, punctis  
 ptera. impressis, inordinate digestis, copiosis  
 oblita. *Thorax* minus punctatus, nec  
 tamen nitens. *Antennæ* basi rubro-  
 fuscae. *Pedes* ex nigro violacei. *Alæ*  
 læte coccineæ.

Viridicol- 40. *C. Desc.* *Thorax* marginatus viridis;  
 lis. basi apiceque cæruleus. *Elytra* cærulea,  
 inordinate punctata, lineis impressis  
 obsoletis. *Antennæ* sensim crassiores  
 nigrae, in medio rubrae. *Subtus* vio-  
 lacea. *Pedes* nigri.

Viennensis. 41. *C. Desc.* *Tibiæ* a medio *tarisque* rufi  
 coloris. *Antennæ* nigrae, sensim cras-  
 siores. *Thorax* tenuissime, magis cons-  
 pique, *elytra* punctata.

20. Punctata. 42. *C. Desc.* Nigro-ænea, abdomine flavescente. *Thorax* margine flavo. *Elytra* flava, maculis oblongis in singulo elytro decem nigris. *Antennæ* articulis tribus exterioribus crassioribus. *Pedes* subfusci, femoribus æneo-nigris.

Xanthomelæna. 43. *C. Desc.* Subtus nigra. *Caput* flavum, in fronte macula nigra. *Oculi* nigri. *Antennæ* filiformes nigræ. *Thorax* flavus, maculis quatuor nigris, quarum una utrinque prope marginem, una in medio & super hanc alia transversa. *Elytra* flava, sed sutura nigra & linea lata longitudinali nigra prope latus externum; item alia brevissima prope internum. Animal, dum vivit, elegantissimum, at mortuum vera fluxæ pulchritudinis imago.

*Obs.* Licet chrysf. *calmariensem* non citaverit *D. Schrank*; forsan tamen chrysf. *xanthomelæna* varietas. Nam, excepto elytrorum colore, vix differunt. V.

Dimidiata. 45. *C. Desc.* Tota nigra, sed pedes, os, elytraque a basi ad medium rufa.

Flavo-guttata. 46. *C. Desc.* Simillima chrysf. *marginatæ* a qua differt sola pictura elytrorum thoracisque. *Fronti* puncta duo flava insunt. *Antennæ* basi fuliginose flavescunt.

Dubia. 47. *C. Desc.* Pertinet ad buprestes *Scop.* & cryptocephalos *D. Geoff.* Tota aterima, nitens, sine ullis striis punctisve, etiam vel ad lentem conspicuis. *Pedes* non saltatorii. Decidat *Linnaeus*, an non tamen ejus chrysf. *hemisphærica* sit, cum chrysf. *saltatoriarum* aliquæ varient pedibus simplicibus.

Clavicornis. 48. *C. Desc. Caput, thorax, (qui latus est & marginatus & elytrorum longitudine) elytraque viridi-nigrescentia. Pedes rufi. Antennæ fuscae, insigni clava instructæ. Caput intra thoracem fere totum retrahit; nec tamen thorax ita globosus, ut in cryptocephalis laudati auctoris.*

Lusitanica. 49. *C. Desc. Major chryf. Bankii. Caput nigrum, primo antennarum articulo violaceo. Thorax cupreus, obscure nitidus. Elytra vage punctata, ænea. Corpus subtus cum pedibus violaceum.*

Bankii. 50. *C. Desc. Statura chryf. bicoloris. Caput æneum, ore testaceo antennisque fuscis. Elytra ænea, punctata. Subtus tota cum pedibus & elytrorum margine inferiori testacea.*

Adonidis. 51. *C. Desc. Affinis chryf. futurali. Caput nigrum, fronte flava. Thorax ater, margine laterali flavo, puncto medio nigro. Scutellum atrum. Elytra flava, futura nigra, quæ tamen scutellum haud attingit. Vitta lata nigra in medio elytrorum, quæ nec ad basin nec ad apicem excurrit. Corpus & pedes atra, plantis fuscis.*

*Obs. In prima Mantiss. sub nomine chryf. 3-lineatæ descripta.*

Dorsalis. 52. *C. Desc. Affinis videtur præcedenti, at minor. Elytra testacea, sola futura atra, quæ basin haud attingit. Antennæ & pedes nigri. Scutellum atrum.*

Cuprea. 53. *C. Desc. Statura & magnitudo omnino chryf. graminis. Corpus, antennæ &*

*pedes*, nigra. *Caput* æneum, oculis fuscis. *Thorax* æneus, margine incrassato, punctato. *Elytra* omnino cuprea, nitida, basi gibba. *Abdominis* margo sanguineus.

Limbata. 54. *C. Desc.* Statura & summa affinitas chryf. *sanguinolentæ*, a qua tamen manifeste differt elytris multo lævioribus & margine anteriori sanguineo. *Color* omnis niger, parum æneo tinctus.

Hannoveriana. 55. *C. Desc.* Statura chryf. *marginatæ*, cyaneo nitida, glabra. *Antennæ* moniliformes nigrae. *Thorax* margine late ferrugineo. *Elytra* punctato-friata, margine vittaque media ferrugineis, quæ postice cum margine coit.

Litura. 56. *C. Desc.* Statura chryf. *pallidæ*, at duplo minor. *Caput* rufum, margine postico nigro. *Thorax* rotundatus, nitidus, immaculatus. *Elytra* striatopunctata, futura lineaque media nigris. *Subtus* nigra, pedibus pallidis. *Mas* pallidus, ubi *femina* rufescens; interdum linea nigra elytrorum deest.

Fucata. 57. *C. Desc.* Statura & magnitudo chryf. *hæmorrhoidalis*. *Caput* uti corpus subtus, *pedesque* atra, immaculata. *Thorax* viridis, glaber, nitens. *Elytra* obscuriora vage punctata.

Fuscicornis. 58. *C. Desc.* Magnitudo præcedentis. *Caput*, *thorax*, *elytra* viridi-ænea, immaculata, glabra, nitida. *Corpus* subtus magis obscurum. *Antennæ* & *pedes* nigri.



Ruficollis. 59. *C. Desc.* Statura chryf. *betulæ*. *Antennæ* rufæ, apice fuscæ. *Caput* viridi-æneum, ore rufo. *Thorax* rufus, immaculatus. *Elytra* viridia, nitida, immaculata. *Corpus* viride. *Pedes* rufi.

Abfinthii. 60. *C. Desc.* *Corpus* magnitudine chryf. *tanacetii*. *Caput* pallidum, bafi nigrum. *Thorax* pallidus, macula media nigra. *Elytra* pallida, lineis tribus atris, quæ tamen nec bafin nec apicem attingunt; exteriores apice coeunt. *Pedes* ferruginei, geniculis nigris.

4-Maculata. 61. *C. Desc.* Magnitudo & ftatura chryf. *alni*. *Caput* testaceum, bafi inter oculos nigrum. *Thorax* rotundatus, testaceus, immaculatus. *Elytra* lævia, nitida, testacea, maculis duabus nigris, altera bafeos rotundata, altera pone medium transversali fere fasciam constituyente. *Abdomen* atrum. *Pedes* testacei.

20-Punctata. 62. *C. Desc.* Statura chryf. *analii*. *Thorax* æneus, marginibus incrassatis albis. *Elytra* alba, futura maculisque decem oblongis æneis. *Pedes* ænei, geniculis albis.

*Obs.* Varietas videtur chryf. 20-punctatæ, n. 42; vix enim differt nisi colore. V.

Ruficodis. 64. *C. Desc.* Magnitudo chryf. *graminis*. *Tota* obscure ænea. *Antennæ* capituli thoracisque longitudinem æquant. *Thorax* antice concavus. *Abdomen* lateraliter rubrum. Alarum nervus exterior, bafi ad medium usque, ruber.

Cæruleo-violacea. 65. *C. Desc.* Affinis chryf. *alni*. cæruleo-violacea. *Thorax* elytrorum latitudinem

fere æquat. *Subtus* viridi-violacea. *Antennæ* apice crassiores caput thoracemque minime superant.

Griseo- 66. *C. Desc.* Supra griseo-fusca, nitens; nitida. *subtus* nigricans. *Antennæ* pedesque nigricante fusci.

*Hab. in lilio.*

Ferruginea. 90. *C. Desc.* *Tota* pallide testacea, seu lucide castanei coloris, nitida, ovata. *Thorax* inflexus uti *chrysl. elongata*. Ad lentem *elytra* striato-punctata. *Oculi* soli nigri. *Femora postica* crassiora, quod in saltatoriis omnibus obtinetur, si auctoribus fidas.

Euphorbiæ. 91. *C. Desc.* *Tota* atra, nitida minime æs aurumve inclinans. *Elytra* impunctata nec striata. *Antennæ tibiæque* omnes rufæ.

Altica. 92. *C. Desc.* *Frons* rufa. *Oculi* nigri. *Pedes* rufi. *Thorax* niger, basi utrinque in margine exteriori macula rufa. *Elytra* atra, nitida, irregulariter minutissime punctata, subtilissime tomentosa; singula prope basin puncto rubro.

Pulex. 93. *C. Desc.* Oblonga, tota nigra, nitens. *Thorax*, *elytraque* subtilissime, at irregulariter punctata.

Cincta. 94. *C. Desc.* *Caput* nigrum. *Thorax* obscure æneus, margine albo. Margo & anticus & posticus in medio albus. *Elytra* viridi-ænea, margine punctisque duobus dorsalibus albis. *Corpus* atrum. *Femora postica* valde incrassata.

Nigripes. 95. *C. Desc.* Affinis chryf. *hyosciami*, at  
*pedes omnes nigri.*

Anglica. 96. *C. Desc.* Statura & summa affinitas  
chryf. *atricillæ*, at *thorax* etiam ater.  
*Tibiæ pallidæ.*

Testacea. 100. *C. Desc.* Differt sane a chryf. *exfoleta*.  
Major est, magis gibba, *thoracè ely-*  
*trisque lævissimis, nitidis.*

Tabida. 101. *C. Desc.* Statura omnino chryf. *exfo-*  
*leta*, at paullo minor. *Tota pallida,*  
*immaculata, oculis folis nigris, pro-*  
*minulis. Elytra lævia.*

Atra. 102. *C. Desc.* Parva, *tota atra,* *folis*  
*plantis pedum & antennarum subrufes-*  
*centibus.*

Cæruleo- 103. *C. Desc.* *Antennæ* corporis dimidio  
striata. *longiores, rufæ. Caput, thorax pedes-*  
*que lutescente-rufa, nitida. Elytra*  
*obscurè violacea, striato - punctata.*  
*Corpus subtus nigrum.*

Violaceo- 104. *C. Desc.* Vix pulice major. *Antennæ*  
punctata. *rufæ. Caput thoraxque aurato-cæru-*  
*lea, concavo-punctata. Elytra viola-*  
*cea, punctis concavis longitudinaliter*  
*digestis. Corpus subtus nitido-nigrum.*  
*Pedes rufi, femoribus posticis fuscis.*

Viridi- 105. *C. Desc.* Minime ovata. *Antennæ*  
cærulea. *rufæ, ultimis articulis incrassatis, fuscis.*  
*Caput, thorax qui lævis, elytraque*  
*viridi - cærulea. Pedes obscurè rufi,*  
*femoribus nitido-nigris.*

Bicolor. 106. *C. Desc.* Nimium affinis chryf. *rufipedi.*

*Elytra* æneo-nigra, striato-punctata.  
*Pedes* nigri.

Ovata. 107. C. Desc. Tota viridescenti - nigra.  
*Elytra* irregulariter punctata.

Brassicæ. 108. C. Desc. Similis præcedenti, sed minor  
 magisque elongata.

Lævis. 109. C. Desc. ovata nigra, subtilissime  
 scabra.

Marginata. 110. C. Desc. Chryf. nemorum affinis.  
*Antennæ*, caput, corpus subtus pedes-  
 que nigra. *Thorax* pallide luteus,  
 lateraliter nigricans. *Elytra* lutea,  
 extus & intus nigro marginata, quæ  
 nigredo basin non attingit.

Cærulea. 111. C. Desc. *Antennæ* basi ferrugineæ.  
*Elytra* cærulea, irregulariter punctata.  
*Pedes* ferruginei.

Longipes. 136. C. Desc. Statura chryf. tridentata,  
 at major. *Antennæ* breves, ferratæ.  
*Thorax* niger, subpubescens. *Elytra*  
 pallida, punctis tribus nigris, unico ad  
 basin & pari in medio. *Pedes* nigri, an-  
 tici in omnibus, quas vidi, elongati.

6-Macula- 137. C. Desc. Paullo major chryf. 4-punc-  
 tata. *Antennæ* breves, ferratæ, nigræ.  
*Thorax* rufus, nitidus, immaculatus.  
*Elytra* glabra, rufa, nitida, puncto  
 unico ad basin & duobus in medio  
 nigris.

Atraphaxi- 138. C. Desc. Magnitudo chryf. 4-punctata.  
 dis. *Caput* atrum, *antennis* ferratis cine-  
 reis. *Thorax* rufus, maculis tribus

approximatis nigris ad basin. *Elytra* pallidiora, maculis tribus, posteriori majori transversa. *Pedes* rufi, *femoribus* nigris. *Abdomen* nigrum, cinereo villosum.

Flavicollis. 139. C. Desc. Nimis affinis videtur chryf. 4 - *maculata*. *Caput* nigrum, lineola inter antennis, punctis duobus in oculorum orbita, fulvis. *Antennæ* nigrae, basi fulvæ. *Thorax* glaber, nitidus, fulvus, punctis sex nigris in strigam digestis. *Elytra* pallida, puncto basales apiceque nigris. *Pedes* rufi, geniculis nigris. Punctum apicis elytrorum interdum deest.

Marginata. 140. C. Desc. Nimis chryf. *longimanæ* affinis, cujus forte mera varietas. *Corpus* totum nigro-æneum. Punctum flavum ad os. *Elytra* flava, margine omni nigro.

2-Macula- 141. C. Desc. Nimis chryf. 2 - *punctata* affinis & forte mera ejus varietas. Differt tantum thorace haud atro, sed fulvo.

Cyanea. 143. C. Desc. Statura chryf. *cordigeræ*. *Caput* & *elytra* cyanea, nitida. *Thorax* glaber, rufus.

Collaris. 144. C. Desc. Major chryf. *sericea*. *Caput* cyaneum, antennis basi rufis. *Thorax* glaber nitidus, medio cyaneus, lateribus rufis. *Elytra* cyanea, macula magna apicis rufa. *Corpus* nigrum. *Pedes* nigri, *femoribus* rufis.

Quadrum. 145. C. Desc. Magnitudo chryf. *Moræi*.

*Corpus* totum atrum nitidum. *Elytra* lævia, flava, vitta media lata atra, quæ apicem tamen haud attingit, sed ante apicem reflectitur ad futuram.

Vittata. 146. *C. Desc.* Magnitudo & statura chryf. *Moræi*. *Corpus* nigrum, nitidum. *Elytrorum* margo exterior flavus & in medio stria abbreviata flava.

2-Pustulata. 147. *C. Desc.* Nimis affinis chryf. 4-pustulata. *Tota* atra. *Elytra* striata, macula magna apicis rufa, margine tamen ipso tenuissime nigro.

Histrion. 148. *C. Desc.* Magnitudo chryf. *Scopolinæ*. *Caput* nigrum, orbita oculorum rufa. *Thorax* niger, margine lineolisque tribus abbreviatis ferrugineis. *Elytra* punctata nigra, maculis apiceque ferrugineis. *Pedes* ferruginei, geniculis femorumque posticorum fascia rufa.

Pusilla. 149. *C. Desc.* Parva, duplo minor chryf. *pini*. *Caput* fulvum, *antennis* pallidis *oculisque* nigris. *Thorax* fulvus, immaculatus. *Elytra* substriata, punctis duobus baseos fasciaque postica, nigris. *Corpus* nigrum. *Pedes* pallidi.

*Obs.* Variant interdum maculæ elytrorum, mox confluunt, mox omnino desunt

Violacea. 152. *C. Desc.* *Antennæ* corpus fere æquant. *Elytra* regulariter punctato-striata. *Subtus* cæruleo-atra, *supra* cærulea.

Cærulea. 153. *C. Desc.* Affinis præcedenti, at *elytra* punctis irregulariter sparsis.



Nigra. 154. C. Desc. Tota nigra, antennis basi pedibusque rufis. Thorax lævis. Elytra punctato-friata.

Fulva. 155. C. Desc. Nigro-fusca. Antennæ nigræ. Caput, thorax lævis pedesque rubello-fulva. Elytra pallide flavescencia striis carent.

Lineola. 174. C. Desc. Statura chryf. nymphaeæ. Caput griseum, antennis nigris. Thorax griseus, linea media nigra lateribusque subangulatis. Elytra grisea, puncto baseos nigro. Corpus subtus fuscum, cinereo pubescens.

Sanguinea. 175. C. Desc. Statura omnino chryf. caprea; at rubra, antennis, oculisque nigris. Abdomen nigrum. Pedes cinerei.

Nigricor- 176. C. Obs. Delenda species hæc; nam  
nis. chryf. halensis Syst. est cistela 13  
Mantiss.

Cantharoi- 177. Desc. Statura chryf. nymphaeæ. Antennæ filiformes, basi rufescentes. Caput & thorax exacte chryf. nymphaeæ, rufa, immaculata. Elytra & abdomen cyanea, nitida.

14-Puncta- 178. Desc. Magnitudo & statura chryf. 12-  
sa. punctata. Caput fulvum, ore, antennis punctoque verticali, nigris. Thorax fulvus, punctis quinque nigris 4, 1. Elytra pallidiora, punctis 1, 2, 2, 1, 1; quorum sextum majus, rotundatum, septimum terminale. Abdomen & Femora fulva.

**Subspinosa. 179.** *C. Desc.* Statura chryf. *flavipedis*. *Caput* rufum, *antennis* filiformibus nigris, basi rufis. *Thorax* utrinque unispinosus, subpunctatus, rufus, immaculatus. *Elytra* punctata, obscure nigra. *Abdomen* nigrum. *Pedes* rufi.

**5-Puncta- 180.** *C. Desc.* Tota aterrima. *Oculi* prostantes. *Frons* inter oculos sulco profundo longitudinali. *Thorax* fulvus f. ruber. *Elytra* fulva, thorace pallidiora, punctato-striata, striis per singula decem, puncto minori ad basin exteriorem, majori ultra medium nigris, notata. Margo internus niger. *Scutellum* nigrum; & post hoc ex dilatata marginis nigredine macula magna, utrinque elytro communis nigra.  
*Obs.* Fere omnino similis *crioc. 5-punctatae Mantiss.* 29; eademque species videtur. Vix enim differt nisi coloris varietate.

**Varsians. C.** ( la variable ) ovata cærulea f. viridis, *antennis* pedibusque nigris. *Mantiss.* 24.  
*Act. Hall.* 1. 272. chrysomela varsians.  
*Hab.* in Saxonia. in Gallia Auf. V.  
*Desc.* *Corpus* medium, totum glabrum aut viridi-æneum, aut cyaneum, immaculatum. *Pedes* nigri.

**Centaurii. C.** ( de la centauree ) ovata cuprea nitens; subtus viridi-ænea, pedibus cupreis. *Mantiss.* 25.  
*Hab.* in Germaniæ centaurea. *D. Schneider.*  
*Desc.* Statura & magnitudo præcedentis. *Antennæ* nigræ. *Corpus* supra cupreum, nitidum, subtus viridi-æneum. *Scutellum* æneum. *Pedes* cuprei.

Tremula.

Tremula. C. ( du tremble ) ovata cærulefcens , elytris testaceis.

*Geoff. inf. I. 252. 2.*

*Hab. in Europæ populo.*

*Desc. An satis a chryf. populi diftincta? At duplo minor & elytra apice concolora.*

6-Punctata. C. ( la 6-punctuée ) nigra , thorace rufo , punctis duobus , elytris rufis , punctis tribus nigris. *Mantiff. 43.*

*Hab. in Europæ plantis. Circa Lugdunum. V.*

*Desc. Affinis chryf. 10-punctatæ , omnino diftincta a cryptöcephalo 6-punctato.*

*Caput nigrum , ore rufo. Thorax rufus , punctis duobus nigris interdum bafi connatis. Elytra glabra rufo , punctis tribus bafeos 2 , 1 , nigris. Corpus nigrum , ano rufo. Pedes rufi.*

Rumicis. C. ( de la patience ) ovata , thorace fulvo , punctis quatuor nigris , elytris fulvis , futura vittaque media nigris. *Mantiff. 47.*

*Hab. in rumici spinofa Hispaniæ. D. Vahl.*

*Desc. Statura & magnitudo chryf. pallidæ.*

*Antennæ nigræ , articulo primo fulvo.*

*Caput fulvum , læve , nitidum , puncto*

*in medio bafeos nigro. Thorax lævis ,*

*nitidus , fulvus , punctis quatuor trans-*

*verfim pofitis. Scutellum nigrum. Elytra*

*lævia , fulva , futura tota vittaque*

*media , quæ tamen nec bafin , nec*

*apicem attingit , nigris. Corpus nigrum.*

*Pedes fulvi.*

Ruficollis. C. ( le collier ) ovata cyanea , antennarum bafi thorace pedibusque rufis. *Mantiff. 55.*

*Hab. in Ruffia Meridionali. D. Boeber.*

*Desc. Statura omnino chryf. polygoni ,*

*Infeâ. Tomus IV.*

R

at paullo minor & alia. *Antennæ* basi rubræ, apice fuscæ. *Caput* cyaneum, utrinque puncto parvo baseos rubro. *Thorax* rufus, nitidus, immaculatus. *Elytra* nitida, cyanea, vix punctata. *Corpus* cyaneum. *Anus* & *Pedes* rufi.

Aucta. C. ( l'augmentée ) ovata, thorace cyaneo nitido, elytris punctatis cyaneis, margine rubro. *Mantiss.* 69.

*Hab.* Dresdæ. *D. Zschuck.*

*Desc.* Magnitudo & statura chryf. *marginata*. *Caput*, *thorax*, *elytra* cyanea nitida, margine elytrorum late rufo. *Antennæ* pedesque nigri.

5-Punctata. C. ( la 5-punctuée ) ovata nigra, thorace rufo, coleoptris testaceis punctis quinque nigris. *Mantiss.* 72.

*Hab.* Hamburgi. *D. Schulz.*

*Desc.* Media. *Caput* cum antennis, *corpus*, *pedes*, nigra. *Thorax* rotundatus, rufus immaculatus. *Elytra* lævia, testacea, puncto baseos apicisque & communi in medio nigris.

Scutellata. C. ( l'écussonnée ) ovata rufa, coleoptris maculis quinque nigris. *Mantiss.* 73.

*Herbst. arch.* chrysomela scutellata.

*Hab.* in Germania. *D. Schneider.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Parva. *Caput* & *thorax* rufa, immaculata. *Antennæ* apice fuscæ. *Elytra* lævia, rufa, macula baseos communi duabusque in medio approximatis fere confluentibus, nigris. *Abdomen* basi nigrum.

Flavicans. C. ( la jaunâtre ) ovata flavescens, elytris viridi-cinereis. *Mantiss.* 75.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino chryf. lituræ. *Caput*, *thorax*, *pedes* flavescencia. *Elytra* punctato-striata, viridicinea, margine parum flavesciente.

*Pallipes. C.* ( la pallipede ) ovata nigra, elytris pedibusque pallescentibus. *Mantiss.* 85.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parva. *Antennæ* nigrae, basi pallidæ. *Caput* & *thorax* nigra, glabra, immaculata. *Elytra* lævissima, pallescentia. *Pedes* pallidi.

*Sophiæ. C.* ( du sisymbre ) ovata cærulea, tibiis plantisque flavis.

*Ad. Hall.* 1. 272. chrysomela sphiæ ovata viridis, elytris postice acuminatis, tibiis plantisque ferrugineis.

*Hab.* in sisymbrio sphia Halæ.

*Desc.* Statura & magnitudo chryf. armoraciæ. Totum corpus læve, glabrum, cæruleum, nitidum, solis tibiis plantisque flavescantibus. *Elytra* parum acuminata.

*Littoralis. C.* ( des rivages ) oblonga atra, elytris porcatis, atro-fusca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numerosis. *Mantiss.* 93. *Geoff. inf.* 1. 252. 1. tab. 4. fig. 6. galleruca.

*Hab.* ad Europæ Australis littora.

*Desc.* Statura omnino chryf. tanaceti, at major, tota atra immaculata. *Elytra* lineis quatuor elevatis postice coeuntibus, interjectis punctis impressis numerosis.

*Rustica. C.* ( la rustique ) oblonga nigra, thorace elytrisque griseis. *Mantiss.* 94.

*Ad. Hall. I. 274. chrysomela rustica, ovata nigra, elytris griseis, striis quinque eminentibus.*

*Hab. in Germaniæ fruticibus. Circa Lugdunum. V.*

*Desc. Affinis videtur chryf. tanaceti. Corpus nigrum, at thorax & elytra grisea. Elytra punctata, lineis tribus elevatis multo distinctioribus.*

*Lachicæ. C. ( la rouillée ) oblonga, capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris nigro-æneis. Mantiss. 105.*

*Hab. Dresdæ. Mus. D. Romani. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Statura & magnitudo chryf. vitellinæ. Caput & thorax obscure ferruginea. Antennæ moniliformes sensim crassiores. Elytra punctato - striata, obscure ænea. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei.*

*Cruciata. C. ( la porte-croix ) oblonga rubra, coleoptris cruce nigra. Mantiss. 110.*

*Schall. aâ. Hall. I. 273. chrysomela cruciata.*

*Hab. Halæ-Saxonum. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Minor chryf. coccinea. Caput obscurum, antennis nigris. Thorax marginatus, lævis, nitidus, ruber, immaculatus. Coleoptra lævia nitida, rubra, futura fasciæque lata in media, atris. Corpus rufum, abdominis basi nigra. Pedes nigri.*

*Obs. Saltatoriæ femoribus incrassatis.*

*Brassicæ. C. ( du chou ) saltatoria atra, elytris pallide testaceis, margine omni fasciæque media, atris. Mantiss. 146.*

*Hab. in Germaniæ oleribus.*



*Desc.* Corpus parvum, atrum. *Antennæ* basi pallidæ. *Elytra* lævia, margine omni fasciaque media lata, atris. *Pedes* atri.

*Corpore cylindrico.*

**Rubrifrons. C.** ( la pudique ) cyaneus nitidus, fronte; thoracis fascia, femoribusque rubris.

*Mantiss. crypt.* 37.

*Hab. Prof. Leske.*

*Desc.* *Antennæ* fuscæ, basi rufæ. *Caput* magnum, cyaneum, macula magna rufa. *Thorax* rotundatus, in medio late rufus, margine antico posticoque tenuissime cyaneo. *Elytra* glabra, lævia cyanea, immaculata. *Pedes* cyanei, *femoribus* imprimis in medio rufis.

**Bucephala. C.** ( la bucéphale ) cyanea, ore, thoracis marginibus pedibusque rubris. *Mantiss. crypt.* 41.

*Añ. Hall.* 1. 276. chrysomela bucephala. Cylindrica, cyanea, thorace rufo, macula cyanea, pedibus rufis, femoribus basi plantisque cæruleis, maxillis forcipatis rufis.

*Hab. in anthylli vulneraria Saxonix.*

*Desc.* Maxillæ in altero sexu magnæ; incrassatæ, forcipatæ, rubræ, apice nigræ.

**8-Guttata. C.** ( la 8-punctuée ) atra, elytris maculis quatuor flavis. *Mantiss. clypt.* 50.

*Hab. in fraxino Saxonix. D. Hybner.*

*Desc.* Magnitudo chryf. *Moræi.* *Caput* atrum, fronte flavo maculata. *Thorax* ater, nitidus, lævis, margine antico flavo. *Elytra* punctata, atra, maculis quatuor flavis, prima baseos, duabus

in medio & quarta ad apicem. *Pedes* nigri, *antici* flavi.

**Nitidula. C.** ( la brillante ) thorace æneo nitido , elytris cyaneis , capite , antennarum basi pedibusque flavis. *Mantiss. clypt.* 65.

*Hab.* in Russia Meridionali. *D. Boeber.*

*Desc.* Major chryf. *labiata*. *Caput* flavum , basi parum æneum. *Antennæ* nigræ , basi flavescences. *Thorax* æneus , nitidus , immaculatus. *Elytra* subpunctata , cyanea , nitida , immaculata. *Corpus* nigrum. *Pedes* flavi , *femoribus* linea nigra.

**Flavilabris. C.** ( la bouche jaune ) obscure ænea , nitida , ore lutescente , antennis pedibusque nigris. *Mantiss. crypt.* 67.

*Myll. prodr.* 519. *cryptocephalus* parvulus.

*Geoff. inf.* 1. 8.

*Hab.* in betula Saxonix. *D. Schaller.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Affinis chryf. *labiata* , at *elytra* striato-punctata. *Antennæ* nigræ , basi lutescentes. *Pedes* nigri. *Larva* faccata , sacco antice oblique truncato.

*Corpore oblongo , thorace angustiore.*

**5-Punctata. C.** ( la 5-ponctué ) nigra , thorace rufo , coleoptris flavescensibus , maculis quinque nigris. *Mantiss. crioc.* 29.

*Hab.* in Germania Australiori. *D. Schulz.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Caput* cum *antennis* , nigrum. *Thorax* gibbus , rufus , nitidus. *Elytra* glabra , lævia , flava , puncto altero baseos , altero apice & quinto communi in medio dors. *Corpus* & *pedes* nigra immaculata.

Rufipes. C. ( la rufipede ) atra nitida, antennarum basi pedibusque flavis. *Mantiff. crioc.* 43.

*Hab.* in Saxoniae fruticibus. *Mus. D. Romanus.*

*Desc.* Paullo major chrysf. *melonopa*. *Antennæ* omnino hujus generis, at paullo longiores, nigræ, basi flavescentes. *Corpus* totum nigrum, glabrum, nitidum, immaculatum. *Pedes* flavescentes.

*Elongatæ.*

Gigas. C. ( la gigantesque ) villosa fusca, elytris; abdomine femoribusque testaceis. *Mant. cistela* I.

*Hab.* in Gallia Australiori. *D. Brouffenet.*

*Desc.* Gigas in hoc genere. *Antennæ* filiformes, villosæ, fuscæ. *Caput & thorax* villosa, immaculata. *Elytra* substriata, testacea. *Abdomen* dilute testaceum. *Pedes* fusci, femoribus testaceis.

Lepturoides. C. ( la lepturoïde ) atra, thorace quadrato; elytris striatis testaceis. *Mantiff. cist.* 6. *Leske rusf.* I. pag. 15. 5. tab. *A. fig.* 4. *cistela* rufitarfis.

*Hab.* in Europæ Australioris spicis fecalinis. *D. de Schestedt.*

*Desc.* Nimis affinis chrysf. *ceramboides*; at *thorax* omnino diversus, transversus, quadratus, paullo marginatus.

Varians. C. ( la variable ) testacea, oculis nigris; elytris substriatis. *Mantiff. cistela* 12.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & summa affinitas chrysf. *marinæ*, at paullo major. *Corpus* totum

testaceum, oculis folis nigricantibus;  
*Elytra* substriata.  
 Variat obscurior, *antennis pedibusque*  
 testaceis.

Humeralis. C. ( la militaire ) nigra, elytris puncto basales ferrugineo. *Mantiss. cistela* 14.  
*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*  
*Desc.* Parva. *Corpus* totum nigrum, ferrugineum ad basin elytrorum. *Tibiæ* testaceæ.

Morio. C. ( la Négresse ) nigra obscura, pedibus testaceis. *Mantiss. cistela* 15.  
*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*  
*Desc.* Statura parva, oblonga, angusta, villosa. *Pedes omnes* testacei.

Ambulans. C. ( l'ambulante ) glabra atra, elytris punctis. *Mantiss. lagria* 9.  
*Hab.* in Germaniæ *D. Schneider.* In Gallia Aust. V.  
*Desc.* Statura & summa affinitas, chrysolongatæ, at *thorax* corpore concolor, ater. *Antennæ* ferratæ. *Elytra* glabra, nitida, punctata.

Scutellaris. C. ( la chevaliere ) nigra cinereo hirta, scutello albo. *Mantiss. lagria* 17.  
*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.*  
*Desc.* Statura & magnitudo L. atræ, at corpus totum pilis densis cinereis hirtum & *scutellum* omnino album.

Rufa. C. ( la rousse ) oblonga nigra, pedibus piceis. *Erotylus* 15. *sp.*  
*Hab.* Kilix-Holsatorum. *D. Lund.*  
*Desc.* *Antennæ* filiformes nigre, primo articulo ferrugineo. *Caput* & *thorax* nigra, obscura. *Elytra* striata nigra, immaculata, *Pedes* picei, geniculis nigris.

*Obs.* Nomen triviale primæ *Mantiff.* conservavi, ne confundatur cum *crioc. rufipede*. V.

*Hispa.*

*Obs.* Licet hujus generis nomen a *D. Fab.* conservatum fuerit, species tamen sub hoc genere incedentes, ad hispas *Systematis* non omnes referendæ sunt; sed hispa *picipes* *Mantiff.* 8. ad hoc genus pertinere videtur. V.

*Picipes.* B. ( la picipede ) antennis fusiformibus atra, elytris pedibusque piceis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura reliquis longior. *Antennæ* fusiformes, moniliformes, extrorsum crassiores. *Caput* & *thorax* lævia, glabra, atra, maculata. *Elytra* lævia, picea. *Pedes* breves picei.

*Bruchus.*

*Marginalis.* 5. B. *Desc.* *Antennæ* porrectæ nigræ. *Caput* & *thorax* atra, puncto parvo cinereo ad basin thoracis. *Elytra* lævia, cinerea, macula ad basin, altera majori in medio marginis exterioris tertique in apice elytri, nigris. discus elytrorum immaculatus. *Pedes* nigri.

*Scabrosus.* 6. B. *Desc.* Statura B. *feminarii*, at paullo major. *Antennæ* nigræ, extrorsum subcrassiores. *Caput* & *thorax* nigra. *Elytra* rufa, striis elevatis scabris punctisque aliquot nigris, holosericeis, sparsis.

2-Punctatus. 7. B. *Desc.* Distinctus puncto magno ocellari nigro, iride flava ad basin elytrorum.

Varius. B. ( le varié ) elytris nigris , punctis albis nigrisque alternis striatis , femoribus muticis. *Mantiss.* 14.

*Hab.* in Sueciæ pinetis. *D. Pay Kull.*

*Desc.* *Corpus* nigrum , cinereo paullo micans. *Elytra* punctis plurimis alternis albis nigrisque striata. *Pedes* nigri , *femoribus* muticis.

*Curculio.*

Jaceæ. 36. *C. Desc.* *Statura* curc. *pini.* *Antennæ* fractæ , nigræ. *Rostrum* crassiusculum , cylindricum , nigrum. *Thorax* ovatus , niger , cinereo irroratus. *Elytra* nigra , atomis cinereis villosis adspersa & puncto distincto baseos versus scutellum.

*Obs.* Junior , atomis plurimis e villo cinereo conflatis , adultior vero , magis glaber & niger.

Bilineatus. 37. *C. Desc.* *Medius.* *Rostrum* brevius , crassiusculum , nigrum. *Thorax* niger , lineis tribus albis. *Elytra* striata nigra , lineis duabus e punctis quadratis albis , quarum altera ad marginem , altera ad futuram. *Pedes* simplices , nigri.

Tessellatus. 38. *C. Medius.* *Caput* & *antennæ* fusca. *Thorax* & *elytra* grisea , at *elytra* apice striis quinque albis & in his puncta distincta atra.

Equiseti. 39. *C. Desc.* *Nimis* affinis videtur curc. *lapathi.* *Rostrum* atrum. *Thorax* niger , vix tuberculatus , lateribus albis. *Elytra* muricata , lateribus apiceque albis ; in parte anteriori nigra puncta duo parva alba. *Femora* simplicia.



- Bufo. 40.** *C. Desc.* *Rostrum* elongatum, inflexum fuscum, litura dorsali cinerea antennisque piceis. *Thorax* fuscus, dorso plano, punctis duobus minutissimis nigris. *Latera scutellumque* alba. *Elytra* plana fusca, rufo-subvillosa, fascia in medio lata communi alba. *Litura* alba ad apicem.
- Æneus. 41.** *C. Desc.* *Parvus.* *Corpus* nigrum, *elytris* solis æneis. *Femora* mutica.
- Fusci-rostris. 42.** *C. Desc.* *Parvus.* *Statura* sequentis. *Rostrum* elongatum, cylindricum, nigrum. *Thorax* & *elytra* striata grisea, lineis duabus aut tribus albis ad suturam. *Pedes* rufi, *femoribus* basi nigris.
- Nigrirostris. 43.** *C. Desc.* *Corpus* fuscum, rostro cylindrico, atro, nitido. *Thorax* gibbus, rotundatus, viridis, lineis duabus dorsalibus fuscis. *Elytra* tomentosa, viridia, immaculata. *Pedes* fusci, *femoribus* simplicibus.
- Rufirostris. 44.** *C. Desc.* *Statura* & *magnitudo* curc. *aterrimi.* *Caput* nigrum, at anterior dimidia *rostri* pars rufa, apice tamen puncto parvo nigro. *Thorax* niger. *Elytra* striata immaculata. *Pedes* rufi, *femoribus* simplicibus.
- Variabilis. 45.** *C. Desc.* *Medius.* *Caput* pallidé testaceum, *rostro* apice fusco. *Thorax* obscurus, lineis tribus distinctis viridibus. *Elytra* pallide rufescentia, polline virescenti adpersa. *Pedes* rufi.
- Salicariæ. 46.** *C. Desc.* *Corpus* parvum, nigrum. *Antennæ* clavatæ nigræ, basi testaceæ.

*Rostrum* elongatum striatum & *thorax* ;  
 nigra immaculata. *Coleoptra* striata,  
 disco testaceo margine omni nigro.  
*Pedes* testacei, *femoribus* apice fuscis.

Sifymbrii. 47. *C.* (du creffon amphibie) *Desc.* Parvus.  
*Rostrum* elongatum, nigrum. *Antennæ*  
 fuscae, clavatae. *Thorax* albus, macula  
 fusca in qua linea dorsalis alba. *Elytra*  
 albo fuscoque varia & ad basin puncto  
 parvo oblongo atro. *Corpus* subtus  
 albidum. *Pedes* mutici.

Capreæ. 48. *C.* *Desc.* Parvus. Caput, thorax,  
 corpus, atra. *Thorax* linea dorsali  
 cinerascens. *Elytra* striata, atra, fas-  
 ciis duabus sinuatis albis, quæ tamen  
 marginem anteriorem haud attingunt.  
*Pedes* inermes nigri.

Malvæ. 49. *C.* *Desc.* Parvus. *Rostrum* nigricans.  
*Thorax* & *abdomen* pilis cinereis grisea.  
*Elytra* testacea. *Pedes* testacei, *femo-*  
*ribus* inermibus.

Bifasciatus. 50. *C.* *Desc.* Parvus. *Rostrum* elongatum,  
 cylindricum, atrum. *Antennæ* clavatae,  
 clava solida cinerascens. *Thorax*  
 rotundatus ater, linea dorsali paullo  
 pallidiori. *Scutellum* cinereum. *Elytra*  
 striata, fasciis duabus undatis cinereis  
 vix marginem anteriorem attingentibus,  
 quarum anterior, imprimis ad suturam,  
 major, altera in medio multo angus-  
 tior. *Pedes* nigri simplices.

Suturalis. 51. *C.* *Desc.* *Corpus* parvum. Statura curc.  
 violacei. *Rostrum* longum arcuatum,  
 nigrum. *Thorax* fuscus, linea dorsali

alba. *Elytra* striata, gibba, futura  
alba, subtus cinereus.

**Crux. 52.** *C. Desc.* Statura & magnitudo præcedentis. *Caput* atrum, immaculatum, *rostro* incurvo. *Thorax* rotundatus ater, utrinque puncto oblongo baseos albo. *Scutellum* album. *Elytra* striata nigra, futura baseos punctisque plurimis vagis albis. *Pedes* nigri. *Corpus* subtus albidum.

**Venustus. 53.** *C. Desc.* Parvus. *Caput* fuscum, *antennis* testaceis lineaque dorsali albida. *Thorax* fuscus, lineis tribus albidis. *Elytra* punctato-striata, dilutiora, lineis duabus subinterruptis albis. *Pedes* testacei, *femoribus* muticis.

**Oryzæ. 54.** *C. Desc.* Statura & summa affinitas curc. *granarii*, at puncta duo rufa in elytris.

**Filiformis. 55.** *C. Desc.* Statura omnino curc. *paraplectici*, at quadruplo minor. *Rostrum* cylindricum, fuscum. *Thorax* cinereus, lineis tribus fuscis. *Elytra* cinerea immaculata, minime punctata, obtusa. *Pedes* fusci.

**Angustatus. 56.** *C. Desc.* Statura curc. *paraplectici*, at paullo major. *Thorax* scaber. *Elytra* striato-punctata.

**Cylindrus. 57.** *C. Desc.* Statura oblonga curc. *paraplectici*, at minor. *Rostrum* cylindricum atrum, *antennarum* clava acuminata. *Thorax* supra fuscus, subtus albus. *Elytra* substriata, acuminata, nigra, fascia pone medium lata alba, quæ antice ad futuram extenditur. *Abdomen*

nigrum, apice album. *Pedes* breves simplices.

Linearis. 58. *C. Desc.* Statura valde oblonga & tenuis; minor curc. *ascanio*. *Rostrum* mediocre, basi valde attenuatum, apice multo crassiore. *Antennæ* ferrugineæ. *Thorax* oblongus niger, punctatus. *Elytra* striata. *Pedes* picei.

*Obs.* Varietas tota ferruginea invenitur.

Crassipes. 59. *C. Desc.* Statura oblongiuscula curc. *ascanii*. *Antennæ* fractæ nigræ, apice fuscæ. *Thorax* elongatus planus, crassitie fere elytrorum, postice rotundatus. *Elytra* abdomine breviora, lævia, atra.

Atriplici. 60. *C. Desc.* Statura & magnitudo curc. *linearis*, cui valde affinis. Differt tamen *antennis* apice haud ferrugineis, *rostro* tenui basi haud attenuato *thoraceque* minus punctato nitido.

Cæruleo- 61. *C. Desc.* Color nigro-cæruleo-viridescens. subtus obscurior, etiam pectore excavato - punctatus. *Rostrum* tenue, longum. *Thorax* excavato - punctatus. *Elytra* decem striata, striis minime punctatis. *Femora* mutica.

Rhedi. 62. *C. Desc.* *Antennæ* breves non fractæ. *Rostrum* tenue. *Thorax* punctis prominulis confertis scaber. *Elytra* striata striis septem, non punctata, at inter quasvis duas strias puncta aliquot vix ad lentem visibilia. Nonnihil viridescit insectum; *subtus* ex toto nigrum.

Cardui. 63. *C. Desc.* Parvus. Statura curc. *alliaris*, at totus ater. *Elytra* striata. *Pedes* flavi.

**Palustris. 54.** *C. Desc.* Cinereus totus ex tomento brevissimo decumbente. *Thorax* utrinque linea longitudinali flavescente. *Elytrum* singulum in medio notatur puncto albo. *Abdomen* subtus notatur utrinque linea ex punctis fordide albis sensim minoribus : quodvis femur ad apicem cingit fascia alba.

*Obs.* Curculio bipunctatus. *D. Geoff.*

**Elegans. 65.** *C. Desc.* niger. *Elytra* striata, striis novem, duplici punctorum serie inter singulam striam.

**Incisus. 66.** *C. ( le fillonné ) Desc.* Minor niger. *Thorax* punctatus. *Elytra* profunde punctato-striata. *Pedes* fulvescentes.

**Funereus. 67.** *C. Desc.* Niger. *Thorax* punctatus. *Elytra* striata, inter strias punctata. *Abdomen* subtus squamis albis.

**Armatus. 68.** *C. Desc.* Minimus, cinereo - niger. *Thorax* spina utrinque armatus. *Elytra* striata, duplici punctorum serie inter strias.

**Pultiaris. 69.** *C. Desc.* Minimus niger ovatus. *Thorax* in medio linea alba, lateraliter fasciis albis. *Elytra* striata, striis e pilis conflatis.

**Cinctus. 70.** *C. Desc.* Rufo-fulvus. *Elytra* striata, fasciis tribus albis, una transversa in medio, altera superne, inferne altera. Ambo ultimæ non raro desunt.

**Fasciatus. 71.** *C. Desc.* An præcedenti varietas? Vix enim nisi colore differunt.

*Obs.* Curc. vittatus Entom. parisi.

- Murinus. 72. *C. Desc. Niger, pilis murinis vestitus. Scutellum album maculaque alba in thorace prope scutellum.*
- Marmora- 73. *C. Desc. Minimus. Antennæ rufæ. Caput thoraxque nigra. Scutellum albescens. Elytra striata, fusco-rubra, fasciis obliquis obscuris, lineola nigra ad futuram. Pedes rufi, femoribus nigris.*
- Rugosus. 74. *C. Desc. Thorax elytraque rugosa. Margo elytrorum exterior, duabus tribus striis longitudinalibus elevatis.*
- Piceus. 75. *C. Desc. Nitido-ater. Antennæ obscure rufæ. Caput thoraxque scabrosa. Elytra striato-punctata.*
- Nigro- 76. *C. Desc. Niger, postice cinereus. gibbosus. Thorax convexus scaber. Elytra fornicata, punctis concavis fulcata.*
- Castaneus. 77. *C. Desc. Affinis præcedenti, rufo-fuscus. Corpus thoraxque glaber, subtus nigra. Elytra punctis concavis longitudinaliter digestis.*
- Plantaginis. 78. *C. Desc. Minor. Thorax fuscus, fasciis tribus longitudinalibus griseis. Elytra maculis fuscis villosis longitudinaliter dispositis. Pedes obscure ochraceati, tibiis fuscis.*
- Rostratus. 79. *C. Desc. Minor. Caput viridescenti-cæruleum, nitidum. Antennæ dimidio rufæ. Caput elytraque viridescenti-cærulea, nitida. Rostrum latum, depressum thoraxque rufa. Totus supra concavo-punctatus. Pedes rufi.*

Rufus.



- Rufus. 86. *C. Desc.* Totus, etiam rostro, antennis pedibusque, rufus & fere ruber; sed oculi, pectus abdomenque nigra; femora dentata postice crassiora.
- Pilosus. 87. *C. Desc.* Corpus parvum hirtum, nigro cinereoque variegatum. Antennæ testaceæ. Femora postica incrassata.
- Caligino- 102. *C. Desc.* Statura oblonga curc. paraplectici, at paullo minor, totus ater, obscurus, minime nitens. Thorax rotundatus, punctatus, carinatus. Elytra striato-punctata, striis per paria approximatis profundis. Femora acute dentata.
- Didymus. 103. *C. Desc.* Parvus. Corpus supra fuscum, subtus griseum. Rostrum elongatum, atrum. Elytra obscura, valde striata, macula transversa laterali alba e punctis tribus composita. Femora acute dentata.
- Trimacula- 104. *C. Desc.* Caput nigrum, immaculatum. Thorax supra fuscus, antice macula utrinque marginali cinerea lineaque dorsali brunnea. Elytra fusca, sutura basalis brunnea, puncto parvo albo, macula magna alba in medio marginis exterioris & altera lunata ad marginem.
- Litura. 105. *C. Desc.* Statura præcedentis. Thorax linea dorsali nigra, antice lineola, postice puncto, albis.
- Villosus. 106. *C. Desc.* Magnitudo præcedentium. Rostrum porrectum, cylindricum, atrum. Thorax griseus, linea longitudinali albicante. Scutellum album. Elytra grisea, postice fascia obliqua alba, quæ tamen marginem exteriorem haud attingit.

*Pedes* grisei , *femoribus* omnibus dentatis.

Ceraforum. 107. *C. Desc.* Statura curc. nucum , at triplo minor. *Rostrum* cylindricum , glabrum , atrum. *Thorax* fuscus , linea dorsali obsolete cinerea. *Scutellum* cinereum. *Elytra* striata , fasciis duabus repandis , cinereis , fere obsoletis.

Tenuirof- 108. *C. Desc.* Statura præcedentis , at minor. *Caput* nigrum , rostro porrecto , tenui , glabro , atro. *Antennæ* rufæ , clava cinerea. *Thorax* niger , pilis brevissimis cinereis. *Scutellum* cinereum. *Elytra* nigra , fasciis plurimis undatis , pallidioribus.

Tæniatus. 109. *C. Desc.* Minor curc. tortrice. *Rostrum* nigrum , ore sanguineo. *Antennæ* testaceæ , clava nigra. *Thorax* lævis niger , margine antice posticeque rufo. *Elytra* subvillosa , substriata , pallida nigro maculata.

Danubia- 110. *C. Desc.* *Antennæ* fractæ. Color fuscus. *Rostrum* nigrum. *Elytra* cervina , punctis nigris irrorata , ad lentem excavatis punctis striata. *Tibiæ* *tarisque* testaceo colore.

Salicinus. 113. *C. Desc.* Niger. Per medium thoracem linea alba decurrit , per futuram elytrorum usque ad apicem continuanda. Hæc in medio cujusvis elytri ramum fere ad angulos rectos exserit , ut hinc insectum dorso crucem album gerere videatur , quæ in sole auri splendorem habet. *Femora* omnia dentata. *Elytra* striato-punctata. *Subtus* color griseus.

Fraxini. 114. C. Desc. Inter minimos numerandus, griseus. *Caput rostrumque* obscure fusca. *Thorax* macula magna fusca, interdum in duas divisa. *Elytra* fasciis quatuor vel quinque similibus fasciis curc. *scrophulariæ*.

*Larva* apoda, luteo-albida, capite nigro.

Ulmi. 115. C. Desc. Rufo-brunneus. *Rostrum* nigrum. *Caput thoraxque* linea longitudinali albida. *Scutellum* album. *Elytra* maculis duabus, quarum anterior nigra, posterior transversalis albida. *Femora anteriora* incrassata.

Geographi-116. C. Desc. Fusco-niger, squamulis albis supra infraque tectus, quæ squamæ supra thoracem elytraque varias lineas formant. *Thorax* tribus lineis longitudinalibus tribusque aliis transversalibus. Variæ elytrorum lineæ secantur aliis duobus a scutello oblique descendentibus. *Pedes* nigri, albo variegati.

Stellifer. 117. C. Desc. Fuscus. *Thorax* scaber. *Scutellum* puncto in medio flavo. *Elytra* decem punctorum striis longitudinalibus fasciisque tribus albidis.

Hortula- 118. C. Desc. Curc. *scrophulariæ* affinis, sed griseus. *Elytra* striis elevatis punctis albis fuscisque variegatis, maculis duabus nigris ad futuram superne inferneque.

Plebeius. 119. C. Desc. Nigro-fuscus. *Corpus* elongatum. *Elytra* striato-punctata.

Scutella- 120. C. Desc. Fuscus. *Thorax* scaber. *Scutellum* puncto albo. *Thorax* scaber.

*Elytra punctato-striata, macula rubello-fusca in medio.*

Virgo. 121. *C. Desc.* Obscure fuscus, griseo-albidis pilis vestitus. *Oculi nigri. Elytra striata.*

Nubilus. 128. *C. Desc.* *Corpus* magnitudine & statura curc. *ligustici. Antennæ clavatæ, clava acuminata, nigræ. Caput & thorax grisea, immaculata. Elytra punctis striata punctisque plurimis vagis distinctis obscurioribus. Femora postica annulo albo.*

Nigrita. 129. *C. Desc.* Statura & magnitudine curc. *fulcati, at elytra immaculata.*

Sulcatus. 130. *C. Desc.* Major. *Totus ater. Elytra testaceo immaculata, crenato-striata.*

Gemmatus. 131. *C. Natur. fosc. secl. 6. t. 4.*

Picipes. 132. *C. Desc.* Major curc. *nebuloso. Antennæ fractæ, clavatæ, clava obtusiuscula. Rostrum crassum, breve, obtusum, apice nigrum. Thorax griseus, punctis elevatis globosis, minutissimis. Elytra nebulosa, punctis elevatis striata. Pedes itidem grisei, femoribus imprimis posticis rufis.*

Morio. 133. *C. Desc.* Magnus, *totus ater, glaber nitidus. Thorax rotundatus, immaculatus. Femora dentata.*

2-Sulcatus. 134. *C. Desc.* Statura curc *fulcati. Rostrum breve, sulcis duobus dorsalibus impressis, apice incrassatum. Thorax supra niger, lateribus cinereis. Elytra obsolete striata nigra, margine antico &*

lateralis cinereis. *Pedes nigri, femoribus dentatis.*

Fullo. 135. *C. Desc.* Color niger. *Rostrum* valde breve, crassum. *Elytra* albo maculata uti scarabæi *fullonis*, etiam *thorax*, sed punctis minimis. *Abdomen* ovatum. *Pedes* fusci, *femora omnia* dentata.

Religiosus. 137. *C. Desc.* Magnitudo curc. *Germani*, cui etiam insectum habitu multum simile, sed magis atrum. *Rostrum* crassum. *Thorax* punctis prominentibus densè oblitus, uti & *elytra*. *Abdomen* fere globosum, quod magnam partem *elytra* etiam subtus tegunt, fortasse alas non recondentia. Hinc inde in *elytris* puncta nivea, quæ ope lentis conspecta, a pilis quibusdam minutissimis orta, reliquo insecto glaberrimo. *Pulvilli pedum* albi. *Femora* dentata.

Griseo- 138. *C. Desc.* Niger. *Antennæ* longæ fractæ, punctatus. clava fusca. *Rostrum* latum. *Caput*, *thorax* *elytra*que scabra, tuberculis elevatis. *Abdomen* *elytris* crenatis fere obtectum.

Rugosissi- 142. *C. Desc.* Obscure fuscus. *Rostrum* latum, mus. crassum. *Thorax* scaber. *Elytra* coadunata, striis tecta rugosis.

Villosus. 144. *C. Desc.* Nigro-fuscus, pilis cinereis tectus. *Rostrum* crassum. *Thorax* oblongus. *Elytra* punctato-striata.

Splendidu- 159. *C. Desc.* Statura omnino curc. *argentati*, lus. at minor, & *femora* inermia. *Caput* cinereum, rostro apice fustestaceo. *Thorax* viridis nitens, dorso cinerascens, lineis

duabus atris. *Coleoptra* limbo viridi nitente, disco cinereo cupreo, fascia media angulata lituraque poslica, nigris. *Corpus* viridi nitens. *Femora* inermia.

Lusitanicus. 160. *C. Desc.* Statura & magnitudo curc. *incani*. *Corpus* supra fuscum, subtus squamoso - aureum. *Elytra* macula oblonga baseos alba.

Raucus. 161. *C. Desc.* Medius. *Antennæ* medio fractæ, apice clavatæ. *Rostrum* breve, crassum, subplanum. *Thorax* nigricans, punctis elevatis parvis scaber. *Elytra* striata, striis crenatis, grisea, punctis plurimis cinereis sparsa. *Pedes* picei, *femoribus* muticis.

Griseus. 162. *C. Desc.* Statura curc. *lineati*, at paullo longior. *Rostrum* cylindricum, sulco longitudinali profundiore exaratum. *Supra totus* obscure griseus, subtus cinereus, immaculatus. *Femora* simplicia.

3-Guttatus. 163. *C. Desc.* Statura & magnitudo curc. *tristis*. *Rostrum* breve canaliculatum & *thorax* fuscus immaculatus. *Elytra* substriata grisea, puncto parvo albo in medio & macula majori communi versus apicem.

Coryli. 164. *C. Desc.* Affinis curc. *cervino*. *Rostrum* brevissimum, apice atrum. *Thorax* *elytraque* glabra, cinereo fuscoque varia; dimidia futuræ pars basi proxima atra, glabra.

Lunatus. 165. *C. Desc.* Parvus, statura curc. *lineati*. *Rostrum* breve, crassum, puncto frontis impresso. *Elytra* lineis tribus quatuorve



elevatis, acutis, quæ tamen apicem elytri haud attingunt, cinerea, fascia alba ab angulo humerali ad medium futuræ ducta, quæ in coleoptris semilunarem constituit. Postice macula magna communi alba, in cujus medio lunula communis nigra. *Pedes* cinerei, fusco fasciati.

Undatus. 166. *C. Desc.* Parvus, statura omnino *curc. lunati*.

Hispidulus. 167. *C. Desc.* Parvus, statura *curc. lineati*. *Antennæ* clavatæ, articulo primo longiori. *Thorax* punctatus fuscus, lineis tribus longitudinalibus cinereis, media tenuiore. Punctum utrinque laterale cinereum. *Elytra* fusca, pilis erectis hispida punctisque obscurioribus striata, interjectis pilis albis, qui quasi lineas et maculis nigris albisque constituunt. *Pedes* nigricantes.

Tristis. 168. *C. Desc.* Medius. Caput, thorax, abdomen & pedes obscure *nigra*. *Elytra* profunde striata, cinerea.

Punctatus. 169. *C. Desc.* Major ovatus. *Rostrum* brevissimum. *Thorax* gibbus, glaber. *Elytra* striato-punctata, at præterea punctis elevatis holoscericeis atris albisque conspersa.

Obscurus. 170. *C. Desc.* *Totus* obscure ferrugineus. *Elytra* lineis obsoletis elevatis.

Niger. 171. *C. Desc.* *Corpus* magnitudine & statura *tristis*, *totum* obscure nigrum, punctis parvis elevatis, scabrum. *Antennæ* nigræ. *Pedes* rufi, genubus plantisque nigris.

Variolosus. 172. *C. Desc.* Statura curc. punctati, totus niger. Thorax punctis majoribus passim confluentibus excavatus. Elytra connata, postice acuminata.

Latirostris. 173. *C. Desc.* Statura curc. albin. Corpus nigrum. Rostrum latissimum, planum, album, apice nigrum. Thorax niger, canaliculatus. Elytra nigra, striis interruptis glaucis, apice alba, punctis duobus nigris. Pedes nigri, albo annulati. Abdomen subtus album, lateribus nigris.

Vau. 174. *C. Desc.* Rostrum crassum. Insectum oblongum, cinereum. In singulo elytro infra medium macula albida, tum in medio macula oblonga obliqua cum altera alterius elytri signum arietis V f. litteram. V. constituens.

*Varietas.* Minor, magis fusca. Maculae albæ clarioreſ & eæ, quæ infra medium, minores, rotundæ.

Affinis. 175. *C. Desc.* Totus niger, sed thorax lateribus & elytra per totum cinereo variegata. Rostrum fulcis duobus, striis f. carinis elevatis tribus, media in apice bifida. Thorax punctis elevatis confluentibus scaber. Elytra singula, decem ex punctis.

Maurus. 176. *C. Desc.* Rostrum breve crassum. Antennæ fractæ. Caput, rostrum, thorax punctis elevatis confita. Elytra, quæ magnam partem abdominis subtus tegunt, striata; striæ nudo oculo inspectæ adparent constare punctis excavatis, sed reipsa quasi quibusdam villis alternatim comparentibus nentur, eo

fere modo, quo vestium oræ a tartoribus suuntur. Color ater, minime nitens.

Austria- 177. *C. Desc.* Color totius fuscus, sed *thoracis & elytrorum* latera rubescunt. *Alæ* nullæ. *Totus* tomentosus. *Elytra* ex punctis impressis striata. *Rostrum* crassum.

Hinnulus. 178. *C. Desc.* Subfuscus oblongus. *Thorax* lateribus albidus. *Elytra* lucide fusca albo variegata, prorsus ut cervorum juniorum pellis. Latera elytrorum cinerea partem abdominis cinerei contingunt. *Alatus*.

Chrysopte- 179. *C. Desc.* Nomen ex vivo datum; at descriptio deinde ex mortuo, in quo aurum mutatur in ferrugineum colorem. Longus niger, obscure cinereo nebulosus. *Thorax* punctis excavatis cicatrifantibus. *Elytra* punctato - striata, hinc inde quasi pulvere ferrugineo adspersa, præsertim ad marginem inferiorem facile deciduo. *Abdominis* apex villo fulvo hirsutus.

Araneifor- 180. *C. Desc.* Magnitudo aranæ rupestris, totus ex rufo rubellus, cui in sole auri nitor accedit; valde refert araneam thorace brevi, rostro brevissimo ac vix ullo, abdomine globoso ovato. *Thorax* punctis excavatis inordinate adspersus, elytrorum partem abdominis etiam subtus amplectentium punctis in lineas decem longitudinales dispositis.

Linearis. 181. *C. Desc.* Color rufo-testaceo rufus. Magnitudine & habitu curc. granarii,

a quo præcipue differt thorace elytris notabiliter brevior, *roſtro* brevi craſſo. *Thorax* excavato - punctatus. *Elytra* punctato - ſtriata. *Pedes* mutici.

Atro- 182. *C. Deſc.* Niger, nitidus, lævis. *Thorax* elongatus, fere cylindricus. *Elytra* coadunata, *abdomen* partim tegunt. *Femora* in medio increſſata.

Grifeo- 183. *C. Deſc.* Supra rufo-brunneus. *Subtus* nigricans. *Oculi roſtrumque* apice nigra. *Thorax* rotundatus, convexus ſcaber. *Elytra* fulcis elevatis. *Totum animal* ſquamis luteſcenti-grifeis marmoratum. *Elytra, antennæ, pedesque* ad lentem villoſa.

Flavipes. 184. *C. Deſc.* Parvus. *Corpus* oblongum. *Caput, thorax, elytra abdomenque* ſquamis aurato-viridibus obtectum, ſub quibus infectum nigrum eſt. *Antennæ pedesque* nudi, dilute lutei.

Capitatus. 185. *C. Deſc.* Niger, ſed ſquamulis cinereo-grifeis omnino tectus, exceptis antennis pedibusque fufcis. *Caput* thoracis latitudinem æquat. *Abdomen* breve, teres. *Elytra* lineis longitudinalibus concavo-punctatis.

Tereticol- 186. *C. Deſc.* Minor. *Antennæ pedesque* rufo-brunnei. *Corpus* nigrum æneocinereo griseum, qui color e ſquamulis conſtat. *Thorax* fere cylindricus. *Elytra* concavo-punctata.

Piſus. 187. *C. Deſc.* *Corpus* ſupra nigricante-fuſcum, ſubtus fulvum. *Thorax* lineis tribus longitudinalibus fulvis. *Elytra*

holosericea, striis novem punctatis, spatio inter strias interjecto punctato, alternatim nigro fuscoque maculato.

**Fasciatus. 188.** C. Desc. Supra cinereus. *Caput* nigrum. *Thorax* scaber, nigricans, lateraliter cinereus. *Elytra* nigricantia, fasciis duabus transversis griseis, una nebulosa ultra medium elytri, altera in parte postica.

**Fasciola- 189.** C. Desc. Albido-cinereus. *Rostrum* breve, carinatum, sulcis ad carinæ utrumque latus pilo ex ferrugineo rubente cinctis. *Thorax* subfuscus, ad latus utrumque linea curva, albida, longitudinali; alia latior in medio in quinque minores subdivisa per lineas tres elevatas, quarum acies nuda. Hinc forte invenire licet individua recens. exclusa, quæ mediam illam striam indivisam habent, eo quod pili linearum elevatarum detriti nondum sint. *Enum.*

**Spinifer. 190.** C. Obs. An *curculio verrucosus*. Linn.?

**Aurifer. 191.** C. Desc. Magnus. Niger nitidus. *Rostrum* latum. *Thorax* scaber. *Elytra* coadunata, apice acuminata, macula utrinque aurea lateraliter ab basin, margine exteriori aurato; tertia sæpe macula lineari aurata, oblique posita, ad partem posticam. *Abdomen* subtus squamis aureis tectum.

**S. 192.** C. Desc. Inter majores numerandus. Niger affinis curc. *bipunctato* D. Geoff. *Caput thoraxque* pilis flavicantigriseis oblecta. *Thorax* linea flavescenti utrinque in parte antica. *Elytra*

coalita abdominis latera involventia.  
Sutura griseo fuscoque alternatim mar-  
morata. *Femora antica* incrassata.

Pulveru- 193. *C. Obs.* Nimium affinis curc. *pulverulenti*.  
lentus. n. 75. *Ent. carn.* sed *rostrum* breve.

\* *Longirostris femoribus simplicibus.*

2-Maculatus. *C.* ( le bimaculé ) longirostris fuscus,  
elytris puncto cinereo, rostro pedibus-  
que atris. *Mantiss. C.* 21.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura curc. *coloni*, at paullo  
minor. *Rostrum* incurvum, atrum, ni-  
tidum. *Thorax* fuscus, linea laterali  
cinerea. *Elytra* lævia, fusca, puncto  
distincto cinereo. *Pedes* nigri.

Abbreviatus. *C.* ( le retranché ) longirostris ater, tho-  
race plano punctato, elytris abbreviatis  
substriatis. *Mantiss. C.* 25.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura fere curc. *palmarum*, at qua-  
druplo minor. *Antennæ* fractæ, nigrae,  
apice cinerascens. *Rostrum* cylin-  
dricum, incurvum, atrum, nitidum.  
*Thorax* planus, punctatus, linea media  
parum elevata. *Elytra* substriata abdo-  
mine breviora. *Corpus* atrum.

Cæruleoce- *C.* ( le cæruleo - céphale ) longirostris  
phalus. violaceus nitens, thorace elytris-  
que thorace testaceis. *Mantiss. C.* 33.

*Ad. hall.* 1. 282. curculio cæruleoce-  
phalus, longirostris atro - cæruleus,  
elytris-que fulvis.

*Hab.* in Saxonice cratægo. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Caput* pu-  
bescens, violaceum. *Thorax* & *elytra*



pubescentia , testacea , nitida. *Corpus*  
& *pedes* violacea. *Antennæ* extrorsum  
crassiores.

4-Tubercu- C. ( le quadrituberculé ) longirostris, tho-  
latus. race quadrituberculato nigro, elytris  
striatis cinereo variegatis. *Mantiss.* C. 39.  
*Hab.* Kiliæ. D. Daldorf. In Gallia Aust. V.  
*Desc.* Parvus. *Rostrum* incurvum, atrum.  
*Corpus* cinereum. Thoracis dorsum ni-  
grum, tuberculis quatuor erectis, ele-  
vatis. *Elytra* striata fusco cinereoque  
varia. *Pedes* cinerei, *femoribus* posticis  
nigris.

Roboris. C. ( du roure ) longirostris, rostro tho-  
raceque rufis, elytris violaceis. *Mantiss.*  
C. 42.

*Hab.* in Saxonix quercu. D. Hybner. In  
Gallia Aust. V.

*Desc.* Statura & magnitudo curc. *fusci-  
rostris*. *Caput* violaceum, rostro rufo.  
*Thorax* rotundatus, lævis, rufus, im-  
maculatus. *Elytra* vix striata, violacea,  
nitida, immaculata.

Cuprirostris. C. ( le cuivreux ) longirostris oblongus  
viridi-æneus, elytris striatis, rostro  
cupreo. *Mantiss.* C. 43.

*Hab.* in betula Dresdæ. D. Zschuck.

*Desc.* *Corpus* parvum, oblongum. *Rostrum*  
arcuatum, cupreum. *Thorax* viridi-  
æneus, nitidus. *Elytra* striata, viridi-  
ænea, nitida. *Pedes* fusci.

Picirostris. C. ( le gluant ) longirostris oblongus  
niger, argento-holosericeus, rostro  
dimidiato pedibusque piceis. *Mantiss.*  
C. 47.

*Hab.* Hafniæ. D. Lund.

*Desc.* Affinis curc. *rufirostri*, at major & alius. *Caput* nigrum, rostro elongato ultra dimidium piceo. *Thorax* & *elytra* nigra, at villo argenteo holosericea. *Pedes* picei, geniculis nigris.

*Rana. C.* ( la grenouille ) longirostris, thorace fusco, limbo testaceo, elytris testaceis, fasciis tribus undatis cinereis. *Mantiss. C.* 52.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus; gibbus. *Caput* fuscum; rostro apice testaceo. *Thorax* fuscus, margine omni testaceo. *Elytra* striata; testacea, fasciis tribus cinereis. *Corpus* cinereum. *Pedes* testacei.

*Erysimi. C.* ( de la tortellé ) longirostris niger; thorace bituberculato virescente, elytris cyaneis. *Mantiss. C.* 54.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Summa affinitas curc. *cyanei*, at magis gibbus. *Rostrum* elongatum, incurvum, nigrum. *Thorax* obscure viridis, tuberculo utrinque elevato. *Elytra* striata, cyanea. *Pedes* nigri.

*Unifasciatus. C.* ( le fascié ) longirostris supra fuscus; fascia media cinerea. *Mantiss. C.* 59.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Medius. *Caput* fuscum, rostro elongato, arcuato atro. *Thorax* supra fuscus, subtus cinereus. *Elytra* substriata, fusca, fascia in media lata cinerea. Litura cinerea ad apicem. *Subtus* cinereus. *Pedes* nigri, femoribus albidis.

*Lythri. C.* ( de la falicaire ) longirostris ater, elytris fascia media abbreviata puncto-

que postico albis , pedibus flavis.

*Mantiff. C. 61.*

*Hab. in lythri floribus Uplandiæ. D. Pay Kull.*

*Desc. Parvus. Caput & thorax atra nitida , immaculata. Elytra striata , nigra fascia media alba , quæ tamen marginem exteriorem haud attingit. Pone fasciam punctum parvum oblongum album. Pedes flavi , genubus nigris.*

*Quercus. C. ( du chêne ) longirostris cinereus , thoracis dorso fusco , elytris testaceis cinereo undatis. Mantiff. C. 67.*

*Linn. Syst. nat. curculio quercus an ?*

*Hab. in Sueciæ quercu. D. Pay Kull.*

*Desc. Parvus. Corpus cinereum. Rostrum nigrum. Thoracis dorsum fuscum , linea media pallidiori. Elytra striata pallide testacea , fasciis. 4 , 5 undatis cinereis. Pedes testacei.*

*Plantaginis. C. ( du plantain ) longirostris , elytris cinereis , macula media fusca. Mantiff. C. 72.*

*Deyur. inf. curculio plantaginis.*

*Hab. Halæ. D. Hybner.*

*Desc. Statura & omnino curc. rumicis. Rostrum nigrum. Thorax cinereus medio fuscus , linea dorsali cinerea. Elytra cinerea , macula magna media fusca , & præterea puncta aliquot ejusdem coloris.*

*Bardanæ. C. ( de la bardane ) longirostris cylindricus griseo tomentosus , pedibus anticis elongatis. Mantiff. C. 84.*

*Hab. in bardana Dresdæ. D. Romanus.*

*Desc. Statura & magnitudo curc. para-pleæici , junior totus tomento griseo*

tectus, adultior niger & glaber evadit;  
*elytra* rotundata, obtusa. *Pedes anteriores* parum elongati.

**Cæruleus. C.** ( le bleu ) cærulescens subvillosus;  
 antennarum basi pedibusque flavis.

*Hab.* in Europa. In Ulteriori Calabria:  
*Vincent. Petagn. t. f. 24.*

*Desc.* *Palpi* quatuor extrorsum crassiores;  
 articulo ultimo oblique truncato *antennæ*que setaceæ thorace longiores;  
 rostro crasso elongato plano insidentes  
 genus enunciant. *Corpus* totum cærule-  
 lescens supra subvillosum, subtus ni-  
 tens. *Elytra* tenuissime punctata, mar-  
 ginata. *Palpi* flavescences, antennarum  
 basis, *femora* & *tibiæ* flavæ.

*Obs.* Si quis velit ad attelabi genus hoc  
 animal reducere & proprie ad *pubes-*  
*centem*, per me licebit; sed is ani-  
 madvertat palporum & antennarum  
 structuram, quæ excludit omnino ab  
 attelabis nostrum insectum. *Ibid.*

3\* *Longirostres, saltatorii, femoribus posticis crassis.*

**Calcar. C.** ( l'épéronné ) longirostris, femoribus  
 saltatoriis unidentatis niger, antennis  
 plantisque testaceis.

*Hab.* Kilix. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus. *Corpus* nigrum. *Elytra* vix  
 striata. *Antennæ* plantæque testaceæ.  
*Femora postica* incrassata unidentata.

**Ilcis. C.** ( du chêne-vert ) longirostris, femo-  
 ribus saltatoriis, nigricans, elytris  
 striatis cinereo variis. *Mantiss. C. 156.*

*Hab.* in Uplandix quercu. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Parvus, statura curc. *vinimalis*.  
*Corpus* nigrum. *Thorax* macula dorsali  
 triloba;

triloba , cinerea. *Elytra* cinereo varia.

Iota. C. ( Iota ) longirostris femoribus saltatoriis ater, elytris striatis, futura basi alba. *Mantiff. C.* 157.

*Hab. in Uplandia. D. Pay Kull.*

*Desc.* Parvus. Totus ater, sola futura basi alba.

\*\*\* *Longirostres femoribus dentatis.*

Verbasci. C. ( du bouillon - blanc ) longirostris femoribus dentatis niger, thoracis lateribus flavescens, elytris punctis albis nigrisque alternis striatis. *Mantiff. C.* 121.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc.* Statura & summa affinitas curc. *scrophulariæ*, cujus forte mera varietas. Caput nigrum, immaculatum. Thorax flavescens, linea dorsali sive potius dorso nigro. *Elytra* nigra, punctis elevatis holosericeis albis nigrisque alternis striata.

Guttula. C. ( le tuberculé ) longirostris femoribus dentatis, thorace tuberculato niger, elytris striatis puncto postico albo. *Mantiff. C.* 124.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Parvus. Rostrum porrectum, incurvum, nigrum. Thorax inæqualis linea dorsali impressa tuberculoque utrinque elevato, erecto. Margo anticus parum elevatus. *Elytra* vix striata, nigra, puncto apicis albo. Corpus subtus cinereum.

Troglodytes. C. ( le troglodyte ) longirostris femoribus dentatis fuscis, thorace linea dorsali

cinerea, elytris pedibusque testaceis.  
*Mantiff. C. 13.*

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc. Parvus. Caput fuscum, antennis subtestaceis. Thorax fuscus linea dorsali albida. Elytra striata, subtestacea, futura nigra. Pedes testacei.*

Fraxini. C. ( du frêne ) longirostris femoribus dentatis ferrugineis fuscus, capite dorsoque nigris. *Mantiff. C. 143.*

*Dey. inf. curculio fraxini.*

*Hab. in Sueciæ fraxino. D. Pay Kull.*

*Desc. Magnitudo curc. druparum. Caput nigrum, rostro incurvo. Thorax ferrugineo-fuscus, dorso nigro. Coleoptra subvillosa, ferrugineo-fusca, dorso nigro. Corpus ferrugineo fuscum.*

Tremulæ. C. ( du tremble ) longirostris femoribus dentatis nigricans, elytris striatis griseo irroratis. *Mantiff. C. 147.*

*Hab. in Sueciæ populo. D. Pay Kull.*

*Desc. Statura & magnitudo curc. tortricis. Rostrum porrectum, atrum. Thorax ater, lævis, nitidus, postice rubro nitens. Elytra crenato-striata, nigra, atomis plurimis griseis.*

4-Pustulatus. C. ( le quadripustulé ) longirostris femoribus dentatis niger, elytris maculis duabus ferrugineis. *Mantiff. C. 149.*

*Desc. Antennæ clavatæ, nigrae, clava apice alba.*

\*\*\*\* *Brevirostres femoribus dentatis.*

Fusco-macu- C. ( le tacheté ) brevirostris femoribus  
 latus. subdentatis ater, thorace elytrisque  
 lævibus fusco maculatis. *Mantiff. C. 272.*



*Hab. in Germania.*

*Desc.* Corpus magnum, læve, glabrum, atrum. Thorax maculis lateralibus, elytris numerosis fuscis. Pedes nigri, femoribus subdentatis.

\*\*\*\*\* *Brevirostres femoribus muticis.*

Fulvus. C. ( le fauve ) brevirostris fulvus, capitis basi pedibusque fuscis, rostro emarginato. *Mantiss. C. 177.*

*Hab. in Saxonia. D. Hybner.*

*Desc.* Parvus. Caput fulvum, basi fuscum. Rostrum breve, apicē emarginatum. Thorax gibbus, lævis, fulvus, immaculatus. Elytra vix striata, obscuriora. Pedes fusci.

Palliatu. C. ( l'entouré ) brevirostris fuscus, thoracis elytrorumque margine cinereo. *Mantiss. C. 178.*

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura omnino curc. viridis, at paullo minor. Corpus supra fuscum, subtus cinereum, quo colore & thoracis & elytrorum margo inficitur.

Tamarisci. C. ( du tamarisc ) brevirostris viriditens, elytris viridi-ferrugineo nigro cinereoque variis. *Mantiss. C. 181.*

*Hab. in Africæ tamarisco. D. Vahl.*

*Desc.* Statura omnino curc. splendiduli, at duplo fere major. Caput, thorax, corpus viridia, nitida. Elytra variegata, distincta imprimis maculis duabus marginalibus cinereis.

*Obs.* Nimis affinis curc. tamarisci, nostri *Mus.* forte regionis varietas. V.

Emarginatus. C. ( l'échancré ) brevirostris oblongus

fuscus, coleoptrorum dorso cinereo, lineis duabus punctorum impressorum atrorum. *Mantiss. C.* 186.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino curc. *nebulos.* *Rostrum* breve, crassiusculum, bisulcatum, fuscum. *Antennæ* apice cinereæ. *Thorax* fuscus, linea laterali albida. *Elytra* punctis elevatis minutissimis substriata, fusca, interne cinerea, striga punctorum nigrorum. *Coleoptra* apice emarginata.

**Glaucus. C.** ( le verdâtre ) brevirostris rostro carinato thoraceque inæquali obscuris, elytris glaucis, puncto postice elevato. *Mantiss. C.* 188.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Magnitudo & statura curc. *albini.* *Rostrum* breve, crassum, fuscum, supra ferrugineum, carina elevata acuta. *Antennæ* fuscæ, clava cinerea. *Thorax* inæqualis, nigro cinereoque varius. *Elytra* lævia, glauca, puncto postico elevato, quasi fornicato, atro. *Pedes*, uti & *corpus*, livida & immaculata.

**Albidus. C.** ( le blanchâtre ) brevirostris oblongus fuscus, elytris albidis, fascia media lituraque baseos apicisque fuscis. *Mantiss. C.* 189.

*Herbst.* 83. 75. *tab.* 24. *fig.* 31. curculio candidus.

*Hab.* in Germania.

*Desc.* Minor curc. *nebuloso.* *Caput* fuscum. *Thorax* fuscus, antice utrinque litura albida nigro punctata. *Elytra* albida, litura baseos, fascia media, quæ interdum abbreviata lituraque apicis

fuscis. *Rostrum* carinatum. *Abdomen* albidum, lineis punctorum nigrorum elevatorum.

*Costatus*. C. ( le rayé ) brevirostris cinereis thorace nigro, lineis quatuor cinereis. *Mantiff.* C. 194.

*Hab.* in Gallia Australi. *Broussenet. Mus. D. Banks.*

*Desc.* Magnitudo curc. incani. *Antennæ* in medio fractæ basi ferrugineæ. *Rostrum* apice incrassatum, nigrum, dorso cinereo. *Thorax* rotundatus, niger, linea dorsali paullum elevata atra. *Elytræ* pedesque cinerea.

*Geminatus*. C. ( les gémeaux ) brevirostris cinereus, thorace trilineato, elytris striis numerosis fuscis per paria approximatis. *Mantiff.* C. 203.

*Hab.* Kilix. *D. Daldorf.*

*Desc.* Medius fere globosus. *Antennæ* in medio fractæ, capitulo ferrugineo. *Rostrum* brevissimum, crassum, cinereum. *Thorax* rotundatus, cinereus, lineis tribus latis fuscis. *Elytra* globosa, cinerea, striis longitudinalibus fuscis per paria approximatis. *Pedes* cinerei.

*Fulvipes*. C. ( le fulvipede ) brevirostris tomentoso-virescens, pedibus testaceis. *Mantiff.* C. 208.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura parva curc. lineati. *Rostrum* brevissimum, planum. *Corpus* pubescens, viride. *Abdomen* argenteo pubescens. *Antennæ* fractæ, fuscae. *Pedes* testacei.

*Ruficollis*. C. ( le collier ) brevirostris testaceus.

capite elytrisque striatis cinereo-fuscis.  
*Mantiss. C. 209.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Parvus. *Caput* fuscum, antennis fractis rufis, clava fusca. *Thorax* lævis, testaceus. *Elytra* striata, cinereo-fusca. *Corpus* testaceum.

*Albirostris. C.* ( le vieux ) *brevirostris* rostro latissimo plano elytrisque postice albis nigro variis. *Mantiss. C. 238.*

*Ad. Hall. 1. 287.* *curculio albirostris* *brevirostris* niger, rostro-albo, elytris postice albis, punctis nigris contiguïs. *Fycol. arch. 80. 66. tab. 24. fig. 26.* *curculio albirostris.*

*Hab.* Halæ in betula. *D. Hybner.*

*Desc.* *Curc. latirostris* duplo major. *Thorax* niger, immaculatus. *Elytra* nigra, apice alba, macula magna palmata nigra. *Pedes* nigri, tibiis tarsisque albo annulatis.

*Planirostris. C.* ( le difforme ) *brevirostris* rostro latissimo plano nigro æneus, rostro pedibusque testaceis. *Mantiss. C. 239.*

*Hab.* Kiliae. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus. *Rostrum* breve, latissimum, planum, testaceum. *Antennæ* fractæ, primo articulo longiori testaceo, reliquis brevibus, crassioribus, nigris. *Thorax* & *elytra* lævia, ænea, nitida, immaculata. *Pedes* simplices testacei.

*Fulvirostris. C.* ( le flavipede ) *brevirostris* nigro-æneus, rostro plano pedibusque flavescens. *Mantiss. app.*

*Hab.* in Scania. *D. Pay. Kull.*

*Desc.* Parvus. *Rostrum* planum depressum, flavescens. *Antennæ* extrorsum cras-

fiores, nigræ, basi flavescentes. *Thorax*,  
*elytra*, *corpus* æneo - nitidula. *Pedes*  
 flavi.

*Obs.* An femora dentata, an mutica? V.

Triangularis. C. ( le triangulaire ) brevirostris obscurus  
 flavicans, thoracis basi triangulari,  
 elytris striato-punctatis.

*Hab.* in Europa. In Ulteriore Calabria.  
*Vincent. Petagn. specim. n. 71.*

*Desc.* E majoribus est, ovalis, color  
 ferrugineo-cinereus flavo polline ad-  
 spersus; *subtus* pube cano-flavescente.  
*Rostrum* breve nigrum, linea unica  
 elevata. *Thorax* punctis variolosis, in  
 basi angulis tribus, medio loco scutelli.  
*Elytra* striato-punctata, punctis paten-  
 tioribus striisque versus apicem per  
 paria coeuntibus, maculis villoso-flavis  
 undique adspersa. Inter nostra speci-  
 mina varietas adnotanda in duobus,  
 quorum color magis nigricans. *Rostrum*  
 trisulcatum. *Dorsum* linea profunda lon-  
 gitudinali excavatum. Anguli *thoracis*  
 obtusiusculi. Omnium magnitudo & ha-  
 bitus eadem.

*Attelabus.*

Mutillarius. 11. A. *Desc.* Statura & summa affinitas  
 att. *formicarii*, at paullo major. *Corpus*  
 nigrum, fronte hirsutie densa alba lata.  
*Thorax* niger vix pubescens. *Elytra*  
 nigra, basi parum rufescentia fasciis-  
 que tribus albis, quarum prima inter-  
 rupta, tertia in ipso apice elytrorum.  
*Subtus* niger, abdomine rufo. *Clerus* 1.

Ruficollis. 12. A. *Desc.* Statura att. *coryli*. *Caput*  
 rufum, vertice late nigro. *Antennæ*

apice cinereæ. *Thorax* gibbus, rufus, immaculatus. *Elytra* cyanea, immaculata. *Abdomen* rufum, subtus nigrum, margine tamen rufo. *Pedes* rufi.

Pubescens. 13. A. *Desc.* *Antennæ* & *caput* hujus generis. *Corpus* totum violaceum hirtum, rostro solo nigro, magis quam in reliquis elongato.

2-Fasciatus. 14. A. *Desc.* Magnitudo att. *formicarii*. *Caput* & *thorax* virefcenti-cærulea, pubescentia, immaculata. *Elytra* glabra nitida, cyanea, fasciis duabus coccineis, altera in medio, altera ante apicem. *Corpus* pubescens, viridizæneum. *Clerus* 7.

4-Maculatus. A. ( le quadrimaculé ) niger, thorace rubro, elytris punctis duobus albis. *Mantiff.* *Clerus* 7.

*Schul. aët. Hall.* 1. 288. attelabus 4-maculatus niger, elytris maculis duabus albis, thorace rubro.

*Hab.* in pinetis Hallensibus. D. *Hybner*. *Desc.* Parvus. *Caput* atrum, antennis moniliformibus piceis. *Thorax* villosus, rufus. *Elytra* subvillosa nigra, punctis duobus albis. *Pedes* nigri.

Unifasciatus. A. ( le fascié ) nigra, elytris fascia alba basi rubris. *Mantiff.* *Clerus* 8.

*Sulz. hist. inf. tab.* 4. fig. 13. attelabus formicarius minor.

*Hab.* in Helvetiæ, Africæ onopordine. D. *Vahl*.

*Desc.* Similis præcedentibus, at fascia unica in medio elytrorum.

8-Punctatus. A. ( le 8-ponctué ) cyaneus, elytris



rufis , punctis quatuor nigris. *Mantiss.*  
*Clerus* 9.

*Hab.* in Hispaniæ umbellatis. *D. Vahl.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* totum  
cyaneum hirtum. *Elytra* rufa , punctis  
quatuor nigris 1 , 2 , 1. *Pedes* cyanei.

*Cerambyx.*

Glycyrrhizæ. 24. *C. Desc.* Triplo major cer. *fuliginatore.* *Caput* atrum , *litura* baseos albida.  
*Antennæ* breves , crassæ , nigræ , primo  
articulo ferrugineo apice nigro. *Thorax*  
utrinque spinosus , lineis tribus albis.  
*Elytra* nigra , lineis duabus lateralibus  
elevatis , carinatis , lævibus , sulcis inter  
has villosis albis. *Sutura* alba. *Pedes*  
ferruginei , apice nigri.

*Obs.* Variat sæpius ætate , thorace ely-  
trorumque futura totis nigris , lanu-  
gine alba derasa.

Carinatus. 25. *C. Desc.* Statura & magnitudo cer.  
*fuliginatoris.* *Antennæ* breves , crassæ ,  
nigræ. *Caput* & *thorax* punctata linea-  
que media impressa nigra. *Elytra* ob-  
tusa , picea , linea laterali elevata  
villosa albida. *Corpus* subtus villosa  
cinereum.

Chrysogaster. 26. *C. Desc.* Niger. *Thorax* utrinque spina  
armatus. *Pectus* , *abdomen* & nonnihil  
etiam *thorax* vellere aureo teguntur.  
*Elytra* attenuata , tomento subtilissimo  
tecta , ex atro in canum colorem  
inclinant.

Elegans. 27. *C. Desc.* Ater. *Antennæ* , *femora* , *abdo-*  
*men* ex obscure testaceo rubent. *Thorax*  
utrinque spina armatus, *Elytra* ex læte.

testaceo rubent, basi macula magna atra eam regionem omnem occupante & per marginem interiorem versus apicem decurrente, ac in ejus medio denuo magnam atram maculam utrinque elytro communem constituyente & postea iterum solam futuram, nec tamen ad apicem usque decurrente. Per media elytra fasciæ duæ flavæ, versus postica convexæ & denticulos emitentes.

*Fab. Rhagium bifasciatum*, elytris fuscis, fasciis duabus obliquis flavis.

*Geoff. inf. parif. stencorus* 1.

*Sulz. inf. t. 5. f. 8.*

Sycophanta. 28. *C. Desc. Sp. cer. inquisitori* plane habitu simillima; fors etiam incola & prior arborum abieti congenerum. Color prædominans ferrugineus est & hic *totus* ex concolori tomento ortus. *Oculi* punctaque *elytrorum* nigra. Puncta elytrorum tres constituunt præcipue fascias nigras, in quibus tomentum ferrugineum rarius est, quarum ea, quæ in medio est, latior, nigrior. Omnis nigredo ex corporis glabritie. Lineæ in singulo elytro elevatæ duæ.

Æthiops. 29. *C. Desc. Caput* linea longitudinali media, depressa exaratum. *Abdomen* villosum, præsertim apice. *Elytra* abdomine breviora nonnihil.

Timidus. 30. *C. Desc. Facies* lepturæ. *Caput* antice elongatum, nitens, sub maxillis dente notatum, villosum. *Antennæ* breves. *Thorax* villosus. *Elytra* punctata, sordida, apice truncata. *Corpus* totum subtus rufo villo pubescens.

*Obs. Timidus vocatus*, cum a longe fugiat ab hoste, sub umbella sese recipiens.

Fulvus. 31. *C. Desc. Apteris punctatus. Elytra subpellucida, obtusa, nitida, abdomine breviora.*

*Variat*, abdominis elytrorumque basi nigra.

*Obs. Locus, tempus, habitus cer. fulvum ab æthiope non differre demonstrant; inde hujus varietas videtur.*

Scabricor- 32. *C. Desc. Antennæ articulus primus*  
nis. lin. 5 longus. *Thorax marginatus, angulis posticis dentatis. Elytra lineis duabus elevatis, tuberculosis antice deletis, apice obtusa, thorace & capite pallidiora. Pedes antennis concolores.*

Ovatus. 33. *C. Desc. Cer. hispida paullo minor. Antennæ magnæ, basi minus fuscæ. Elytra striis longitudinalibus duabus elevatis, apice pilorum fasciculis.*

Monilis. 34. *C. Desc. Antennarum articuli nigro griseoque variegati. Corpus nigrum. Thorax longitudinaliter striis punctatis, e punctis pila grisea exsurgunt. Elytra eodem modo striata, fascia lata transversa nigro antice posticeque marginata. Femora brevia, lata basi grisea, apice nigra.*

Fasciatus. 35. *C. Obs. An. cer. fuliginatois species diversa?*

Erythroce- 36. *C. Desc. Caput rubrum. Oculi antennæ-*  
phalus. que (non attenuatæ, sed filiformes)

nigro colore insignes. *Thorax* ruber ; villosus, basi apiceque nigris. *Elytra* nigra longitudinaliter punctata, non tamen striata. *Alæ* fuliginosæ. Pectus nigrum. *Abdomen* rubrum, subtus ad basin macula magna nigra. *Pedes* rubri. *Fab. saperda* 13 *Mantiff.*

**Ferreus.** 52. *C. Desc.* Pectus scutellumque albida ex villo. *Elytra* inordinate punctata.

**Silphoides.** 54. *C. Desc.* Cylindraceus. *Thorax* inermis, ferri colore ; ad regionem scutelli macula exigua alba, tam viciniam thoracis, quam elytrorum occupans, ex villis albis orta. *Elytra* punctata, punctis in lineas longitudinales dispositis, non tamen punctato-lineata, lineis subternis in singulo elytro elevatiusculis. *Abdomen*, certo situ luminis respectu, canescit. *Femora antica* usque ad apicem e medio & *tibiæ* ultra medium fulvo colore gaudent.

**Tremulus.** 55. *C. Desc.* Statura cer. *populei*, cui valde affinis. *Antennæ* mediocres, longitudine corporis.  
*Schæff. icon. t. 101. f. 1.*

**Ferrugineus.** 56. *C. Desc.* Delenda hæc species ; nam *cerambyx cantharinus* Linn.

**Testaceus.** 57. *C. Desc.* *Antennæ* longitudine corporis nigræ. *Corpus* totum nigrum, *elytris* solis testaceis.

**Violaceus.** 58. *C. Desc.* Statura & magnitudo cer. *cylindrici*. *Antennæ* nigræ, corpore vix longiores. *Thorax* rotundatus, sub-

pubescens. *Elytra* lævissima, rugosa.  
*Pedes* nigri.

Lineola. 59. *C. Desc.* Parvus. *Corpus* cylindricum, nigrum. *Antennæ* longitudine corporis. Linea rubra in dorso thoracis. *Femora omnia* apice, uti & *tibiæ anticæ*, rubra.

Minutus. 60. *C. Desc.* Parvus, totus fuscus immaculatus. *Femora omnia* clavata.

Lineatus. 61. *C. Medius.* *Antennæ* longitudine corporis nigræ, articulis basi cinereis. *Caput* & *thorax* rotundatus inermis, ferruginea nigro lineata. *Elytra* punctata, fuscoque varia, macula magna cinerea in medio marginis exterioris. *Pedes* fusci.

*Obs.* *Leptura figurata* n. 34.

Villoso- 64. *C. Desc.* *Corpus* elongatum. *Antennæ* viridescens. corpore longiores, nigro cinereoque variegatæ. *Thorax* cylindricus, lineis tribus longitudinalibus luteis. *Scutellum* luteum. *Elytra* viridescenti - luteo punctulata.

Dygmaeus. 65. *C. Desc.* Magnitudine pulicis, supra fuscus, subtus nigricans. *Antennæ* denticulatæ, villosæ. *Thorax* lævis. *Elytra* æqualia, apice rotundata.

Barbipes. 83. *Desc.* *Antennæ* in mare corpore longiores, in foemina mediocres. *Totus* niger tomentosus. *Thorax* globoso-depressus niger, sed rufo villo *totus* hirsutus, adparet rufus. *Elytra* fulvo-testacea, nonnihil nitida, ad lentem hirsuta. *Antennarum* articulus primus crassus longior; secundus, tertius,

quartus, breves, simul sumti longitudine primi; hi *omnes* nigri; quintus iterum longus fusco-ferrugineus. *Reliqui* in unico, quod restat specimine deficiunt. *Subtus* totus niger villosulus. *Femora* secundi & ultimi paris barbata, barba rufa; unde nomen.

Ruficollis. 84. *C. Desc.* Differt manifeste a cer. *fennico*. *Corpus* minus. *Caput* nigrum, *antennis* mediocribus piceis. *Thorax* fere cylindricus, subspinofus, hirtus, rufus. *Elytra* violacea. *Pedes* nigri, *femoribus* subclavatis.

Clavipes. 85. *C. Desc.* Magnitudo cer. *bajuli*, totus niger, opacus. *Antennæ* corpore longiores. *Femora omnia* valde clavata.

Ruficus. 86. *C. Desc.* Statura cer. *bajuli*, at triplo minor. *Caput* nigrum, immaculatum, *antennis* longitudine fere corporis. *Thorax* niger verrucosus. *Elytra* lævia, testacea, macula media apiceque nigris. *Pedes* nigri, mutici.

Aulicus. 87. *C. Desc.* Valde affinis cer. *striati*, at *thorax* nitidus & *elytra* haud striata.

Hafnienfis. 88. *C. Desc.* Statura cer. *striati*. *Elytra* nigra, albedine irrorata.

Rufipes. 89. *C. Desc.* *Corpus* parvum. *Antennæ* breves, fuscae, basi ferrugineae. *Caput* & *thorax* lævia, nitida, violacea. *Abdomen* æneum, nitidum. *Pedes* violacei, *tibiis* rufis. *Femora postica* clavata, basi ferruginea.

Floralis. 90. *C. Desc.* *Caput* nigrum, *antennis*



ferrugineis. *Thorax* globosus niger, fasciis duabus albis. *Elytra* nigra, fasciis quinque, prima bascos, quinta apicis. *Pedes* rufi.

Trifasciatus. 91. C. Desc. Statura omnino L. *verbasçi*. *Caput* atrum, *antennis* rufis. *Thorax* globosus, ferrugineus, tomento cinereo tectus. *Elytra* atra, fasciis tribus albis, prima annulari. *Abdomen* subtus annulis albis.

Obs. Inter lepturas ordinanda hæc species quæ Galliæ Aust. incola. V.

Nigricornis. 92. C. Desc. Statura omnino cer. *cardui*, at paullo minor. *Antennæ* mediocres, totæ nigræ. *Thorax* rotundatus, niger, lineis tribus pallidis, lateralibus abbreviatis. *Elytra* lævia, fusca, unicoloria. *Corpus* cinerescens. Spec. app.

Virefcens. 93. C. Desc. *Antennæ* longitudine corporis, fuscæ. *Caput* & *thorax* rotundata, obscure cinerea, villosa. *Elytra* apice attenuata, viridia. *Pedes* cinerei.

\*\*\* *Thorace rotundato, spinis fixis lateralibus mucronato.*

Varius. C. ( le varié ) thorace spinoso tuberculatoque, corpore nigro cinereoque variegato, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Mantiss. Cer.* 2.

Hab. in Austria. Mus. D. Zschuck.

Desc. Minor cer. *ædili*. *Antennæ* corpore parum longiores cinereo nigroque annulatae. *Caput* fuscum. *Thorax* spinosus dorsoque trituberculato. *Elytra* rotundata, cinereo nigroque varia. *Corpus* subtus nigrum. *Femora omnia* clavata,

nigricantia. *Tibiæ* atræ, cinereo annulatae. *Tarsi* cinerei.

- Heres. C.** ( l'analogue ) thorace spinoso rugoso niger, elytris apice subspinosis testaceis, antennis longis. *Mantiff. Cer.* 22.  
*Schæff. icon. tab.* 24. *fig.* 3.  
*Hab.* in Europæ quercu.  
*Desc.* Affinis cer. *cerdo*, attamen distincta species videtur.

- Fasciculatus. C.** ( le fasciculé ) thorax spinoso, elytris integris punctis tribus hispidis, antennis mediocribus hirtis. *Mantiff. Cer.* 37.  
*Hab.* in Germania. *D. Schneider.*  
*Desc.* Medius quasi inter cer. *nebulosum* & *hispidum*. *Antennæ* mediocres, hirtæ, fuscae. *Caput* & *thorax* fusca. *Elytra* fusca, punctis tribus hispidis, basi pallidiora uti in cer. *hispido*, at apice omnino integra. *Pedes* grisei.

- Pilosus. C.** ( le velu ) thorace hispinoso, elytris griseis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis. *Mantiff. Cer.* 39.  
*Hab.* Halæ. *D. Hybner.*  
*Desc.* Statura omnino cer. *hispidi*, at distinctus. Minor. *Antennæ* longitudine corporis, hirtæ. *Thorax* utrinque hispinosus, griseus. *Elytra* punctis tribus elevatis, hispidis, grisea, basi parum pallidiora, apice unidentata.

- Sartor. C.** ( le ravauteur ) thorace spinoso, niger, scutello flavo, elytris immaculatis, antennis longissimis. *Mantiff. Lamia* 18.  
*Hab.* Dresdæ in æsculo hippocastano.  
*Mus. D. Zschuck.*  
*Desc.* Affinis cer. *futoris*, cujus forte  
meræ

mera varietas major. *Frons* inter antennas valde canaliculata. *Antennæ* longissimæ. *Scutellum* flavum.

**Funestus.** C. ( le funeste ) thorace spinoso fuscus , elytris lævibus , maculis duabus atris , antennis brevibus. *Mantiss. Lamia.* 38.  
*Hab.* frequens in Galliæ sambuco. *D. Broussenet.*

*Desc.* Nimis affinis cer. *tristi* , at duplo minor. *Elytra* haud scabra , sed quasi holosericea. *Antennæ* multo breviores.

**Cruciatuſ.** C. ( le porte - croix ) thorace spinoso niger , coleoptris cruce media alba. *Mantiss. Lamia.* 43.

*Pall. icon. tab. F. fig. 5.* cerambyx cruciatuſ.

*Hab.* in Russia Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino cer. *fuliginatoris* , at paullo major. *Antennæ* breves , nigræ. *Caput* nigrum. *Thorax* acute spinosus , niger , linea dorsali alba. *Coleoptra* nigra , futura lata fasciæque media abbreviata albis. *Pedes* nigri.

**Cinerarius.** C. ( le cendré ) thorace spinoso cinerascens , antennis brevibus. *Mantiss. Lamia* 45.

*Pall. icon. tab. F. fig. 11.*

*Hab.* in Russia Meridionali. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & summa affinitas cer. *fuliginatori* , at duplo fere minor & totum corpus cinerascens.

**Morio.** C. ( le morio ) thorace spinoso niger , elytris unicoloribus , antennis brevibus. *Mantiss. Lamia* 54.

*Scop. ent. carn.* 169. cerambyx Æthiops.

*Hab. in Germania Australiori. Mus. D. Zschuck.*

*Desc.* Nimis cer. *pedestri*, affinis, at paullo major & *elytra* unicoloria, mox nigra, mox testacea. *Antennæ* breves, nigrae, articulo primo interdum testaceo. *Pedes* mox nigri, mox testacei.

*Lineatus. C.* ( le porte - ligne ) thorace spinoso ater, *elytris* marginalibus lineisque duabus utrinque coeuntibus albis. *Mantiff. Lamia* 55.

*Herbst. arch. inf.*

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino cer. *pedestris*. *Caput* & *thorax* atra, linea dorsali alba. *Elytra* atra, margine futura lineisque duabus antice posticeque coeuntibus albis. *Pedes* nigri.

*Mordax. C.* ( le méchant ) thorace spinoso griseus, *elytris* nebulosis testaceo subfasciatis. *Mantiff. Rhagium* 2.

*Schæff. icon. tab. 8. fig. 2.*

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Nimis affinis cer. *inquisitori*, at paullo major & *corpus* haud nigrum, sed griseo villosum.

*Indagator. C.* ( le curieux ) thorace spinoso cinereus, *elytris* striatis, atomis fasciisque duabus nigris. *Mantiff. Rhagium* 3.

*Hab. in Germania. D. Schulz.*

*Desc.* *Antennæ* nigrae in medio piceæ. *Caput* planum, cinereo villosum. *Thorax* spinosus, cinereo villosus. *Elytra* cinerea, atomis fasciisque duabus nigris. *Pedes* nigri.

*Cinctus. C.* ( le mandarin ) thorace spinoso niger,

elytris subferrugineis , fascia flava ,  
femoribus posticis unidentatis. *Mantiff.*  
*Rhagium* 5.

*Hab.* in Austria. *D. Saldoner.*

*Desc.* Magnitudo & statura cer. *cursoris.*  
*Antennæ* longitudine fere corporis ,  
ferrugineæ , apice compressæ. *Caput*  
nigricans. *Thorax* inæqualis , spinosus ,  
nigricans , lobo antico distincto. *Scu-*  
*tellum* pube flavescente. *Corpus* subtus  
pube aurea. *Pedes* ferruginei , femo-  
ribus quatuor posticis ante apicem  
intus unidentatis.

Minutus. C. ( le Pygmée ) thorace spinoso , elytris  
clavato striatis cinereis nigro undatis.  
*Mantiff.* *Rhagium* 9.

*Hab.* Kiliæ.

*Desc.* *Corpus* cer. *inquisitori* , triplo  
minor.

Cærulescens. C. ( le bleuâtre ) thorace mutico cylin-  
drico albo - cæruleus , lineis tribus  
thoracis scutelloque pallidioribus.

*Scop.* n. 160.

*Vincent. Petagn. inf. specim. t. f. 18.*

*Fuesly arch. entom. t. 26. f. 5.*

*Hab.* in Austria , in Ulteritri Calabria.

*Desc.* *Totus* tomentosus hirsutulus , albo-  
cæruleus seu coloris gallice *couleur*  
*d'eau* , sed minus saturate , fronte , lineis  
in dorso thoracis tribus scutelloque  
pallidioribus. *Elytra* lineis longitudina-  
libus punctorum , diffitorum tamen ,  
nec magnorum.

\*\*\*\* *Thorace inermi subcylindrico.*

Ferrugineus. C. ( le rouillé ) hic est cerambyx can-  
tharinus. *Syst.*

Ruficollis. C. ( le collier ) thorace cylindrico sub-spinoso niger , antennis thoraceque ferrugineis , elytris cyaneis. *Mantiff. Saperda*. 36.

*Hab.* Monspelix. *D.* Brouffenet.

*Desc.* Major L. præusta. *Antennæ* longitudine corporis , ferrugineæ , primo articulo crassiori , nigro. *Corpus* nigrum. *Thorax* ferrugineus , utrinque dente obsoleto. *Elytra* cyanea. *Pedes* atrii.

\*\*\*\*\* *Thorace inermi subrotundo seu ex globoso depresso.*

Agrestis. C. ( l'agreste ) thorace nudo niger. Elytris striatis fuscis , antennis brevibus. *Mant. Callidium* 16.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura omnino cer. *rustici* , at duplo minor , & *elytra* striata , fusca.

Fuscus. C. ( le brun ) thorace subtuberculato canaliculato nudo niger , elytris striatis obscure testaceis , antennis mediocribus. *Mantiff. Callidium* 30.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino cer. *luridi*. *Antennæ* breves , fusca. *Corpus* & *thorax* nigra , immaculata. *Elytra* striata obscure testacea. *Pedes* nigri , *femoribus* brevibus , crassis , compressis.

Tristis. C. ( le sombre ) thorace subtuberculato nudo , elytris substriatis , corpore lurido immaculato. *Mantiff. Callidium* 31.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura & summa affinitas cer. *rustici* , at triplo minor , & *elytra* magis striata.



Salicis. C. ( du faule ) thorace tuberculato spinosoque rufus, pectore elytrisque nigris. *Mantiff. Callidium* 38.

*Herbest. arch. stenocorus ruficollis.*

*Hab. in Lipsiæ salicibus. D. Zschuck.*

*Desc. Antennæ breves, rufæ. Thorax rufus; tuberculis duobus dorsalibus spinæque utrinque acuta. Elytra vix striata nigra. Pectus nigrum. Abdomen pedesque rufa.*

Pufillus. C. ( le délicat ) thorace rotundato niger, antennis tibisque testaceis. *Mantiff. Callidium* 39.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc. Corpus parvum, nigrum. Antennæ corpore longiores, testaceæ. Thorax rotundatus, muticus. Femora clavata nigra, tibiis testaceis.*

Gibbosus. C. ( le bossu ) thorace rotundato niger, elytris cinereo fasciatis, basi bituberculatis, apice acuminatis. *Mantiff. Callidium* 64.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc. Statura & magnitudo cer. mystici. Antennæ longitudine corporis, subferrugineæ. Caput & thorax nigra, obscura, immaculata. Elytra fascia lata ante medium apiceque cinereis. Tubercula duo baseos elevata, compressa & apice margo exterior excurrit in spinam validam.*

### *Leptura.*

Ferruginea. 29. L. *Desc. delenda est hæc leptura. Oculi enim iunares sunt, nec a cer. scabricorne differt.*

Variegata. 31. L. *Desc.* Nigra. *Caput* maculis duabus oblongis inter antennis. *Thorax* maculis plurimis transversalibus. *Elytra* maculis inæqualibus, omnibus luteo villosis. *Pedes* nigri.

Villosa. 32. L. *Desc.* Nigra, sed e pilis flavis, flava adparet. *Antennæ* nigricantes. *Oculi* nigri. *Elytra* quatuor maculis nigris lævibus. *Corpus* subtus nigrum. *Pedes* nigri.

Punctata. 33. L. *Desc.* *Caput* obscure rubrum, puncto nigro inter antennis, tribusque aliis postice. *Thorax* supra capite concolor, septem punctis nigris. *Elytra* nigricantia, punctulata. *Pedes* rufi, articulis nigris.

Figurata. 34. L. *Obs.* A leptura rustica Linn. differre videtur, uti D. Schrank optime animadvertit.

*Scop. carn. n.* 176.

*Beyt. Zur. Nat. p.* 67.

*Enum. n.* 306.

*Desc.* Nigra. *Caput* nigrum. *Thorax* niger, postice albo vix conspicuo marginatus. *Scutellum* album, lineis duabus albis divergentibus in elytra descendentibus; sed non ultra medium, tunc punctum album, macula alba oblonga, strigaeque alba transversalis arcuata cujus apex per futuram ascendit. *Elytra* apice albo maculata. *Corpus* subtus nigrum, maculis duabus albis utrinque ad pectus, tribusque lineis albis in incisuris. *Femora antica* in medio incrassata.

Cyanea. 35. L. *Desc.* Cærulea. *Antennæ* basi fulvæ, apice nigricantes. *Thorax elytraque*

scabra. *Femora* crassa cærulea. *Tibiæ* *tarfi*que fulvi.

Atra. 39. L. *Pod. gr. p.* 28.

*Desc.* Tota nigra sericea.

Maculicor- 44. L. *Desc.* Nigra. *Antennæ* nigræ, fulvo-  
nis. luteo variegatæ. *Elytra* testacea, apice  
truncato nigro. *Pedes* nigri.

Nigripes. 45. L. *Desc.* Nigra. *Elytra* obscure tes-  
tacea.

Tabacifor- 46. L. *Desc.* Minor. *Palpi* labiaque lutea.  
mis. *Antennæ*, *caput* *thorax*que nigra.  
*Elytra* lutescenti-fusca, punctulata,  
nigro marginata. *Femora* *tibiæ*que au-  
rantia. *Tarsi* fusci.

2-Punctata. 47. L. *Desc.* Differt a lept. *melanura*, quam-  
vis valde affinis. *Corpus* majus nigrum,  
tomento cinereo villosum. *Elytra* li-  
vida, rarius testacea, sutura, puncto  
medio apiceque nigris. *Elytra* apice  
rotundata, nec emarginata.

Villica. 48. L. *Desc.* lept. *melanura*, paullo major.  
*Antennæ* nigræ, articulo primo rufo.  
*Caput* rufum, *oculis* nigris. *Thorax*  
rufus, angulis posticis acutis, subspi-  
nosis. *Abdomen* & *pedes* ferruginea.

Scutellata. 49. L. *Desc.* Major lept. atra. *Corpus* ni-  
grum, *scutello* albo. *Elytra* apice emar-  
ginata. *Abdomen* serico albo nitet.

Ruficornis. 50. L. *Desc.* Minuta. *Corpus* totum nigrum,  
pube flavescente sericeum. *Antennæ*  
rufæ. *Pedes* rufi, *femoribus* posticis  
apice nigris.

*Obs.* Variat femoribus omnibus apice nigris.

Marginata. 51. L. Desc. Statura lept. *nigræ*. Corpus totum nigrum, obscurum, exceptis margine *elytrorum* tibiisque posticis rufis.

12-Maculata. 52. L. Desc. Statura lept. 6-*maculatæ*, at paullo major. Corpus totum nigrum, immaculatum. *Elytra* lævia, glabra, flava, maculis sex nigris: 1a. ad scutellum; 2a. ad marginem exteriorum; 3a. ad marginem interiorem; 4a. ad marginem exteriorem; 5a. in medio; 6a. ad apicem. *Pedes* nigri.

Dubia. 53. L. Desc. Nimis affinis videtur lept. *attenuatæ*. Corpus totum nigrum, tomento fulvo nitidulum. *Elytra* glabra testacea, antice punctis tribus parvis, intermedio anteriore, in medio puncto majusculo & versus apicem altero paullo minori. *Pedes* nigri.

6-Guttata. 54. L. Desc. Corpus statura lept. *attenuatæ*, totum nigrum, *elytris* solis maculis tribus flavis, quarum anterior bascos ad futuram; reliquæ duæ in medio.

Cerambyci-formis. 55. L. Desc. *Thorax* antice angustior, lana flava rara tectus. *Elytra* cereæ recentis colore, fasciis tribus nigris, prima ex maculis in singulo elytro quatuor, quarum intermediæ duæ coactæ & minores. Fascia secunda latior, nec ad marginem interiorem pertingens; tertia apicem occupat.

Consimilis. 56. L. Desc. Nigro-aurea, subtus obscurior.

*Antennæ* fusco-testaceæ. *Elytra* non lacunosa, striis singula decem punctis exarata. *Pedes* rubro-testacei, *femoribus* posticis dentatis.

Affimilis. 57. L. Desc. Nigra. *Elytra* singula striis novem punctata. *Pedes* testacei. *Femora* postica dentata.

Chrysomeloides. 58. L. Desc. Nigra. *Thorax* antice angustior. *Elytra* punctis excavatis sparsis, castanea, utroque margine nigro. *Pedes* castanei.

Bifasciata. 59. L. ( la bifasciée ) Desc. Tota nigra subulata. *Elytra* rubra, futura fasciisque duabus nigris, quarum una in apice, altera post medium versus apicem. *Abdomen* rubrum, apice nigro. *Alæ* fuliginosæ.

Thalassina. 60. L. Desc. Chrysomelis affinis. *Thorax* globosus ruber. *Elytra* minime attenuata, nec apice truncata, sed obtusa, nitide cærulea, manifeste sed irregulariter punctata. *Caput*, *antennæ*, *pedes* penitusque nigra. *Abdomen* rubrum.

Oo. 61. L. Desc. Nigra, sed *thorax*, & multo magis *elytra*, punctis minutissimis canis confita. In medio cujusvis elytri punctum majusculum canum & in cujusvis elytri apice ellipsis cana oblonga.

Spinosæ. 62. L. Desc. Nigra. *Antennarum* bases, articulus primus totus & secundus dimidius testudineo-rubri, uti & *pedes*, sed *plantæ* & *femorum*, quæ clavata, clavæ nigri coloris sunt. *Thorax* postice angustior, ipse, uti & *elytra*, punctis

crebris, minutis, sparsis, excavatis.  
Color thoracis elytrorumque profunde  
cyaneus.

**Unipunctata.** L. ( l'étoilée ) nigra, elytris rufis, puncto  
medio nigro.

*Hab.* Dresdæ. *D. Romanus.*

*Desc.* Elytra sola rufa, puncto unico in  
medio. *Antennæ & pedes nigri.*

**Hastata.** L. ( la belle ) atra, elytris rubris, apice  
futuraque media rubris.

*Sulz. inf. t. 5. f. 11. leptura hastata.*

*Geoff. inf. paris. tom. I. p. 226. 6. stenocorus niger, elytris rufescentibus,*  
*apice futuræque medietate nigris.*

*Hab. in Europa Australiori.*

*Desc.* Affinis lept. *melanura*, at elytra  
in omnibus rubra & futura a medio  
ad apicem nigra, versus apicem  
tamen color niger angustatus. *Abdo-*  
*minis segmenta margine villis argenteis*  
*splendent.*

*Obs.* *Mas* minor, abdomine magis ru-  
fescente.

**Picipes.** L. ( la gluante ) thorace globoso, elytris  
striga obliqua alba.

*Hab. in Europa. Mus. D. Hunter. In*  
*Gallia Aust. V.*

*Desc.* Corpus lept. *alni*, paullo majus.  
*Antennæ* longitudine corporis picei.  
*Thorax* globosus, ater immaculatus.  
*Elytra* lævia, atra, in medio striga  
abbreviata, obliqua, alba. *Pedes* picei,  
*femoribus* clavatis, nigris.

**Pubescens.** L. ( la cotonneuse ) nigra, cinereo vil-  
losa, costa alarum basi testacea.

*Hab. in Suecia. D. Pay Kull.*



*Desc.* Affinis lept. *testacea*. Corpus totum nigrum, cinereo villosum, sola costa alarum basi testacea.

**Humeralis. L.** ( la militaire ) nigra, humeris abdomineque ferrugineis.

*Hab.* in Germania. *D. Schneider.* In Bressia. V.

*Desc.* Statura omnino lept. 4-punctata, at duplo fere major. *Elytrorum* basis exterior sive humeri abdomenque ferruginea.

**Suturalis. L.** ( la futurale ) cinerea, elytris testaceis, futura nigra.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Lept. atra, paullo major. *Antennæ* testaceæ, apice nigrae. Caput, thorax, abdomen cinereo villosa. *Elytra* lævia, testacea, futura sola atra. *Pedes* rufi, geniculis nigris.

**Femorata. L.** ( la pudique ) nigricans, femoribus basi rufis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo lept. nigra. Caput, thorax, elytra, corpus nigricantia. *Pedes* nigri, femoribus basi rufis. *Tibiæ anticae* etiam rufæ.

*Obs.* Variat pedibus omnibus nigris, femorum annulo tantum rufo.

**Præusta. L.** ( la brûlée ) aureo-pubescens, capite elytrorumque apicibus nigris.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Paullo minor lept. nigra. Caput nigrum, antennarum primo articulo ferrugineo. Thorax, elytra, pedes, abdomen tomento aureo testæ. *Elytra* apice nigra. *Pedes* rubri.

4-Guttata. L. ( la quadripunctuée ) fusca , elytris nigris , punctis duobus baseos ferrugineis.

*Desc.* Magnitudo & statura lept. *nigræ*. *Corpus* fuscum. *Thorax* cinereo pubescens. *Elytra* nigra , punctis duobus baseos ferrugineis. *Femora* basi ferruginea.

*Armata*. L. ( l'armée ) thorace ovato , marginæ postico scutelloque flavo , elytris fastigiatis , antennis brevibus.

*Hab.* in Europa. In Ulteriori Calabria.

*Vincent. Petagn. t. fig. xxxvi.*

*Desc.* Tota nigra. *Thorax* ovatus postice latior , punctis elevatis. *Elytra* fastigiata , basi excavato-punctata. *Antennæ* articulis extrorsum dentatis , corpore breviores. *Anus* acuminatus aculeum mentiens. *Thorax* pone & *scutellum* flava. *Pedes* antici pube flava. Forte hincori nova species? Conf. leptura *scutellata* Fab. spec. n. 10.

*Obs.* Ad lepturas hoc insectum retuli , licet in specimine D. *Vincent. Petagn.* sub nomine rhagii nigri ordinatum fuerit. Mas foeminae similis. *Elytra* tota concavo - punctata. *Scutellum* albicans , non flavum , nec *thorax* postice flavo marginatus. Species nova non videtur. V.

### *Necydalis.*

*Ruficollis*. 15. N. *Desc.* Statura & magnitudo omnino N. *cærulescentis*. *Caput* viride , nitidum , *antennis* nigris. *Thorax* tereiusculus , rufus , nitidus , immaculatus. *Elytra* viridia. *Abdomen* rufum. *Pedes* nigri.

*Sanguinicollis*. N. ( le collier rouge ) thorace teretiusculo rufo , corpore fusco.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Magnitudo & statura N. *cærulescentis*. *Caput* , cum antennis, fuscum. *Thorax* punctis duobus impressis, teretiusculus , rufus. *Elytra* lineis elevatis tribus striata , fusca. *Corpus* fuscum , sive obscure nigrum.

*Ustulata*. N. ( la brûlée ) nigra , elytris basi futuraque lata testaceis.

*Herbest. arch.* necydalis ustulata.

*Hab.* in Germaniæ plantis.

*Desc.* Statura omnino N. *humeralis*.

*Melanura*. N. ( la mélanure ) nigra , thorace elytrisque testaceis , his apice nigris.

*Hab.* in Hispaniæ plantis. *D. Vahl.*

*Desc.* Statura & magnitudo N. *ruficollis*.  
*Caput* , *antennæ* , *corpus* , *pedes* nigra.

*Obs.* In *Enum. cantharis rufiventris* *D. Scop. n. 139.* inter necydales ordinata fuit , licet *elytra* minime sint attenuata , eo quod lineis tribus insignantur , intima brevissima , extima longissima. Huic characteri in hoc genere multum tribuit *D. Schrank* omnesque cantharides *Linn.* *Thorace teretiusculo* ad genus præfens libenter referret. Notis hujus generis characteristicis oculos lunares addidit *D. de Geer.* sed superflua videtur utraque nota , forma enim elytrorum sufficienter distinctæ necydales videntur.

### *Pyrochroa.*

Hoc novum genus admiserunt *D. Fab. de Geer, Geoff. Schrank* , sed synonymia variat.

Pyrochroam *D. Geoff.* non citavit. *Linn.*  
 Pyrochroa *D. Geoff.* lampyris coccinea  
*Syst.* apud *D. Fab.*

. . . . . cantharis *peḍinicornis* teste  
*D. de Geer.*

. . . . . species propria sub nomine  
 pyrochroæ *satrapæ* in Enum.

*Obs. 1.* In cantharide *peḍinicorni* caput,  
 corpus & scutellum nigra, in pyrochroa  
*D. Geoff.* ignita, non eadem igitur  
 infecta.

*Obs. 2.* In secunda *Mantiss.* ad pyro-  
 chroas relata fuit cantharis *peḍini-*  
*cornis* *Linn.* major *L. coccinea.* *An-*  
*tennæ* nigræ valde pectinatæ aut potius  
 flabellatæ. *Caput* atrum. *Thorax* testa-  
 ceus, macula media atra. *Elytra* glabra,  
 testacea, immaculata. *Corpus* atrum.

*Obs. 3.* Cantharis *peḍinicornis* *Linn.* sta-  
 tura lampyris *sanguineæ*; ergo minor  
*lamp. coccinea* & non major. Pyrochroa  
 3 novæ *Mantissæ* videtur pyrochoa  
*purpurata.* *D. Schrank.* In Gallia Aust.  
 utraque species descriptionique ejusdem  
 Entomologis conformis.

*Pyr. purpuratæ desc.* Color infecti aterri-  
 mus. *Caput* cordatum. *Labium* superius  
 magnum, reliquo capite depressius;  
*labium* inferius dimidio brevius, corpo-  
 ribus duobus, quæ *palpi* inferiores,  
 membranaceis fuscis, apice denticulatis  
 instructa; *palpi* superiores atrii, teretes,  
 apice rubri. *Maxillæ* ante apicem fascia  
 coccinea. *Antennæ* pectinatæ, decem  
 articulatae: articulus primus & secundus  
 qui etiam reliquis brevior, cuneiformes,  
 tertius dente modico in latere  
 interiori, reliquorum dentibus succive  
 majoribus, septimo, octavo, nono,  
 decimo ramum longum emittentibus;

undecimus cylindricus. Post antennas oculi reniformes, transversi. Regio inter oculos antennisque sita, cujusque quasi in angulis dicta membra sita sunt, depressior. *Collum* inter caput & thoracem atrum. *Thorax* fere orbicularis, medio sulco læviusculo & utrinque puncto excavato, colore eleganter rubro, inter rubrum commune & igneum, intermedio; *totus* pilis hujus coloris minutissimis, subtilissimis, densissimis tectus, unde sericeo splendore nitet. *Pectus* atrum. *Elytra* ejusdem ac *thorax* coloris, eodem sericeo splendore nitentia. *Pedum anticorum* tarsi lobos utrinque quatuor, post quos unguis bifurcatus, at *postici* tres tantum gerunt. *Alæ* fuliginosæ.

*Obs.* 4. In nostris punctum rubrum in occipite. Sequentē rarior majorque. V. *Satrapa*. Color aterrimus. *Caput* cordatum, supra infraque ignei coloris. Structura labiorum palporumque, ut in priore. *Palpi* superiores *toti* atri. *Antennæ* atræ, articulis tribus primis cuneiformibus, secundo brevissimo, quarto ramum longum emittente, quod & reliqui deinde facere pergunt, sed undecimus teres. *Oculi* atri, reniformes, ab antennis magis, quam in priore specie remoti, una sui parte tantum in superiore capitis siti. In fronte fovea ampliüscula, caput mortuum repræsentatura, si esset, quod oculorum foramina referret. *Thorax* structura prioris, sed tam ipse, quam pectoris latera, ignei coloris, sterno atro. *Pectus* pedesque & *abdomen* punctis minutissimis, creberrimis, excavatis conspersa. *Elytra* sericea ex

pilis ut in priore, sed ignei coloris. Universim præfens species priori elegantia multum concedit.

Minuta. 1. P. ( la petite ) atra, antennarum apicibus elytrisque fanguineis.

*Drury inf. pyrochroa nigro-rubra.*

*Hab. in Norwagia. D. Lund.*

*Desc. Minor. Thorax, uti totum corpus, ater. Antennæ apice rufæ.*

### *Cantharis.*

Nigra. 17. C. *Desc. Antennæ fulvæ, apice nigricantes. Caput postice nigrum, antice fulvum. Oculi nigri. Thorax ruber immaculatus. Elytra cinerascens - nigra. Abdomen subtile nigrum, annulis rubris. Pedes rubelli.*

Thoracica. 18. C. *Desc. Nigra. Antennæ flavescens. Thorax ruber. Elytra lævia, viridia.*

Plumbea. 20. C. *Desc. Antennæ maris vix thoracem æquant, fœminæ dimidii corporis longitudine. Nitida nigra.*

Cinerea. 21. C. *Desc. Oculi nigri exserti. Antennæ castaneo-fuscæ. Totum insectum pilis cinereis tectum, inde cinerea, licet nigra.*

Rotundata. 22. C. *Desc. Corpus plumbeum. Elytra lævia. Pedes pallide flavescens.*

Maculata. 23. C. *Desc. Caput, corpus supra & infra, pedesque rubello-lutea. Antennæ, oculi tarsique nigri. Elytra obscure ochraceata, apice macula nigra. Alæ nigricante-fuscæ.*

Pallipes.



- Pallipes. 24. *C. Desc.* Caput atrum, palpis pallidis. Antennæ fuscæ, basi pallidæ. Thorax marginatus ater. Elytra glabra, pallida, apice fusca. Pedes pallidi.
- Ruficollis. 25. *C. Desc.* Summa affinitas canth. fuscæ, at duplo minor. Caput, cum antennis ferratis, atrum. Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra, alæ & pedes atra. Abdomen rufum. Pedes nigri.
- 2-Punctata. 26. *C. Desc.* Caput & antennæ nigra; fronte testacea. Thorax marginatus, marginibus reflexis testaceis, punctis duobus nigris. Elytra serico aureo splendentia, apice nigra. Abdomen nigrum, apice ferrugineum. Pedes testacei, geniculis posticorum nigris.
- Pulicaria. 27. *C. Desc.* Parva, tota atra, excepto thoracis marginibus tentaculisque abdominalibus.
- Nigripes. 36. *C. Desc.* Caput & thorax lutea. Antennæ fuscæ & punctum fuscum inter antennis. Elytra pallide testacea, apice nigra. Abdomen & pedes atra. Similis canth. melanuræ, attamen omnino distincta.
- Proboscidea. 37. *C. Desc.* Forte proprii generis insectum. Caput & thorax plana, depressa, nigra, immaculata. Palpi porrecti nigri; articulo penultimo majori, subtus appendiculo ovato, irregulari, fisso, ultimo arcuato hamato, acuto. Elytra lævia, testacea, apice nigra. Abdomen nigrum, apice testaceum. *Lymexylon* 4.

- Formicoides. 38. { An inter cantharides , an inter  
 Variegata. 39. { meloes numerandæ ? Dubium idem  
 Testacea. 40. { de tribus sequentibus quas inter  
 cucujos collocavit. *D. Fab.*

Depressa. 41. *C. Desc.* Statura depressa & magnitudo cantharidis. *Antennæ* nigrae , moniliformes , pilosæ , articulis undecim , ultimo acuto. *Caput* depressum , planum , rufum , ore oculisque nigris , postice utrinque angulo obtuso globoso acutum. *Thorax* planus , subfulcatus.

Dubia. 42. *C. Lege* Flavipes ( la flavipede ) thorace denticulato nigro , pedibus flavescens , antennis filiformibus longitudine corporis.

*Iter. Norwag.*

*Hab. in* arborum truncis decorticatis Norwagiæ.

Mutica. 43. *C. Desc.* *Antennæ* filiformes , corpore breviores. *Caput* & *thorax* atra , immaculata ; ad basin thoracis puncta duo impressa. *Elytra* filiformia , striata , obscura sive fusca. *Pedes* simplices , nigri.

Berberidis. 44. *C. Desc.* *Palpi* rufi. *Antennæ* fusca , basi rubra , reliqua testacea. *Thorax* in medio linea longitudinali rubra percurritur , quæ dein totum marginem posteriorem occupat. Vel si præplacet , *thorax* rufus est , lateribus nigris. *Femora* nigra. *Tibiæ* flavescens.

Pallida. *C.* ( la pâle ) thorace marginato atra , elytris pedibusque pallide testaceis.  
*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc.* Parva. *Caput* atrum, *antennarum* basi *palpisque* pallidis. *Thorax* marginatus, ater, immaculatus. *Corpus* atrum, *pedibus* pallidis. *Elytra* pallide testacea, immaculata.

Viridis. C. ( la verte ) æneo-viridis, ore flavescente.

*Hab.* in Scania. D. Pay Kull.

*Desc.* Statura & magnitudo canth. 2-pustulata. *Caput*, *thorax*, *elytra* viridi-ænea, immaculata, solo ore flavescente. *Antennæ* nigræ. *Corpus* obscurum, *tentaculis abdominalibus sanguineis*.

Sanguinolenta. C. ( la sanguinolente ) nigro - ænea, thoracis margine elytrisque sanguineis.

*Mantiss. Malach.* 4.

*Hab.* Kiliæ. D. Daldorf.

*Desc.* Statura præcedentium, at duplo minor. *Caput* & *thorax* nigro - ænea. *Thoracis* margo sanguineus. *Elytra* omnino sanguinea, immaculata. *Abdomen* & *pedes* nigra.

Cyanea. C. ( la bleue ) cyanea, thorace abdomineque rubris. *Mantiss. Malach.* 5.

*Hab.* in Hispaniæ umbellatis. D. Vahl.

*Desc.* Statura præcedentis. *Caput*, *antennæ*, *elytra*, *pedes*, cyanea, nitida, immaculata. *Thorax* & *abdomen* rufa, nitida.

Flavipes. C. ( la flavipede ) nigra, antennarum basi tibiisque flavis. *Mantiss. Malach.* 10.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* *Corpus* parvum, nigrum, nitidum, immaculatum. *Antennæ* nigræ, basi flavæ. *Pedes* flavi, *femoribus* nigris.

Barbata. C. ( la barbue ) fusca , antennis tibiisque piceis. *Mantiss. Lymexylon. 3.*

*Schall. aet. Hall. 1. 322. tab. 1. fig. 7.*  
mordella barbata fusca , palpis enliformibus trilobis , lobis lateralibus latissimis.

*Schaff. icon. tab. 279. fig. 7. a. b.*

*Hab. in Germaniæ lignis.*

*Desc. Corpus fuscum , tomento aureo fugaci , nitidulum. Antennæ & pedes pallidiores.*

Favipes. C. ( la flavipede ) nigra , elytris basi , abdomine apice pedibusque flavis. *Mant. Lymexylon. 5.*

*Hab. in Saxonix ligno. D. Hybner.*

*Desc. Statura & magnitudo canth. navalis.*

*Caput , thorax , antennæ , nigra immaculata. Elytra nigra , basi ad futuram flava. Corpus nigrum. Abdomen apice flavum. Pedes flavi.*

Morio. C. ( la morio ) nigra , pedibus anticis flavis. *Mantiss. Lymexylon. 6.*

*Hab. in Saxonix lignis. D. Hybner.*

*Desc. Duplo præcedente major. Corpus totum nigrum , pedibus quatuor anterioribus solis flavis.*

*Obs. Ad quod genus Syst. referendus sit cucujus D. Fab. incertum mihi videtur. Post cantharides ordinavi , licet cerambycem planatum comprehendat hoc genus. V.*

Sulcata. C. ( la sillonnée ) thorace fulcato nigra , elytris crenato-striatis. *Mant. cucujus 2.*

*Hab. in Croatiæ ligno putrescente. D. Saldoner.*

*Desc. Corpus medium , elongatum. Antennæ breves , moniliformes. Caput nigrum trifulcatum sulco intermedio*

longiore. *Thorax* planus, itidem trifurcatus, furcis lateralibus apicem haud attingentibus. *Elytra* crenato-striata. *Abdomen* piceum. *Pedes* simplices.

Cærulea. C. ( la bleue ) thorace fulcato nigra, elytris striatis cæruleis, abdomine rufo.

*Mantiss. cucujus* 3.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Major canth. depressa, at statura eadem depressa. *Caput* nigrum, ore piceo. *Thorax* depressus, canaliculatus fulcoque utrinque profundo abbreviato exaratus. *Elytra* cærulea nitida, striata. *Abdomen* rufum. *Pedes* nigri.

Flavipes. C. ( cérambyx ) planatus *Syst.*

Testacea. C. ( la testacée ) thorace subquadrato mutico testacea, femoribus compressis.

*Mantiss. cucujus* 7.

*Hab. sub betulæ corticibus. Mus. D. Romani.*

*Desc.* Triplo minor canth. flavipede. *Antennæ* longitudine fere corporis, filiformes, testaceæ. *Corpus* elongatum, testaceum, immaculatum. *Pedes* breves, testacei, femoribus compressis.

Monilis. C. ( le collier ) thorace quadrato mutico supra nigra, thorace margine, elytris macula ferrugineis. *Mantiss. cucujus* 9.

*Hab. in Germania.*

*Desc.* *Antennæ* breves, moniliformes. *Corpus* subtus testaceum.

Mutica. C. la pacifique ) thorace mutico nigro, puncto utrinque impresso, elytris striatis fuscis. *Mantiss. cucujus* 8.

*Hab. in Germania. D. de Hattorf.*

*Desc.* Statura depressa præcedentium. *Antennæ* filiformes corpore breviores. *Caput & thorax* atra immaculata ; ad basin thoracis puncta duo impressa. *Elytra* filiformia , striata , obscura sive fusca. *Pedes* simplices nigri.

*Elater.*

Thoracicus 31. *E. Desc.* Fuscus. *Thorax elytraque* sparsa inordinate punctis albidis. *Abdomen* superne sub elytris rubrum s. aurantium.

Carbonâ- 32. *E. Desc.* Totus aterrimus , minime nitidus. *Antennæ* thorace breviores , ferratæ. *Elytra* punctato-striata , sed hæ striæ non comparent , nisi dedita opera deleantur squamulæ queis totum corpus omnesque artus , quasi quodam pulvere teguntur : squamulæ hæ aterrimæ , intermixtæ pilis albis.

Hæmatoce- 33. *E. Desc.* Simillimus *E. aterrimo* ; sed *antennæ* , quæ subtus ferratæ *pedesque* ex fusco-sanguinei.

Austriacus. 34. *E. Desc.* Tomentosulus per omnia ferrugineus. *Elytra* subtiliter striata. *Oculi* soli nigri. *Antennæ* longæ , prope filiformes.

Purpureus. 35. *E. Desc.* *Antennæ* nigræ pedinatae. *Caput* nigrum. *Thorax* antice angustior , niger , bysso coccinea tectus , hinc purpuram sub vario situ oculi exhibens. *Scutellum* atrum. *Elytra* coccinea , lineis duabus elevatis , striato-punctata. *Alæ* fuliginosæ. *Subtus* omnibus artubus aterrimus.



- Fuscus.** 36. *E. Desc.* *Totus* niger. *Thorax* non nihil ex nigro-æneus, ad lentem punctatus. *Elytra* thorace pallidiora, ad lentem punctato striata & præterea adhuc subtilissime punctata.
- Cupreus.** 37. *E. Desc.* *Statura* omnino & *magnitudo* *E. pectinicornis*, obscure cupreus, f. rufo-æneus. *Antennæ* nigrae, pectinatae. *Elytra* striata, basi testacea, apice cuprea.
- Filiformis.** 38. *E. Desc.* *Corpus* filiforme, *E. obscuro*, duplo minus, totum aureo-fuscum, immaculatum.
- Striatus.** 39. *E. Desc.* *Medius*. *Caput* & *thorax* obscure nigra. *Elytra* fusca, lineis quatuor pallidis, ad apicem coeuntibus. *Antennæ* ferrugineæ. *Pedes* fusci.
- Limbatus.** 40. *E. Desc.* *Statura* & *magnitudo* *E. minuti*, cui valde affinis, at *elytra* testacea, margine omni nigro.
- Marginatus.** 41. *E. Desc.* Simillimus præcedenti, at paullo major. *Corpus* nigrum. *Thorax* niger obscurus, margine omni ferrugineo.
- Rufus.** 42. *E. Desc.* *Maximus*. *Totus* rufus. *Antennæ* ferratae. *Oculi* nigri nitentes. *Elytra* striis longitudinalibus profundis.
- Fuscus-major.** 43. *E. Desc.* *Fuscus* nitidus. *Totus* villosus. *Antennæ* capite thoraceque longiores. *Abdomen* supra rubellus. *Pedea* castaneo-fusci nitidi.

Fuscus- 44. E. Desc. *Antennæ nigricantes uti caput*  
minor. *thoraxque supra & infra. Elytra, pedes,*  
*abdomen infra obscure fusca.*

Obtusius. 45. E. Desc. *Medius. Antennæ rufæ. Caput,*  
*thorax, quæ pilis griseis vestita,*  
*abdomen infra, nigra. Elytra obscura*  
*fusca, griseo villosula.*

Inæqualis. 46. E. Desc. *Major niger. Antennæ ferrati-*  
*formes. Thorax & elytra squamis pi-*  
*lisque griseis lata atraque cum capite*  
*scabra.*

Undulatus. 47. E. Desc. *Majusculus. Antennæ arti-*  
*culis conicis. Corpus nigrum; sed*  
*e pilis griseis murinum adparet. Elytra*  
*longitudinaliter sulcata, in singulo*  
*fasciis tribus transversis undulatis ni-*  
*gris pilorum defectu. Subtus nitidus*  
*niger.*

*Larva 6 - poda castaneo - fusca in terra*  
*subque lapidibus reperitur: incisuræ*  
*fasciis luteis separatæ sunt.*

Nigro- 48. E. Desc. *Parvus. Antennæ nigræ,*  
maculatus. *primo articulo rufo. Thorax rufus,*  
*linea nigra subtus, maculis tribus*  
*elongatis nigris supra. Pedus nigrum.*  
*Abdomen subtus rufescens, basi late-*  
*raliterque nigricans. Pedes ochraceati.*

Æneo-niger. 49. E. Desc. *Minimus. Totus ochrescenti*  
*niger nitidus.*

Balreatus. 54. E. Desc. *Magnitudo variat. Caput,*  
*thorax corpusque subtus nigra. Elytra*  
*itidem nigra, fascia longitudinali fulva*  
*in medio.*

Advena. 60. E. Desc. *Thorax* villosus, antennis paullo brevior. *Elytrum* striatum, villosulum, striis binatis excavatis, una solitaria: hujus color dupliciter sumi potest, vel enim talis, qualem dixi, vel universo modo, nempe castaneus, apice basi fasciaque media repanda testaceis.

Istriacus. 61. Desc. *Antennæ* subpectinatae, thorace duplo longiores. *Caput* nigrum, oculis prominulis. *Thorax* in medio æque latus ac longus, sulco longitudinali, postice inter angulos dentatos nigredine inquinatus. *Scutellum* nigrum. *Elytrum* punctulis congestis scabrum, inter quæ villi parvi adscendentes prodeunt; idem tribus lineis elevatis parallelis longitudinaliter striatum est, margine utroque cujusque lineæ excavata lineola notato. *Abdominis* apex ruber. *Corpus* subtus pedesque nigri, nitore aliquo lucidi.

Degener. 62. E. Desc. *Statura* E. *sanguinei*. A sociis vere degener, ob thoracis angulos posticos rotundatos, non vero dentatos. *Totus* niger & villosus, *antennas* gerit dentatas, thorace vix longiores. *Thorax* in latitudinem magis quam longitudinem extensus. *Elytrum* striatum, striis 12, valleculis interjectis punctatis. *Corpus* subtus modice nitens. Puncta flava in thorace tria, in quolibet elytro octo alterna, subrotunda, aureo colore, non vero nitore, prædita, æqualis magnitudinis, unico excepto, nempe antico penultimo prope marginem interiorem collocato.

**Elongatulus. E.** ( l'alongé ) ater, elytris testaceis apice nigris. *Mantiff. Elater* 42.

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc.* Statura & summa affinitas. *E. balteati*. *Caput*, *thorax*, *scutellum* atra, nitida, immaculata. *Elytra* punctatofriata, testacea, apice nigra. *Corpus* nigrum, *pedibus* apice testaceis.

**Pilosus. E.** ( le velu ) fuscus cinereo subvillosus, elytris striatis. *Mantiff. Elater* 45.

*Leske itin. I. p. II. I. tab. A. fig. I.* elater pilosus.

*Hab. in Lusatiæ montibus.. D. Prof. Leske.*

*Desc.* Parvus, totus obscurus, villo parvo cinereo reclusus. *Elytra* striata.

**Advena. E.** ( le passager ) ater, elytris striatis pedibusque obscure cinereis. *Mantiff. Elater* 50.

*Hab. ad Bizerta Hispaniæ. D. Vahl.*

*Desc.* Parvus. *Caput* & *thorax* atra, parum nitida. *Elytra* acuminata, striata, obscure cinerea. *Abdomen* nigrum, *pedibus* cinereis.

**Buprestoides. E.** ( le buprestoïde ) cylindricus niger immaculatus, capite retracto. *Mantiff. Elater* 55.

*Linn. Syst. nat. 2. 656. 36. in Sv. 746.* elater buprestoides.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* *Corpus* medium cylindricum, nigrum, minime nitidum. *Caput* intra thoracem reclusum. *Elytra* striata.

**Dermestoides. E.** ( le dermestioïde ) subvillosus cinereus, elytris striatis, capite retracto. *Mantiff. Elater* 56.

*Linn. Syst. nat.* 2. 656. 37. Sv. 747.  
elater dermestoides.

*Hab. in Suecia. D. Pay Kull.*

*Desc.* Parvus. *Corpus* totum cinereum,  
subvillosum, immaculatum.

*Obs.* Hi duo ultimi in speciebus non  
reperiuntur. V.

*Cicindela.*

Biramosa. 11. *C. Thumb. nov. sp.* 1. 26. f. 40.

*Desc.* *Corpus* totum supra obscure æneum,  
subtus aureum, nitidum. *Elytrum* margo  
exterior albus ramos five dentes duos  
emittens, altero in medio, altero  
versus apicem.

Semipunctata. 12. *C. Desc.* Statura & summa affinitas  
cic. ripariæ. *Corpus* totum æneum.  
*Elytra* striato-punctata, in medio ad  
futuram quasi polita, glaberrima. *Pedes*  
nigrî.

Caraboides. 14. *C. Desc.* *Caput* & *thorax* nigro-ænea.  
*Oculi* exserti, & *maxillæ* insignes. *Tho-*  
*rax* perfecte cordatus, marginatus ut  
in carabis, sed margo angustus, linea  
longitudinali excavata. *Elytra* nigro-  
ænea, maculis viridi-æneis variegata,  
minutissime punctata; ad utrinque mar-  
ginem puncta excavata lata in lineam  
longitudinalem disposita. *Pedes* fusci.  
*Pedus* nigro-æneum; abdomen atrum  
nitens.

Flexuosa. *C.* (la tortueuse) obscura, elytris punctis  
quatuor lunulisque tribus albis, in-  
termedia flexuosa. *Mantiss. cicindela* 13.  
*Hab.* ad Hispaniæ littora. *D. Vahl.*  
*Desc.* Statura & summa affinitas cic.

*luridæ. Caput* obscurum, labio dentato albo margine nigro. *Maxillæ* nigræ. *Thorax* obscurus, basi apiceque impressus immaculatus. *Elytra* obscura, punctis duobus baseos ad futuram oblique positis; tunc lunula ad marginem exteriorem, tunc punctum ad futuram, demum lunula in medio marginis flexuosa & fere duplicata. Punctum magnum album ad marginem & denique lunula elytrum terminat. *Abdomen* æneum. *Pedes* cuprei.

Capensis. C. ( du Cap ) subænea, elytris albis, linea fusca triramosa.

*Hab.* ad C. B. Spei. *Tulbagh.* In Ulteriori Calabria.

*Vincent. Petagn. specim. n. 214.*

*De Geer tom. 7. t. 6. f. 11.*

*Desc. Corpus* testaceum. *Maxillæ* subnigræ.

*Oculi* perlati, nitentes. *Caput* viride, fronte testaceo-aurata. *Thorax* margine albidior, macula viridi-cuprea triloba. *Elytra* striata, macula ad basin, fasciisque duabus repandis transversis, viridicupreis, omnibus futuræ connexis. *Alæ* hyalinæ, nigro maculatæ.

*Obs.* Ad hoc genus & ad hanc speciem hoc insectum referre maluit *D. Vincent. Petagn.* quam vel ad aliud genus, vel novam conficere speciem.

### *Buprestis.*

Acuminata. 21. B. *Desc.* Parva. *Corpus* elongatum. *Elytra* angustissima, flexibilia, viridia, ad lentem scabra. *Alæ* nigricantes.

Lugubris. 23. B. *Desc.* *Corpus* magnitudine & statura bup. tenebrionis. *Caput* obscurum,



griseum, *antennis* griseis. *Thorax* obscurus, griseus, lævis, margine auro pauco nitidulo. *Elytra* integra, obscura, grisea, punctis plurimis elevatis, oblongis, glabris, scabra. *Corpus* subtus cupreum, nitidum.

Læta. 25. B. Desc. *Corpus* lineare, magnitudine & statura bup. *viridis*. *Caput* & *thorax* rubra, aurea, nitida. *Elytra* viridia, integerrima, futura aurea. *Pedes* rufo-fuscescentes.

Salicis. 26. B. Desc. Statura & magnitudo bup. *nitidulæ*. *Caput* viride pubescens, *antennis* fuscis. *Thorax* depressus, marginatus, viridis, maculis duabus cyaneo impressis. *Elytra* integra, rufo-aurea, basi, imprimis ad futuram, viridia. *Subtus* viridia immaculata.

Cyanea. 27. B. Desc. Statura & magnitudo bup. *viridis*. *Corpus* totum cyaneum, nitidum, oculis testaceis.

Berolinensis. B. ( le Prussien ) *elytris* bidentatis viridi nigroque variis, ano tridentato. *Mant.* Bup. 7.

*Herbst. arch. inf.* buprestis Berolinensis.

*Pall. icon. tab. D. fig. 10.*

*Hab. in Germania.*

Desc. Statura & magnitudo bup. *obscuræ*.

*Caput* & *thorax* punctata, viridia. *Elytra* viridi nigroque varia, substriata, apice bidentata. *Corpus* subtus cupreum.

Flavomaculata. B. ( le maculé ) *elytris* truncatis dentatis striatis nigris, maculis quatuor flavis. *Mantiff. Bup. 22.*

*Deyur. inf. 4. 137. 6. buprestis flavo maculata.*

*Hab. in Scania. D. Pay. Kull.*

*Desc. Media. Caput æneo-nigrum, fronte flava. Thorax niger, margine flavo. Elytra striata apice truncata, dentata, maculis quatuor flavis, postica didyma. Abdomen æneo-nigrum, apice punctis duobus fulvis. Pedes nigri.*

**Tæniata. B. ( le fascié )** elytris ferratis cinereo villosa, elytris nigris, fasciis duabus ferrugineis. *Mantiss. Bup. 42.*

*Hab. in Europa Australiori. Mus. D. Banks.*

*Desc. Parva. Antennæ nigræ. Caput & thorax villosa, obscure grisea. Elytra ferrata, substriata, fasciis duabus pone medium ferrugineis, quarum postica margines haud attingit. Ante fascias punctum unum alterumve ferrugineum. Corpus cinereo villosum.*

**Decostigma. B. ( le faillant )** elytris integris elevato-striatis fuscis, punctis quinque flavis. *Mantiss. Bup. 47.*

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc. Statura bup. chryso stigma. Thorax punctatus, nigricans, cupreo nitens. Elytra striis elevatis tribus abbreviatis nigra, punctis quinque flavis, primo solitario, reliquis octo, elytris complicatis, in circulum dispositis. Corpus nigro-æneum.*

**Onopordinis. B. ( de l'onopordon )** elytris integris cupreis, sulcis punctisque numerosis albo villosis, thorace scabro. *Mant. Bup. 51.*

*Hab. in Hispaniæ onopordine. D. Vahl.*

*Desc. Paullo bup. fasciculari minor. Corpus æneum, nitidum, albo villosum.*

*Thorax* punctis elevatis scaber. *Elytra* ænea, fulcis punctisque pluribus magnis, impressis albo villosis. *Pedes* cuprei.

**Acuminata.** B. ( le pointu ) elytris integris attenuato-acuminatis obscuris, corpore cupreo. *Mantiff. Bup.* 58.

*Pall. icon. tab. D. fig. 10.* buprestis acuminata.

*Hab. in* Russia Meridionali. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino bup. *rusticæ*, distincta elytris postice elongatis, attenuatis. *Caput* cupreum. *Thorax* cupreus, nigro maculatus. *Elytra* striata, obscura. *Corpus* cupreum, nitidum.

**Cariofa.** B. ( le carié ) atra, elytris integris atomis albis, thorace varioloso. *Mant. Bup.* 61.

*Pall. iter. 3. app. 708. 52. icon. D. fig. 6.* buprestis cariofa.

*Hab. in* Russia Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino bup. *tenebrionis*, at duplo major. *Corpus* nigrum, atomis albidis adspersum. *Elytra* substriata. *Thorax* maculis plurimis elevatis glabris.

**Undata.** B. ( l'ondé ) viridi-ænea, elytris integris apice obscuris, strigis undatis albis.

*Mantiff. Bup.* 64.

*Hab. in* Germania. *D. Schulz.*

*Desc.* Major. bup. *rubi*. *Caput & thorax* ænea, nitida, immaculata. *Elytra* basi viridi-ænea, strigis aliquot fere obsoletis albis, apice nigricantia, strigis albis distinctis, valde undatis.

**Aurulenta.** B. ( le porte-or ) supra obscure viridis, elytrorum margine aureo. *Mantiff. Bup.* 67.

*Hab.* Halæ. *D. Hybner.*

*Desc.* Media. *Antennæ* nigræ. *Caput* & *thorax* viridia, obscura, lævia, immaculata. *Elytra* obscuriora, margine exteriore late aureo. *Corpus* cupreum.

*Elata.* B. ( l'élégant ) elytris integerrimis linearibus, corpore elongato aureo nitido. *Mantiss.* Bup. 84.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura bup. *atræ* oblonga, at minor & tota ænea nitida.

*Brutea.* B. ( le Calabrois ) nigra punctis albicantibus maculata, thorace varioloso dilatato albidior, maculis quinque nigris notato.

*Hab.* in Europa. In Ulteriori Calabria. *Vincent. Petagn. t. f. xx. n. 108.*

*Desc.* Hæc e maximis est. *Tota* nigra punctata, punctis maculisque albis confersa. *Frons* orbicularis, punctis albis. *Thorax* maculis quinque nigris nitidis inter albedinem maculatam ipsius, quarum duæ in singulo latere; quinta in medio thoracis. In basi ante scutellum fovea triangularis. *Elytra* sulcato-punctata, maculis punctisque albis.

*Obs.* Cum bup. *tenebrione*, non confundenda. Distincta enim species, cum illius diversus sexus non sit atque in diffitis locis inveniantur & in diversis plantis constanter habitent. *Ibid.*

*Stephanelli.* B. ( le Stéphanelli ) viridi-aurea nitens, thorace lineis fuscis elytris integris.

*Hab.* in Ulteriori Calabria. *Vincent. Petagn. specim. n. 110.*

*Desc.* *Corpus* oblongum colore viridi-aureo splendente sericeo. *Oculi* testacei. *Antennæ*

*Antenna* cæruleæ. *Thorax* lineis duabus fuscis in medio parallelis. *Elytra* integra. *Femora antica* in parte anteriori rubro fulgentia. *Anus* linea nigro-cærulea. *Ungues* nigro-cærulei.

Diversa igitur species, neque cum bup. viridi, neque cum bup. manca confundenda. Inter minores locum habet.

*Dytiscus.*

Fenestratus. 23. D. Desc. Statura omnino dyt. 2-pustulati. *Corpus* subtus ferrugineum. *Caput* nigrum, ore, *antennis* punctisque baseos ferrugineis. *Thorax* niger, margine ferrugineo. *Elytra* nigra, punctis duobus fenestrato-hyalinis, altero in medio, altero versus apicem.

Hermanni. 25. D. Desc. Statura dyt. erythrocephali. *Caput* obscure ferrugineum, oculorum orbita nigra. *Thorax* ferrugineus, margine antico & postico nigris. *Elytra* lævia, nigra, basi ferruginea, apice truncata. *Abdomen* ferrugineum, apice nigrum.

Gibbus. 26. D. Desc. Statura dyt. erythrocephali, at paullo minor. *Caput* ferrugineum, basi parum nigricante. *Thorax* ferrugineus, margine postico nigro. *Elytra* lævia, nigra, basi margineque obsolete ferrugineo maculata. *Corpus* & *pedes* ferruginea, *abdomine* apice nigro.

Depressus. 28. D. Desc. *Corpus* parvum, depressum. *Caput* ferrugineum, oculis nigris. *Thorax* ferrugineus, margine antico maculisque duabus baseos nigris. *Elytra*

fusca, maculis tribus marginis & quibusdam disci ferrugineis.

6-Pustulatus, 29. D. *Desc.* Minutus. *Caput* ferrugineum, oculorum regione nigra. *Thorax* niger, lateribus ferrugineis. *Elytra* glabra, lævia, nigra, maculis tribus ferrugineis, prima baseos majore lunata, reliquis duabus versus marginem. *Corpus* atrum, *pedibus* ferrugineis.

Lituratus. 30. D. (l'effacé) *Desc.* *Corpus* parvum, depressum, atrum. *Basis elytrorum* pallida & versus apicem punctum unum alterumve. *Pedes* picei.

Lineatus. 31. D. (le rayé) *Desc.* *Caput* ferrugineum, basi parum nigricans. *Thorax* lævis, ferrugineus. *Coleoptra* fusco cinereoque mixta (vel cinerea *Linnaei*) margine pallidiore. Per medium dorsii lineæ quatuor distinctæ, albicantes.

Inæqualis. 32. D. *Desc.* Magnitudo dyt. *lineati*. *Caput* ferrugineum, oculorum orbita nigra. *Thorax* ferrugineus, postice niger. *Elytra* lævia, nigra, margine ferrugineo ramulos inæquales abbreviatos exferente. *Subtus* ferrugineus.

*Variat* interdum linea media elytrorum flava a macula baseos ad medium marginis exterioris ducta.

Pufillus. 33. D. *Desc.* *Corpus* vix magnitudine pediculi, nigrum. *Thorax* ater, margine albo. *Elytra* nigra, margine imprimis antico & apicis albo.

Planus. 34. D. *Desc.* Statura omnino dyt. *erythrocephali*, at *caput* nigrum. *Corpus*



planum læve, vix nitidum. *Tibiæ* ferrugineæ.

Orbicularis. 35. *D. Desc.* Statura fere dyt. *scarabæoidis*, at minor & fere orbiculatus. *Antennæ* perfoliatæ. *Totus* lævissimus, nitens.

Bipunctatus. 36. *D. Desc.* Parvus, statura omnino hujus generis. *Caput* atrum, puncto utrinque marginali griseo. *Thorax* ater, nitidus, margine griseo. *Elytra* fusca, margine pallidiori & puncto distincto griseo versus apicem.

*Obs.* Ad dytiscos antennis perfoliatis hi duo ultimi pertinent. V.

Gyrinoides. 37. *D. Desc.* *Antennæ* perfoliatæ. Ovatus, convexus, niger. *Oculi* huic insecto, ut in toto genere, tantum duo, sed ita facti, ut eisdem usus præstent ac gyrini *natatoris* quatuor: oculus enim uterque deorsum oblongus, inflexus, majori tamen sui parte pagina corporis inferiori existens. *Elytra* manifeste striata, striis in singulo decem. *Antennæ* clavatæ, articulis tribus extremis crassioribus, testaceæ, clava nigra. *Palpi* antennis longiores, ferruginei; *tibiæ* testudineæ. *Pedes* natatorii nulli.

Immaculatus. 38. *D. Desc.* Major femine cucurbitæ vulgaris, ater *totus*, lævissimus, nec punctis nec striis, etiam ad lentem conspiciendis; nec tamen valde nitens. *Antennæ* filiformes, *tibiæ*que obscure castaneæ.

Coccinelloi-40. *D. Desc.* Habitus coccinellæ, & ita convexus; subtus niger, pedibus pallide testacei. *Caput* nigrum, ante

acutum, utrumque macula exigua flavescenti. *Thorax* niger, lateribus flavicantibus. *Scutellum* nigrum. *Elytra* flavicantia, sed singula striis 18 punctorum munitissimorum nigrorum.

**Fimbriatus. 41.** D. *Desc.* Fusco-niger sine punctis aut striis, hinc glaberrimus. *Subtus* colore cimicis *leāularii* dilutiore. Latera *thoracis*, margoque *elytrorum* exterior flavus, sed hæc flavedo in elytris tres quatuorve dentes introrsum emittit.

**Fusculus. 42.** D. *Geoff. inf paris. t. I. n. 9.*  
*Desc.* Parum nitet, etsi nec striatus nec punctatus.

**Unilineatus. 43.** D. *Desc.* Ater lævis. *Thorax* lateribus obscure ferrugineus. *Elytra* lævia, margine exteriori toto, striaque a basi non ultra medium pertinente pedibusque flavescantibus.

**Nigricans. 44.** D. *Desc.* Niger, nitidus. *Elytra* fusca nitida. *Antennæ* filiformes, apicem versus tamen nigricantes, *pedesque* lucide castanei nitentes.

**Bilineatus. 45.** D. *Desc.* *Corpus* ovatum depressum. *Caput* lineolis transversis nigris. *Antennæ* rufo-flavescentes. *Thorax* antice posticeque nigro marginatus. *Elytra* ad lentem rufo maculata.

**Seminiger. 46.** D. *Desc.* Magnitudo præcedentis. *Corpus* supra & infra nigrum nitidum. *Caput* rufo variegatum. *Antennæ* rufæ. *Thorax* *elytraque* lævia, lateraliter rufo marginata. *Pedes* castaneo-brunnei.

- Griseo-  
striatus. 47. *D. Desc. Antennæ luteo-griseæ, apice*  
*bruneæ. Caput, thorax, nigro griseoque*  
*variegata. Elytra nigra, griseo margi-*  
*nata, lineis longitudinalibus griseis. Dor-*  
*sum sine scutello. Pedes rufo-brunnei.*
- Hyalinus. 48. *D. Desc. Caput latissimum thoraxque,*  
*pallida. Oculi nigri. Corpus infra aotice*  
*viride, postice brunneum. Antennæ*  
*fuscæ. Elytra diaphana. Pedes fusci,*  
*posteriores crassiores longioresque.*
- Stagnalis. 49. *D. Desc. Antennæ fulvæ. Caput, thorax,*  
*nigra. Foveolæ duæ in capite. Elytra*  
*lævia, ad lentem transversim striata,*  
*luteo marginata, striis duabus longi-*  
*tudinalibus punctulatis.*
- Lactuofus. 50. *D. Desc. Totus niger. Antennæ fus-*  
*cescentes. Elytra lævia.*
- Tesselatus. 51. *D. Desc. Corpus nigrum. Antennæ ful-*  
*vescentes. Caput fulvum. Oculi nigri.*  
*Thorax capiti concolor, fascia fusca*  
*in medio. Elytra fulva, lævia, punctis*  
*impressis regulariter dispositis.*
- Variegatus. 52. *D. Desc. Caput luteum. Oculi nigri.*  
*Thorax fuscus luteo marginatus. Elytra*  
*fusca, maculis quatuor pallide flaves-*  
*centibus margines versus, in medio*  
*maculis duabus parvis. Corpus subtus*  
*fulvescenti-luteum. Tarforum primus*  
*articulus vix conspicuus.*
- Melanoph-  
thalmos. 53. *D. Desc. Corpus infra, caput thorax-*  
*que, flavescentia. Oculi nigri. Elytra*  
*lævia fusca.*
- Quadratus. 54. *D. Desc. Oculi nigri. Caput flavum,*

*Thorax* capiti concolor, antice niger.  
*Elytra* nigra, lævia, maculis quatuor  
 luteis versus marginem exteriorem,  
 quatuorque aliis in medio in quadratum  
 dispositis.

Monostria- 55. *D. Desc.* Niger. *Thorax* elytraque,  
 tus. lateraliter luteo maculata. Stria unica  
 prope futuram longitudinalem.

Clavicornis. 56. *D. Desc.* Fuscus. *Oculi* nigri. *Caput*  
*thoraxque*, rubro-fusca. *Antennæ* cla-  
 vatae. *Elytra* lævia.

*Antennis* perfoliatis.

Picipes. *D.* ( le gluant ) niger, pedibus piceis,  
 elytris lævibus. *Mantiff. Hydroph.* 6.

*Hab.* in Germaniæ aquis.

*Desc.* Hujus generis videtur. *Antennæ*  
 mihi defunt. *Corpus* læve, glabrum.  
*Elytra* vix striata. *Pedes* picei.

Griseus. *D.* ( le gris ) supra cinereus, subtus fuscus.  
*Mantiff. Hydroph.* 11.

*Hab.* in Saxoniae aquis. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo dyt. minuti,  
 at supra totus cinereus. *Pedes* cinerei.

*Antennis* setaceis.

2-Punctatus. *D.* ( le bipoctué ) ater, thorace flavo,  
 punctis duobus nigris, elytris flavo  
 fuscoque variis. *Mantiff. Dyt.* 19.

*Hab.* in Germaniæ aquis.

*Desc.* Medius. *Caput* nigrum, ore sub-  
 ferrugineo. *Thorax* flavus, punctis  
 duobus dorsalibus atris. *Elytra* lævia,  
 glabra, nigro-fusca, flavo variegata.  
*Corpus* atrum. *Pedes* ferruginei.

**Hybneri.** D. ( l'Hybner ) lævis ater , ore thoracique margine , ferrugineis , elytris linea marginali flava. *Mantiss. Dyt.* 21.

*Hab. in Germaniæ aquis. D. Hybner.*

*Desc.* Magnitudo & statura dyt. *transversalis*. *Caput* nigrum , ore ferrugineo. *Thorax* niger , margine imprimis antice ferrugineo. *Elytra* lævia , atra , linea marginali flava , quæ tamen apicem haud attingit. *Corpus* nigrum.

**Stagnalis.** D. ( des étangs ) lævis niger , thorace antice ferrugineo , elytris fuscis flavo lineatis. *Mantiss. Dyt.* 22.

*Hab. in Germaniæ aquis. D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo præcedentium. *Caput* nigrum , ore ferrugineo. *Thorax* niger antice ultra dimidium ferrugineus , margine tamen ipso nigro. *Elytra* lævia fusca , flavo lineata. Margo flavescit. *Corpus* nigrum , *pedibus* flavis.

**Abbreviatus.** D. ( l'abrégé ) niger , elytris striga abbreviata baseos punctisque duobus flavescitibus. *Mantiss. Dyt.* 25.

*Hab. in Kilicæ aquis. D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino dyt. *transversalis* , at duplo minor. *Caput & thorax* , nigra , margine obsolete ferrugineo. *Elytra* glabra , lævia , nigra , nitida , striga undata baseos flavescente , quæ tamen futuram haud attingit. In medio versus marginem exteriorem macula & versus apicem punctum , ferruginea. *Pedes* picei.

**Hæmorrhoidalis.** D. ( l'hémorrhoidal ) niger , thorace elytrorumque basi apiceque , ferrugineis.

*Mantiss. Dyt.* 27.

*Hab. in Kilicæ aquis. D. Daldorf.*

*Desc.* Magnitudo dyt. *uliginosi*. *Caput*, cum antennis, obscure ferrugineum. *Thorax* ferrugineus, margine antico nigro. *Elytra* lævia, nigra, basi apiceque, obscure ferruginea. *Corpus* nigrum, *pedibus* ferrugineis.

*Dorsalis*. D. ( le dorfal ) capite thoracis margine elytrorumque puncto baseos distincto margineque inæquali ferrugineis. *Mant.* *Dyt.* 36.

*Hab.* in Kilix aquis. D. *Daldorf*.

*Desc.* Nimis affinis dyt. 6-pustulato, at major & puncto tantum unico distincto baseos. *Pedes* ferruginei.

*Picipes*. D. ( le picipede ) niger, thorace antice ferrugineo, elytris flavo lineatis. *Mant.* *Dyt.* 40.

*Hab.* in Germaniæ aquis. D. *Hybner*.

*Desc.* Parvus. *Caput* nigrum, ore ferrugineo. *Thorax* antice ferrugineus, postice niger. *Elytra* lævia, nigra, lineis plurimis flavescens. *Corpus* nigrum, *pedibus* piceis.

*Chrysomeli-* D. ( le chrysoméline ) supra cinereus, nus. subtus niger. *Mantiff.* *Dyt.* 42.

*Hab.* in Germaniæ aquis. D. *Schneider*.

*Desc.* Parvus. *Caput*, *thorax*, *elytra* lævia, obscure cinerea, immaculata. *Corpus* nigrum. *Pedes* cinerei, femoribus nigris.

*Halensis*. D. ( de Hall. ) ater, thorace rufo, baseos medio nigro, puncto rufo, elytris cinereis nigro striatis. *Mantiff.* *Dyt.* 44.

*Hab.* in Germaniæ aquis. D. *Hybner*.

*Desc.* Parvus planus. *Caput* rufum imma-



culatum. *Thorax* rufus, in medio ad basin macula magna nigra & in hac punctum rufum. *Elytra* cinerea, striis plurimis approximatis, confluentibus, imprimis ad futuram nigris, quæ tamen nec basin nec apicem attingunt. *Corpus* atrum, *pedibus* rufis.

Confluens. D. ( le confluent ) niger, capite thoraceque ferrugineis, elytris pallidis, lineis quatuor disci nigris. *Mantiss. Dyt.* 46.  
*Hab.* Kilix. D. *Daldorf.* Halæ. D. *Hybner.*  
*Desc.* Parvus. *Caput* & *thorax* obscure ferruginea, immaculata. *Elytra* pallida, in medio lineolis quatuor postice confluentibus nigris. *Pedes* flavescents.

Obliquus. D. ( l'oblique ) ferrugineus, elytris maculis quinque obliquis fuscis. *Mantiss. Dyt.* 47.  
*Hab.* in Kilix aquis. D. *Daldorf.*  
*Desc.* Statura præcedentium. *Caput*, *thorax*, *corpus*, ferruginea. *Elytra* ferruginea, maculis quinque elongatis, obliquis, fuscis, exteriore hamata. *Pedes* ferruginei.

Impressus. D. ( l'imprimé ) oblongus flavescens, elytris cinereis, punctis impressis striatis. *Mantiss. Dyt.* 48.

*Ad.* Hall. 1. 312. dytiscus impresso punctatus.

*Hab.* in Europæ aquis.

*Desc.* *Corpus* magis oblongum, antice attenuatum. *Corpus*, *caput*, *thorax*, flavescencia, oculis solis nigris. *Elytra* cinerea, striis plurimis punctorum impressorum.

Crafficornis. D. ( le crassicorne ) fuscus capite thora-

ceque flavis, antennis medio incrassatis.  
*Mantiff. Dyt. 52.*

*Myll. prod. 1001. dan. 779. dytiscus crassicornis.*

*Hab. Lipsiæ. D. Prof. Leske.*

*Desc. Parvus. Antennæ singulares, flavæ, articulo medio incrassato, & uti videtur, fissio. Caput & thorax, flava immaculata. Elytra fusca, basi parum flavescencia.*

**Pictus. D.** ( le peint ) ferrugineus, thorace nigro, elytris pallidis, futura maculaque laterali nigris. *Mantiff. Dyt. 53.*

*Hab. in Germaniæ aquis. D. Hybner.*

*Desc. Minutus. Caput & corpus ferruginea. Thorax niger, margine parum ferrugineo. Elytra glabra, lævia, flavescencia, futura lata maculaque magna laterali nigris.*

### *Carabus.*

**Convexus. 13. C.** *Desc. Corpus car. violaceo duplo minor, totum atrum, læve.*

**Catenulatus. 14. C.** *Desc. An sit car. intricatus Linn. ex ejus descriptione eruere non possum? Hortensis certe non est, ut striæ & puncta minime excavata, sed elevata & catenulis similia, docent. Præterea huic thorax prioris, sed angulis posticis longioribus & dentiformibus. Inter marginem exteriorem & ei viciniam seriem punctorum, sunt plures quam tres lineæ longitudinales. Corpus pedesque nigri.*

**Purpurascens. 15. C.** *Desc. Nigro-violaceus, elytra subtilissime striata.*

- Rufipes. 48. C. ( le rufipede ) *Desc. Elytra punctato-striata. Pedes rubelli.*
- Flavipes. 49. C. ( le flavipede ) *Corpus nigrum læve. Antennæ pedesque flavescentes. Elytra lævia.*
- Vinearum. 50. C. *Desc. Corpus viridescente-nigrum. Thorax postice foveatus. Puncta inter antennis duo. Elytra striis octo punctato-striatis.*
- Agrorum. 51. C. *Desc. Aurato-viridis, punctulatus. Antennæ pallide fulvæ. Elytra striis octo.*
- Lucorum. 52. C. *Desc. Totus lævis. Puncta tria longitudinaliter disposita ad futuram elytrorum.*
- Bicolor. 53. C. *Desc. Rubella sunt, antennæ, oculi, pedes. Caput thoraxque viridia. Elytra basi fulva, apice viridia, striis octo. An varietas præcedentium?*
- Thoracicus. 54. C. *Desc. Affinis car. 6-punctato, & forte mera ejus varietas. Caput elytraque viridia. Thorax rubro-cupreus.*
- Equestris. 55. C. *Desc. Niger. Thorax scaber, cordatus, niger. Elytra striis novem punctatis, fascia nigra cruciformi futura interrupta.*
- Crucifer. 56. } C. *Desc. An species, an præce-*  
 Quadrifer. 57. } *dentium varietates? Vix nisi colore differunt.*
- Minutus. 58. C. *Desc. Minimos inter ordinandus. Totus niger lævis, immaculatus.*

- Piger. 63.** *C. Desc. Niger. Thorax late marginatus, minime cordatus, postice foveis duabus. Elytra striis octo punctulatis.*
- Viridulus. 65.** *C. Desc. Præcedenti similis. Elytra lævia. Corpus viride nitidum. Antennæ pedesque fusci.*
- Luctuosus. 68.** *C. Desc. Niger. Thorax latitudinem elytrorum æquat, lævis. Elytra striis octo lævibus. Variat antennis pedibusque fuscis.*
- Sericeus. 70.** *C. Desc. Niger. Antennæ basi rubro-fuscæ. Thorax elytraque punctulata, villosula. Pedes rubro-fusci.*
- Leporinus. 72.** *C. Desc. Nimium car. sericeo affinis; sed elytra minime sericea, stria 3a, 5a, ultimaque punctis impressis.*
- Ruficornis. 77.** *C. Desc. Affinis car. leucophthalmo. Antennæ palpique obscure rufi. Elytra profunde fulcata. Corpus subtus castaneo-fuscum.*
- Rufipes. 78.** *C. ( le rufipede ) Desc. Caput thoraxque fusca nitida. Antennæ rubro-flavæ. Corpus infra castaneo-fusca. Elytra striis longitudinalibus concavis. Pedes rufescentes.*
- Æneus. 79.** *C. Desc. Antennæ fuscæ, basi rufæ. Caput thoraxque nigro-cuprea, nitida. Corpus subtus nitens, nigrum. Elytra fere lævia, capiti thoracique concoloria, striis septem longitudinalibus vix conspicuis.*

**Bimacula-** 80. C. (le bimaculé) *Desc.* *Corpus* subtus, *antennæ* pedesque, aurantio - lutea. *Caput*, *thorax* nigra nitida. *Elytra* itidem nigra, longitudinaliter striata, basi macula ovata ochracea.

**4-Punctatus.** 81. C. (le quadriponctué) *Desc.* *Totus* æneo-niger nitidus. *Elytra* subtilissime striata, punctis quatuor concavis prope marginem interiorem. *Abdomen* breve, ovatum.

**Arenarius.** 82. *Desc.* *Statura* omnino car. *caliginosi*. *Maxillæ* exsertæ, pallidæ, apice nigræ. *Caput* pallidum, *oculis* testaceis. *Thorax* obcordatus, antice posticeque truncatus, immaculatus. *Elytra* striata, pallida, maculis duabus communibus angulatis, atris. *Pedes* pallidi.

**Madidus.** 83. C. *Desc.* *Statura* & magnitudo car. *leucophthalmi*. *Corpus* atrum, quasi humore inunctum. *Antennæ* apice fuscescentes. *Thorax* basi puncto majori utrinque excavatus. *Abdomen* obtusum.

**Spinibarbis.** 84. C. *Desc.* *Statura* car. *cuprei*. *Caput* prominens, ore *antennisque* rufis.

**Pilicornis.** 85. C. *Desc.* *Statura* præcedentis. *Antennæ* pilis longioribus hirtæ, ferrugineæ, primo articulo æneo. *Thorax* rotundatus, æneus, postice utrinque impressus. *Elytra* ænea, striata punctisque tribus impressis. *Pedes* rufi, *femoribus* nigris.

**Azureus.** 86. C. *Desc.* *Statura* car. *lati*. *Elytra* striata.

- Pallens. 87. *C. Desc.* Statura & magnitudo car. *vulgaris*. *Totus pallidus. Elytra striata.*
- Æneus. 88. *C. Desc.* Statura & magnitudo car. *cuprei*. *Caput*, cum antennis, ferrugineum, *oculis* verticeque nigris. *Thorax* transversus, canaliculatus, æneus, nitens. *Elytra* striata, ænea, nitida immaculata. *Subtus totus* pallide ferrugineus.
- Limbatus. 89. *C. Desc.* Magnitudo car. *melanocephali*, at latior. *Antennæ* pallidæ. *Caput* virescens, linea frontali antice bifida, albida. *Os* testaceum, maxillis apice nigris labioque albo. *Thorax*, latitudine fere elytrorum, viridis, margine antico & laterali pallidis. *Elytra* viridia, margine pallido, a quo fasciæ duæ flexuosæ abbreviatæ exeunt. *Corpus* testaceum, *pedibus* pallidis.  
*Ad. soc. Berol. phys. 4. t. 7. f. 4.*
- Andrææ. 90. *C. Desc.* Statura omnino car. *crucis minoris*. *Elytra* apice parum fusca. *Pedes* pallidi. Fascia in medio elytrorum ad futuram dilatata.
- Rufescens. 91. *C. Desc.* Parvus, *totus ferrugineus*, solo vertice anoque nigris.
- 2-Pustulatus. *C.* ( le bipustulé ) *Desc.* Statura omnino & magnitudo car. *crucis majoris*. *Antennæ* thorace longiores, nigræ. *Thorax* rotundatus, ater, villosus, punctatus. *Elytra* obtusa, crenato-striata, villosa, nigra, maculis duabus magnis rubris, quarum anterior major ad marginem exteriorem, posterior orbiculata.
- 4-Guttatus. *C. Desc.* Differt manifeste a car. *quadri-*



*maculato. Elytra* haud obtusa. *Thorax* valde rotundatus, ater. *Tibiæ* pallidæ.

Affinis. 96. *C. Desc.* Car. *lato* simillimus, sed major.

Teutonus. 97. *C. Desc.* Similis præcedenti. *Caput* nigrum nitens, sed *palpi* inferiores ferruginei, superiores fusci. In media fronte punctum impressum, sæpe tamen oblitteratum. *Antennæ* nigrae, articulis primo & secundo ferrugineis. *Thorax* aurantius glaber, latus, marginatus, non tamen cordatus. *Elytra* fulva, postice macula magna profunde cyanea, plus quam dimidia elytra occupante, margine tamen exteriori elytrorum fulvo usque ad apicem; striæ in singulo elytro novem, non punctatæ. *Subtus* cæruleo-niger est, *pectore* aurantio, *pedibus* ferrugineis.

Eques. 98. *C. Desc.* Elegantissimorum hujus generis animalium unum, nec tamen decipienti auro ingratum fœtorem contgens. *Caput* nigrum, punctis sparsis copiosis. *Thorax* perfecte cordatus, levissime marginatus, saturate fulvus. *Elytra* rufa, & obsolete striata sub-tomentosa. Circa eorum medium atra macula magna, cum ea, quæ in altero existit elytro, fasciam constituens, quam tamen futura, ibi adhuc fulva, dirimit; haud procul ab apice alia macula similis cum priori ope marginis exterioris inter utramque atri cohærens, & cum socia, nihil jam prohibente futura, fasciam continuam constituens. Sinus inter utramque maculam pallidius fulvus, & fere albidus, uti

& apices. Præterea in basi cujusvis elytri ad marginem anteriorem macula atra. *Abdomen* profunde cyaneum, minutissime punctatum; *pectus* aurantium; *femora* basi ferruginea, apice nigra; *tibiæ*, basi & apice, nigrae, medio ferrugineæ.

Quadrifstria-99. C. Desc. Nitidus, nigro-fuscus. *Thorax* elytraque obscure castanea, nitidissima. *Elytra* prope marginem tantum anteriorem striis quatuor longitudinalibus percurruntur, reliquo elytro lævi.

Cordatus. 100. C. Desc. *Caput* & *thorax* fusco-virent & valde nitent. *Antennæ* basis fuscorufa. *Elytra* striata ut in prioribus æneovirentia. *Corpus* subtus fusco-virens. *Tibiæ* fusco-rufescentes, spinosociliatæ.

Junceus. 101. C. Desc. Sub nomine carabi *spinipedis minoris* missus etiam a Doctiss. & R. P. Poda. *Antennæ* villosæ, apice piceæ. *Elytra* striata, striis elevatis (9), infra apicem in margine externo obiter erosus. *Tibiæ* piceæ, spinosæ.

Salicinus. 102. C. Desc. Ubi niger, ubi lucidior. *Elytra* villosula, punctata striataque. *Tibiæ* & *manus* spinosæ.

Arenarius. 103. C. Desc. Pediculo vix duplo major, nitidissimus. *Antennæ* villosæ. *Elytra* punctatim striata. *Tibiæ* & *manus* ciliato-spinosæ.

#### Majores.

Variolosus. C. ( le variolé ) apterus ater, elytris punctis

punctis variolosis impressis. *Mantiss.*  
*Carab.* 4.

*Hab. in Transylvania. D. Saldoner.*

*Desc.* Magnus, totus ater. *Antennæ* nigrae;  
apice fuscæ. *Thorax* plenus, margi-  
natus, fere quadratus, ater immacu-  
latus. *Elytra* connata, punctis magnis  
variolosis spatis, tunc inde confluen-  
tibus impressis. *Corpus* atrum.

Purpuraf- C. ( le pourpré ) apterus ater, thoracis  
elytrorumque margine violaceo, elytris  
striatis. *Mantiss.* *Carab.* 6.

*Hab. in Germania. D. Schulz.*

*Desc.* Magnus, a car. violaceo omnino dis-  
tinctus. *Elytra* haud connata, at absque  
alis, striata, nigra, margine purpureo.

Hispanus. C. ( l'Espagnol ) apterus niger, thorace  
cyaneo, elytris rugosis aureis. *Mantiss.*  
*Carab.* 8.

*Hab. in Hispania. D. Vahl.*

*Desc.* Statura omnino car. cyanei. *Corpus*  
atrum. *Thorax* supra cyaneus. *Elytra*  
subrugosa, aurea, margine cyaneo.  
*Pedes* atrii.

Arvensis. C. ( le campagnard ) apterus nigro-cu-  
preus, elytris striatis punctis excavatis  
triplici serie. *Mantiss.* *Carab.* 18.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* *Corpus* atrum, nitidum. *Antennæ*  
atræ. *Caput*, *thorax* obscure cuprea.  
*Elytra* striata obscuriora, margine cu-  
preo punctisque excavatis triplici serie.

Reticulatus. C. ( le réticulé ) alatus niger, elytris reti-  
culatis viridi-æneis, thoracis margine  
virescente. *Mantiss.* *Carab.* 33.

*Hab. in Europa. Mus. D. Zschuck.*

*Desc.* Statura & magnitudo car. *inquisitoris*. *Caput*, cum antennis, nigrum, ultimo articulo ferrugineo. *Thorax* nigricans, margine reflexo aureo. *Elytra* subtilissime reticulata, viridia, micantia. *Pedes* nigri.

*Minores.*

**Sabulosus. C.** ( des sables ) pallidus, capite coleopterorumque macula dorsali, nigris. *Mantiss. Carab.* 47.

*Hab.* in Saxoniæ fabuletis. *Mus. D. Romani*.  
*Desc.* *Caput* atrum, nitidum, mandibulis pallidis apice nigris. *Antennæ* pallidæ. *Thorax* cordatus, pallidus. *Elytra* striata pallida, macula magna communi nigra a basi ultra medium ducta. *Corpus* nigricans. *Pedes* pallidi.

**Flavicornis. C.** ( le flavicorne ) niger, thoracis margine, antennis pedibusque flavescens. *Mantiss. Carab.* 50.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner*.  
*Desc.* *Medius*. *Caput* atrum, antennis flavescens. *Thorax* cordatus ater, margine flavo. *Elytra* striata nigra, in altero sexu basi ad futuram rufa. *Pedes* flavescens.

**2-Notatus. C.** ( le frontal ) ater, capite, punctis duobus frontalibus rubris, antennis basi flavis. *Mantiss. Carab.* 54.

*Hab.* Kilix. *D. Daldorf*.  
*Desc.* Statura & magnitudo fere car. *ruficornis*, totus ater. *Caput* læve, nitidum, punctis duobus impressis & inter hæc puncta duo minutissima uti in dytisco 2-pustulato. *Thorax* lævis, glaber. *Elytra* striata.

**Lateralis.** C. ( le latéral ) niger, thorace elytrorumque margine ferrugineis. *Mant. Carab.* 55.

*Hab.* Kilix. D. Daldorf.

*Desc.* Caput nigrum, antennis ferrugineis basi nigris. Thorax ferrugineus, margine antico posticoque lateribusque ante marginem nigris. Elytra striata nigra, margine ferrugineo-basi latiori. Pedes ferruginei, femoribus nigris.

**Holosericeus.** C. ( le soyeux ) holosericeo-niger, capite æneo nitido. *Mantiss. Carab.* 52.

*Hab.* Kilix. D. Daldorf.

*Desc.* Caput æneum, nitidum, ore antennisque nigris. Thorax & elytra quasi holosericea, minime nitida. Elytra striata. Pedes nigri.

**Lepidus.** C. ( l'agréable ) viridi-æneus, thorace quadrato pollice utrinque bifstriato, elytris striatis. *Mantiss. Carab.* 67.

*Leske iter.* I. 17. 8. tab. A. fig. 6. carabus lepidus.

*Hab.* in Lusatiæ arenosis. Prof. Leske.

*Desc.* Magnitudo & statura omnino ceruleo-virescentis. Corpus nigro-violaceum, supra viridi-æneum, nitidum. Antennæ pedesque nigri. Thorax quadratus canaliculatus & utrinque lineolis duabus approximatis impressis. Elytra striata. Tibiæ anticae apice parum incrassatae.

**Erythrocephalus.** C. ( l'érythrocéphale ) niger, capite rufo, antennis pedibusque flavis. *Mantiss. Carab.* 72.

*Hab.* Kilix. D. Daldorf.

*Desc.* Medius. Caput rufum, nitidum. Thorax glaber nitidus, niger, immaculatus. Elytra striata, nigra. Pedes & antennæ flavescents.

**Oblongo-** C. ( l'oblong - ponctué ) niger , elytris punctatus. striatis , punctis dorsalibus plurimis impressis. *Mantiss. Carab.* 80.

*Hab.* Hafniæ. *D. Lund.*

*Desc.* Medius , ater. *Caput & thorax* atra , nitida , immaculata. *Elytra* obscuriora , striata , punctis plurimis dorsalibus impressis. Margo exterior itidem punctatus.

**Nigricornis.** C. ( le nigricorne ) niger , thorace cupreo ; elytris striatis viridibus , pedibus piceis. *Mantiss. Carab.* 82.

*Hab.* in Dania. *D. Schestedt.*

*Desc.* Statura omnino car. 6-punctati , at paullo major. *Caput* viridi-æneum , ore antennisque nigris. *Thorax* cupreus , nitidus , linea dorsali punctoque utrinque impressis. *Elytra* striata , viridia. *Corpus* nigrum , cæruleo nitidum. *Pedes* picei , apice nigri.

**Nitidulus.** C. ( le brillant ) niger , elytrorum margine æneo nitido. *Mantiss. Carab.* 88.

*Hab.* in Kamshatka. *D. Banks.*

*Desc.* Statura & magnitudo car. cuprei. *Caput & thorax* cordatus , nigra , cupreo colore nitentia. *Elytra* striata , striis alternis punctatis , ad futuram nigra , in medio longitudinaliter cuprea & a medio ad marginem ænea , nitida. *Pedes* nigri.

**Hæmorrhoidalis.** C. ( l'hémorrhoidal ) thorace suborbiculato , elytris nigris apice rufis. *Mant. Car.* 97.

*Hab.* Dresdæ. *Mus. D. Romani.*

*Desc.* *Antennæ* rufæ , apice nigricantes. *Caput & thorax* rufa , immaculata. *Elytra* vix striata , atra , nitida , apice rufa. *Corpus* rufum.



**Picipes. C.** ( le picipede ) thorace rotundato ater nitidus, elytris fuscis, pedibus ferrugineis. *Mantiss. Carab.* 98.

*Hab. in Suecia. D. Pay Kull.*

*Desc.* Parvus, oblongus, agilis. *Corpus* atrum. *Thorax* rotundatus, lævis, nitidus. *Elytra* striata, fusca. *Pedes* ferruginei.

**Agilis. C.** ( l'agile ) thorace rotundato rufus; elytris abdomineque nigris. *Mantiss. Carab.* 99.

*Hab. Upsaliæ. D. Pay Kull.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* rufum, *elytris abdomineque* nigris.

**Viridanus. C.** ( le verdâtre ) viridi-æneus, elytris ferrugineis, macula communi nigro-ænea. *Mantiss. Carab.* 105.

*Hab. in Germaniæ quisquiliis.*

*Desc.* Statura car. *vaporariorum*. *Caput & thorax* viridi-ænea, lævia, nitida. *Elytra* striata, ferruginea, macula magna postica communi, nigro-ænea. *Pedes* ferruginei.

**Prasinus. C.** ( le vert ) niger, capite thoraceque viridi-æneis, elytris macula magna communi postica nigra. *Mant. Carab.* 109.

*Thunb. nov. sp.* 4. 74. fig. 87. carabus prasinus, thorace capiteque cyaneis, elytris rubris postice macula communi fusca.

*Hab. Hafniæ. D. Pflug.*

*Desc.* Statura omnino car. *vaporariorum* & paullo major. *Antennæ* nigrae, articulo primo ferrugineo. *Caput & thorax* viridi-ænea, glabra, nitida. *Elytra* striata, rufa, macula magna communi nigra a medio futuræ ad apicem. *Corpus* nigrum. *Pedes* rufi.

**Dorsalis. C.** ( le dorsal ) thorace rotundato nigro , coleopteris pallidis , macula magna dorsali nigra. *Mantiss. Carab.* 116.

*Hab.* Kilizæ. *D. Daläorf.*

*Desc.* Parvus. *Caput & thorax* atra , nitida , margine tamen tenuissime pallescente. *Elytra* subtilissime striata , nitida , pallida. *Corpus* nigrum. *Antennæ & pedes* ferruginei.

**Angustatus. C.** ( l'étoit ) thorace cylindrico cyaneo , elytris testaceis apice nigris. *Mantiss. Carab.* 122.

*Hab.* in Germania. *D. Schneider.*

*Desc.* Parvus , vix hujus generis. *Antennæ* testaceæ , nigræ , basi flavæ. *Caput* magnum , ovatum , atrum , nitidum. *Thorax* elongatus , cylindricus , cyaneus , immaculatus. *Elytra* vix striata , testacea , apice nigra. *Corpus* nigrum. *Pedes* testacei , geniculis nigris.

### *Tenebrio.*

**Culinaris. 3.** *T. Fab.* 15. alatus ferrugineus , elytris striatis , cyaneo emarginato.

**Rostratus. 16.** *T. Fab.* carabus rostratus , apterus , elytris lævibus nigris , thorace angustiore , capite angustissimo.

*Vincent. Petagn. specim. n.* 121.

*Obs.* Singulare hoc insectum rostro attelabum , thorace carabum , elytrorum figura tenebrionem repræsentat.

*Fab.* in Ulteriore Calabria. Prope Massilian lectus. *V.*

**Reflexus. 27.** *T. Desc.* Statura & summa affinitas tenebrionis. *Totus* ater. *Thorax* antice lunatus , lateribus valde marginatus.

*Elytra* connata, striis duabus puncto-  
rum elevatorum & linea laterali valde  
carinata.

Ater. 28. *T. Desc. Thorax* antice rotundatus ;  
postice truncatus. *Elytra* striata.

Glaber. 29. *T. Desc. Minor* ten. *quisquilio*. *Totus*  
ater, glaber, lævissimus.

Lignarius. 30. *T. Desc. Corpus thoraxque* depressa.  
*Caput* latum, planum. Foveæ duæ in  
thorace. *Elytrorum* color variat : in  
aliis obscure violaceus, in aliis rufus.  
In omnibus caput, thorax, pectus  
femoraque *nigra* nitida.

Lardarius. 31. *T. Desc. Vix* pulice major. *Totus* luteo-  
fulvus. *Oculi* nigri. *Antennæ* articulis  
undecim. *Thorax* fere quadratus. *Elytra*  
striis longitudinaliter concavo-punctatis.

Gemellatus. 32. *T. Totus* niger nitidus. *Thorax* lævis.  
*Elytra* striis octo per paria dispositis.

Cupreus. 33. *T. Desc. Niger*, supra æneus. *Thorax*  
punctulatus, convexus, valde margi-  
natus. *Elytra* striis octo punctatis,  
punctulis elongatis.

Villosus. 34. *T. Desc. Totus* castaneus. *Caput* ;  
*thorax*, *elytraque* pilis raris adspersa.

Ferrugineus. 35. *T. Desc. Affinis* præcedenti, sed  
minime villosus. *Antennæ* fere clavi-  
formes.

Ventricosus. 39. *T. Desc. Antennæ* villosulæ. *Caput*  
vertice depresso & complanato. *Thorax*,  
cum capite, punctatus, basi subrotunda

truncatus, latere rotundatus, antice leniter excavatus. *Elytra* punctulata, opaca, latere infuso, coalita, apice deflexa. *Abdomen* fuscus nigro-ceruleum, apice nudo s. ab elytris minime tecto. *Femora* nigra, caeruleo-violacea, subclavata. *Manus* fuscus fuscæscentes.

**Carinatus. T.** ( le carené ) niger, thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus lævibus.

*Forst. Desc. anim.* 78. 6. apterus.

*Vincent. Petagn. specim. n.* 125. t. f. 19.

*Hab. in* Egypto, & in Ulteriore Calabria. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Statura omnino ten. *spinosi*. *Totus* ater. *Thorax* rotundatus, lateribus gibbis. *Elytra* connata, striis tribus carenatis.

**Dermeſtoides. T.** ( le dermeſtoïde ) ater, thorace ovali marginato, elytris striatis. *Mantiff. Teneb.* 14.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo ten. *buprestoides*, at elytra striata. *Pedes* breves, compressi.

**Villosus. T.** ( le velu ) fuscus cinereo-villosus, elytris lævibus ferrugineis. *Mantiff. Teneb.* 18.

*Hab. in* Europæ quisquiliis.

*Desc.* Parvus. *Antennæ* moniliformes, nigrae. *Caput* & *thorax* fusca, cinereo-villosa. *Elytra* lævia, villosa, ferruginea.

**Brunipes. T.** ( le brunipede ) ater, glaber nitidus, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mantiff. Teneb.* 20.

*Hab.* Dresdæ. *D. Heisse.*

*Desc.* Parvus. *Caput* & *thorax* atra, lævia, nitida. *Antennæ* moniliformes, ferrugineæ. *Elytra* striata, nitida, ferruginea, immaculata. *Pedes* ferruginei.

Tubercula- T. ( le tuberculé ) niger, thorace scabro, elytris tuberculato-muricatis. *Mantiss.*  
*Pimelia* 1.

*Hab.* in Europa Australiori. *D. de Slanbusch.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis, at duplo minor. *Thorax* punctis elevatis scaber. *Elytra* punctis elevatis subspinosus muricata.

Acuminatus. T. ( le pointu ) thorace marginato, marginibus antice posticeque spinosis, elytris lævibus carinatis. *Mantiss.*  
*Pimelia* 20.

*Hab.* in Europa Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura & summa affinitas ten. spinosi. *Totus* ater, & *elytra* omnino lævia, glabra, linea unica laterali carinata.

Barbatus. T. ( le barbu ) niger, palpis porrectis pedibusque flavescens. *Mantiss.*  
*Helops.* 5.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino ten. *ferrati*, at duplo minor. *Caput*, *thorax*, *elytra* striata, nigra immaculata. *Antennæ* fuscae, basi apiceque ferrugineæ. *Palpi*, uti in ten. *ferrato*, porrecti, securiformes, flavi. *Pedes* flavi.

Canaliculatus. T. ( le canaliculé ) niger, thorace canaliculato utrinque impresso, elytris striatis, palpis porrectis. *Mantiss.* *Helops.* 6.

*Hall.* 1. 326. tenebrio dubius, alatus niger, thorace fulcato, elytris striatis. *Schall auct.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Schaller.*

*Desc.* Statura omnino ten. *ferrati*, totus niger. *Palpi* porrecti haud *ferrati*. *Thorax* inæqualis in medio canaliculatus, punctis utrinque impressis. *Elytra* elevato-striata. *Pedes* nigri, tarsis piceis.

*Lævis.* T. ( le lisse ) niger, thorace canaliculato, postice attenuato, elytris lævibus. *Mantiss. Helopsf.* 7.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis. *Corpus* nigrum, minime nitidum. *Elytra* haud striata.

*Morio.* T. ( le Morio ) ater, thorace quadrato, lævi, elytris punctato-striatis. *Pimelia* 17.

*Vincent. Petagn. Specim. n.* 124.

*Hab.* in America Boreali & in Ulteriori Calabria.

*Desc.* Affinis ten. *nigritæ*, at paullo major. *Antennæ* apice moniliformes, articulo ultimo longiori ovato. *Thorax* lævis, quadratus, marginibus haud rotundatis, obscurus. *Elytra* punctato-striata, obscura. *Corpus* subtus & *pedes* atra, nitida.

*Ruficollis.* T. ( l'esclave ) ferrugineus, elytris striatis nigris. *Mantiss. Helopsf.* 19.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino ten. *quisquiliæ*. *Caput* obscurum, *antennis* nigris. *Corpus*, & *thorax* lævis, glabra, ferrugineæ, nitida. *Elytra* striata, nigra.



Cyaneus. T. (l'azuré) cæruleus, thorace punctato, elytris striatis. *Maniff. Helopfs.* 21.

*Hab.* Hafniæ. *D. Scheffed.*

*Desc.* Parvus, totus cæruleus, immaculatus. *Thorax* punctatus. *Elytra* striato-punctata. *Pedes* obscuriores.

*Meloe.*

Cichorei. 4. *M. Variat* antennis apice flavis & totis nigris. *D. Vincent. Petagn.*

Monoceros. 10. *M. Fab. notoxus* 2.

Marginatus 13. *M. Desc.* Duplo minor mel. *proscarabæo*. *Caput* nigrum, antennis moniliformibus. *Thorax* niger, margine ferrugineo. *Elytra* abbreviata, lævia, concava, nigra, margine exteriori ferrugineo. *Abdomen* & *pedes* nigra, obscure nitida, immaculata. *Alæ* nullæ.

Nitidulus. 14. *M. Desc.* Minor mel. *vesicatorio*. *Antennæ* moniliformes nigrae. *Caput*, *thorax* viridi-ænea, nitida. *Elytra* testacea, immaculata.

Festivus. 15. *M. Desc.* *Corpus* totum viridi-æneum, immaculatum. *Elytra* testacea, maculis viridi-æneis. Maculae elytrorum variant.

Erythroce- 16. *M. Desc.* *Caput* testaceum, linea media nigra. *Thorax* canaliculatus, linea dorsali lateribusque cinereis. *Elytra* margine, futura lineaque media cinereis.

Pabilis. 17. *M. Desc.* Nimis præcedenti affinis, a quo tamen differt vertice capitis

rufo , immaculato , thorace elytrisquæ  
atris , immaculatis.

Pedicula- 19. *M. Desc.* Alatus niger, *Antennæ* rufo-  
fufcæ , moniliformes , articulis decem.  
*Thorax* non marginatus , cordatus ,  
fuscus , ad elytra ruber. *Pedes* testaceo-  
rufi. *Elytra* nitentia fusca , basi ruben-  
tia , glaberrima , absque striis aut  
punctis.

Syriacus. *M.* ( le Syrien ) alatus viridi - cæruleus ,  
thorace luteo. *Mus. Lud. Ulr.* 102.

*Gron. Zooph.* 620.

*Fab.* lytta 3. viridi - cærulea , thorace  
ferrugineo.

*Hab.* in Europa Australiori frequens.

4-Punctatus. *M.* ( le quadriponctué ) ater , elytris testa-  
ceis , punctis duobus nigris.

*Hab.* in Russia. *Mus. D. Banks.*

*Desc.* *Elytra* testacea , maculis duabus  
dorsalibus nigris.

Collaris. *M.* ( le collier ) ater , vertice , thorace  
pedibusque ferrugineis , elytris cyaneis.

*Mylab. Mantiss.* 3.

*Hab.* in Russia Meridionali. *D. Boeber.*

*Desc.* Magnus. *Antennæ* obscure ferru-  
gineæ. *Caput* nigrum , fronte margine-  
que obscure ferrugineis. *Thorax* obscure  
ferrugineus , margine omni parum nigro.  
*Elytra* cyanea , obscure nitida. *Corpus*  
atrum , pedibus ferrugineis.

*Obs.* Variat magnitudine. *Mas* fœmina  
duplo minor.

Melanurus. *M.* ( le mélanure ) niger , elytris flavis ,  
maculis quatuor apiceque nigris , an-  
tennis clavatis.

*Hab. in Europa.* In Ulteriore Calabria.

*D. Vincent. Petagn. n. 136. t. f. XIII.*

*Desc.* Simillimus, sed major mel. *cichorei*, a quo differt maculis elytrorum; duæ enim majores ad basin elytri: duæ fere in medio, quarum futuræ proxima conjuncta cum alia alterius elytri apparet, ut unicam latam maculam constituat. Apices elytrorum, fascia nigra undulata. *Alæ* fuscae, apicibus nigris.

*Obs.* Affinis videtur mel. 8. *Maculato*. V.

**Austriacus.** M. ( l'Autrichien ) niger, thorace rubro, elytris viridibus.

*Hab.* Viennæ.

*Desc.* Habitus mel. *vesicatorii*, quem magnitudine haud multum superat. *Thorax* ruber, in medio sulco longitudinali exaratus. *Elytra* mollia, flexilia, saturate viridia, prati umbrosi instar. *Alæ* fuliginosæ. *Abdomen* nigrum, violascens; sub elytris utrinque supra linea fulva longitudinalis, ad anum non pertingens. Cæterum insectum totum lana tenui molli brevi tectum, fere ut mel. *cichorei*.

### *Mordella.*

**Abdominalis.** 7. M. *Desc.* Caput, pectus, elytra, spina analis, pedes, atra. Thorax & abdomen fulva, immaculata, nitida.

*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 15.*

**Fusca.** 9. M. *Desc.* Fusca. Caput, thorax, elytra, flavicant, elytra tamen multo obscuriora & fere fusca. Pedes & antennarum bases flavi coloris. Oculi nigri. An varietas mord. thoracica?

2-Maculata. M. ( la bimaculée ) ferruginea , pectore atro , elytris testaceis , macula nigra.

*Hab. in Hungaria. D. Saldoner.*

*Desc.* Magna. *Caput* magnum , transversum , ferrugineum , ore atro. *Antennæ* pectinatae , maris imprimis , radiis complicatis clavam simulant. *Thorax* gibbus ferrugineus. *Elytra* testacea , macula magna ante apicem nigra. *Pedus* atrum. *Abdomen* brevissimum , gibbum , ferrugineum , ano obtuso fere truncato , margine prominulo. *Pedes* ferruginei , geniculis nigris. Color maris obscurior.

*Staphylinus.*

Hirtus. 1. *S. Sulz. hist. inf. t. 7. f. 16.*

Maxillofus. 3. *S. Obs. synonymia D. F. 3. deleatur ; nostram enim observationem confirmavit D. Fab. in nova Mantiss. n. 4. V.*

Brunnipes. 27. *S. ( le brunipede ) Desc. Statura & magnitudo staph. politi. Antennæ* nigrae , articulo primo & ultimis duobus ferrugineis. *Caput & thorax* atra , nitida , oculis albis. *Elytra & abdomen* atra , at obscuriora. *Pedes* rufi.

Marginatus. 28. *S. Desc. Statura & magnitudo staph. politi , at paullo minor. Totus* ater , glaber , nitens , at *thoracis latera & pedes omnes* flavescunt.

Clavicornis. 29. *S. Fab. 14. Desc. Statura & magnitudo omnino staph. 2-guttati. Antennæ* moniliformes crassiores. *Thorax* rotundatus , ater , nitens lævis. *Elytra* vix punctata , atra , immaculata. *Abdomen & pedes* atra.

**Hypnorum.** 30. *S. Desc.* Statura staph. *fuscipedis*, at paullo minor, ater, glaber, lævis, nitens. *Thoracis* latera, imprimis basi, testacea. *Elytra* testacea, immaculata, *scutello* tamen nigro.

**Nitidulus.** 31. *S. Desc.* Duplo minor præcedenti. *Antennæ* nigrae, basi flavescentes. *Caput* & *thorax* glabra, atra, margine flavescente. *Elytra* testacea, margine nigro. *Pedes* flavescentes.

**Merdarius.** 32. *S. Desc.* Parvus. *Antennæ* ferrugineae, apice fuscæ. *Caput* atrum. *Thorax* rufus. *Scutellum* nigrum. *Elytra* rufa. *Abdomen* nigrum.

**Atricapillus.** 33. *S. Desc.* Parvus. *Antennæ* extrorsum crassiores apice fuscæ, ultimo articulo ferrugineo. *Caput* atrum nitidum. *Thorax* rufus, glaber, immaculatus. *Elytra* fusca, puncto baseos margineque postico albis. *Abdomen* ferrugineum, apice fuscum.

**Marginellus.** 34. *S. Desc.* Medius. *Caput*, *thorax*, *abdomen*, *pedes*, atra, immaculata, obscura, vix punctata. *Elytra* atra, at margine laterali & postico obscure ferrugineo.

**Rugosus.** 35. *S. Desc.* valde affinis staph. *piceo*, at paullo major. *Totus* niger. *Caput* planum. *Thorax* depressus, longitudinaliter rugosus. *Elytra* rugosa, nigra. *Pedes* nigri.

*Obs.* Variat elytris testaceis.

**Thoracicus.** 36. *S. Desc.* minor. *Antennæ* monilliformes, extrorsum crassiores, basi pallidæ, apice

nigræ. *Caput* atrum nitidum. *Thorax* rufus nitidus. *Elytra* fusca, basi albida, margine tamen crassiori fusco. *Abdominis* segmenta picea vel potius basi nigra, apice rufescentia. *Pedes* flavescentes.

[Pygmæus. 37. *S. Desc.* Affinis præcedenti, at minor. *Caput* atrum, nitidum. *Thorax* obscure pallidus. *Elytra* pallida, margine crassiori fusco. *Abdomen* magis nigrum.

Major. 38. *S. Desc.* Totus niger. *Thorax* convexiusculus. *Maxillæ* magnæ, duræ. *Abdomen* lateraliter villosulum.

*Fab. staph. olens* niger opacus immaculatus, capite thorace latiore.

*Raj. inf.* 109. 1.

Cærulef- 39. *S. Desc.* *Caput*, *thorax*, *elytra* punctulata, cærulescentia. *Antennæ*, *pedes* & *abdomen* nigra.

Macroly- 40. *S. Desc.* Fuscescenti-niger. *Antennæ* tron. tenues. *Caput* depresso. *Thorax* rotundatus. *Elytra* longa, subtilissime punctulata.

Chrysoce- 41. *S. Desc.* *Caput* luteum, *oculis* nigris. *Antennæ* *maxillæ*que nigricantes. *Thorax* *elytra*que obscure nigra, punctis latis impressis. *Scutellum* macula nigra cordiformi. *Abdomen* pilis rufis supra argenteo-griseis vestitum.

Flavopte- 42. *S. Desc.* *Palpi* *antennæ*que rufescentia. *Caput* & *thorax* obscure nigra. *Elytra* rufescentia. *Abdomen* nigrum, maculis duabus



duabus lateralibus e pilis auratis, singula ad singulum latus. *Scutellum* nigrum.

**Fulvopte-** 43. *S. Desc.* Antennæ, pedes, elytra, *castanea*. Caput thoraxque *polito-nigra*. *Elytra* punctulata. *Abdomen* fusconigrum.

**Brachypete-** 44. *S. Desc.* Antennæ crassæ breves. *Thorax* latus ad lentem, uti elytra, punctulatus. *Elytra* pedesque fusca. Cæterum nigrum.

**Punctatus.** 46. *S. Desc.* Totus niger, exceptis antennis fulvis. Caput, thorax, elytra ad lentem punctulata fuscoque maculata.

**Æneus.** 47. *S. Desc.* Niger nitidus. *Thorax* punctis decem impressis, oculo nudo minime conspicuis. *Elytra* ænea ad lentem punctulata.

**Maculatus.** 48. *S. Desc.* Caput nigrum. *Thorax* lateraliter luteo marginatus. *Elytra* nigra, macula lutea elongata.

**Æneocephalus.** 58. *S. Desc.* staph. *polito* minor. Antennæ fuscae, basi rufæ. Caput thoraxque ænea, nitida villosula. *Elytra* & *abdomen* obscure nigra, itidem villosula. *Femora* nigra, *tibiis tarsisque* pilis rufescentibus tectis.

**Æneus.** 59. *S.* An varietas staph. *ænei*. *D. Geoff.*

**Nitens.** 60. *S. Desc.* *Thorax* mei speciminis gerit puncta excavata majora quinque, innumera minora.

**Domicella. 61.** *S. Desc.* Niger. *Antennæ* breviusculæ extrorsum crassiores, fuscæ, basi nigræ. *Thorax* obscure castaneus, obtrusus capuciformis, leviter depresso. *Elytra* brevia, obscure castanea. Hinc habitus infecti, qui domicellæ modestioris palliolum, tali forte colore præditum, gestantis. *Abdomen* prope elytra castaneum, dein nigrum; *subtus* nitens castaneum usque ad partem abdominis, quæ supra nigra, hæc enim & *subtus* nigra. *Pedes* nigri.

**Blattinus. 63.** *S. Desc.* Habitus *blattæ lucifugæ* & *thorax* ita latus, marginatus, margine tamen non reflexo. Ater nitens glaber. *Thorax* lateribus pallide testaceus, lævissimus. *Elytra* fusco-castanea, lævissima, nitidissima, uti *thorax*, margine exteriori ad basin nigro. *Abdomen* nigrum, pilosum. *Pedes* lucide testacei.

**Martialis. 64.** *S. Desc.* Caput nigrum. *Palpi antennæ* que ferrugineæ. *Thorax* niger, margine exteriori & ad marginem posticum testudineo-ruber. *Elytra* obscure ferruginea, margine externo nigro. *Abdomen* nigrum, pilosulum. *Pedes* testaceo-rubri.

**Eraflicæ. 68.** *S. Desc.* *Antennæ* extrorsum crassiores; villosæ. *Elytra* punctata.

**Arnica. 69.** *S. Desc.* *Palpi* pedibus testaceis concoloris. *Antennæ* thorace duplo longiores, articulis decem apice truncatis, ultimo ovato. *Alæ* hyalinæ.

**Hellebori. 70.** *S. Desc.* Magnitudo pediculi. *Antennæ*

extrorsum crassiores. *Thorax* & *elytra* punctata.

**Dilatatus. S.** ( le dilaté ) thorace marginato atro nitidulo , *elytris* fuscis , *antennis* ferratis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *Prof. Leske.*

*Desc.* Major staph. *erythroptero*. *Antennæ* nigrae , valde ferratae & pilosae. *Caput* atrum , læve , immaculatum , *maxillis* forcipatis. *Thorax* lateribus posticeque valde marginatus , ater , margine præfertim variis coloribus nitidulo. *Elytra* fusca. *Abdomen* atrum. *Pedes* nigri , *tarsis anticis* brevibus dilatato-pilosis.

**Nitidus. S.** ( le luisant ) ater nitidus , *elytris* testaceis.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura & magnitudo staph. *politi* & forte ejus mera varietas. *Corpus* totum atrum , nitidum , *solis elytris* testaceis.

**Fulgidus. S.** ( le brillant ) ater nitidus , *elytris* plantisque testaceis , capite punctulato.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis , at distinctus statura tenuiore , capite majore , punctis plurimis impressis plantisque testaceis.

**Analus. S.** ( le bicolor ) ater nitidus , *antennis* , *elytris* , ano pedibusque testaceis.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Major staph. 2-pustulato. *Caput* & *thorax* atra , nitida immaculata. *Elytra* lævia , nitida , testacea , immaculata. *Abdomen* atrum , ano testaceo. *Antennæ* & *pedes* testacei.

**Canalicula-** S. ( le canaliculé ) flavus , capite abdominisque cingulo atris , thorace canaliculato.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum , *antennis* basi flavis. *Thorax* gibbus , canaliculatus , immaculatus. *Abdomen* planum , flavum , ante apicem cingulo atro. *Pedes* flavi.

**Tricolor.** S. ( le tricolor ) ater , *antennis* thoraceque rufis , *elytris* pedibusque testaceis.

*Hab.* in Daniæ boletis. *D. de Schestedt.*

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum , nitidum , *antennis* obscure rufis. *Thorax* rufus ; nitidus , immaculatus. *Elytra* testacea , immaculata. *Abdomen* nigrum. *Pedes* testacei.

**Melanocephalus.** S. ( le mélanocéphale ) ferrugineus ; capite atro.

*Hab.* in Suecia. *D. Pay. Kull.*

*Desc.* Minutus. *Totus* ferrugineus , solo capite atro immaculato.

**Analus.** S. ( le tacheté ) flavus , *elytris* basi anoque atris. *Mantiss. Oxyporus.* 2.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus. *Antennæ* flavæ , apice fuscescentes. *Caput* & *thorax* flava , nitida , immaculata. *Elytra* flava , basi atra. *Pectus* atrum. *Abdomen* flavum , apice atrum. *Pedes* flavi.

**Abdominalis.** S. ( l'abdominal ) rufus , abdomine atro nitido.

*Sp. inf. app.*

*Hab.* in Norwagia. *D. Lund.*

*Desc.* Reliquis paullo minor. *Corpus* totum rufum. *Abdomine* solo atro , nitido.

*Forficula.*

2-Punctata. 4. F. Desc. *Antennæ* articulis II nigris. *Caput* nigrum, postice rufum. *Thorax* marginatus niger, margine rufo. *Elytra* nigra, macula magna versus futuram albida margineque pallescente. *Abdomen* nigrum. *Forceps* acuta, recta.

Gigantea. F. ( le géant ) pallida, supra nigro variegata, ano bidentato, forcipe porrecta unidentata. *Mantiss.* 2.

*Hab.* in Europa Australiori.

*Obs.* Simillima nostræ forficulæ maximæ; ut patebit ex descriptione D. Fab. V.

*Desc.* Gigas in hoc genere. *Antennæ* multiarticulatæ, pallidæ. *Caput* pallidum, *oculis* nigris. *Thoracis clypeus* planus, quadratus, niger, margine lineaque dorsali nigra. *Pectus* pallidum. *Abdomen* nigrum, ultimo segmento pallido, dentibus duobus validis fuscis; subtus latera pallida. *Forceps* porrecta, pallida, dente pone medio apicibusque fuscis. *Pedes* pallidi.

## H E M I P T E R A.

*Mantis.*

Pagana. 4. M. *Obs.* Delenda hæc species; in nova enim *Mantissa* synonymiam agnovit D. Fab. Dubium legitimum fuit; fasciculi enim D. Pallas tunc ignoti erant ipseque clariss. Fab. raphidiam *mantispa* & mantem *paganam* ad diversa genera retulerat. Errorem suspicatus fueram, ut patet ex his verbis, an hæc species propria? An *raphidia mantispa* Linnæi? Sed hodiernorum Entomologorum prin-

cipis fide , nodum solvere non ausus fueram. E genere *raphidia* ad genus *mantis* transtulit *Illust. Fab.* An instrumentorum cibariorum inspectio hanc mutationem rite probat ? V.

- Sancta. M. ( la sainte ) thorace ferrato , viridiflavescens , elytris viridibus immaculatis , alis subhyalinis. *Mantiss.* 23.  
 — Hab. in Gallia Australiore. *D. de Slanbusch.*  
 — Desc. Statura omnino mant. *oratoria* , at triplo minor. *Caput* , *thorax* , *abdomen* , viridiflavescens , immaculata. *Elytra* viridia , immaculata. *Ala* subhyalina , apice virescentes. *Pedes* flavescens , *tibiis anticis* subtus punctis duobus atris.

### Gryllus.

- Laxmanni. 27. G. T. Desc. *Ala* in *femina* omnino nullæ , in *mare* duæ parvulæ reticulatæ , fuscae , margine crassiore versus basin pallidæ , sub scuto *thoracis* porrecto latentes.
- Rufo-margi-31. G. L. Desc. Viridis. *Antennæ* setaceæ fuscae. *Oculi* brunnei. *Thorax* lineis tribus longitudinalibus elevatis. *Elytra* viridia , postice fusco-pallida , margine exteriori pallido.
- Rufo-termi-32. G. L. Desc. Præcedenti minor, obscure viridis. *Antennæ* fuscae , setaceæ , corporis dimidium æquant. *Elytra* antice viridia , postice nigricante-fusca. *Thorax* lineis duabus nigris. *Abdominis* latera maculis nigris.
- Lineola. 33. G. L. Desc. Magnitudo gryll. *migræ*



*torii. Caput fuscum, fulcatum. Thorax segmentis tribus carinatus, fuscus, carina rufa. Elytra grisea. Alæ albæ fusco reticulatæ. Femora postica linea interiori sanguinea, tibiis cæruleis adpersis spinis albis apice atris.*

Germanicus. 34. G. L. *Ræf. inf. 2. gryll. t. 21. f. 7.*  
*Desc. Corpus majus gryll. italico. Thorax subcarinatus, testaceus. Elytra testacea, fusco-maculata. Femora posticæ transversim striata, nigroque punctata, maculaque semilunari atra utrinque ad apicem. Tibiæ sanguinæ.*

Thalassinus. 35. G. L. *Desc. Caput viride, ore oculisque fuscis. Thorax lævis, viridis, antice utrinque macula magna fusca. Elytra grisea, costa baseos viridi. Femora postica viridia, fusco maculata. Tibiæ sanguinæ.*

Cineraescens. 36. G. L. *Desc. Affinis gryll. flavo, at duplo major. Frons virescens, ore ferrugineo. Thorax carinatus, fuscus. Elytra fuscescentia, albo punctata apice cinerea. Alæ basi flavescentes, apice late cineræ. Tibiæ posticæ rufæ.*

Lunatus. 37. G. L. *Ræf. Loc. t. 20. f. 6. 7.*  
*Desc. Variat 1°. Capite (excepta nucha), thoracis lateribus pedibusque subrubris, elytro margine interiore viridi, alibi fusco-nebuloso, alis fuscescentibus. 2°. corpore fusco, abdomine subtus viridi-flavo, elytris superne obscurioribus introrsum albidis, alis pallidioribus.*

Pellucens. 38. G. L. *Desc. Oculi nigri. Antennæ*  
 Aa iv,

corpore longiores, albidæ. *Palpi* albi, tribus articulis. *Thorax* longitudine capitis. *Alæ* corpore paullo longiores, albæ. *Pedes* albidî, subpellucidi. *Cornicula* caudæ alba.

Vesperî & tota nocte clamat, sub folio latet, adventantes observat, ad minimum strepitum tacet.

Ephippiger. G. T. ( le porte-selle ) thorace postice clavato, elytris brevissimis fornicatis. *Mantiss. Loc. 32.*

*Ad. Berol. 1784. tab. 3. fig. 6.-8. gryllus ephippiger.*

*Hab. in Europæ Australioris pratis.*

*Desc. Magnus. Antennæ* corpore triplo longiores. *Caput* viride, postice griseum. *Thorax* rotundatus, griseus, lateribus flavescens. Margo posticus dilatatus, elevatus, *elytra* abbreviata, fornicata, cinerea fere tegens. *Abdomen* cylindricum, nigrum, ense recurvo apice flavescens. *Pedes* fusci, *femoribus* subtus flavis.

Pedestris. G. T. ( le piéton ) thorace lævi postice rotundato, elytris brevissimis apice capiteque albidis. *Mantiss. Loc. 34.*

*Hab. in Italia. Dr. Allioni.*

*Desc. Statura* præcedentis. *Antennæ* fætae vix corporis longitudine, fuscae, basi pallidæ. *Caput* albidum. *Thorax* fuscus, lateribus antice albidis, postice elongatus, rotundatus. *Elytra* brevissima, fusca, apice albida. *Abdomen* fuscum, lineis duabus dorsalibus punctorum ferrugineorum. *Pedes* grisei, *genuibus* posticis nigris.

An potius mera puppa, quum nostra omnino absque ense?

**Cisti. G. L.** ( du ciste ) thorace scabro, crista bifida, alis rubris, fascia nigra, femoribus posticis canaliculatis. *Mantiss. Gryll.* 29.

*Hab. in cisto Halimifolio. D. Vahl.*

*Desc.* Paullo major gryll. *stridulo. Antennæ* flavescences. *Caput* nigrum, fusco varium, basi albidum. *Thorax* fusco cinereoque varius, punctis elevatis subspinosis scaber, linea dorsali antice cristata crista bifida, postice carinata. *Elytra* fusco cinereoque varia. *Alæ* basi rubræ. *Femora postica* incrassata, extus variegata, subtus canaliculata, intus flavescencia, macula magna baseos atra lateribusque sanguineis. *Tibiæ* sanguineæ.

### *Fulgora.*

**Minuta. F.** ( la petite ) fronte conica, capite thoraceque flavescens, linea dorsali, elytris albidis. *Mantiss.* 20.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Parva statura cicadæ, at omnino hujus generis. *Antennæ* breves, crassæ, extrorsum crassiores. *Corpus* totum flavescens, linea capitis thoracisque dorsali alba. *Elytra* pallida.

### *Cicada.*

**Gibbosa. 33. C.** *Desc.* Fusca cum coloris viridis mixtura. *Caput* crassum. *Oculi* prominenti. *Alæ* reticulatæ, basi gibbosæ s. dilatatæ versus marginem anteriorem, dein in medio elevatæ, sed a lateribus versus apicem angustæ.

**Pallida. 34. C.** *Desc.* Pallide flava. *Thorax* antice punctis sex excavatis, per paria dispo-

fitis. *Alæ* membranaceæ, basi obscure fusca. *Pedes* nigri. *Tota* supra punctulata.

Regalis. 35. *C. Desc.* Fusco-lutea. *Caput* thoraxque fascia lutea sinuata.

Membrana- 36. *C. Desc.* *Caput* latum depressum, supra  
cea. pallidum. *Thorax* brevis, pallide fulvus, punctis duobus nigris antice. *Scutellum* maculis duabus triangularibus nigris. *Elytra* diaphana, postice venis fulvescentibus. *Corpus* subtus pedesque fulvescentia.

Variegata. 37. *C. D. Desc.* *Thorax* immaculatus. *Scutellum* transverse sulcatum. *Elytra* maculis duabus albidis.

Venosa. 38. *C. D. Desc.* Præcedente minor. *Tota* fusca. *Corpus* subtus pedesque fusca, luteo variegata. *Elytra* nervis albis.

Fasciolata. 39. *C. D. Desc.* *Thorax* fascia lata fulvo-lutea. *Elytra* fascia pallidior transversa in medio.

Trifasciata. 40. *C. D. Desc.* *Caput* luteo-fuscum. *Thorax* capiti concolor, fascia transversa punctorum nigrorum in medio interrupta. *Scutellum* punctis duobus nigris maculisque duabus albis. *Elytra* alba, fasciis duabus transversis fuscis, tertia terminali.

Transversa- 41. *C. D. Desc.* lutea. *Oculi* nigri. *Elytra*  
lis. viridesciente - lutea, fasciis duabus transversis fuscis.

Cæca. 42. *C. D. Desc.* Pallide lutea. *Oculi* nigricantes. *Abdomen* supra, oculis concolor.

**Flammigera. 43.** C. D. *Desc.* *Tota* sulphurea. *Caput thoraxque* linea longitudinali rubra. *Elytrum* singulum, fascia flexuosa rubra. *Alæ* albæ, opalææ.

**Carpini. 44.** C. D. *Desc.* *Caput* viridi - lutescens; maculis duabus nigris. *Thorax*, qui capiti concolor, maculis duabus nigris lateralibus. *Scutellum* punctis duobus nigris quadratis. *Elytrum* singulum, maculis tribus nigris in triangulum positis, apice fuscum. *Abdomen* subtus nigrum. *Pedes* lutei.

*Obs.* Variat capite thoraceque nigris.

**Geographica. 45.** C. D. *Desc.* *Caput* luteum, punctis tribus nigris, tertio postico crassiore. *Thorax* antice maculis quatuor nigris coeuntibus cum macula magna nigra postica. *Scutellum* maculis duabus nigris. *Elytra* punctis duobus nigris in medio plurimisque maculis ovalibus. *Abdomen* fuscum. *Pedes* pallide virides.

**Spumaria- 51.** C. D. *Desc.* *Caput thoraxque* viridescente-grisea. *Oculi* nigri, *stematibus* roseis. *Corpus* subtus obscure fuscum. *Alæ superiores* viridescente - griseæ, *inferiores* diaphanæ. *Pedes* ochracei.

**Undata. 52.** C. D. *Desc.* *Corpus* citrinum. *Thorax* supra fuscus. *Alæ superiores* citrinæ, striga interiori fusca, sinuata, quæ, alis clausis, unicam fasciam format.

**Biguttata. 53.** C. D. *Desc.* *Statura* parva præcedentis. *Caput* nigrum, punctis aliquot flavis. *Thorax* niger, margine antico flavo. *Elytra* lævia fusca, puncto albo versus posteriora. *Abdomen* atrum, ano ruf.

- Turca. 54.** C. D. *Desc.* Gigas in hoc genere.  
*Caput* atrum, *antennis* crassis, ferrugineis. *Thorax* ater, *scutello* carinato, acuto. *Abdomen* flavescens supra, basi atra. *Elytra* coriacea, nervosa, atra, apice fusca, punctis aliquot minutissimis albis. *Alæ* atræ, basi maculis tribus ferrugineis, apice fuscæ, lunula magna hyalina. *Pedes* nigri, *femoribus* posticis flavis.
- Serratulæ. 55.** C. D. *Desc.* Parva. *Caput* flavum, puncto verticali nigro. *Scutellum* margine nigro. *Elytra* albida, puncto baseos fasciisque duabus apicis nigris.
- Fulgida. 56.** C. D. *Desc.* Parva, flava. *Thorax* fuscus. *Elytra* fusco-aurata, margine flavescente. Macula communis dorsalis albida in medio.
- Quercus. 57.** C. D. *Desc.* Minuta. *Caput* & *thorax* flavescencia, *oculis* nigris. *Elytra* itidem flavescencia, maculis quatuor oblongis sanguineis. Apex macula magna dentata fusca. *Alæ* albæ.
- Gibba. 59.** C. D. *Desc.* *Thorax* postice emarginatus. *Scutellum* acutum.
- Unifasciata. 60.** C. D. *Desc.* Major præcedenti. *Corpus* cinereum, fascia elytrorum obliqua fusca pone medium. *Abdomen* supra atrum.
- Muscæfor- 61.** C. D. *Desc.* *Caput* brevissimum, elevatius, fronte quadrata, si supra inspiciatur, fere habitu capitis muscæ. *Os*, seu capitis pars inferior, angulatum, utrinque nempe ad angulos



rectos sectum, & carina in medio; lineæ laterales transversæ nullæ; ante rostri apophysin fascia flava, ipsa apophysi rufo-fusca rostro cinereo, apice nigro. *Thorax* brevissimus, albidus, in medio punctulis duobus majusculis excavatis. *Elytra* obscure cinerea, basi fasciaque alba; sed fascia, antequam in singulo elytro marginem interiorem attingat, nonnihil de candore amittit. Regio inter basin fasciamque dictam nigra, fasciaque post albam nigra angustior. *Alæ* valde fuliginosæ.

Quadrima- 64. C. D. *Desc.* Color totius flavescens; seu flavo-ferrugineus, præter maculas albas in elytris, oculos nigras, punctaque duo minuta nigra in fronte. Non est tamen cicada *populi* Linn. cum qua quidem multum convenit.

Hæmorrhœa. 67. C. D. *Desc.* Sæpe macula unica fulva in medio thoracis, plerumque duæ, hinc una inde altera. Nonnunquam una in medio, sed *thoracis* lateribus rubescentibus. Sæpe *elytra* apicem versus testudineo-rufa, subinde apice elytris concolore, sæpius tantum testaceo maculato. Cætera *totum* animal aterrimum.

Lineata. C. (la rongée) pallida, capite thoraceque nigro punctatis, elytris lineatis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura omnino cic. interruptæ.

*Caput* & *thorax* pallida, punctis plurimis sparsis nigris. *Elytra* pallida, lineis varie anastomosantibus nigris. *Pedes* pallidi, *femoribus* fascia nigra.

**Abbreviata.** C. ( la courbe ) flavescens , elytris cinereis , vitta abbreviata atra.

*Hab.* Hafniæ. *D.* Lund.

*Desc.* Statura præcedentis. *Caput & thorax* flavescencia , immaculata. *Elytra* cinerea , vitta fere marginali a basi ultra medium ducta margineque anguli ani atris. *Abdomen pedusque* disco atro. *Pedes* flavescences.

**Striata.** C. ( la striée ) nigra , capite fasciis duabus flavis , elytris albo striatis.

*Hab.* in Kiliæ plantis.

*Desc.* Statura cic. *viridis*. *Caput* subtus flavum , supra nigrum , fasciis duabus flavis , altera ante apicem , altera bascos. *Elytra* nigra , striis plurimis albis. *Corpus* nigrum. *Pedes* flavescences.

**Maculata.** C. ( la tachetée ) grisea , elytris punctis apiceque fuscis , alis albis apice fuscis.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* Statura & magnitudo cic. *rosæ*. *Caput & thorax* grisea immaculata. *Elytra* grisea fusco maculata apiceque fusca , nervis albo nigroque punctatis. *Alæ* albæ immaculatæ , apice fuscescentes. *Abdomen* atrum , corniculo parvo inflexo caudaque bifida sub ano inserta. *Pedes* flavi.

**Nitidula.** C. ( la brillante ) elytris pallide auratis albo nigroque punctatis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Parva. *Rostrum* nigrum , lineola media flavescence. *Caput* flavum , punctis quatuor atris in medio. *Thorax* antice flavescens , postice fuscescens. *Scutellum* flavum. *Elytra* pallide aurea ,

punctis aliquot albis nigrisque, imprimis ad margines.

**Fasciata. C.** ( la fasciée ) flavescens, elytris obscuris, fascia maculisque duabus oppositis albidis. Cercopis 18 *Mantiss.*

*Hab.* Kiliæ. *D.* Daldorf.

*Desc.* Statura & magnitudo cic. *biguttatæ*.

*Caput*, *thorax*, *scutellum*, *pedes* flavescencia. *Abdomen* atrum. *Elytra* obscura, fascia media maculisque duabus pone fasciam marginalibus oppositis flavis. *Alæ* hyalinæ.

### Cimex.

**Semipunctatus. 7. C.** *Desc.* *Caput* acuminatum, flavum; lineis duabus marginalibus nigris, quæ tamen apicem haud attingunt. *Thorax* rotundatus, flavus, punctis decem nigris 4, 4, 2. Lineola parva nigra utrinque ad basin. *Scutellum* magnum flavum, lineis quatuor nigris lateralibus abbreviatis. *Subtus* flavus nigropunctatus. An species? An cic. *lineati* varietas?

*Stoll. cimic. t. II. f. 8.*

**Pedemontanus. 8. C.** *Desc.* Paulo minor cim. *grammico*. *Caput* obscure fuscum immaculatum. *Thorax* & *scutellum* fusca, atomis sive punctis parvis numerosissimis sparsis albis. *Pedes* nigri.

**Litura. 9. C.** *Desc.* Statura & summa affinitas cim. *fuliginosi*, at *scutellum* lineolis s. lituris tribus albis, quarum posterior solitaria brevior.

**Hottentotta. 10. C.** *Desc.* Major cim. *mauro* & latior;

distinguitur facillime colore toto obscure ferrugineo, minime nitido.

- Albo-lineatus.** 11. *C. Desc. Minor. Caput* griseum, striis media albida. *Thorax* griseus, striis quinque fere obsoletis, imprimis intermediis duabus. *Scutellum* griseum, striis quinque marginibusque albis. *Abdomen* fuscum, margine griseo, punctis aliquot albis.
- Secalinus.** 12. *C. Desc. Fuliginosus. Abdomen* marginis nigrum.
- Cappatus.** 13. *C. Desc. Niger*, punctatus.
- Serratulæ.** 23. *C. Desc. Parvus. Antennæ* triarticulatæ, filiformes. *Caput & thorax* atra. *Elytra* pallida, punctis duobus nigris. *Alæ* albæ, apice fuscæ. *Pedes* rufescentes.
- Lævis.** 24. *C. Desc. Statura cim. corticalis*, at duplo minor. *Caput & thorax* nigra, immaculata. *Abdomen* brunneum, margine integro. *Alæ* angustæ, pallidiores.
- Crassipes.** 25. *C. (la crassipede) Desc. Affinis videtur cim. eroso* Linnæi. *Antennæ* flavæ, clavatæ. *Caput* fuscum, apice fissum. *Thorax* niger, scaber. *Elytra* fusca, alis pallidis. *Abdomen* postice dilatatum, marginatum, acutum, basi nigrum, margine albo, apice flavescens. *Pedes* flavi, tibiis anticis incrassatis.
- Umbraculata.** 26. *C. (l'ombragée) Desc. Magnitudo præcedentis. Caput* marginatum, ferrugineum, ore flavescens. *Thorax* marginatus, ferrugineus, puncto marginali albo. *Scutellum* ferrugineum, apice

apice album. *Elytra* immaculata. Margo *abdominis* albo nigroque varius. *Abdomen* subtus flavescens, maculis baseos utrinque duabus & anali solitaria.

Chelifer. 27. *C. Desc.* Fuscus. *Caput* parvum. *Antennarum* articulus ultimus fere clavatus. *Thorax* latus, marginibus reflexis, postice latior, fulcis quinque. *Pedes* *antici* brevès, apice cheliformes.

Appendiceus. 28. *C. Desc.* *Caput* parvum albidum, vel fuscum. *Thorax* alis tribus magnis, elevatis, albis, fusco-reticulatis; lateralibus compressis carinatis, acutis; intermedia glòbosa, brevior. *Scutellum* elevatum, foliaceum, acutum, album, macula fusca baseos. *Elytra* reticulata; alba; fusco maculata; basi gibba. *Pedes* albi.

Fimbriatus. 37. *C. Desc.* *Thorax* scaber, marginibus spinosis, fimbriatis. *Pedes*, imprimis *femora*, spinosa.

Sanguineus. 39. *C. Desc.* Statura omnino cim. *grisei*. *Antennæ* nigræ, articulo ultimo basi pallido. *Caput* & *thorax* obtuse spinosus, fusca, immaculata. *Scutellum* fuscum, macula fusca utrinque ad basin flava, apiceque album. *Abdomen* subtus flavum, fusco maculatum, margine albo nigroque vario. *Pedes* rufi.

Luridus. 40. *C. Desc.* Major cim. *baccarum*. *Antennæ* fuscæ, articulo penultimo apice albo. *Caput* virens, apice late emarginatum. *Thorax* obtuse spinosus, virens, dorso griseo. *Scutellum* basi virens, apice griseum. *Elytra* grisea,

macula fusca posticeque terminantur puncto albo. *Abdominis* margo nigro rufoque varius. *Subtus* flavescens, nigro punctatus.

*Nigricornis* 41. C. ( la nigricorne ) *Desc.* *Antennæ* nigræ. *Corpus* mox ferrugineum, mox griseum, *spinis thoracis* semper nigris. *Pedes* pallidi.

*Albipes* 42. C. ( l'albipede ) *Desc.* *Statura* præcedentis. *Corpus* supra nigricans, obscurum, *subtus* pallidum. *Antennæ* albo nigroque variæ. *Thoracis* margo albidus. *Scutellum* apice album. *Abdominis* margo albo nigroque varius. *Pedes* pallidi.

*Spiniger*. 43. C. *Desc.* *Statura* omnino cim. *marginati*, at duplo minor. *Antennæ* rufæ, primo articulo apice spinoso cinereo, ultimo nigro. *Caput* cinereum, antice *spinis* utrinque duabus erectis, acutis. *Thorax* griseo-fuscus, margine elevato in spinam obtusam postice emarginatam vel potius bidentatam. *Scutellum* griseum, apice puncto albo. *Elytra* grisea basi albida. *Alæ* fuscæ. *Abdomen* griseum, margine prominente acuto albo maculato.

*Quadratus*. 44. C. *Stoll. cim. 2. t. 5. f. 36.*  
*Desc.* *Antennæ* basi cinereæ, medio rufæ, apice fuscæ. *Thorax* obtuse spinosus, scaber, fuscus, margine albicante. *Abdomen* depressum, planum, fuscum, utrinque angulatum, *subtus* flavescens.

*Dentatus*. 45. C. *Desc.* *Supra* fusco-cinereo-æneus. *Antennæ* nigræ, articulis quatuor,



tertio a medio ad apicem albo. *Caput* ad lentem viridi-æneum, manifeste bilobum. *Thorax* obtuse angulatus, lateribus anticis ferratis. *Elytra*, quæ parte coleoptrata sunt, longitudine fere abdominis, at una cum appendiculis alæformibus abdomine longiora. Infra lividus, nigro punctatus.

**Bilobus.** 46. *C. Desc.* Priori simillimus, nisi quod supra e rubro fuscescens, nec æneus. *Antennæ* vero rufæ, non annulatæ; uti prioris.

*Obs.* Posset esse cimex *bidens* *Linnaei*.

**Pudicus.** 48. *C. Desc.* *Antennæ* nigræ; articulis quinque. *Caput* rubrum, lineis duabus longitudinalibus exaratum, margine utroque laterali nigrum. *Oculi* fusci; *stigmata* intra hos rufo fusca. *Thorax* ruber, utrinque angulis tumidiusculis exsertis. *Scutellum* rubrum; apice pallidius. *Elytra* rubra; appendices alæformes hyalinæ. *Abdomen* supra nigrum, marginibus citrino variegatis, ano emarginato. *Subtus* virescentiflavus. *Pedes* rufi. *Supra totus* omnibus partibus punctatus.

**Laciniatus.** 49. *C. Obs.* *D. Sparrman* cimex *paradoxus* valde nostræ affinis & forsan mera variatas. Conf.

*Desc. Ad. Suec.* 1777 optima. Nostra emendanda.

*Desc.* Forte hoc cimice insectum non singularius. *Alæ*, *thorax* *abdomenque* laciniata, laciniis in parte superiore fuscis, in inferiore albis, spinis numerosissimis dense adpersa. *Antennæ* spinosæ. *Elytra* pellucida, albida,

in cavitate profunda abdominis recepta.  
*Pedes longi, imprimis posteriores.*

- Diffimilis. 72. *C. Desc.* Nimis cim. *prasino*, affinis videtur, at subtus *totus* ferrugineus pedibus virescentibus. An cim. *prasini* mera varietas ætatis?
- Melanocephalus. 74. *C. Desc.* Parvus, subtus obscure æneus, nitens, abdominis margine albo nigroque variegato. Supra griseus, æneo tinctus, capite macula utrinque ad apicem thoracis scutellique basi nigro-æneis. *Pedes* pallidi, *femoribus* puncto nigro.
- Carbonarius. 76. *C. Desc.* Magnitudo cim. *ornati*. *Totus* ater. *Alæ* albæ vel pallidæ. *Tibiæ* spinosissimæ.
- Fumofus. 77. *C. Desc.* præcedenti simillimus, at multo minor, fuscus nitidus.
- Limbofus. 78. *C. Desc.* Niger nitidus. *Elytra* margine exteriori albo marginata.
- Albo-marginatus. 79. *C. Desc.* Simillimus cim. *cæruleo*, a quo præcipue differt margine thoracis elytrorumque albo, immo & margine appendicum alæformium albido, tum abdominis lateribus flavo variegatis, ac denique pedibus spinosis, cum prioris spinulæ potius pili dicendi sint.
- Subapterus. 90. *C. Desc.* *Caput* longum. *Rostrum* nigrum, crassum arcuatum. *Elytra* abbreviata. *Abdomen* supra marginibus elevatis, maculis lateralibus punctisque nigris longitudinaliter dispositis, *subtus* valde convexum fuscum.

Flavicollis. 91. *C. Desc.* Statura cim. atri. *Antennæ* nigrae, seta rufa. *Caput* rufum, ore oculisque nigris. *Thorax* rufus, immaculatus. *Pedes* rufi, *femoribus* annulo nigro.

Tyrannus. 92. *C. Desc.* Affinis nimis cim. atro, at rostrum omnino sanguineum. *Pedes* rufi, *femoribus*, imprimis anticis, annulatis. *Plantæ* nigrae.

Schach. 93. *C. Desc.* Statura præcedentis. *Caput* coccineum, *antennis* nigris. *Thorax* ater nitidus, immaculatus. *Scutellum* coccineum. *Elytra* atra, macula magna transversali coccinea in medio, alia minori ad apicem. *Pedes* nigri.

Olivaceus. 94. *C. Desc.* *Caput* glaucescens, *antennis* rufis, articulis apice nigris capillaribus. *Thorax* olivaceus, antice nigricans. *Scutellum* nigrum, margine rufo. *Elytra* obscura, ferruginea, apice coccinea, puncto atro. *Corpus* nigrum.

Capillaris. 95. *C. Desc.* Statura & magnitudo cim. campestris. *Corpus* flavescens, elytris apice macula læte coccinea, quæ terminatur puncto nigro. *Abdomen* carinatum, atrum, marginibus flavescens.

Seticornis. 96. *C. Desc.* Affinis videtur cim. gothico. *Caput*, *thorax* & *antennæ* atra, immaculata. *Elytra* basi pallida, apice puncto coccineo. *Subtus* ater.

Meriopte- 100. *C. Desc.* *Corpus* nigricans, nitidum. *Antennæ* breves & duplo certe crassiores quam femora antica, articulis 1, 2, fusco-rubris, margine pilosis.

dum 3, 4, nigri sunt, sed basi & apice citrini, setacei, æquales. *Caput* & *thorax* fusca. *Elytrum* angustum, nitido & fusco-castaneo corio, membrana hyalina, margine exteriori fusca ibidemque prope basin albido puncto notata. *Alæ* rubelli vini colore. *Pedes* citrini & paleacei; *postici* longiores & crassiores.

Umbellata-101. *C. Desc.* Non sine aliqua difficultate a *pabulino* separavi, quocum habitu & magnitudine convenit, licet differat thorace punctato, scutello punctis binis fuscis. Variat *thorace* lineolis (3) scutelloque punctis totidem flavescens, & colore obscuriore.

Fulvipes. 102. *C. (la fulvipe) Desc.* *Antennæ* basi fulvæ. *Alæ* hyalinæ. *Femora postica* compressa. Larva nigra, *antennis* fulvis, apice nigris, elytro abbreviato, coriaceo, albo, fascia nigra; pedibus fulvis. Tales larvæ juxta ramulos arborum ambulantes, & manum hostis mire eludentes, sæpissime occurrunt, apteræ semper, & elytris dimidiatis, quæ ne pro veris speciebus adsumantur, probe cavendum. Species hæc, ab aliis omnibus distinctissima, proxime accedit *sylvestri* Linnæi, cum vero hujus *antennæ* minime attenuatæ, & *elytra* versus basin alba, versus apicem vero fusca dicantur, ita a nostro diversum esse volumus.

Genistæ. 103. *C. Desc.* Huic nitor nullus. *Antennæ* articuli duo extremi tenuiores, ultimo flavescens.

- Flavipes. 104.** *C.* ( la flavipede ) *Desc.* Lucidus. *Elytri* corium fusco-castaneum ; membrana basi fascia dimidiata, alba, acuminata, corio incumbente. *Alæ* violaceo-hyalinæ. *Antennæ* articulis tribus, non computata basi, corpori subæquales. *Abdomen* basi superne flavicans.
- Croceus. 105.** *C.* *Desc.* *Totus* croceus. *Antennæ* croceo nigroque variegatæ, articulo secundo longissimo. *Scutellum* margine nigricans. *Elytrorum* membrana nigra. Subtus *abdomen* croceum nigro variegatum.
- Ternatus. 106.** *C.* *Desc.* cim. *striato* fimillimus. *Caput* nigrum, lineis duabus luteis prope oculos. *Thorax* niger, antice luteo marginatus, fasciis tribus longitudinalibus luteis, quarum una in medio, una utrinque laterali. *Scutellum* nigrum, macula rhombea dimidiato lutea croceaque. *Elytra* nigra, margine exteriori luteo, apice macula triangulari croceata. *Antennæ*, *pedes*, *alæ*, *abdomen* subtus, nigra.
- Albinus. 107.** *C.* *Desc.* *Oculi* brunnei. *Scutellum* fusco lineatum. *Elytra* viridia, apice alba. *Corpus* subtus, *pedes* *antennæ*que viridescencia.
- Trilinea- 108.** *C.* *Desc.* *Antennæ* articulis quatuor ; quarto setaceo, nigræ. *Caput* nigrum, linea utrinque juxta oculos rubra. *Thorax* fuscus, lineis tribus longitudinalibus rubris. *Scutellum* fuscum apice rubrum. *Elytra* fusca sub apice rubra ; ipse apex niger, appendices fuscæ. Subtus una cum pedibus ruber, seu colore *pæoniæ officinalis* diluto.

Nugax. 132. *C. Desc.* Caput medium, fuscum. *Antennæ* albo nigroque variæ. *Rostrum* basi fuscum. *Abdominis* basis albo fuscoque variegata. *Pedes* fusci. *Tibiæ anticae* pallidæ, apice fuscæ. *Femora postica* pallida, apice fusca.

Lynceus. 134. *C. Desc.* Statura cim. pini. Caput & *antennæ* nigra. *Thorax* niger, margine exteriori pallido, postico griseo sive pallido densissime nigro punctato. *Scutellum* triangulo nigro, lineolis duabus apicis pallidis. *Elytra* grisea, macula magna apicis atra, puncto niveo. *Alæ* cinereæ, punctis aliquot obsoletis; albis. *Subtus* niger, punctis tribus pectoralibus fulvis.

Urticæ. 135. *C. Desc.* Statura & magnitudo cim. pini. *Antennæ* quadriarticulatæ, fuscæ. *Caput & thorax* nigro-ænea, obscura, immaculata. *Elytra* punctata, grisea, ad basin pallidiora. *Alæ* albæ, puncto parvo centrali nigro. *Abdomen* nigrum, margine albo-variegato & subtus macula media alba. *Femora* nigra, basi pallida. *Tibiæ* pallidæ, cingulis tribus nigris.

Roseus. 139. *C. Desc.* Parvus. *Caput* albidum. *Thorax* *scutellum* & *elytra* sanguinea. *Elytra* apice albida. *Alæ* fuscæ. *Femora* sanguinea. *Tibiæ* albidæ nigro punctatæ.

Boopis. 141. *C. Desc.* *Oculi* capite thoraceque latiores. *Antennæ* adeo tenues ut vix conspiciantur. *Thorax* qui antice angustissimus, *caput & elytra* luteo nigroque marmorata. *Pedes* pallidi, fusco maculati.



Eryngii. 142. *C. Desc.* Corpus subtus, caput, scutellum, antennæ, nigra. Thorax ruber, fascia transversali nigra, antice dissecta. Elytra rubra, ante apicem macula triangulari nigra. Alæ nigrae.

Stellifer. 143. *C. Desc.* Nigra sunt caput, scutellum, antennæ pedesque. Thorax niger, margine antico laterali que rubro, striga rubra longitudinali in medio. Elytra rubra, in medio macula magna nigra, à margine versus interiorem usque extensa. Alæ nigrae; cruce macula triangulari alba. Subtus ruber. Abdominis incisuræ singulæ tribus maculis nigris.

Nobili. 144. *C. Desc.* Caput nigrum, uti antennæ; pedes scutellumque. Thorax ruber, maculis duabus nigris magnis arcuatis, lineola rubra separatis. Elytra rubra, puncto parvo nigro in medio. Membrana maculis albis. Alæ albæ. Subtus niger, abdominis medio rubro.

Variegatus. 146. *C. Desc.* Oculi prominuli. Caput nigrum. Thorax niger, margine laterali luteo. Elytra nigro luteoque variegata. Antennæ articulus secundus basi luteus, apice niger, ultimi duo nigri. Femora nigra. Tibiæ albo nigroque alternatim annulatæ.

Monilis. 147. *C. Desc.* Totus fuscus. Scutellum puncto luteo. Antennæ, pedes, abdomen margine, nigro luteoque alternatim variegata.

Catarinæ. 148. *C. Desc.* Caput nigrum. Thorax antice niger, postice viridescens. Scutellum

nigrum, apice griseum. *Antennæ pedesque* nigro & griseo variegati.

**Apicaris.** 149. *C. Desc. antennæ* fulvæ, apice nigræ. *Caput* nigrum. *Thorax* postice griseus, antice niger. *Scutellum* nigrum. *Elytra* fulvo-fusca, apice macula alba triangulari. *Alæ* fuscæ. *Pedes* flavescents, *genubus* nigris.

**Femoralis.** 150. *C. Desc. Totus* pallide viridescens. *Alæ* diaphanæ. *Corpus* subtus fuscum. *Femora* nigro punctulata.

**Constellaris.** 151. *C. Desc. Parvus*, niger, nitidus. *Elytra* antice fulva, membrana fusca tribus maculis albidis.

**Fuligineus.** 152. *C. Desc. Parvus*, obscure fuscus, punctis dense sparsus. *Alæ* nervis albidis.

**Ternatus.** 153. *C. Desc. Simillimus cim. striato. Caput* nigrum, lineolis duabus flavis oculos prope. *Thorax* niger, antice flavus, lineis tribus longitudinalibus. *Scutellum* nigrum, macula rhombea bicolor, lutea crocea. *Elytra* nigra, margine exteriore flava, apice macula ejusdem coloris triangulari. *Antennæ, alæ, corpus* subtus, *pedesque*, nigra.

**Nigropunctatus.** 154. *C. Desc. Antennæ* nigræ. *Caput* luteum, macula nigra oblonga in medio. *Thorax* maculis duabus nigris, fere lunatis, quatuorque aliis postice in lineam dispositis. *Scutellum* luteum, punctis duobus minimis nigris antice, maculis duabus oblongis lateralibus. *Elytra* viridia, immaculata. *Corpus* subtus, *pedesque* viridi-lutea.

Virides- 155. *C. Desc. Totus pallide viridis. Oculi*  
*cens. fusci. Elytra apice fusco maculata.*

Albinus. 156. *C. Desc. Pallide viridis. Oculi fusci.*  
*Scutellum linea longitudinali fusca,*  
*e duabus parallelis lineis composita.*  
*Elytra apice alba. Antennæ, corpus*  
*subtus, pedes longi, viridescencia.*

Elongatus. 157. *C. Desc. Corpus elongatum. Caput antice*  
*nigrum, postice viride. Thorax viridis,*  
*lineis quatuor longitudinalibus nigris,*  
*lateralibus non computatis. Scutellum*  
*lineis quatuor nigris e lineis thoracis*  
*extensis. Elytra viridia, prope futuram*  
*fusca. Antennæ virides, basi tantum*  
*apiceque fuscae. Abdomen subtus pedes-*  
*que longi, pallide viridia.*

Sponsalis. 158. *C. Desc. Pallidus. Antennæ tenuissimæ.*  
*Oculi brunnei. Caput fascia longitudi-*  
*nali nigra, ocellis duobus rubellis ter-*  
*minata. Thorax lineis tribus longitu-*  
*dinalibus nigris, media usque ad scu-*  
*tellum producta. Scutellum fascia nigra.*  
*Abdomen subtus, elytra pedesque pal-*  
*lida, immaculata.*

Conicus. 159. *C. Desc. Antennæ tenuissimæ. Oculi*  
*prominuli. Thorax conicus. Elytra valde*  
*striata. Pedes flavescences.*

Flammeus. 160. *C. Desc. Caput rubro-luteum, macula*  
*longa nigra inter oculos fuscus. An-*  
*tennæ nigræ. Thorax niger lævis.*  
*Scutellum puncto rubello in apice.*  
*Elytra apice macula magna rubra.*  
*Corpus subtus nigrum. Pedes nigri,*  
*articulis rubellis.*

- Plässeus. 161. *C. Desc.* Minor niger, nitidus. *Alæ* nigrae. *Pedes* nigro viridique variegati.
- Atramen- 162. *C. Desc.* Totus niger, aliis etiam  
tarius. nigris. *Thorax* planus, latus, antice emarginatus.
- Carthusia- 163. *C. Desc.* Totus supra lacteus, excepto  
nus. capite nigro. *Thorax* fulcis tribus longitudinalibus elevatis. *Antennæ* nigrae crassae, articulo tertio longiore.
- Cordatus. 187. *C. Desc.* *Antennæ* longæ, nigricantes, articulo primo fulvescente. *Thorax* luteo fasciatus, in medio niger, postice fulvus. *Scutellum* antice nigrum, macula cordata flava. *Elytra* rubello-flava, puncto minimo luteo vix conspicuo, apice macula lutea triangulari. *Corpus* subtus nigrum. *Pedes* fulvi, versus basin flavi.
- Cruentatus. 188. *C. Desc.* Viridis, oculis concoloribus. *Thorax* fasciis duabus longitudinalibus rubellis. *Scutellum* viride. *Elytrum* antice striga sanguinea, duabusque aliis longitudinalibus. *Pedes* virides.
- Ruficornis. 189. *C. Desc.* Elongatus, pallide virescens. *Oculi* virescentes. *Antennæ* tenuës, corporis longitudine, fulvescentes.
- Redicornis. 190. *C. Desc.* Elongatus, totus viridis. *Antennæ* porrectæ. *Pedes* longi.
- Tiliae. 193. *C. Desc.* *Antennæ* setaceæ nigrae, articulo secundo basi apiceque pallido. *Caput & thorax* viridia, linea laterali nigra. *Scutellum* viride, punctis duobus parvis versus apicem nigris.

*Elytra* viridia, fasciis tribus atris; anteriore abbreviata, media antrorsum angulata, postica latiore. *Pedes* albo nigroque annulati.

**Agilis. 194.** *C. Desc.* Statura & magnitudo præcedentis. *Caput* atrum nitidum, rostro pallido *antennarumque* articulo primo rufescente. *Thorax* ater nitidus, margine postico late flavo. *Scutellum* atrum, apice flavum. *Elytra* fusca vel potius picea, macula pone basin pallida. Apex pallidus terminatur puncto atro. *Abdomen* atrum. *Pedes* pallidi. Simillimum ex Italia misit *Dr. Allioni*, at absque thoracis margine pallido.

**6-Gutta- 195.** *C. Desc.* *Caput* nigrum, orbita oculorum flavescente. *Thorax* ater, linea dorsali punctoque utrinque marginali flavis. *Scutellum* flavum. *Elytra* lævia nigra, macula oblonga baseos flava, secunda in medio margine tenuioris & tertia apicis quæ terminatur puncto atro. *Corpus* atrum.

**Rivulo- 208.** *C. Desc.* Statura cim. *lacustris*, at paullo minor. *Caput* nigrum, antennis quadriarticulatis. *Thorax* niger, antice parvum rufescens, utrinque puncto parvo fere obsoleto albo. *Elytra* nigra, punctis albis, e quibus alis complicatis sex apparent, quatuor *scutellum* cingentibus, anterioribus duobus longioribus, reliquis duobus in medio dorsi uno post alterum. *Femora* nigra, *postica* incurva, bidentata.

**Pallipes. 209.** *C. Desc.* *Corpus* statura præcedentium totum nigrum, pedibus solis pallidis.

Spina valida prominens utrinque sub thorace. *Abdominis* margo parum pallescit.

Clavipes. 210. C. Desc. Similis cim. *tipulario*, at triplo minor & *pedes* haud elongati.

Ater. C. ( la noire ) ater nitidus, elytris apice pallescentibus. *Acanth.* 3. *Mantiss.*

*Hab.* Kiliæ.

Desc. Duplo minor cim. *rosteræ*. *Corpus* totum atrum nitidulum, oculis valde prominulis. *Elytra* coriacea, apice pallida.

Fasciata. C. ( la fasciée ) ater, elytris pallescentibus, fasciis duabus abbreviatis nigris;

*Acanth.* 10. *Mantiss.*

*Hab.* Kiliæ. D. Daldorf.

Desc. Parvus. *Corpus* totum atrum, nitidum. *Antennarum* articuli duo priores ferruginei, apice nigri, ultimo nigro toto. *Thorax* sulco transverso impressus. *Elytra* pallescentia; fasciis duabus, altera in medio, altera ad apicem, nigris, futuram tamen haud attingentibus. *Pedes* flavescents; *femoribus* *posticis* annulo nigro.

Sylvestris. C. ( la sauvage ) ater, elytris albis; arcu apice nigro. *Acanth.* 23. *Mantiss.*

*Hab.* in Europæ sylvis.

Desc. Parvus. *Antennæ* ferrugineæ, articulorum apicibus nigris. *Caput* & *thorax* atra, nitida, immaculata. *Elytra* alba, apice nigra, macula magna flava. Margo interior flavescens macula nigra. *Alæ* albidæ, macula apicis nigra. *Pedes* ferruginei. *Corpus* atrum;



**Varius. C.** ( la variée ) thorace obtuse spinoso supra rufus subtus flavescens, scutello nigro basi apiceque albo. *Cim.* 49. *Mantiss.*

*Hab. in Hispania. D. Vahl.*

*Desc.* Statura & magnitudo cim. *albipedis*. *Antennæ* nigrae. *Caput* nigrum, lineis duabus rubris antice coeuntibus. *Thorax* rufus, margine lineolisque duabus abbreviatis anticis nigris. *Scutellum* nigrum, basi album, maculis duabus parvis baseos majorique apicis nigris. *Apex* albus. *Elytra* rufa, immaculata. *Abdominis* margo nigro rufoque maculatus. *Corpus* subtus flavescens, abdomine lineis tribus punctorum fuscorum. *Pedes* rufi.

**Ferrugatus. C.** ( la ferrugineuse ) thorace acute spinoso supra griseus, capite spinisque nigris, abdomine ferrugineo.

*Hab. in Suecia. D. Pay Kull.*

*Desc.* Medius. *Caput* nigrum, *antennis* pallidis primo ultimoque articulo nigro. *Thorax* griseus, margine tenuissime flavo spinisque acutis elongatis nigris. *Scutellum* obscurum, apice flavescens. *Elytra* grisea sive pallida, punctis numerosis fuscis. *Alæ* albidæ, arcu apicis fusco. *Abdomen* ferrugineum. *Pedes* fusci. *Mantiss. app.*

**Tristriatus. C.** ( la tristriée ) ovatus flavescens, elytris apice puncto ocellari atro abdomine lineis tribus albis. *Cim.* 135. *Mantiss.*

*Hab. in agro Pedemontano. Dr. Allioni!*

*Desc.* Statura parva cim. *nubili*. *Caput* & *thorax* flavescencia, immaculata. *Elytra* basi flavescencia, apice rufes-

centia, puncto subocellari atro, & hic color rufescens in medio extenditur. *Subtus* flavescens, abdomine lineis tribus albis. *Pedes* flavescences.

6-Punctatus. C. ( la 6-punctuée ) oblongus, thorace elytris rufis, maculis duabus nigris. *Cim.* 213. *Mantiff.*

*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.*

*Desc.* Magnitudo & statura plurimorum. *Caput* atrum. *Thorax* lævis, rufus, punctis duobus nigris. *Scutellum* nigrum. *Elytra* rufa, maculis duabus nigris, altera versus futuram, altera versus apicem. *Alæ* fuscæ. *Corpus* fuscum, linea laterali rubra. *Pedes* fusci, *femoribus* rubris.

Floralis. C. ( la Flore ) oblongus supra obscure griseus, elytris apice puncto rubro, femoribus posticis elongatis nigris. *Cim.* 248. *Mantiff.*

*Hab.* in Hafniæ floribus. *Dr. Pflug.*

*Desc.* Statura omnino *cim. pratensis*. *Caput* & *thorax* obscure grisea, antennis pallidis. *Elytra* concoloria, puncto apicis rufo. *Corpus* fuscum, ano rufescente. *Pedes* pallidi, *femoribus posticis* elongatis nigris.

Inquinatus. C. ( la souillée ) oblongus flavescens; elytris nigris albo variis. *Cim.* 250. *Mantiff.*

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Medius. *Caput* flavescens, *antennis* nigris. *Thorax* flavescens, lateribus margineque postico nigris. *Elytra* nigra, basi apiceque albo nigroque variis. *Corpus* flavescens, margine nigro. *Pedes* nigri.

Nassatus.

**Nassatus. C.** ( la flavipede ) oblongus viridis ,  
antennis pedibusque flavescens.  
*Cim. 251. Mantiss.*

*Hab.* Hafniæ in ïlia. *D. Lund.*

*Desc.* Parvus. *Totus* viridis , immacu-  
latus , *antennis pedibusque* solis fla-  
vescentibus.

**Transversa- C.** ( la transversale ) oblongus viridis ,  
*lis.* thorace lineola interrupta , elytris ma-  
cula fuscis. *Cim. 256. Mantiss.*

*Hab.* Kilix: *D. Daidorf.*

*Desc.* Statura *cim. populi* , at duplo minor.  
*Corpus* viride. *Antennarum* ultimus ar-  
ticulus fuscus. *Thorax* viridis , lineola  
transversa in medio interrupta fusca.  
*Abdomen* viride , dorso atro. *lytra*  
viridia , macula magna versus apicem  
futuraque fuscis. *Pedes* virides.

**Umbratilis. C.** ( la délicate ) oblongus niger , elytris  
flavo lineatis apice fascia alba , an-  
tennis apice capillaribus. *Syst. nat. 90.*

*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Medius. *Antennæ* nigrae , apice  
setaceæ. *Caput* , *thorax* , *scutellum* ,  
*corpus* , nigra immaculata. *Elytra*  
nigra , lineolis aliquot flavis abbrevi-  
atis exarata , apice fascia nivea.  
*Pedes* picei.

**Tricolor. C.** ( la tricolor ) oblongus ater , elytris  
apice macula coccinea , antennis apice  
capillaribus. *Cim. 272. Mantiss.*

*Hab.* in Hispaniæ urtica. *D. de Schestedt.*

*Desc.* Statura & summa affinitas *cim.*  
*gothici* , at *totus* ater , elytrorum solis  
apicibus macula magna coccinea. *Ala*  
nigra , macula marginali transversa  
pallida. *Pedes* nigri.

**Varius. C.** ( la coquette ) oblongus flavescens ; capite , scutelli margine , atris. *Cim.* 275. *Mantiss.*

*Hab.* Kiliæ. *D.* Daldorf.

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum , *antennis* basi pallidis. *Thorax* flavescens , margine postico nigro punctoque laterali apicis rufo. *Scutellum* flavum , margine nigro. *Elytra* flavo fuscoque varia , puncto obsoleto rufo apicis. *Corpus* , uti & *pedes* , flavescencia.

**Holsatus. C.** ( la pâlie ) oblongus exalbidus , thorace lineis duabus elytris interne fuscis. *Cim.* 278. *Mantiss.*

*Hab.* Kiliæ. *D.* Daldorf.

*Desc.* Statura omnino *cim. lævigati*. *Antennæ* setaceæ exalbidæ. *Thorax* lineis duabus dorsalibus fuscis. *Elytra* interne fusca , externe albida. *Corpus* exalbidum.

**Pallens. C.** ( la pâle ) oblongus pallidus , capite corporeque atris. *Cim.* 281. *Mantiss.*

*Hab.* in Suécia. *D.* Pay Kull.

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum , *antennis* pallidis. *Thorax* , *scutellum* , *elytra* , *pedes* , pallida , immaculata. *Corpus* atrum.

**Vagans. C.** ( l'errante ) oblongus griseus , capite thoraceque linea nigra , pedibus testaceis. *Cim.* 286. *Mantiss.*

*Hab.* in Suecia.

*Desc.* Statura omnino *cim. feri*. *Caput* & *thorax* grisea , linea longitudinali nigra. *Scutellum* nigrum , punctis duobus parvis rufis. *Elytra* grisea , interdum punctis aliquot obsoletis nigris. *Alæ* exalbidæ. *Pedes* testacei.

**Stridulus. C.** ( l'importune ) glaber niger , elytris fuscis nigro maculatis , margine rufo.  
*Reduv. 5. Mantiss.*

*Hab. Monspeliæ. D. Broussonet. Mus. D. Banks.*

Primo vere agilis antennis continuo motitans , thoracis attritu stridens.

*Desc. Parvus. Antennæ nigræ , triarticulatæ. Thorax niger , nitidus , striga transversa valde impressa. Schelli triangulum fuscum. Elytra intus fusco-cinerea , punctis tribus atris , extus rufa. Alæ fuscæ , macula atra. Corpus nigrum , abdominis segmento 2 , 3 , 4 , rufis. Pedes nigri , anterioribus incrassatis.*

**Cruentus. C.** ( la méchante ) rufus , capite , pectore abdominisque striis macularibus rufis.  
*Reduv. 14. Mantiss.*

*Schæff. icon. 1. tab. 5. fig. 9. 10.*

*Hab. Monspeliæ. D. Broussonet.*

*Desc. Statura & magnitudo cim. annulati. Caput nigrum , gula rostrique basi rubris. Antennæ nigræ. Thorax rufus , lobo antico nigro , punctis duobus magnis rubris. Elytra rufa , immaculata. Alæ obscuræ. Pedus nigrum. Abdomen rufum , lineis tribus punctorum nigrorum margineque nigro vario. Pedes rufi , puncto femorum , genibus tarsisque rufis.*

**Tessellatus. C.** ( la marquetée ) thorace elytrisque obscure ferrugineis , abdomine atro , margine albo vario. *Reduv. 38. Mantiss.*

*Hab. Monspeliæ. D. Broussonet. Mus. D. Banks.*

*Desc. Statura præcedentium. Caput nigrum rubro punctatum. Antennæ nigræ.*



*Thorax* lobo antico nigro testaceo maculato, postico obscure ferrugineo, margine postico acuto albido. *Scutellum* nigrum, linea dorsali alba. *Elytra* obscure ferruginea, immaculata. *Alæ* obscuræ. *Corpus* subtus fuscum, abdomine atro nitido, margine albo vario. *Pedes* rufi, *femoribus* intus nigris.

**Cuttula. C.** ( l'étoilée ) ater nitidus, elytris pedibusque sanguineis, alis puncto albo.

*Hab.* in Germania. *Dr. Heisse.*

*Desc.* Medius. *Caput & thorax* atra, nitida, immaculata. *Scutellum* atrum. *Elytra* rubra, puncto parvo atro ad futuram. *Alæ* nigræ puncto magno marginali albo. *Abdomen* atrum, immaculatum. *Pedes* rufi, *femoribus* anticiis incrassatis, unidentatis.

**Ferrugatus. C.** ( la rouillée ) thorace acute spinoso; supra griseus, capite spinisque nigris, abdomine ferrugineo. *Cim. Mant. app.*

*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Medius. *Caput* nigrum, *antennis* pallidis, primo ultimoque articulo nigris. *Thorax* griseus, margine tenuissimo flavo spinisque acutis elongatis, nigris. *Scutellum* obscurum, apice flavescens. *Elytra* grisea f. pallida, punctis numerosis fuscis. *Alæ* albidæ, arcu apicis fusco. *Abdomen* ferrugineum. *Pedes* fusci.

*Obs. I.* Cimicum numerosa gens a variis in varias familias distributa fuit; mihi sequentes non incongruæ videntur *D. Schrank.*

*Nudi*, alis elytrisque per omnem ætatem carentes.

*Apteri*, alis, non elytris carentes,



*Scutellati*, scutello lato, longitudine abdominis.

*Coleoptrati*, elytris totis coriaceis.

*Membranacei*, valde depressi ut foliolum:

*Angulati*, thoracis lateribus plus minusve mucronatis.

*Ovati*, ovari, fere rotundi, mutici.

*Ovato-oblongi*, ex ovata figura magis oblongi.

*Oblongi*, oblongi cum aliqua inclinatione in ovalem.

*Angustati*, lineares, proportionnaliter angustissimi.

*Obs. 2.* *Linnæi* ordines cimicum, septimo forsan excepto, hoc genus feliciter ordinant. V.

### *Aphis.*

**Alni.** 35. *A. Desc.* *Oculi nigri. Abdomen conicum, non bicornè. Corpus inflatum, villosulum.*

**Prunij.** 36. *A. Desc.* *Albido-viridis, albo pulverulenta. Oculi nigri. Abdominis appendices breves.*

**Pomi.** 37. *A. Desc.* *Magnitudo media lutescente-viridis. Antennæ, oculi, pedes, abdominis appendices, obscure fusca. Corpus tumidum ovatum. Appendices truncatæ, in medio incrassatæ. Abdomen subtus postice maculis duabus nigris.*

**Juniperi.** 38. *A. Desc.* *Obscure fusca. Caput parvum. Oculi nigri. Antennæ læves. Appendices conicæ breves. Corpus totum pilosum. Pedes villosi.*

**Millefolij.** 39. *A. Desc.* *Viridis. Oculi fusco-rubri.*

*Antennæ longæ. Corpus squamis nigris elevatis, subtus viride, annulo ultimo nigro. Thorax pedusque maculis nigris. Stylus corniculaque nigra.*

Salicis- 40. *A. Desc. Nigro-viridis. Corpus supra duplici macularum albidarum serie. Antennæ mediocres. Appendices longæ.*

Gallarum- 41. *A. Desc. Tota viridescens - grisea. Abdomen fusco - cinereum, villo margaritato tectum.*

Solidaginis. 43. *A. Desc. Corpus majusculum, fuscum, antice angustatum, fronte emarginata. Cornicula elongata setacea. Stylus corniculis duplo brevior. Pedes pallidi, geniculis nigris.*  
*Obs. Juniores omnino testaceæ.*

Achilleæ. 47. *A. Desc. Antennæ filiformes, albidæ. Alæ albidæ. Anus, stylus & cornicula albida.*

Fraxini. 48. *A. Desc. Caput & thorax nigra. Abdomen viride, segmentorum marginibus nigris. Antennæ pedesque variegati.*

Ægopodii. 55. *A. Desc. Corpus nigrum, abdomine, rostro pedibusque pallidis.*

Papaveris. 57. *A. Corpus nigrum, antennis pallidis. Corpus nigrum, stylo corniculisque pallidis. Pedes nigri, interdum pallidi, geniculis nigris. Alæ pallidæ, costa fusca.*

*Obs. Juniores obscure virefcentes.*

Longirostris. *A. (le cortical) cinerea, rostro corpore triplo longiore.*

*Hab.* Dresdæ sub arborum corticibus, formicarum larvis victitans.

*Desc.* Media. *Rostrum* longissimum, cylindricum, quo larvarum succum haurit.

*Obs.* Plurimæ in speciebus non memoratae, in nova *Mantiss.* reperientur ex *G. pastinacæ*, *nymphaeæ*, *abjinthii*, &c.

### Coccus.

*Betulæ.* 5. *C. Desc.* *Corpus* minimum albidum.

*Zosteræ.* 26. *C. Desc.* *Corpus* parvum, orbiculatum; album depresso-planum.

*Visci.* 21. *C. Desc.* *Fœminam* vidit tantum *D. Schrank.* in foliis visci albi, plura in singulis, hæc, agitato folio decidunt, vestigio tamen sui relicto, cavitate nempe quadant in folio, cui adhæserunt, causata. Ad lentem puncta hæc sunt scutellæ orbiculares, centro-flavo, margine albo. Magnitudo hujus insecti vix  $\frac{1}{2}$  lin. in diametro æquat.

*Mali.* 23. *C. Desc.* *Cocco hesperidum* similimus habitu. Cingitur margine foliaceo, summe diaphano, plicato s. rugoso, & dorso ex iisdem rugis cingitur ellipsi alba.

Color adulti albido-fuscescens, junioris lucide castanei, demto margine & ellipsi dorsali.

*Costatus.* 24. *C. Desc.* Mense aprili ann. 1775 in ramulis amygdali persicæ elegantissimum hunc coccum vidit *D. Schrank.*

*Fœmina* ovalis, ano profunde emarginato, eleganter castanei coloris; medio dorso linea flava pinnata lon-

gitudinali, maculis quatuor flavis, duabus anticis, duabus in lobis per anemarginaturam causa.

Farinosus. 25. *C. Desc. Corpus* ovatum, incisuris 24, capite computato. *Totus* rubro-fuscus, sed pulvere albedo tectus. *Antennæ* apice incrassatæ. *Pedes* brevissimi.

*Obs.* Aphides, chermes, & cocci ferentantum a loco natali denominanda, nec synonyma congerenda, ne in generibus adhuc, quod specierum ad accuratam attinet distinctionem, obscuriusculis synonyma temere confundantur. Multa in his minutulis detecta sunt, plura restant detegenda. *Enum.*

### *Lepidoptera.*

Europome. 19. *P. C.* An species? An *P. palæna* varietas? *V.*

Aurora. 22. *P. C.* Alis integerrimis fulvis, anticis subtus puncto ocellari, posticis sesquialtero argenteis.

*Hab.* in Sibiria. *D. Boeber.*

*Desc.* Mera *P. hyale* varietas videtur, differt tantum colore supra fulvo. Vix distingui meretur.

Raphani. 23. *P. C.* Alis rotundatis integerrimis albis, apice nigris albo maculatis, posticis subtus nigro venosis, flavo pulverulentis. *Mantiss.* 187.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *P. sinapis*. *Antennæ* nigrae, albo annulatæ. *Caput* & *thorax* fusca. *Abdomen* album, dorso fusco. *Alæ anticæ* concolores, albæ, macula pone medium marginemque nigris, Margo maculis tribus albis.

*Alæ posticæ* supra albæ, punctis marginalibus fere obsoletis fuscis; *subtus* nigro venosæ, pulvere flavicante adpersæ.

Allionia. 48. P. G. Desc. Magnitudo & statura P. jurtinæ. Corpus fuscum immaculatum. *Alæ* dentatæ, fuscae, ocellis paginæ inferioris obscure perspicuis absque pupilla *Subtus* basi fuscae, strigis duobus obscurioribus, apice pallidiores, anticis ocellis duobus magnis, anteriori pupilla alba, posteriori cæco. Inter ocellos macula alba. *Posticæ* loco ocellorum punctis tribus albis majorique atro.

Fauna. 50. P. G. Fab. 971. alis dentatis supra fuscis, anticis ocellis duobus punctisque duobus albis, posticis subtus griseis.

*Hab.* in Germaniæ pinetis. M. D. Romani.

*Desc.* Nimis affinis P. *fidia*, at duplo minor. *Alæ* supra omnes fuscae, anticis ocellis duobus minoribus iride flavescens, sæpe cæcis & inter ocellos puncta duo alba, posticis puncto uno alterove obsoleto albo punctoque distinctiori atro subtus; ocelli anteriorum majores. *Posticæ* griseæ. *Mantiss.* 371.

Eudora. 51. P. G. Fab. 435. alis dentatis fuscis, anticis utrinque disco ferrugineo, ocello maris unico, fæminæ duobus. M. 435.

*Hab.* in Germaniæ sylvis. D. Boeber.

*Desc.* Nimis affinis P. *janira*, at paullo minor. Differt disco *alæ anticæ* utrinque ferrugineo. *Posticæ* subtus obscure griseæ, immaculatæ.

Philoxenus. 52. P. G. Fab. P. F. Dauus. Alis integerrimus fulvis, anticis ocello subtus

albo fasciatis, posticis ocellis sex.  
*Mantiss.* 347.

*Wien. Verz.* 321. 25. papilio iphis.

*Naturf.* 10. tab. fig. papilio typhon.

*Myll. Faun. Fridrichsd* papilio tullia.

*Maf.* alis supra ocellis obsoletis.

**Actæa. 54.** P. G. Alis repandis supra fuscis, anticis ocellis duobus punctisque duobus albis posticis subtus marmoratis. *Mant.* 369.

*Desc.* Nimis affinis P. *fidia* & *Fauna*, at *alæ* vix dentatæ & *alæ posticæ* subtus marmoratæ, puncto uno alterove atro ad angulum ani.

**Alexis. 55.** P. G. *Ligea* Syst. teste D. *Fab.* & optimo jure.

*Naturf.* 8. t. 3. f. 6.

*Desc.* Distinctus maculis albis in pagina inferiore *alæ posticæ*. Variat rarius fascia cinerea loco flavæ.

*Larva* villosa viridis, linea dorsali nigra, capite flavo, cauda bifida.

**Æthiops- 56.** P. G. *Blandina*. Alis dentatis fuscis, fascia rufa ocellata, posticis subtus fuscis, fascia cinerea. *Mantiss.* 412.

*Wien. Verz.* 167. 7. papilio media.

*Desc.* Nimis affinis P. *ligea*. Differt tamen alis posticis vix ocellatis, fuscis, fascia cinerea absque maculis albis.

**Arge. 59.** P. G. Alis dentatis albis nigro strigosis, anticis ocello unico, posticis quinque. *Mantiss.* 422.

*Papilio arge.* Esp. pap. tab. 84. fig. 1. 2.

*Hab.* in Russiæ Australioris desertis. D. *Boeber.*

*Desc.* Statura & summa affinitas P. *gala*.



*thea*. *Alæ omnes* albæ, strigis plurimis undatis nigris. *Alæ anticæ* utrinque ocello parvo superiori cæco. *Posticæ* utrinque quinque pupillatis.

**Arethusa. 61.** P. G. *Alis* dentatis supra fuscis, fascia maculari rufa, anticis utrinque ocello unico. *Mantiss.* 401.

*Wien. Verz.* 169. 16.

*Hab.* in Germania. *Mus. D. Romani.*

*Desc.* Simillimus P. *femele*. *Alæ omnes* supra fuscæ, fascia communi e maculis quatuor fulvis. Dentes albo nigroque varii. Oculus parvus cæcus *alæ anticæ*. Subtus *anticæ* fuscæ, disco ferrugineo ocello majori pupillato. *Posticæ* griseæ.

**Manto. 62.** P. G. *Fab. erina* alis dentatis fuscis, fascia maculari fulva, punctis ocellaribus nigris. *Mantiss.* 414.

*Wien. Verz.* 161. 15. papilio erina.

*Desc.* Affinis P. *ligea*, at distinctus corpore minore ocellisque cæcis vel potius punctis ocellaribus.

**Tarpeia. 64.** P. G. *Fab.* Alis integris fulvis, omnibus ocellis quatuor cæcis. *Mantiss.* 338.

*Cram. pap.* 32. tab. 375. fig. E. F. papilio celamine.

*Desc.* *Alæ omnes* supra fulvæ, margine fusco ocellisque quatuor, rarius quinque nigris cæcis. Subtus *anticæ* fulvæ, *posticæ* fuscæ, strigis fasciaque albis.

**Afer. 65.** P. G. Alis integris fuscis, ocellis sex, posticis cinereo venosis. *Mantiss.* 413.

*Hab.* in Russiæ Australioris desertis. D. Boeber.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino P. *blandinæ*. *Antennarum* clava subtrus

excavata. *Alæ omnes* nigræ, ocellis circiter sex. Subtus *antica* nigræ, basi litura ferruginea ocellisque 5, 6, duobus majoribus. *Posticæ* fuscæ, cinereo-venosæ, ocellis sex vel septem.

**Clymene. 67.** P. G. Alis dentatis fuscis, litura ferruginea, posticis ocellis supra subtribus, subtus subseptem. *Mantiss.* 434.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *P. jurtina*. *Alæ antica* fuscæ, disco rufo, utrinque ocello subtus pupillato. *Posticæ* fuscæ, maculis quatuor fulvis & in his ocelli duo aut tres cæci, subtus fuscescentes, ocellis septem cæcis, e quibus 2, 3 sæpe minutissimi vix apparent, ultimi duo connati.

**Autonæ. 68.** P. G. Alis dentatis fuscis flavo subfasciatis ocellisque duobus pupillatis, anticis subtus basi fuscis. *Mantiss.* 393.

*Hab.* in Russia Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Nimis affinis *P. semele*. *Alæ* supra fuscæ, anticis fascia maculari flavefcente, posticis striga albida. *Ocelli* duo distincti nigri, pupilla alba. *Alæ antica* subtus fuscæ, fascia lata flava, ocellis duobus, anteriore majore pupillato.

**Ida. 70.** P. G. Alis subdentatis fuscis, disco fulvo, anticis utrinque ocello nigro bipupillato, posticis subtus griseo variis. *Mantiss.* 429.

*Hab.* in Gibraltar. *D. Boeber.*

*Desc.* Nimis affinis *P. pilosellæ*, at minor, alis subintegris at omnino absque punctis albis in pagina inferiori alæ posticæ.

**Cynthia. 93.** P. P. Alis dentatis nigris fulvo flavo-

que fasciatis, posticis subtus fulvis  
flavo fasciatis. *Mantiss.* 574.

*Wien. Verz.* 179. 3. papilio cynthia.

*Naturforsch.* 12. tab. 2. fig. 1. 4.

*Desc.* Major *P. cinxia*. *Ala antica* supra  
fusca, fasciis plurimis nigris; subtus  
pallide fulvæ, undis aliquot nigris.  
*Postica* nigræ, rarius fulvo maculatæ,  
pone medium fascia e maculis sex fulvis,  
quarum quatuor aut quinque puncto  
nigro notatæ. *Subtus* fulvæ, fascia  
basaleos interrupta media nervis divisa,  
apicis maculari. Inter has ultimas  
fascia striga e punctis quinque distinctis.  
*Mas* supra obscurior maculisque albis  
notatus.

*Larva* spinosa atra, lineis duabus dorso-  
libus flavis, capite cærulescente.

*Puppa* pallida, nigro flavoque maculata.

**Didyma. 94.** *P. P.* Alis dentatis fulvis (cinereis)  
nigro maculatis, posticis subtus flavis  
nigro punctatis, fasciis duabus fulvis  
continuis. *Mantiss.* 569.

*Desc.* Magnitudo *P. phæbe*. *Abdominis*  
latera nigro punctata. Fascia antica,  
*ala postica* subdidyma.

**Athalia. 96.** *P. P.* Alis repandis fulvis nigro punc-  
tatis, posticis subtus albis punctatis  
fasciisque duabus fulvis. *Mantiss.* 571.

*Esp. pap. tab.* 88. fig. 5. 6.

*Hab.* in Russia Boreali. *D. Boeber.*

*Desc.* Minutus in hac familia. *Ala* supra  
omnes fulvæ, punctis numerosissimis  
nigris. Subtus *antica* fulvæ, nigro  
maculatæ, apice albæ nigro punctatæ;  
*postica* albæ, strigis plurimis punctorum  
nigrorum fasciisque duabus fulvis, an-  
teriore abbreviata e maculis tribus.

*Pilosellæ*. 97. P. P. *Obs.* nec est pap. *pilosellæ*.  
D. Fab. V.

*Dictynna*. 98. P. P. Alis dentatis nigris fulvo maculatis, posticis subtus fulvis, maculis baseos fascia media maculari lunulisque apicis flavis. *Mantiff* 573.

*Esp. pap. tab.* 89. *fig.* 1. 2. papilio *athalia* minor.

*Desc.* Reliquis obscurior maculis minoribus fulvis. *Posticæ* subtus maculis minoribus fulvis. *Posticæ* subtus maculis quinque baseos flavis, fascia in medio maculari flava nigro marginata & lunulis flavis versus apicem.

*Arfilache*. 99. P. P. *Fab. Pales*. Alis subintegris fulvis basi maculisque nigris, posticis subtus brunneis flavo argenteoque variis. *Mantiff* 598.

*Wien. Verz.* 177. 8. papilio *pales*.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller*.

*Desc.* Magnitudo & affinitas P. *dia. Alæ* supra omnes, fulvæ & basi maculisque plurimis nigris. Subtus *anticæ* fulvæ, lunulis punctisque aliquot nigris maculisque duabus flavis apicis. *Posticæ* basi maculis argenteis, tunc brunneæ puncto parvo argenteo, tunc fascia magna, sinuata, obsolete flava, & in hac maculæ duæ argenteæ, altera in medio, altera ad marginem exteriorem, demum brunneæ, maculis aliquot fere obsoletis argenteis & denique margo flavo varius punctis sex vel septem argenteis.

*Niphe*. 100. P. P. An Europæus?

*Corythallia*. 102. P. P. *Fab. Phæbe*. Alis dentatis

nigro flavoque variis, posticis subtus  
flavescentibus nigro undatis, basi qua-  
dripunctatis, fasciis duabus fulvis,  
posteriori maculari. *Mantiss.* 568.

*Wien. Verz.* 179. 1. papilio phœbe.

*Esp. pap. tab.* 25. *fig.* 2. papilio cinxia.

— *tab.* 61. *fig.* 4. 5. papilio cory-  
thallia. *Mal.*

*Hab. in Europæ centaurea scabiosa. Mus.*

*D. Schieffermyller.*

*Desc. Antennæ* albo nigroque annulatæ,  
clava ferruginea annulo fusco. *Alæ*  
supra nigricantes, maculis numerosis,  
mox pluribus, mox paucioribus nigris.  
Margo albo maculatus. Subtus *antica*  
flavæ nigro maculatæ, apice flavæ,  
nigro undulatæ; *postica* basi flavæ,  
punctis quatuor nigris, tunc fascia  
fulva in medio bifida, nigro margi-  
nata; tunc flavæ nigro undatæ, demum  
fascia fulva e punctis septem distinctis  
& denique flavæ nigro undatæ.

V-Album. 103. P. P. Alis angulatis fulvis nigro macu-  
latis omnibus supra macula alba, pos-  
ticis subtus lunula alba. *Mantiss.* 489.

*Wien. Verz.* 176. 7. papilio V-album.

*Desc.* Nimis affinis P. *polychloros* & forte  
mera ejus varietas. Differt tamen alis  
magis angulatis, macula alba & abs-  
que maculis cæruleis marginalibus.  
*Alæ* subtus variegatæ, lunula centrali  
alba.

F-Album. 108. P. P. *Desc.* Statura & magnitudo P.  
*celtis*. *Alæ antica* fulvæ, maculis in  
medio tribus magnis nigris. Margo  
fuscus. *Postica* fulvæ, macula magna  
media lituraque apicis nigris. Subtus  
fusca, lineola media nivea, quæ ad



basin incrassata puncto fusco, apice  
flavescentes. *Mantiss.* 557.

**Arduinna. 109.** P. P. Alis dentatis fulvis nigro macu-  
latis, posticis subtus albis, fasciis duabus  
fulvis, posteriore nigro punctata. *M.* 577.

*Desc.* Affinis P. *delia*, at *alæ* supra  
fulvæ, maculis rarioribus nigris; puncta-  
taque *alæ* posticæ simplicia. Margo *alæ*  
niger, ciliis albis.

**Amathusia. 110.** P. P. (Amathuse) alis dentatis fulvis,  
maculis strigaque punctata nigris, pos-  
ticis subtus variegatis, basi puncto  
apice striga punctorum. *Mantiss.* 580.

*Hab* in Russia. D. Boeber.

*Desc.* Distinctus striga punctorum distinc-  
torum in omni ala. Subtus *posticæ* flavo  
fulvo fuscoque variegatæ. Punctum  
distinctum nigrum, subocellatum ad  
basin & striga punctis sex subtus ocel-  
laribus versus apicem.

**Fascelis. 111.** P. P. Alis dentatis fusco fulvoque  
variis, posticis subtus albis nigro  
punctatis, fasciis duabus fulvis, poste-  
riore lunulata. *Mantiss.* 570.

*Desc.* Nimis D. *didymæ* affinis. Differt  
tamen alis supra obscurioribus, magis  
fuscis fasciaque posteriore *alæ* posticæ  
e lunulis fulvis conflata, quæ tamen  
in fœmina distinctiores.

**Phœbe. 112.** P. P. *Fab.* 571. M. Alis repandis fulvis  
nigro punctatis, posticis subtus albis  
nigro punctatis fasciisque duabus fulvis.

*Desc.* Minutus in hac familia. *Alæ* supra  
*omnes* fulvæ, punctis numerosissimis  
nigris. Subtus *antica* fulvæ, nigro  
maculatæ, apice albæ, nigro punctatæ.

*Posticæ*



*posticæ* albæ, strigis plurimis puncto-  
rum nigrorum fasciisque duabus flavis,  
antere abbreviata e maculis tribus.

**Celtis. 113.** P. P. Alis angulato-dentatis fuscis;  
maculis fulvis unicaquæ alba, posticis  
subtus griseis. *Mantiss.* 556.

*Syst. arch.* 2. tab. 2. fig. 1. 2. 3.

— 3. tab. 2. fig. 1.

*Desc.* Affinis P. *Carinenta* & paullo minor.  
*Alæ anticæ* valde angulatæ, conco-  
lores, maculis quatuor fulvis unica-  
que pallidiore. *Posticæ* supra fuscæ,  
macula unica fulva, subtus griseæ,  
lineola parva centrali alba.

*Larva* viridis, nigro maculata lineolis-  
que albis.

*Puppa* viridis albo lineata.

**Bellargus. 132.** P. R. (Adonis) alis integris cæruleis,  
striga marginali atra, subtus cinereis,  
punctis ocellaribus numerosis, posticis  
macula centrali alba. *Mantiss.* 694.

*Wien. Verz.* 184. 11. papilio Adonis.

— 184. 12. papilio Alexis vix differt.

*Desc.* Nimis præcedenti affinis. Differt  
tamen alis supra nunquam argentatis,  
sola striga marginali atra. *Subtus* puncta  
magis ocellata.

*Fœmina* magis cærulescens quam fœmina  
*corydon* & fascia rufa in omni ala  
distinctior solo oculo adueto distin-  
guenda.

*Larva* viridis, lineis dorsalibus macula-  
rum fulvarum.

**Cyllarus. 135.** P. R. Alis integris cæruleis; margine  
nigro, subtus fusco-cinereis, striga  
punctorum ocellatorum, posticis basi  
cæruleis. *Mantiss.* 685.

Wien. Verz. 183. 7. papilio Dæmoetas.

Pod. Mus. Græc. papilio Alexis.

Rœs. inf. 3. tab. 37. fig. 4.

Geoff. inf. 2. 63. 31. papilio alis rotundatis cæruleis, subtus ocellorum fascia solitaria.

Desc. Statura præcedentium. *Alæ* cæruleæ nitidæ, margine postico fusco. *Fœmina* alis fuscis cæruleo micantibus. Subtus omnes cinereæ, striga incurva punctorum nigrorum ocellatorum, punctis *alæ anticæ* ad marginem interiore majoribus. Basis *alæ posticæ* cærulescens, nitida.

*Larva* pallida, striga dorsali rufa, lineis lateralibus obliquis viridibus, capite nigro.

*Puppa* fusca nigro maculata.

Corydon. 136. P. R. Alis integris cæruleo-argenteis, margine nigro, subtus cinereis, punctis ocellaribus, posticis macula centrali alba. *Mantiss.* 693.

Wien. Verz. 184. 10. papilio Corydon.

Desc. Mas. *Antennæ* annulatæ, clava subtus ferruginea. *Alæ* supra argenteæ, nitidæ, margine fusco posticarum maculari. Subtus *anticæ* albidæ, punctis numerosis nigris fere simplicibus; *posticæ* obscuriores, annulo e punctis duodecim ocellatis nigris. In medio hujus annuli macula alba, & pone annulum lunulæ marginales fulvæ, nigro notata. *Fœmina*, antennarum clava subtus ferruginea. *Alæ* fuscæ cæruleo micantes, anticis lunula media atra, posticis lunulis marginalibus fulvis. Subtus puncta magis ocellata lunulæque fulvæ distinctiores.

**Biton. 137.** P. R. ( Damon ) alis integerrimis cæruleis subtus fusco cinereis, punctis numerosis, posticis vitta alba. *M.* 634.

*Wien. Verz.* 182. 6. papilio Damon.

*Hab.* in hedyfaro onobrychis Austriae.

*D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentis. *Alæ* supra cæruleæ nitidæ; *anticæ* lunula media margineque fuscis; *posticæ* margine radiatò fusco ( *femina* alis supra totis fuscis. ) Subtus *omnes* fusco-cinereæ, lunula media punctisque 5, 6 approximatis atris, annulo albo cinctis. *Posticæ* punctis septem ocellaribus minoribus & præterea vitta lata albida, quæ tamen marginem posticum haud attingit.

*Larva* obscure viridis, linea laterali obscuriore, capite nigro.

**Tiresias. 138.** P. R. ( Amyntas ) alis caudatis cyaneis, margine nigro, subtus cinereis, punctis nigris posticisque duobus ferrugineis anguli ani. *Mantiss.* 666.

*Wien. Verz.* 185. 18. papilio Amyntas.

*Desc.* Parvus. *Alæ omnes* cyaneæ, nitidæ, margine nigro ciliis albis. *Anticæ* lunula nigra; *posticæ* cauda parva alba; subtus *omnes* cinereæ, anticis lunula media strigaque valde postica punctorum nigrorum. Margo punctis obsoletioribus. *Posticæ* punctis duobus baseos strigaque valde undulata punctorum; præterea margo strigis duabus punctorum obsoletiorum, inter quas maculæ duæ fulvæ superne inferneque puncto atro.

**Minimus. 139.** P. R. ( Albus ) alis integerrimis fuscis immaculatis, subtus cinereis, striga punctorum ocellatorum. *Mantiss.* 688.

Dd ij

*Wien. Verz.* 184. 9. papilio Alfus.

*Schæff. icon.* 2. tab. 162. fig. 12.

*Desc. Alæ omnes supra fuscæ nitidulæ, subtus cinereæ, anticis lunula media strigaque e punctis 7 nigris annulo albo cinctis, posticis punctis octo aut novem.*

Arcus. 140. P. R. ( Alcon ) alis integerrimis cæruleis, margine fusco, subtus fusco-cinereis, punctis numerosis ocellaribus. *Mantiss.* 683.

*Wien. Verz.* 182. 4. papilio Alcon.

*Desc.* Statura P. arion. Mas alis omnino cæruleis, margine tantum nigricante ciliisque albis. Fæmina obscurior, punctis obsoletis obscurioribus. Subtus omnes fusco-cinereæ, punctis atris numerosis annullo pallido cinctis.

Tiphon. 141. *Obs.* Hic est verus P. hero Linn. Hero autem D. Esp. *Jabæus* D. Fab. *Mantiss.* P. F. 352.

Cleobis. 142. P. D. ( Acis ) alis integris cæruleis, subtus lacte canis, punctis oblongis nigris simplicibus. *Mantiss.* 687.

*Wien. Verz.* 182. 5. papilio Acis.

*Desc.* Mas alis cæruleis, striga tantum marginali atra. Fæmina disco tantum cæruleo, lunula nigra. Subtus argenteo-cinereæ, anticis striga punctorum oblongorum nigrorum absque annulo, posticis punctis sparsis rotundioribus, simplicibus.

Simillimum at caudatum in Russia Australiori invenit D. Boeber.

Telephii. 143. P. R. ( Bathus ) alis integris nigris cæruleo nitidis, subtus albidis, punctis

atris numerosis, posticis fascia fulva continua. *Mantiss.* 697.

*Wien. Verz.* 185. 17. papilio Bathus.

*Desc.* *Alæ* omnes cæruleo-nigræ. In medio *alæ anticæ* lunulæ cyaneæ. Margo ipse albo maculatus. *Subtus* albidæ, *anticis* punctis tribus in medio, strigis quatuor pone medium punctorum atrorum simplicium, *posticis* punctis sparsis baseos. strigisque quatuor apicis punctorum atrorum. Inter strigam 2, 3, fascia lata continua fulva.

Meleager. 144. P. R. (Méléager) alis dentatis cæruleis, limbo nigro, subtus canis, punctis ocellaribus nigris. *Mantiss.* 679.

*Wien. Verz.* 182. 1. ♀ papilio endymion.  
— 182. 2. ♂ papilio daphnis.

*Desc.* Statura omnino P. arion. *Mas* alis minus dentatis cæruleis, margine tenuissime nigro, *fæmina* alis magis dentatis obscurioribus, limbo nigro, lunulis albis.

Amphion. 148. P. R. (Hylus) alis integris, lunula media punctis marginalibus nigris, subtus cinereis, punctis ocellaribus. *Mantiss.* 696.

*Wien. Verz.* 185. 16. papilio Hylus.

*Desc.* Præcedentibus minor. *Alæ* omnes cæruleæ, lunula media nigra. Margo terminatur striga atra & in posticis ante hanc strigam puncta aliquot atra. *Fæmina* obscurior. *Subtus* cinereæ, punctis numerosis ocellaribus nigris & in posticis fascia e lunulis ferrugineis.

Amphidamas. 149. P. R. (Hille) alis integris obscuris cæruleo micantibus, omnibus subtus punctis ocellaribus numerosis. *M.* 730.

Wien. Verz. 181. 4. papilio Hille.

Naturf. 6. tab. 5. fig. 2.

Desc. Parvus. *Ala* supra omnes obscuræ, cæruleo nīcantes lunulisque aliquot apicis fulvis. Subtus *anticæ* punctis iisdem numerolis nigris albo annulatis, & versus apicem fascia fulva.

Optilete. 153. P. R. ( Optilete ) alis integerrimis, cærulescentibus, marginē nigricante, posticis subtus cinereis, punctis ocellaribus atris lunulisque duabus fulvis. *Mantiss.* 691.

Knoch. Beytr. 1. tab. 5. fig. 5. 6.

Desc. Affinis P. argo. *Ala* supra immaculatæ, marginē tenuissime nigro. Subtus *anticæ* cinereæ, puncto medio strigæque postica punctorum ocellatorum; *posticæ* punctis duobus baseos, unico in medio strigæque postica punctorum ocellatorum. Strigæ præterea duæ marginales punctorum nigrorum & inter has lunulæ duæ fulvæ.

Phryne. 156. P. R. ( Phryneus ) alis integerrimis supra albis, subtus fuscis albo venosis, ocellis quinque. *Mantiss.* 354.

Desc. Parvus, tener. Corpus album. *Ala* omnes supra albæ, immaculatæ, subtus fuscae venis albis. Versus marginem ocelli quinque pupilla alba.

Leander. 157. P. R. Alis integerrimis fuscescentibus ( fulvis ) posticis subtus cinereis apice fulvis, ocellis sex. *Mantiss.* 350.

Desc. Statura omnino P. arcani. *Mas*, alis fuscis; *femina*, *anticis* fulvis, *posticis* fuscis, ocello uno alterove aut nullo in alis *anticis* & quatuor aut quinque in *posticis*. Subtus *posticæ*



cinereæ, ocellis sex omnibus approximatis pupilla argentea.

Therfa- 158. P. R. Alis subcaudatis fulvis, subtus punctis ocellaribus numerosis, anticis fulvis, posticis cinereis. *Mantiss.* 733.

*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* fuscum. *Maris alæ anticæ* fulvæ, fere immaculatæ, margine nigro. *Posticæ* obscuriores, fascia postica fulva. *Subtus anticæ* flavescentes, punctis tribus strigaeque pone medium e punctis ocellaribus atris. Pone hæc fascia fulva punctis atris. *Posticæ* cinereæ, punctis numerosis ocellaribus fasciaque postica fulva.

Sylvanus. 164. P. U. Alis divaricatis fuscis, maculis quadratis supra flavis, subtus albis. *Mantiss.* 763.

*Desc.* Statura omnino P. comma. *Alæ omnes* supra fuscæ, maculis plurimis quadratis, postice emarginatis flavis. *Subtus* pallidiores, maculis iisdem at albis.

Thaumas. 165. P. U. *Linea* (la ligne) alis integerimis divaricatis fulvis, margine nigro. *Mantiss.* 762.

*Wien. Verz.* 159. 5. papilio linea.

*Pod. Mus. Græc.* papilio sylvestris.

*Desc.* Affinis P. comma, at distinctus. *Antennæ* supra nigræ, *subtus* flavescentes. *Alæ omnes* fulvæ, haud maculatæ, lineola parva in medio margineque nigris; cilia marginis tamen albida. *Alæ subtus* immaculatæ. *Fæmina* absque linea alæ anticæ.

*Larva* solitaria, viridis, immaculata.

*Puppa* tenuissime folliculata, viridis.

**Steropes. 167.** P. U. *Aracanthus*. Alis rotundatis integerrimis fuscis, posticis subtus griseis, maculis ocellaribus albis. *M.* 808.

*Wien. Verz.* 160. 7. papilio steropes.

*Pall. iter.* 1. 471. 64. papilio morpheus.

*Desc.* Papilio nigro fuscus nitens, alis subtus limbo dentato fulvo, secundariis maculis duodecim albis.

**Alceæ. 168.** P. U. Alis divaricatis fusco cinereoque variis, anticis punctis fenestratis, posticis subtus cinereis immaculatis. *M.* 822.

*Desc.* Nimis affinis P. *malvæ*. *Alæ anticae* minus obscuriores, cinereo variæ punctisque aliquot fenestratis. *Posticae* obscuriores, fasciis macularibus albidis. Subtus *omnes* cinereæ fere immaculatæ, punctis aliquot marginalibus nigris.

**Sylvius. 170.** P. U. ( *Paniscus* ) alis integerrimis divaricatis, posticis utrinque fuscis fulvo maculatis.

*Wien. Verz.* 160. 6. papilio brontes.

*Pall. iter. app. n.* 63. papilio palæmon.

*Knoch. Beytr.* papilio sylvius.

*Desc.* Variat alis anticis fuscis fulvo maculatis & fulvis atro maculatis.

**Lavateræ. 171.** P. U. ( de la lavatere ) alis integris fuscis, anticis albo maculatis, posticis punctatis, omnibus lunula media nivea. *Mantiss.* 825.

*Hab.* Kilicæ.

*Desc.* Statura omnino P. *fritilli*, at duplo minor. *Alæ anticae* concolores, fuscae, in medio valde albo maculatæ & in centro lunula nivea distincta annulo nigro cincta. *Posticae* fuscae, albo punctatæ, lunula media distincta, *subtus* concolores.

*Sidæ*. 172. P. U. Alis integris divaricatis nigris albo punctatis, posticis subtus cinereis, fasciis duabus flavis. *Mant.* 823.

*Desc.* Statura omnino P. *fritilli*, at paullo major. *Alæ omnes* supra fuscæ, maculis quadratis albis posticarum obsoletioribus. Subtus *antica* obscuræ, maculis iisdem albis. *Postica* albidæ, fasciis duabus flavis nigro marginatis, anteriore abbreviata.

*Edusa*. P. C. ( *Éduse* ) Alis integerrimis fulvis, puncto margineque nigris, subtus virescentibus, anticis puncto nigro, posticis argenteo. *Mantiss.* 240.

*Esp. pap.* 1 tab. 4. fig. 1. papilio hyale. *Hab.* in Hispania. D. *Vahl.*

*Desc.* Nimis affinis P. *hyale*, at *alæ* supra fulvæ, puncto anticarum medio apicibusque atris. *Antennæ* fulvæ. *Mas*, margine nigro immaculato; *fæmina*, flavo maculato.

*Œdippus*. P. F. ( *Œdippe* ) alis integerrimis supra nigris immaculatis, subtus fuscis, anticis ocellis subtribus, posticis quinque. *Mantiss.* 335.

*Hab.* in Russia Australiori. D. *Boeber.*

*Desc.* Statura omnino P. *hyperanthi*. *Antennæ* albo nigroque annulatæ, clava ferruginea. *Alæ omnes* supra nigræ immaculatæ, subtus fuscæ, ocellis subtribus, posticis quinque pupilla argentea, unico remoto. *Strigæ* marginalis argentea fere obsoleta.

*Manto*. P. G. ( *Manto* ) alis integris fuscis, punctis ocellaribus anticarum quatuor, posticarum tribus, posticis subtus cinereis fusco undatis. *Mantiss.* 397.

Wien. Verz. 169. 15. papilio Manto.

Hab. in Austria. D. Schieffermyller.

Desc. Medius. *Antennæ* supra fuscæ, subtus albidæ, clava ferruginea. *Alæ* supra fuscæ, cæruleo micantes, punctis ocellaribus atris iride ferruginea. Subtus *anticæ* disco ferrugineo. *Posticæ* cineræ, strigis duabus undatis punctisque duobus. fuscis.

Alcyone. P. G. ( Alcyone ) alis dentatis fuscis flavo fasciatis, anticis utrinque ocellis duobus, posticis subtus marmoratis. *Mant.* 399.

Esp. pap. tab. 84. fig. 4. papilio agave.

Hab. in Russiæ Australioris montosis. D. Boeber.

Desc. Simillimus P. *femele*, at fascia alarum distinctior, major striga nigra terminata. *Alæ* minus dentatæ, ciliis albidioribus, & *alæ anticæ* subtus haud disco rufo baseos uti in P. *femele*, sed totæ flavescens strigis nigris.

Medusa. P. G. ( Méduse ) alis subdentatis concoloribus fuscis omnibus fascia maculari flava, ocellis subquatuor. *Mant.* 410.

Wien. Verz. 167. 10. papilio Medusa.

Esp. pap. 1. tab. 7. fig. 2. papilio ligea.

Alb. inf. tab. 5. fig. 1.

Schæffer. icon. tab. 183. fig. 2. 3.

Naturf. 8. 113. 1.

Hab. in Austriæ punica. D. Schieffermyller.

Desc. Statura omnino P. *ligea*. *Alæ* omnes fuscæ, immaculatæ, at ante marginem fascia macularis, & in hac ocelli iride atra pupilla alba. Numerus eorum variat. *Corpus* atrum immaculatum.

Obs. An pap. *ligea* distinctus? V.

**Epiphron. P. G.** (Épiphron.) alis integris nigris fascia rubra, anticis supra ocellis duobus subtus tribus, posticis supra tribus subtus quinque. *Mantiss.* 411.

*Knoch. Beytr.* 3. tab. 6. fig. 7. papilio Epiphron.

*Hab. in Germaniæ montosis. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino & summa affinitas *P. medusæ*, at duplo fere minor. *Corpus* atrum, antennis subtus albis. *Alæ* supra nigricantes, fascia fulva, anticarum imprimis, valde abbreviata, ocellis duobus approximatis; *posticæ* ocellis tribus omnibus pupillaris. *Subtus* concolores, at anticis ocellis tribus, posticis ocellis quinque. Numerus ocellorum *alæ anticæ* variat.

**Arachne. P. G.** (Arachné) alis integris atris, anticis utrinque fascia rufa ocellis duobus, posticis subtus fascia dentata cinerea. *Mantiss.* 415.

*Wien. Verz.* 169. 18. papilio Arachne.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino *P. erinæ*. *Alæ omnes* atræ, cæruleo micantes. *Anticæ* utrinque fascia abbreviata rufa & in hac ocelli duo approximati pupilla alba. *Posticæ* supra atræ, fascia parva maculari rubra, interdum puncto uno alterove ocellari. *Subtus* atræ, fascia dentata cinerea. *Antennæ* supra nigræ, subtus albæ.

**Pyrrha. P. G.** (Pyrrha) alis integris fuscis, fascia rubra anticarum nigro punctata, posticarum maculari. *Mantiss.* 416.

*Wien. Verz.* 167. 9. papilio Pyrrha.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *P. ligea* paullo minor. *Antennæ*

supra nigræ, subtus albæ. *Alæ omnes* supra fuscæ, fascia rufa quæ tamen margines haud attingit. In hac fascia *alæ anticæ* puncta aliquot nigra, *posticæ* macularis, immaculata. *Corpus* immaculatum.

**Cassiope. P. G.** (Cassiopé) alis integris fuscis, fascia rufa, punctis tribus ocellaribus nigris, posticis subtus punctis solis. *Mantiss.* 417.  
*Hab. in Austriæ* gramine. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedenti affinis, at paullo minor. *Corpus* nigrum. *Antennæ* supra nigræ, subtus pallidæ. *Alæ omnes* supra nigræ, fascia margines haud attingente, in posticis imprimis maculari rufa & in hac puncta tria nigra. Subtus *anticæ* concolores; *posticæ* punctis tribus at absque fascia rufa.

**Arete. P. G.** (Areté) alis integris fuscis, fascia rufa, posticis utrinque striga punctorum alborum. *Mantiss.* 418.

*Hab. in Austriæ* montosis. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis. *Corpus* nigrum, abdomine subtus griseo. *Alæ* supra nigræ, anticis fascia lata rufa, quæ tamen margines haud attingit & in fascia puncta subtria ocellaria alba. *Posticæ* nigræ, fascia obsoleta rufa & in hac puncta quatuor distincta alba. Subtus *anticæ* disco ferrugineo, punctis tribus ocellaribus albis; *posticæ* griseo-virescentes, striga e punctis septem albis.

**Salome. P. G.** (Salomé) alis anticis fuscis, fascia rufa, anticis ocello, posticis tribus, subtus



*striga dentata alba ocellisque quinque.*  
*Mantiss.* 419.

*Esp. pap. tab.* 67. *fig.* 4.

*Hab. in* Gibraltar. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura præcedentium at distinctus  
 alis posticis subtus nigris , *striga* uni-  
 dentata alba ; & pone hanc ocelli quin-  
 que parvi pupilla alba. *Ocellus* alæ  
 anticæ in nostris pupilla simplici.

*Ilia. P. G.* (*Ilia*) alis dentatis cœruleo micantibus ;  
 utrinque fascia alba interrupta , omni-  
 bus ocello unico. *Mantiss.* 461.

*Wien. Verz.* 172. 2. papilio *Ilia*.

*Esp. pap. tab.* 37. *fig.* 1. papilio *iris*.

— *tab.* 43. *fig.* 1.

*Hab. in* Germaniæ salice. *D. Schieffer-  
 myller.*

*Desc.* Differre a *P. iris* videtur. Differt  
 ocello distincto in pagina inferiori *alæ  
 posticæ* minus distincto fasciaque haud  
 dentata , nec ocello compresso sed  
 sesqui-altero.

Variat colore nigro albo fasciato & flavo  
 fuscoque vario , semper tamen cœruleo  
 micante. *Fæminæ* magis unicolores  
 minus micant.

*Iole. P. G.* (*Iole*) alis dentatis fuscis cœruleo  
 micantibus , posticis ocello unico ,  
 subtus brunneis , margine rubente.  
*Mantiss.* 462.

*Wien. Verz.* 172. 3. papilio *Iole*.

*Esp. pap. tab.* 46. *fig.* 1. papilio *Iole* , at  
 pagina inferior alarum differt.

*Hab. in* Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & summa affinitas præce-  
 dentis. *Alæ omnes* supra fuscae , cœru-  
 leo micantes. Maculæ duæ distinctæ  
 albæ versus apicem alæ anticæ & ocellus

parvus iride ferruginea versus angulum ani. Subtus omnes basi apiceque rubentes in medio brunneæ. Maculæ duæ magnæ nigræ, albæ innatæ versus marginem crassiorē alæ anticæ.

**Hyppipyle. P. P.** (Hyppipyle) alis dentatis flavis nigro variis apice radiatis, posticis punctis septem rubris. *Mantiss.* 504.

*Esp. pap. tab. 15. fig. 1.* papilio rumina.  
— *tab. 53. fig. 2.*

*Ræf. inf. 4. tab. 7. fig. 1. 2.*

*Schæff. icon. tab. 120. fig. 1. 2.*

Larva flava nigro punctata, spinis carnosis verticillatis rubris, apice nigris.

Puppa pallida, capite obtuso.

**Aceris. P. P.** (de l'érable) alis dentatis albo fasciatis supra nigris, subtus fulvis. *Mantiss.* 514.

*Esp. pap. tab. 82. fig. 1.* papilio Aceris.  
Mus ex India.

— *tab. 81. fig. 34.* minor ex Hungaria.

*Hab. in Acere Europæ, Asiæ.*

*Desc.* major a minore vix distinctus.

**Lucilla. P. P.** (Lucile) alis dentatis supra fuscis subtus brunneis, utrinque fascia maculari alba. *Mantiss.* 549.

*Wien. Verz. 173. 4.* papilio Lucilla.

*Esp. pap. tab. 59. fig. 1.* papilio camilla.

*Pall. iter. 1. app. n. 62.* papilio sapho.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & summa afinitas præcedentium. Differt tamen alis anticis supra linea alba interrupta a basi ad fasciam ducta, posticis, excepta fascia alba, immaculatis. Subtus brunneæ, posticis basi litura tantum alba & pone fasciam striga lunularum albarum.

**Delia.** P. P. ( *Délie* ) alis dentatis fulvo nigroque variis , posticis supra punctis quatuor ocellaribus , subtus albis fasciis duabus fulvis , posteriore nigro punctata.  
*Mant.* 176.

*Wien. Verz.* 179. 6. papilio Delia.

*Rœf. inf.* 4. tab. 13. fig. 4. 5. larva puppa.

— tab. 18. fig. 4. imago.

*Hab.* in Germaniæ Australioris plantagine.

*Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ* supra fulvo nigroque variæ , margine ciliis albidis. In posticis ante marginem puncta 3 , 4 nigra annulo fulvo cincta. Subtus *antica* fulvæ , apice fulvæ , nigro punctatæ. *Postica* basi flavæ , punctis quatuor nigris , tunc fascia fulva interne bifida , nigro marginata , tunc fascia alba nigro punctata , demum fascia fulva nigro marginata punctataque. Margo flavus , nigro punctatus.

*Larva* spinosa atra , lateribus albo punctatis.

*Puppa* livida fulvo punctata.

**Hecate.** P. P. ( *Hécate* ) alis dentatis fulvis nigro maculatis , omnibus apice strigis duabus punctorum nigrorum. *Mant.* 578.

*Wien. Verz.* 179. 4. papilio Hecate.

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ omnes* supra fulvæ , nigro maculatæ & ante marginem strigæ duæ punctorum nigrorum. Margo ipse niger , lineolis fulvis ciliisque albis. Subtus *antica* fulvæ nigro undatæ , strigis iisdem. *Postica* basi flavæ , fascia fulva nigro marginata ; tunc fulvo flavoque variegatæ , strigis duabus punctorum nigrorum distinctorum.

**Artemis. P. P.** (Artémis) alis dentatis fulvis nigro variis, posticis utrinque striga punctorum nigrorum. *Mant.* 579.

*Wien. Verz.* 322. 10. papilio Artemis.

*Hab.* in Austriæ montosis. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Alæ supra fulvæ nigro undatæ. Ante marginem posticum alæ posticæ, striga e punctis septem nigris distinctis. Subtus pallidiores. Posticæ fulvæ, fasciis duabus flavis, anteriore extrorsum bifida. Ante marginem striga e punctis septem nigris. Margo flavus.

**Cynara. P. P.** (Cynara) alis dentatis viridibus nigro maculatis, posticis subtus viridibus maculis tribus fasciisque duabus argenteis. *Mantiff.* 586.

*Wien. Verz.* 176. 1. papilio Pandora.

*Esp. pap. tab.* 58. fig. 1. 2. 3.

*Lesc.* Puncta interdum quinque argenteæ inter fascias.

**Laodice. P. P.** (Laodice) alis dentatis fulvis nigro maculatis, posticis subtus apice fuscis glauco nitentibus, fascia argentea interrupta terminante. *Mantiff.* 587.

*Pall. iter.* 1. app. n. 61. papilio Laodice.

*Schneid. pap. Europ. tab.* 1. fig. 1. 2. papilio Laodice.

*Hab.* in Borussia, Moscovia. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura & magnitudo fere *P. paphiæ*. Punctum album versus apicem alæ anticæ. Subtus anticæ flavescentes, nigro maculatæ strigaeque e punctis argenteis obsoletis. Posticæ basi flavescentes, striga sesqui-altera brunnea, in medio striga interrupta, inæqualis argentea & pone hanc alæ fuscæ argenteo nitidulæ;

nitidulæ, strigis duabus e punctis  
obscurioribus.

Daphne. P. P. (Daphné) alis dentatis fulvis nigro  
maculatis, posticis subtus flavis rufo  
venosis apice ferrugineo argentatis.  
*Mantiss.* 602.

*Wien. Verz.* 177. 10. papilio Daphne.  
— 179. vix differt. conf. papilio  
Dictynna.

*Hab. in rubo idæo Austriæ. D. Schieffer-*  
*myller.*

*Desc. Alæ omnes, uti & anticæ, subtus*  
*fulvæ nigro maculatæ. Posticæ subtus*  
*basî flavæ, ferrugineo fere reticulatæ,*  
*apice brunneæ, argenteo nitidæ,*  
*punctis aliquot ocellaribus fuscis.*

*Larva spinosa fusca albido lineata, spinis*  
*flavis.*

*Puppa virescens subtus multidentata.*

Spini. P. R. (du prunier épineux) alis caudatis  
fuscis subtus cinereis, lunulis margi-  
nalibus fulvis maculaque ani cæru-  
lescente. *Mantiss.* 651.

*Wien. Verz.* 186. 5. papilio spini.

*Hab. in Germaniæ pruno spinosa. D.*  
*Schieffermyller.*

*Desc. Nimis affinis P. pruni. Alæ supra*  
*omnes fuscae, posticis apice maculis*  
*aliquot rufis. Cauda apice alba. Subtus*  
*cinereæ, striga alba ad angulum ani*  
*parum angulata. Versus marginem pos-*  
*ticum lunulæ aliquot fulvæ nigro no-*  
*tatæ, & ad angulum ani macula magnâ*  
*cærulescens, puncto terminali atro.*

*Larva viridis, lineis dorsalibus macula-*  
*ribus flavis, capite nigro. Aldultior*  
*rufescens evadit.*

*Puppa supra fusca, subtus cinereo villosa.*

Linceus. P. R. ( Lincée ) alis caudatis fuscis immaculatis , posticis subtus striga lunulata alba rufaque. *Mantiff.* 653.

*Esp. pap.* papilio Linceus.

*Hab.* in Russiæ. Borealis sylvaticis.  
*D. Boeber.*

*Desc.* Statura & summa affinitas P. *spini*.  
*Alæ omnes* supra fuscæ , *maris* immaculatæ , *maris* macula disci fulva.  
*Cauda alæ posticæ* parva , obtusa.  
*Subtus alæ anticæ* fuscæ , striga abbreviata e lunulis quinque albidis.  
*Posticæ* fuscæ nitidulæ , striga e lunulis plurimis albis & pone has lunulæ aliquot rubræ.

Cerasi. P. R. ( du cerisier ) alis caudatis fuscis immaculatis , subtus striga alba , posticis lunulis fulvis , puncto nigro notatis.  
*Mantiff.* 654.

*Hab.* in Austriæ ceraso.

*Desc.* Statura omnino & summa affinitas P. *pruni*. *Alæ omnes* supra fuscæ , immaculatæ. *Subtus anticæ* fuscæ , striga unica alba. *Posticæ* fuscæ , striga alba & ad angulum ani lunulæ duæ vel tres fulvæ puncto atro. *Cauda* apice alba.

Acaciæ. P. R. ( de l'acacia ) alis caudatis fuscis subtus cinerascensibus , striga alba lunulisque analibus fulvis. *Mantiff.* 655.

*Hab.* in Russia Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Præcedentibus paullo minor. *Alæ anticæ* supra fuscæ , immaculatæ , subtus cinerascens , striga alba. *Posticæ* supra fuscæ , maculis duabus marginalibus fulvis. *Subtus* cinerascens , striga alba lunulisque analibus fulvis , puncto uno alterove atro.



**Erebus. P. R.** ( Erebe ) alis integerrimis fuscis , omnibus subtus striga punctorum ocellatorum. *Mantiff.* 682.

*Knoch. Beytr.* 2. tab. 6. fig. 8. 7. papilio Erebus.

*Desc.* Magnus. *Antennæ* albo nigroque annulatæ , clava nigra. *Alæ* supra fuscae , immaculatæ , subtus fuscae , striga flexuosa e punctis septem atris subocellatis.

**Triton. P. R.** ( Triton ) alis integerrimis cæruleis , subtus striga ferruginea punctisque numerosis nigris. *Mantiff.* 692.

*Hab.* in Russia Meridionali. *D. Boeber.*

*Desc.* Medius. *Alæ omnes* supra cæruleescentes , striga tenui marginali nigra. Subtus omnes cinereæ. *Anticæ* puncto medio plurimisque apicis vix ocellatis , nigris , ante apicem striga e lunulis ferrugineis. *Posticæ* punctis plurimis nigris strigaque postica ferruginea.

**Dorylas. F. R.** ( Dorylas ) alis integris cæruleis ( fuscis ) subtus cinereis , anticis puncto medio strigaque postica punctorum ocellatorum. *Mant.* 695.

*Wien. Verz.* 322. 19. papilio Dorylas.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis nimis P. *Adonis* , at paullo minor. *Mas* alis supra cæruleis nitidis , striga marginali atra. *Fæmina* alis fuscis , lunulis marginalibus fulvis. Subtus cinereæ , anticæ macula magna centrali ocellari & pone hanc striga e punctis 6, 7 ocellaribus. Margo albicat : *posticæ* puncto baseos , striga incurva punctorum ocellatorum & in medio macula cuneata alba.

Argiades. P. R. (Argiade) alis integerrimis cæruleis, margine nigricante, subtus fusco-cinereis, lunula media strigisque duabus punctorum ocellatorum. *Mantiss.* 698.

*Hab.* in Saxonia. D. Boeber.

*Desc.* Statura omnino præcedentium. *Alæ omnes* supra cæruleæ, margine nigro, ciliis albis. Subtus *omnes* fusco-cinereæ, lunula centrali strigisque duabus e punctis ocellatis, posteriore obsoletiore. In posticis præterea puncta duo ocellata basæos.

Acreon. P. R. (Acréon) alis integerrimis fuscis subtus nigro ocellatis, posticis fascia alba rubra strigique punctorum aureorum. *Mantiss.* 699.

*Hab.* in Russia Meridionali. D. Boeber.

*Desc.* *Alæ omnes* fuscæ, maris basi cæruleo nitidæ lunulisque marginalibus obsoletis fulvis. Subtus *omnes* fuscescentes, anticis puncto medio strigique postica punctorum ocellatorum. Margo lunulis albis, nigris, fulvis, nigris albisque strigosus. *Posticæ* fuscæ, punctis nigris ocellatis. Margo albus fascia fulva antice lunulis nigris, postice punctis læte aureis notata.

Chryseis. P. R. (Chryseis) alis aureis margine cærulescente, posticis subdentatis, subtus obscure griseis, punctis ocellaribus numerosis. *Mantiss.* 725.

*Wien. Verz.* 181. 3. papilio Chryseis.

*Esp. pap. tab. fig.* papilio Eurydice.

*Hab.* in Austria. *Mus.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Nimis affinis P. *Hippothoe*. *Mas* alis aureis nitidis, lunula nigra margineque cæruleo nitente tenuissimeque albo. Subtus *antica* obscure cinereæ,

disco fulvo, punctis ocellaribus numerosis. *Posticæ* in angulum excurrentes, cinereæ, itidem punctis numerosis posticeque fasciola rufa.

*Fæmina* alis supra fuscis fulvo micantibus, *anticis* punctis aliquot obscurioribus, *posticis* fasciola fulva nigro punctata. *Subtus* mari simillima.

Hiere. P. R. (Hiere) alis fuscis nigro punctatis, subtus cinereis, punctis ocellaribus numerosis. *Mant.* 726.

*Wien. Verz.* 322. 8. papilio Lampehe.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo præcedentium. *Mas* alis fuscescentibus, *anticis* cæruleo, *posticis* fulvo micantibus, *anticis* punctis sparsis nigris, *posticis* lunula media nigra fasciaque postica fulva fere obsoleta.

*Fæmina* fusca nigro punctata, *posticis* fasciola fusca distinctiore nigro punctata & ante hanc fasciam lunulæ aliquot cyaneæ. *Subtus omnes* cinereæ, punctis numerosis. *Posticæ* fasciola postica fulva.

Xanthe. P. R. (Xanthe) alis subintegris fuscis nigro punctatis, fascia marginali fulva, subtus lutescentibus punctis numerosis. *Mantiss.* 731.

*Wien. Verz.* 181. 6. papilio Xanthe.

*Esp. pap. tab. fig.* papilio Phocas.

*Hab. in rumice acetosa. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minor. *Alæ omnes* fuscae, nigro punctatæ margineque tenuissime albo & ante marginem fasciola fulva nigro punctata. *Subtus* virescentes, punctis numerosis ocellaribus nigris, *anticis* disco fulvo, *posticis* fasciola fulva, apice subemarginatis.

Garbus. P. R. ( Garbus ) alis fuscis nigro punctatis ,  
margine albo , subtus virescentibus ,  
punctis numerosis. *Mantiss.* 732.

*Wien. Verz.* 181. 7. papilio Circe.

*Hab. in Austria acetosella. D. Schieffer-  
myller.*

*Desc.* Nimis præcedenti affinis & forte  
*mas* in copula captus. *Alæ omnes*  
fuscae, obscuræ, nigro punctatæ mar-  
gineque postico albido. Puncta ali-  
quot fulva ante marginem *alæ posticæ*.  
*Subtus* nigro punctatæ, *antica* cine-  
rascentes; *posticæ* haud emarginatæ,  
sed in angulum excurrentes, vires-  
centes, postice fasciola fulva.

Fritillum. P. U. ( le ponctué ) alis integris divaricatis  
nigris albo punctatis. *Mantiss.* 824.

*Geoff. inf.* 2. 67. 38. papilio alis den-  
ticulatis divaricatis nigris albo punc-  
tatis.

*Esp. pap. tab.* 51. *fig.* 2. papilio malvæ.

*Schæff. elem. tab.* 94. *fig.* 9.

*Wien. Verz.* 159. 3.

*Hab. in Germaniæ dipsaco fullonum.*

*Desc.* Differt sane a P. *malvæ*. *Alæ*  
haud dentatæ, margine albo nigroque  
variegato.

*Color alæ posticæ* subtus variat.

*Variat* major maculis alarum pluribus,  
vix tamen distinctus in Russia Meri-  
dionali. Papilio *malvæ* major.

*Esp. pap. tab.* 23. *fig.* 2.

### *Sphinx.*

Afiliformis. 25. S. Alis anticis fuscis, posticis fenestratis,  
abdomine barbato atro, cingulis tribus  
flavis.

*Wien. Verz. app.* sphinx afiliformis.

*Desc.* Minor sph. apiformi. *Palpi* apice flavi. *Caput* atrum, linea oculorum argentea. *Thorax* ater, margine antico tenuissime flavo punctoque flavo ante alas. *Abdomen* atrum nitidum, cingulis tribus flavis. *Alæ antica* fuscae, immaculatæ; *postica* hyalinæ, margine postico nigro. *Tibiæ postica* flavæ.

Tenthredini- 29. *S. Alis fenestratis*, margine omni  
niformis. fasciaque nigris, capite thoracis lateribus abdominisque barbati cingulo fulvo.

*Wien. Verz.* 44. 6. sphinx tenthrediniformis.

*Desc.* Parva. *Antennæ* nigræ. *Caput* thoracisque latera fulva. *Pedes* fulvi, geniculis nigris.

Ichneumono- 36. *S. Alis fenestratis*, margine fasciaque  
niformis. nigris puncto fulvo, abdomine cingulis albis nigrisque alternis.

*Wien. Verz.* 44. 7. sphinx ichneumoniformis.

*Desc.* *Antennæ* nigræ, interdum basifluteæ. *Caput* albidum, vertice nigro. *Thorax* niger, lateribus flavis. *Abdomen* cingulis albis nigrisque latioribus alternis. *Alæ antica* nigræ, margine omni fusco, & in medio fascia nigra puncto fulvo. *Postica* hyalinæ, margine postico punctoque ad marginem interiorem nigris. *Pedes* flavi.

Lonicera. 45. *S. (Fulvia) cyanea*, alis anticis viridibus, punctis quinque rubris, posticis fanguineis, limbo cyaneo.

*Wien. Verz.* 45. 3. sphinx loti.

Ee. iy.

Scabiosellæ. { 46. S. ( Pythia ) atra , alis anticis  
 Pilosellæ, { viridibus , maculis tribus oblongis  
 approxmatis sanguineis , posticis rubris.  
*Larva* pilosa alba , capite lineis duobus  
 punctorum pedibusque anticis nigris ,  
 posticis flavis.

Peucedani. 49. S. ( filipendulæ ) alis anticis cyaneis ,  
 punctis sex rubris , posticis rubris mar-  
 gine cyaneo.  
*Wien. Verz.* 45. 4.  
*Rœf. inf.* 1. tab. 57. fig. 6.  
*Desc.* Variat rarius abdominis cingulo  
 rufo.

Aeacus. 50. S. Cyanea , alis anticis punctis sex  
 flavis , posticis flavis , margine cyaneo.  
*Wien. Verz.* 45. 8. sphinx Aeacus.  
*Desc.* Statura & magnitudo S. *Ephialtes*.  
*Corpus* cyaneum , nitidum , cingulo  
 abdominis flavo. *Alæ* cyaneæ , punctis  
 sex flavis 2 , 2 , 2 oblique positis.  
*Posticæ* flavæ , margine late cyaneo.

Pruni. 56. S. Viridi-cærulea , alis posticis nigris.  
*Wien. Verz. app.* 308. 12. sphinx pruni.  
*Desc.* Nimis affinis S. *staticis* , at duplo  
 fere minor & larva alia.

Lineata. S. ( le rayé ) alis virescentibus , fascia  
 frigidisque albis , posticis nigris , fascia  
 rubra.  
*Arch. inf. fyeft. monog. C. fig.* sphinx  
 Kœchlini.  
*Petiv. gazoph. tab.* 12. fig. 9.  
*Hab. in* gallio vero.  
*Larva* caudata , flavicans nigro maculata ,  
 capite linea dorsali stigmatibusque  
 rubris.  
*Puppa* fusca.



**Sphegiformis. S.** ( le sphégiforme ) alis hyalinis margine fasciaque atris , abdomine barbato , cingulo flavo , antennis ante apicem albis. *Mantiss. fesia* 13.

*Wien. Verz. app.* 305. 10. sphinx sphegiformis.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minor *S. apiformi*. *Antennæ* nigrae ante apicem albæ. *Caput* nigrum , palpis fubtus flavis. *Thorax* ater , lateribus flavis. *Abdomen* barbatum , atrum , cingulo secundi segmenti flavo , prætereaque puncta utrinque duo laterali flava. *Pectoris* latera flava.

**Sedi. S.** ( du sédum ) cyanea , alis anticis maculis tribus connatis , posticis totis rubris. *Mantiss. zygaena* 4.

*Hab. in Russia Meridionali. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino præcedentium. *Corpus* totum cyaneum , nitidum. *Alæ anticæ* cyaneæ , maculis tribus magnis una post alteram positis , annulo flavo cinctis rubris. *Posticæ* rubrae , margine tenuissime nigro.

## B O M B Y C E S.

*Alis reversis.*

**Populi- 27. B.** Alis reversis testaceis dentatis , lunulis numerosis fuscis.

*Wien. Verz.* 310. 5. bombyx populifolia.

*Desc.* Major bomb. *quercifolia*. *Os* nigrum. *Thorax* testaceus , linea dorsali nigra. *Alæ omnes* testaceæ , lunulis numerosis distinctis fuscis. *Posticæ* semitectæ apice pallidiores.

**Taraxaci. 29. B.** Alis subreversis pallidis unicoloribus ,

anticis puncto medio fusco, corpore fulvo.

*Wien. Verz.* 57. 7. bombyx taraxaci.

*Desc. Major. Corpus* hirtum, fulvum, abdominis dorso nigricante. *Alæ omnes* pallidæ, *anticis* puncto parvo fusco. *Pedes* apice atri.

*Larva* pilosa atra, fasciis abbreviatis flavescens.

Trifolii. 30. B. Alis reversis ferrugineis, anticis striga punctoque albis, posticis immaculatis.

*Wien. Verz.* 57. 4. papilio trifolii.

*Ræf. inf.* 1. pap. 2. tab. 35. a. fig. 4. 5. imago.

— tab. 35. b. fig. 1. larva.

*Desc.* Affinis bomb. *quercus*. Differt tamen alis utrinque sexus brunneis. *Posticæ* immaculatæ.

*Larva* solitaria pilosa dilute fusca, incisuris cæruleis punctatis, collari rubro.

*Puppa* folliculata antice flava, postice brunnea.

Lentipes. 31. B. (Énéria) alis reversis luteis (brunneis fæm.) puncto albo, apice pallidioribus.

*Knoch. inf.* 1. tab. 2. bombyx Enéria.

*Wien. Verz.* 57. 3. bombyx catax.

*Desc.* Species omnino distincta. *Mas* flavescens, *fæmina* brunnea, puncto medio niveo.

*Ova* aggregata hirsutæ matris tectæ, disco impresso.

*Larva* gregaria, pilosa, brunnea, incisuris nigris maculisque lateralibus cæruleis sulphureo punctatis.

*Puppa* folliculata flavescens.

Franconica. 35. B. Alis reversis hyalino-albidis, striga pallida, limbo nigro.

*Wien Verz.* 57. 6. bombyx Franconica.  
*Desc.* Minor bomb. *Neustria*. *Antennæ*  
 fuscæ. *Caput & thorax* hirta flavesc-  
 centia. *Abdomen* fuscum. *Alæ omnes*  
 albo-hyalinæ, limbo nervisque fuscis.  
 Striga albida in medio.

*Fæmina* major, tota brunnea, imma-  
 culata, lunula sola media alæ anticæ  
 parum obscuriore.

**Pudica. 54. B.** Alis deflexis albis anticis fusco macu-  
 latis, posticis immaculatis.

*Desc.* Statura & magnitudo bomb. *macu-  
 losæ*. *Caput & thorax* fusca, thorace  
 lunulis duabus antice connatis albis.  
*Alæ omnes* albæ, *anticæ* maculis fere  
 trigonis numerosis fuscis. *Posticæ* im-  
 maculatæ. *Subtus* subconcolores, pos-  
 ticiis maculis duabus fuscis.

**Casta. 55. B.** Alis deflexis atris, fasciis duabus den-  
 tatis albis, posticis rubris, maculis  
 marginalibus fuscis.

*Desc.* Statura & magnitudo bomb. *macu-  
 losæ*. *Corpus* nigrum. *Thorax* fascia  
 antica pallida. *Abdomen* punctis baseos  
 rubris. *Alæ anticæ* nigræ, fasciis  
 duabus unidentatis albis. Punctum  
 parvum in medio castæ & litura versus  
 apicem.

**Maculosa. 57. B.** Alis deflexis nigro maculatis, anticis  
 fuscis, posticis rubris.

*Wien. Verz.* 59. 10. phalæna maculosa.  
*Knoch. Beytr.* 3. tab. 5. fig. 2. phalæna  
 maculosa.

*Hab.* in Germaniæ Australioris gallio  
 aparineo. *Mus. D. Zschuck.*

*Desc.* Magnitudo bomb. *plantaginis*.  
*Thorax* cinereus, lineis tribus atris.

*Alæ anticæ* fuscæ, punctis plurimis atris sparsis. *Posticæ* rubræ, striga lunula maculisque tribus marginalibus atris, interiore geminata. *Abdomen* atrum, linea laterali sanguinea, quæ tamen apicem haud attingit.

*Larva* solitaria pilosa nigra, verrucis cæruleis lineaque dorsali flava.

*Obs.* An varietas? An species?

Auriflua. 59. B. Alis deflexis albis, anticis subtus costa fusca, ano barbato luteo.

*Wien. Verz.* 52. 4. bombyx auriflua.

*Raf. inf.* 1. phal. 2. tab. 21.

*Desc.* Summa affinitas bomb. *chrysoorrhoeæ*, differt tantum costa alæ *anticæ* subtus nigra. Puncta interdum nigra sparsa in pagina superiori alarum.

*Larva* pilosa, nigra rubro lineata punctisque lateralibus albis, verruca collari caudalique.

Lucifera. 66. B. Alis deflexis atris, angulo ani flavo, abdomine supra flavo, linea dorsali punctata nigra.

*Wien. Verz.* 54. 4. bombyx lucifera.

*Desc.* Statura præcedentium. *Caput & thorax* atra. *Abdomen* subtus atrum, supra flavum, linea punctorum nigrorum. *Alæ omnes* atræ, angulo ani flavo.

Plumige-72. B. Alis deflexis subferrugineis, striga flavescente, antennis maris pectinatis.

*Wien. Verz.* 61. 2. bombyx plumigera.

*Desc.* Media. *Corpus* hirtum, ferrugineum. *Alæ anticæ* mox ferrugineæ, unicolores, mox flavo mixtæ, striga palidior; *posticæ* immaculatæ. *Ab-*

*domen flavescens. Antennæ maris radiis longissimis.*

*Larva solitaria glabra viridis, albo lineata.*

Cassinia. 74. B. Alis deflexis griseis, lineolis abbreviatis nigris sparsis.

*Wien. Verz. 61. 1. bombyx. Cassinia.*

*Desc. Magna. Thorax cinereus, linea dorsali lateralique atra. Alæ anticæ griseæ, lineis aliquot atris. Versus marginem posticum striga fere obsoleta, angulata, pallida. Alæ posticæ pallidæ. Subtus albidæ, macula centrali fusca.*

Anacho-77. B. Alis deflexis griseis, strigis albidis, macula apicis fusco ferruginea, striga undata alba.

*Wien. Verz. 56. 3. bombyx anachoreta.*

*Ræf. inf. 3. tab. 43.*

*Desc. Affinis præcedentibus. Alæ griseæ, strigis quatuor albidis, quarum ultima maculam apicis undata transit. Ad angulum ani alæ anticæ puncta duo atra, uno altero majore.*

*Larva pilosa fusca, striga dorsali incarnata, verrucis duabus elevatis punctisque lateralibus rufis.*

*Puppa folliculata, brunnea.*

Reclusa. 78. B. Alis deflexis griseis, strigis albidis subanastomosantibus, macula apicis ferruginea, puncto marginali albo.

*Wien Verz. 56. 4. bombyx reclusa.*

*Ræf. inf. 4. tab. fig. 1.-6.*

*Desc. Nimis affinis bomb. curtulæ, sed paullo minor. Strigæ alarum albæ magis interruptæ, magis anastomosantes. Macula ferruginea apicis minor, puncto tantum marginali albo & puncta atra anguli ani. Alæ anticæ omnino desunt.*

*Larva* fusca, linea dorsali cinerea, maculis duabus nigris.

*Puppa* folliculata, brunnea.

**Tritophus. 103.** B. (Tritophe) alis deflexis dorso dentatis, fusco nebulosis, lunula media ferruginea albo cincta.

*Wien. Verz.* 63. 6. bombyx Tritophus.

*Desc.* Statura omnino bomb. *χiczac.*

*Caput & thorax* hirta, fusca. *Abdomen* cinereum. *Alæ anticae* fusco nebulosæ, strigis aliquot obsoletis, undatis, obscurioribus. In medio lunula alba, pupilla lunata ferruginea. *Posticae* albæ, litura anali fusca.

*Larva* solitaria nuda viridis, gibberibus dorsalibus tribus caudalique obtusa, capite fusco.

**Oleagina. 104.** B. Alis deflexis viridibus fusco subundatis, maculis duabus albis, anteriore pupillata, posteriore majore.

*Wien. Verz.* 59. 2. bombyx oleagina.

*Desc.* *Antennæ* pectinatae, ferrugineae, rachi alba. *Maculae* duae distinctae *alæ anticae*, antica pupilla ferruginea, postica majore. *Posticae* albidæ, margine fusco.

*Larva* postice quadridentata, cinerea, nigro rubroque punctata, collari sanguineo, punctis nigris.

**Pithyocampa. B.** (Pithyocampa) alis reversis griseis, strigis tribus obscurioribus, posticis pallidis, puncto anali fusco. *Mant. B.* 66.

*Wien. Verz.* 58. 11. bombyx Pithyocampa.

*Hab. in* Austriæ pino. *Mus. D. Schief-fermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo bomb. pro-



*cessioneæ. Alæ anticæ* griseæ, strigis tribus undatis nigricantibus. *Posticæ* albæ, macula anguli ani fusca. *Corpus* hirtum griseum, *abdomine* flavescente. *Larva* pilosa cærulescens, maculis dorsalibus flavis, capite atro.

Cinerea. B. ( le cendré ) alis subreversis cinereis ; anticis punctis quatuor atris subocellaribus.

*Hab. in Austria. Dr. Schulz.*

*Desc. Media. Antennæ* pectinatae atræ. *Thorax* hirtus, cinereus. *Abdomen* fuscum. *Alæ* cinereæ, supra punctis quatuor nigris annulo albo cinctis. *Posticæ*, uti *omnes*, subtus immaculatæ.

Mali. B. ( du pommier ) alis reversis cinereis, fascia sinuata obscuriore, puncto atro.

*Hab. in malo & corylo Hafniæ. D. de Loewenskioldt.*

*Desc. Statura* omnino bomb. *castrensis. Antennæ* valde pectinatae. *Caput & thorax* hirti, cinerea. *Alæ anticæ* cinereæ, fascia media lata obscuriore, quæ antice posticeque striga sinuata nigra terminatur. In medio fasciæ punctum atrum. Striga obsoleta fusca ad marginem posticum. *Posticæ*, uti *omnes*, subtus obscuriores, striga media fusca. *Larva* solitaria, pilosa, brunnea, linea dorsali pallidiore, stigmatibus cærulescentibus.

Avellanæ. B. ( du noisetier ) alis reversis obscure cinereis, fascia sinuata obscuriore immaculata.

*Reaum. inf. 1. tab. 44. fig. 7.-10.*

*Hab. in malo & corylo Hafniæ. D. de Loewenskioldt.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis. *Caput* & *thorax* pilosa, obscure cinerea, immaculata. *Alæ* obscure cinereæ, fascia lata media sinuata obscuriore. *Antennæ* parum pectinatae.

**Terebra. B.** ( la tarriere ) alis deflexis dorso dentatis cinereis, atomis strigisque undatis fusco-ferrugineis, thorace postice striga albida,

*Wien. Verz.* 60. 2. bombyx terebra.

*Hab.* in Germaniæ ligno. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura bomb. *Cossus*, at paullo minor. *Antennæ* vix pectinatae albidæ. *Thorax* hirtus fuscus, striga postica albida. *Alæ anticæ* in medio dorsi angulatæ, cinereæ, strigis undatis atomisque fuscis. *Alæ posticæ*, uti omnes subtus albidæ. *Abdomen* albidum, ano fusco.

**Flavomacu- B.** ( le tacheté ) alis deflexis obscure cinereis, fascia media lata angulata nigra, macula marginali flava.

*Hab.* Hafniæ. *D. de Schefftedt.*

*Desc.* Media. *Caput* & *thorax* hirta nigra. *Alæ* obscure cinereæ nitidulæ, fascia in medio lata atra, quæ postice ad marginem exteriorem angulum format & in hoc angulo macula magna flava. *Margo posticus* fuscus, punctis aliquot atris. *Posticæ* subtus cinereæ, puncto strigaque postica fuscis. *Pedes* nigri flavo annulati. *Anus* flavus.

**Rubea. B.** ( le rougeâtre ) alis reflexis hyalino pallide rufescentibus, puncto medio pallido.

*Wien. Verz.* 51. 2. bombyx rubea.

*Hab.*

*Hab. in quercu. D. Schieffermyller.*

*Desc. præcedente major. Alæ omnes pal-  
lide rufescentes, fere hyalinæ, puncto  
medio pallido. Antennæ pectinatae.*

**Testudo. B.** ( la tortue ) alis deflexis flavis f.  
ferrugineis, strigis duabus obliquis  
obscurioribus.

*Sp. inf. 2. 189. 86.*

*Wien. Verz. 65. 1. bombyx testudo.*

*Desc. Strigæ ad marginem anteriorem  
coeunt.*

*Larva apoda, ovata, nuda, viridis, lineis  
duabus dorsalibus albidis.*

*Puppa folliculata, brunnea.*

**Afella. B.** ( le cloporte ) alis deflexis fusces-  
centibus immaculatis.

*Wien. Verz. 65. 2. bombyx afella.*

*Hab. in Austriæ populo. D. Schieffer-  
myller.*

*Desc. Statura omnino præcedentis, at  
triplo minor, tota fusca, immaculata,  
nitidula.*

*Larva apoda, ovata, rubra, linea  
dorsali flava nigro punctata, lateribus  
viridibus.*

*Puppa folliculata, brunnea.*

**Bufo. B.** ( le crapaud ) alis deflexis flaves-  
centibus, fascia lata fusca, maculis  
flavis.

*Hab. in Germania. D. Hybner.*

*Desc. Statura omnino præcedentium. An-  
tennæ flavescentes. Corpus flavescent.  
Alæ anticæ flavescentes, fascia lata  
fusca, quæ ad marginem posticum  
adhuc magis extenditur. In hac fascia  
maculæ duæ, altera in medio, altera  
ante angulum ani. Posticæ fuscæ, angulo*

ani flavescente. Subtus *antica* fuscæ ,  
*postica* flavescentes.

**Trepida. B.** ( le tremblant ) alis deflexis dorso  
 unidentatis griseis, puncto medio ocel-  
 lari strigaeque postica maculari fuscis.

*Wien. Verz.* 49. 4. bombyx tremula.

*Hab. in Austriae quercu. D. Schieffer-  
 myller.*

*Desc.* Magna. *Antennæ* pectinatae, fer-  
 rugineae. *Thorax* fuscus. *Abdomen* ci-  
 nereum. *Alæ antica* obscure griseae ,  
 in medio puncto oblongo fusco annulo  
 albo cincto & postice striga e punctis  
 sex fuscis. Dens validus, erectus niger  
 in medio marginis interioris. *Postica*  
 albæ, margine interiori griseo.

*Larva* solitaria nuda, viridis, lineis  
 duabus dorsalibus albis lateralibusque  
 obliquis flavo rufis.

*Puppa* folliculata dimidia, sub terra.

**Querna. B.** ( du chêne ) alis deflexis griseis ,  
 strigis tribus atris albæ innatis.

*Vien. Verz.* 49. 5. bombyx querna.

*Hab. in Austriae quercu. D. Schieffer-  
 myller.*

*Desc.* Media. *Antennæ* pectinatae, fer-  
 rugineae. *Corpus* hirtum, griseum. *Alæ*  
*antica* griseae, strigis tribus undatis  
 albo marginatis nigris, quarum baseos  
 minima. Ante strigam posticam litura  
 albida. *Postica* albidæ.

*Larva* postice gibba nuda viridis, lineis  
 quatuor flavis spiraculisque atris.

**Helvola. B.** ( le paillet ) alis deflexis helvolis ,  
 maculis ordinariis strigaeque postica  
 cinereis.

*Hab. Kiliae. D. Daldorf.*

*Desc.* Media. *Antennæ* pectinatæ. *Caput* ; *thorax* helvola. *Abdomen* cinereum, ano barbato helvolo. *Alæ anticæ* helvolæ, maculis ordinariis strigæque postica fere obsoleta cinereis. Ante strigam puncta aliquot cinerea. *Posticæ* cineræ.

Undata. B. ( l'ondé ) alis deflexis cinereis ; fasciis duabus fuscis cinereo undatis.

*Hab.* Kilicæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* *Corpus* medium cinereum. *Alæ anticæ* cineræ, fascia ante medium alteraque pone medium fuscis & in his fasciis strigæ aliquot cineræ. Ad basin & ad marginem posticum puncta aliquot fusca. *Posticæ* cineræ.

Advena. B. ( l'étranger ) alis deflexis fuscis, punctis dorsalibus albis, posticis nigris, macula media fulva, puncto nigro.

*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.*

*Desc.* Magnitudo & statura præcedentis. *Antennæ* pectinatæ nigræ, rachi alba. *Thorax*, *abdomen* hirta, cinerea. *Alæ anticæ* fuscæ, lineola baseos punctisque tribus costalibus subocellatis albis. *Posticæ* nigræ, macula magna oblonga fulva puncto nigro. Lineola interrupta marginis tenuioris fulva.

Communi- B. ( le dorsal ) alis deflexis pallide carneis, macula magna dorsali fusca.  
macula.

*Wien. Verz.* 85. 7. bombyx communi-macula.

*Hab.* in Europa Austriariorum. *D. Romanus.*

*Desc.* Parva. *Corpus* albidum. *Alæ* pallide carneæ, macula magna oblonga marginis tenuioris fusca. *Posticæ* omnino albidæ.

**Centrolinea.** B. ( le centré ) alis deflexis cinereo fuscoque nebulosis , lineola centrali alba atræ innata.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna statura B. *caassinæ*. *Antennæ* ferrugineæ. *Corpus* hirtum. *Thorax* griseus. *Abdomen* fuscum. *Alæ* cinereo fuscoque nebulosæ atroque parum undatæ , in medio lineola abbreviata nivea , atro utrinque marginata ; *subtus* griseæ , disco fusco. *Posticæ* supra obscuræ , subtus albidæ , macula centrali fusca.

**Paradoxa.** B. ( le paradoxe ) alis subincumbentibus fusco cinereoque variis , macula centrali albida , posticis atris , *fæmina* aptera.

*Hab. in tritico repente Russiæ. D. Boeber.*

*Desc.* *Mas* niger , antennis valde pectinatis , rachi albida. *Alæ* fuscæ cinereo variæ , imprimis ad marginem tenuiorem. Macula magna albida in medio alæ & margo posticus albo punctatus. *Posticæ* atræ , ciliis albis. *Fæmina* omnino aptera absque ullo allarum rudimento.

**Zona.** B. ( l'orné ) alis incumbentibus nigris fasciis albis , abdomine atro , segmentorum marginibus sanguineis. *Fæmina* aptera.

*Wien. Verz.* 100. 5. phalæna zonaria.

*Hab. in Germaniæ millefolio. D. Pflug.*

*Desc.* Magnitudo & statura omnino B. *antiquæ*. *Antennæ* pectinatæ nigrae , rachi alba. *Thorax* hirtus cinereus , lineis tribus nigris. *Alæ* anticæ nigrae , vitta lata abbreviata baseos , quæ in medio oblique strigaeque postica albis. *Alæ* posticæ albidæ , striga media



margineque postico nigris. *Abdomen* villosum atrum, segmentorum marginibus sanguineis. *Fœmina* aptera, crassa, villosa, abdominis segmentis margine sanguineis. Rudimenta alarum utrinque duo, brevia, cylindrica, hirta, nigra.

Viciella. B. ( de la vesse ) alis incumbentibus cinereo hyalinis, antennis fuscis.

*Wien. Verz.* 133. 2. tab. 1. a. fig. 7. tinea viciella.

— tab. 1. b. fig. 7.

*Geoff. inf.* 203. 50. tinea involucro palearum unico tecto.

*Reaum. inf.* 3. tab. 11. fig. 7. 8.

*Frish. inf.* 6. 16. tab. 7.

*Hab. in vicia sylvatica Europæ. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus* cinereo lunatum. *Antennæ* pectinatæ fuscæ. *Alæ* cinereo hyalinæ, nervosæ, immaculatæ. *Fœmina* intra puppam ova excludit, nec declaratur.

Muscella. B. ( le diaphane ) alis incumbentibus obscure hyalinis, corpore atro.

*Wien. Verz.* 133. 3. bombyx muscella.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Corpus* totum hirtum; atrum, antennis fuscis. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ.

Bombella. B. ( le pointillé ) alis incumbentibus cinereis, fusco irroratis.

*Wien. Verz.* 133. 4. tinea bombycella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Thorax* hirtum, griseum. *Alæ anticæ* cinereæ, atomis numerosis fuscis; *posticæ* immaculatæ.

*Pectinella*. B. ( le pectiné ) alis incumbentibus cinereo-hyalinis, anticis frigis obsoletis obscurioribus.

*Hab.* in Austria. *Mus.* D. Schieffermyller.  
*Desc.* Parva. *Corpus* hirtum nigrum. *Alæ anticae* cinereo-hyalinae, frigis undatis vix conspicuis obscurioribus. *Posticae* immaculatae.

*Popularis*. B. ( le populaire ) alis incumbentibus fuscis albo venosis, posticis albidis.

*Hab.* in Russia, Germania. D. Boeber.  
*Desc.* Statura omnino B. graminis. *Antennae* pectinatae, fuscae. *Alæ anticae* fuscae, venis albis. In medio maculae ordinariae pupilla obscuriore. Versus apicem friga e maculis parvis sagittatis atris. *Posticae* albidae, margine obscuriore subtusque puncto centrali fusco.

### Noctua.

*Crux*. N. ( la croix ) alis rufo-luteis, lineis duabus obliquis albis, antennis ferratis.

*Hab.* Hafniæ. D. de Schesledt.  
*Desc.* Statura N. *heciae*, at paullo major. *Antennae* valde ferratae, rufae. *Caput & thorax* hirta, grisea. *Alæ* luteae, rufo mixtae, lineis duabus obliquis albis ad marginem tenuiorem fere coeuntibus. *Posticae*, uti omnes, subtus obscuriores.

*Tetra*. N. ( la quadriponctué ) levis, alis incumbentibus fusco nitidulis, punctis quatuor costalibus albis, posticis cinereo ferrugineis.

*Hab.* in Austriae alpine. D. Schieffermyller.  
*Desc.* Sequenti duplo minor. *Caput &*

*thorax* fusca, nitidula immaculata.  
*Alæ anticæ* itidem fuscæ, immaculatæ,  
 punctis tribus costalibus parvis versus  
 apicem. *Posticæ* cinereæ, ferrugineo  
 nitidulæ. *Subtus* cinereæ. *Antennæ*  
 pectinatæ.

*Larva* nuda viridis, lineis quinque albis,  
 mediis tenuioribus, capite pallidiore.

Livida. N. ( la livide ) lævis, alis incumben-  
 tibus atris nitidulis, posticis ferrugi-  
 neis, margine fusco.

*Wien. Verz.* 85. 13. noctua livida.

*Hab. in* Austriæ taraxaco. *D. Schieffer-  
 myller.*

*Desc. Corpus* totum, uti *alæ*, atræ  
 nitidulæ.

*Larva* utrinque attenuata, nuda, flavo  
 virescens, rubro micans, linea dorsali  
 obscuriore, laterali tenui pallida,  
 variegata, capite pallidiore.

Nervosa. N. ( la nerveuse ) lævis, alis incum-  
 bentibus lanceolatis, cinereo-fuscis,  
 pallido striatis.

*Wien. Verz.* 85. 12. noctua nervosa.

*Hab. in* Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Alæ* singulares, lanceolatæ, obs-  
 curatæ, pallido lineatæ. *Posticæ* albæ,  
 immaculatæ, *subtus* fuscæ, margine  
 albo.

Capreæ. N. ( du faule ) lævis, alis incumben-  
 tibus repandis fusco-cinereis nitidulis,  
 strigis tribus obliquis stigmatibusque  
 albidis.

*Hab. in* Hafniæ salice. *D. de Schesledt.*

*Desc. Media. Caput & thorax* hirta obs-  
 cure cinerea. *Alæ anticæ* margine  
 postico repando, obscure cinereæ

frigis tribus albidis, duabus ante, tertia pone medium. Stigmata sive maculae ordinariae albae, anteriore rotundata, posteriori majori veniformi. *Postica* fusca, margine cinereo. *Subtus* cinerea, atomis puncto medio strigaeque postica fuscis.

*Larva* solitaria, nuda, viridis.

**Arundinis.** N. (du roseau) laevis alis deflexis cinereis, punctis lunulisque marginalibus nigris, subtus macula centrali fusca.

*Scheve Naturforsh. tab. fig.*

*Hab.* in arundinis caulibus, equis lethalis.

*Desc.* Magna. *Corpus* cinereum, hirtum, immaculatum. *Ala antica* obscurae cineræ, nitidulae, punctis parvis nigris. In margine crassiori puncta tria pallida. Margo posticus lunulis octo atris. *Postica* pallida. *Subtus antica* obscurae; *postica* pallida, macula centrali fusca.

**Silene.** N. (silene) alis deflexis helvolis, macula postica nigro punctata.

*Wien. Verz.* 85. 1. noctua silene.

*Hab.* in brassica campestris. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Caput & thorax* helvola, immaculata. *Ala antica* helvolæ, striga media abbreviata paullo obscuriore. Maculae ordinariae griseæ, posteriori veniformi nigro punctata. *Variat* macula anteriori lunula nigra.

*Larva* nuda, obscure fusca, collari nigro albo marginato, stigmatibus nigris.

**Rubiginea.** N. (la rouillée) laevis, deflexis flavis ferrugineo undatis, punctis nigris sparsis.

*Wien. Verz.* 86. 3. noctua rubiginea.

*Hab. in pyro malo. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura præcedentium. Antennæ fuscescentes. Caput & thorax flava, immaculata. Alæ anticæ flavæ, strigis plurimis undatis ferrugineis. Puncta nigra plurima, imprimis versus apicem. Posticæ fuscæ, margine fulvo.*

Strigosa. N. ( la rayée ) lævis, deflexis fusco cinereoque variis, lineolis tribus atris ante marginem interiorem.

*Wien. Verz. 88. 15. noctua strigosa.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Corpus cinereum. Alæ anticæ variegatæ, striga apicis undata. Margo interior fuscescens, lineolis tribus longitudinalibus atris. Posticæ cinereæ.*

Scutosa. N. ( la noble ) lævis, alis deflexis fusco alboque variis, posticis basi albis, macula fusca, apice fuscis albo maculatis.

*Wien. Verz. 89. 1. noctua scutosa.*

*Hab. in artemisia campestri. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura & magnitudo N. glyphicæ. Corpus griseo-fuscum. Alæ anticæ fuscæ, in medio albæ, maculis tribus fuscis cinctis, apice fuscæ, strigis punctisque marginalibus albis, subtus limbo albo punctis tribus magnis atris. Posticæ basi albidæ, macula magna fusca, apice fuscæ striga obsoleta maculisque duabus albidis. Subtus albæ, puncto medio, striga maculaque apicis fuscis.*

*Larva virescens nigro punctata lineisque tribus obscurioribus.*

**Ononis. N.** ( de l'arrête-bœuf ) lævis , alis deflexis cinereis , carneo nitentibus fusco fasciatis , posticis atris , maculis tribus albis.

*Wien. Verz.* 89. 4. noctua ononis.

*Hab. in ononis spinosæ floribus. D. Schiesfermyller.*

*Desc.* Statura omnino *N. dipsacæ*. *Alæ anticæ* basi cinereæ , in medio fascia fusca cinerea. Margo late fuscus , striga parva cinerea. *Posticæ* atræ , maculis tribus cinereis.

*Larva* solitaria nuda , striis roseis ac purpureis alternis , purpurea atomis nigris.

**Triquetra. N.** ( la triangulaire ) lævis , alis deflexis cinereis , maculis quatuor fuscis , anterioribus triquetris , posticis flavis fusco fasciatis.

*Wien. Verz.* 94. 6. noctua triquetra.

*Hab. in Austria. Mus. D. Romani.*

*Desc.* Statura omnino *N. mt.* *Corpus* cinereum. *Alæ anticæ* cinereo fuscoque variæ , macula magna media triquetra nigra , & pone hanc tres fere coadunatæ , aliæ fuscæ. *Alæ posticæ* flavescentes , fascia baseos margineque postico fuscis.

**Palliata. N.** ( le manteau ) lævis , alis anticis ferrugineis , puncto apicis atro , posticis atris , margine fulvo.

*Hab. in Germania. D. Hybner.*

*Desc.* Magnitudo *N. albicollis*. *Caput & thorax* obscure ferruginea. *Abdomen* supra fuscum , subtus cinereum. *Alæ anticæ* ferrugineæ , striga postica obsoleta cinerea punctoque postico distincto atro. *Posticæ* atræ , margine fulvo.



Subtus omnes nigræ , marginibus flavis.

**Miniosa.** N. ( la peinte ) lævis , alis deflexis , strigis tribus undatis maculisque ordinariis miniaceis.

*Wien. Verz.* 88. 14 noctua miniosa.

*Hab. in Austriæ quercu. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino N. *trapezinae*. *Antennæ* pectinatæ , ferrugineæ , strigis tribus miniaceis. Versus marginem striga punctorum nigrorum. *Posticæ* albidæ , striga marginali fusca.

*Larva* nigra , linea laterali interrupta flava , collari trilineato.

**Instabilis.** N. ( la fragile ) lævis , alis deflexis griseis , fascia media ferruginea.

*Wien. Verz.* 76. 1. noctua instabilis.

*Hab. in Austriæ amygdalo communi. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media. *Corpus* hirtum , subferrugineum. *Alæ anticæ* griseæ , subundatæ , fascia media undata ferruginea. *Posticæ* supra fuscae , *subtus* cinereæ , puncto centrali fusco.

*Color alæ anticæ* variat ; fascia ferruginea tamen semper constans.

*Larva* nuda viridis , linea dorsali alba , laterali flava.

**Humilis.** N. ( l'humble ) lævis , alis deflexis griseis , strigis tribus flavescentibus mediaque fusca , margine punctato.

*Wien. Verz.* 76. 3. noctua humilis.

*Hab. in leontodonte taraxaco. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Antennæ* ferrugineæ. *Corpus* griseum. *Alæ* griseæ , maculis duabus

ordinariis annulo flavescente cinctis. Strigæ tres flavescentes, unica ad basin, duabus versus apicem & præterea unica in medio, quæ maculam posteriorem transit. *Posticæ* fuscæ, *subtus* albidæ, puncto medio fusco.

*Larva* nuda, obesa, viridis, linea dorsali lateralique albis, priore nigro marginata.

**Lychnidis. N.** ( du lychnis ) lævis, alis deflexis ferrugineo-fuscis flavo striatis.

*Wien. Verz.* 76. 5. noctua lychnidis.

*Hab.* in lychnidis dioicæ capsulis. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica. *Corpus* griseum, antennis ferrugineis. *Alæ anticæ* obscuræ, subferrugineæ, striis flavis 6, 7 a basi ultra maculas ordinarias ductis, strigam posticam tamen haud attingunt. Versus apicem strigæ duæ; altera strias fere terminat, altera posterior. Maculæ ordinariæ in medio. Margo subpunctatus. *Posticæ* fuscæ.

*Larva* viridis ferrugineo punctata lineaque laterali ferruginea.

**Fixa. N.** ( la fixe ) lævis, alis deflexis, antice basi pallidis apice virescentibus, striga pallida, posticis flavis, margine nigro.

*Hab.* in Gibraltar. *D. Boeber.*

*Desc.* Parva. *Corpus* supra fuscescens, subtus flavum. *Alæ anticæ* basi cinerascens, in medio fascia fusca; apice virescentes striga cinerea. *Posticæ* flavæ, strigis ante marginem margineque nigris.

**Blanda. N.** ( l'agréable ) lævis, alis deflexis cinereo-fuscis, strigis albidioribus.

*Wien. Verz.* 77. 8. noctua blanda.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media. *Alæ anticae* cinereo-fuscae, strigis albidioribus. In medio maculae ordinariae & pone has saepe striga punctorum nigrorum. *Posticae* albidæ.

**Ambigua. N.** ( l'ambigue ) lævis cinerea, atomis strigaeque pone medium nigris.

*Wien. Verz.* 77. 10. noctua ambigua.

*Hab. in leontodonte, soncho, chenopodio. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica indistincta, cinerea, punctis aliquot baseos strigaeque pone medium nigris. Maculae ordinariae in medio. *Posticae* albidæ, *subtus* puncto medio nigro.

*Larva* ferrugineo fuscoque variegata, capite fusco.

**Gracilis. N.** ( la mince ) lævis, alis deflexis fusco-cinereis, striga undata fusca baseos, flavescenque apicis, intermedia punctata.

*Wien. Verz.* 76. 4. noctua gracilis.

*Hab. in lysimachia vulgari. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Noctua fere indistincta. *Alæ obscuræ*, basi striga nigricante; in medio maculae ordinariae fere obsoletæ; pone has striga e punctis nigris, aliaque flavescens. *Posticae* *subtus* albidæ, striga punctorum nigrorum.

*Larva* nuda virens, lateribus flavescen-  
tibus, incisuris flavis, singulis seg-  
menti punctis quatuor obscuris macu-  
laque antica nigra.

**Promissa. N.** ( la promise ) cristata, alis dentatis

fulco cinereoque variis, strigis dentatis atris, posticis rubris, fasciis duabus nigris.

*Wien. Verz.* 90. 6. noctua promissa.

*Hab. in Austriae quercu. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis præcedentibus affinis, at *N. padæ* duplo minor. *Alæ* cinereo fuscoque variæ, strigis dentatis atris. *Thorax* griseus, fascia atomisque nigris.

**Orbona. N.** ( orbone ) cristata, alis incumben-  
tibus hepaticis, posticis flavis, lunula  
strigaque postica fuscis.

*Hab. in Germania. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino *N. pronubæ*. *Caput*  
& *thorax* hepatica. *Alæ anticæ* hepaticæ, strigis aliquot punctorum nigro-  
rum obsoletorum, *subtus* macula magna  
nigra. *Posticæ* flavæ, lunula media strig-  
aque postica fuscis, *subtus* lunula  
margineque interiori hepaticis.

**Solani. N.** ( du solanum ) cristata, alis incum-  
bentibus virescenti griseoque variis,  
posticis rufis, fascia lata submarginali.

*Naturf.* 9. tab. I. fig. 3.

*Hab. in Europæ solano tuberoso, fabis,*  
in alis larvis sæviens.

*Desc.* Nimis *N. pronubæ* affinis, differt  
tamen alis anticis magis virescentibus.  
Versus apicem puncta aliquot alba ad  
marginem crassiore & juxta hæc ma-  
cula parva atra. *Posticæ* rufæ, fascia  
lata atra. *Subtus omnes* multo dilutiores.

*Larva* obesa, rugosa, cinerea.

*Puppa* nuda, brunnea.

**Linogrifea. N.** ( la gris-de-lin ) cristata, alis in-  
cumbentibus dentatis variegatis apice

ferrugineis , posticis flavis , margine fusco.

*Wien. Verz.* 79. 22. noctua linogrisea.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis *N. pronuba* , at distincta alis dentatis anticis valde variegatis apice ferrugineis.

*Larva* dorso rubicundo , lineolis obliquis punctisque nigris.

**Hymenaea.** *N.* ( l'hymenée ) cristata , alis deflexis griseis , strigis angulatis nigris , posticis flavis , fasciis duabus arcuatis atris.

*Wien. Verz.* 91. 8. noctua hymenea.

*Hab. in pruno spinosa. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *N. paranymphe* , at alæ anticæ magis griseæ absque strigis albis.

*Larva* flavo-virescens , lineis duabus tuberculorum elevatorum denteque medio elevato porrecto.

**Janthina.** *N.* ( la violette ) cristata , alis incumben-  
tibus griseis , litura albida , posticis  
atris , macula media margineque ferru-  
gineis.

*Wien. Verz.* 78. 19. noctua janthina.

*Knoch. inf. tab. 4. fig. 5. phalæna domiduca.*

*Eyest. arch. 3. tab. 16. phalæna domiduca.*

*Hab. in Germaniæ aro. D. Romanus.*

*Desc.* In medio alæ anticæ lunulæ aliquot  
albæ.

*Larva* albida fusco undata posticeque  
punctis nigris.

**Ambusta.** *N.* ( la foudroyée ) cristata , alis incum-  
bentibus griseo-fuscis , strigis tribus  
annuloque medio flavescens , striga  
postica undata.

*Wien. Verz.* 88. 16. noctua ambusta.

*Hab. in lichene parietino. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Antennæ* ferrugineæ basi albidæ. *Caput & thorax* rufo-grisea. *Alæ* griseo-fuscæ, strigis tribus annulorum medio oblongo flavescentibus. *Posticæ* albidæ, apice fuscæ.

*Larva* nuda, fusca alba lineata. Quies 3 mensum.

Subtusa. N. ( la meurtrie ) cristata, alis incumbentibus fusco-cinereis, strigis quatuor annulisque tribus flavescentibus.

*Wien. Verz.* 88. 17. noctua subtusa.

*Hab. in populo tremula. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentis. *Antennæ* pallidæ. *Corpus* cinereum immaculatum. *Alæ anticæ* obscure cinereæ, striga parva basios, altera ante medium, tunc annuli tres, anteriori striga secunda connexa, posteriori majori veniformi; demum striga incurva & ultimo striga undata flavescentibus. *Posticæ* fuscæ.

*Larva* nuda, albida, albo lineata, capite nigro, fronte alba.

Lunaris. N. ( la lunaire ) cristata, alis incumbentibus dentatis fuscescentibus in medio griseis, puncto atro lunulaque fusca.

*Wien. Verz.* 94. 1. noctua lunaris.

*Hab. in Quercu Austriæ. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Antennæ* fuscæ, basi albæ. *Caput & thorax* fusco-grisea. *Alæ anticæ* basi griseæ, tunc fuscæ, striga cinerea; in medio griseæ, puncto parvo atro lunulaque vel macula veniformi fusca, tunc striga cinerea; demum fuscescentes, fascia obsoleta dentata cinerea punctisque



punctisque ante marginem nigris. *Postica* basi cinereæ, apice fuscæ. *Corpus* magnum, abdomine cinereo.

*Larva* ferrugineo-fusca, pallido punctata, antice punctis duobus fulvis tuberculisque duobus caudalibus.

**Craccæ. N.** ( de la vesse ) cristata, alis striatis cinereis, puncto albido, lunula punctata thoraceque antice atris.

*Wien. Verz.* 94. 3. noctua craccæ.

*Hab. in vicia cracca. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura *N. lusoria*, at paullo minor. *Thorax* cinereus antice ater. *Alæ antica* venis striatæ, cinereæ, puncto parvo albo ante medium. In medio lunula e punctis aliquot atris. Postice fascia obsoleta obscurior. Costa punctis quatuor fuscis.

*Larva* fusco griseoque varia, cauda bifida.

**Signum. N.** ( la marquée ) cristata, alis maculis tribus fuscis, costa baseos cinerascens, thorace fusco antice brunneo.

*Wien. Verz.* 78. 8. noctua signum.

*Hab. in Austriæ atriplice hortensi. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura *N. C. nigrum*. *Alæ antica* fuscæ, costa usque ad medium cinerea fusco undata, apice albo punctata. In medio loco macularum lunulæ duæ cohærentes, atræ. Margo posticus striga punctorum alborum. *Postica* obscuræ.

**Nun-atrum. N.** ( la centrale ) cristata, alis incumbentibus fuscis cinereo strigosis, lineolis duabus centralibus atris, anteriore arcuata.

*Wien. Verz.* 78. 9. noctua nun-atrum.

*Insect. Tomus IV.*

G g

*Hab. in gallio aparine. D. Schieffermyller.*

*Desc. Nimis affinis N. Gothicæ. Antennæ ferrugineæ pectinatae. Alæ anticæ fuscæ, strigis aliquot albidis. In medio lineolæ duæ, quarum anterior major arcuata. Costa ultra medium punctis atris postice cinereis. Posticæ fuscæ, subtus puncto centrali albo.*

*Larva glabra, viridis, albo punctata, linea laterali nivea.*

*Cincta. N. ( l'entourée ) cristata, alis incumbentibus fuscis, macula media grisea, linea flexuosa atra cincta pupillaque atra.*

*Wien. Verz. 78. 10. noctua i cinctum.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Antennæ pectinatae, fuscæ. Caput & thorax cinerea. Alæ anticæ ultra medium fuscæ. In medio macula magna grisea, & in hac punctum transversum atrum. Maculam ipsam cingit linea flexuosa atra ante basin interrupta. Alæ apice griseæ, margine punctato. Posticæ fuscæ.*

*Rectangulata. N. ( la rectangulaire ) cristata, alis subincumbentibus fuscis maculisque quatuor mediis atris, duabus costalibus, thorace antice atro.*

*Wien. Verz. 78. 15. noctua rectangula.*

*Hab. in trifolio melilotus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura præcedentium. Caput & thorax ferrugineo-fusca, hic antice ater. Alæ anticæ fuscæ, punctis aliquot baseos maculisque quatuor mediis, quarum duæ costales, nigris. Costa albo punctata.*

**Flammatra. N.** ( la brûlée ) cristata , alis incumben-  
tibus griseis , linea flexuosa baseos nigra ,  
thorace fascia atra.

*Wien. Verz.* 80. 1. noctua flammatra.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis N. exclamationis. *Corpus*  
cinereum , fascia lata abbreviata tho-  
racis atra. *Alæ anticæ* griseæ , linea  
magna baseos flexuosa atra. In medio  
maculæ ordinariæ macula fusca distinctæ.

**Cespitis. N.** ( du gazon ) cristata , alis incum-  
bentibus fuscis , strigis tribus undatis albidis  
nigræ innatis , posticis albis.

*Wien. Verz.* 82. 2. noctua cespitis.

*Hab. in aira cespitosa. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Caput & thorax* fusca ,  
immaculata. *Alæ anticæ* fuscæ , niti-  
dulæ , strigis tribus undatis pallidis ,  
unica ante medium , duabus pone me-  
dium , quæ interne terminantur striga  
atra. In medio maculæ ordinariæ annulo  
albo. *Posticæ* albæ , margine interdum  
fuscescente.

*Larva* nuda fuscescens , lineis tribus pal-  
lidioribus.

**Chenopodiata N.** ( de la patte d'oie ) cristata , alis planis  
cinereis nigro maculatis , striga postica  
bidentata alba , thoracis crista brevi  
bifida.

*Wien. Verz.* 82. 6. noctua chenopodii.

*Hab. in Austriæ chenopodio. D. Schieffer-  
myller.*

*Desc.* Media. *Antennæ* fuscæ. *Caput &*  
*thorax* cinerea immaculata. *Alæ anticæ*  
cinereæ , atomis imprimis costæ mar-  
ginisque postici nigris. In medio maculæ  
ordinariæ. Ante marginem posticum  
striga cinerea bidentata.

*Larva* viridis, linea dorsali obscuriore, laterali rubra.

Contigua. N. ( du bon-Henri ) cristata, alis planis fusco cinereoque nebulosis, striga postica bidentata alba, thoracis cristâ bifida.

*Wien. Verz.* 82. 7. noctua contigua.

*Hab.* in chenopodio bono-Henrico Austriae. *Mus. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis præcedenti affinis, at magis obscura.

*Larva* viridis, capite maculisque duabus primi segmenti brunneis, stigmatibus nigris.

Dentina. N. ( l'ondée ) cristata, alis planis cinereo fuscoque variis, macula marginis interioris strigae posticae flavis.

*Wien. Verz.* 82. 8. noctua dentina.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ anticae* cinereae, in medio imprimis fuscescentes, maculis ordinariis maculaque cinerea bifida. Distincta macula marginis interioris ad basin strigae posticae undata flavis.

Distincta. N. ( la distinguée ) cristata, alis incumbentibus luteo cinereis, maculis duabus centralibus atris, apice obscuris.

*Hab.* Hafniæ. *D. Schestedt.*

*Desc.* Statura omnino N. *exclamationis*. Caput & thorax hirra. Palpi subtus fusci. *Alæ anticae* ultra medium luteo-cinereae, strigis aliquot obsoletis fuscis. In medio macula potius unica oblonga atra, stigmate rotundato in duas divisa. Margo posticus obscurus, striga grisea terminalique e punctis atris. *Posticae*

subtus cinereæ, puncto medio strigaque postica fuscis.

**Suffusa. N.** ( l'inégale ) cristata, alis incumben-  
tibus fuscis apice pallidioribus, lineola  
media duabusque apicis puncto albo  
notatis atris.

*Wien. Verz.* 80. 4. noctua suffusa.

*Hab.* in soncho arvensi. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Corpus fuscum, fascia antica atra.

*Ala antica* fuscæ, interdum griseo  
variegatæ, apice pallidiores. Pone  
medium lineola crassa atra & versus  
apicem duæ minores, cuspidatæ, puncto  
albo notatæ. *Postica* albidæ.

**Signifera. N.** ( la porte - enseigne ) cristata, alis  
subincumbentibus cinereis fusco unda-  
tis, linea baseos atra, pupilla apicis  
oblonga albida.

*Wien. Verz.* 80. 8. noctua signifera.

*Hab.* in cochlearia draba. *D. Schieffer-  
myller.*

*Desc.* Caput & thorax grisea, immacu-  
lata. *Ala antica* cinereæ, fusco paullo  
undatæ. Linea atra a basi usque ad  
medium ducta, quæ apice dilatatur  
pupilla oblonga, albida. Maculæ ordi-  
nariæ in medio, altera oblonga, altera  
veniformis. Margo nigræ striatus. *Pos-  
tica* albidæ.

*Larva* nuda, cinereo fuscoque varia punctis  
lineisque nigris, collari flavescente,  
lineis tribus albis.

**Valligera. N.** ( la creusée ) cristata, alis incum-  
bentibus cinereo fuscoque variis, ma-  
cula oblonga baseos nigricante, puncto  
ocellari ferrugineo.

*Wien. Verz.* 80. 9. noctua valligera.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Antennæ pectinatæ. Corpus griseum.*

*Alæ* griseæ, maculis ordinariis punctisque variis fuscis. Macula magna, oblonga, nigricans ad basin & in hac punctum ferrugineum annulo albido cinctum. Costa fusca, punctis tribus albis. *Antennæ pectinatæ.*

**Cæcimacula. N.** ( du fium ) cristata, alis incumbentibus dentatis griseis, punctis duobus baseos nigris strigisque duabus cinereis.

*Wien. Verz. 81. 14. noctua cæcimacula.*

*Hab. in Austriæ sive falcaria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus* griseum, antennis fuscis. *Alæ anticæ* basi griseæ, punctis duobus nigris, altero ad basin, altero ante medium in striga ipsa undata cinerea. Medium parum obscurius maculis ordinariis. Pone has striga altera cinerea. Margo griseus, striga punctorum nigrorum.

*Larva* carnea, atomis nigris, lateribus capiteque flavescens.

**Croceago. N.** ( la safranée ) cristata, alis deflexis ferrugineis, strigis fuscis, costa albo punctata.

*Wien. Verz. 86. 2. noctua croceago.*

*Hab. in quercu Austriæ. D. Schieffermyller.*

*Desc. Caput & thorax* ferruginea, immaculata. Thoracis cristula valde elevata, compressa. *Alæ anticæ* ferrugineæ, strigibus tribus obscuris. Costa punctis duobus baseos quatuorque in medio niveis. *Posticæ* albidæ, puncto strigaeque undata sanguineis.

*Larva* flavescens, linea dorsali fusca lineolisque obliquis lateralibus aurantiis.



Aurago. N. ( la dorée ) cristata , alis deflexis fuscescentibus , litura baseos fasciaque media late flavis.

*Wien. Verz.* 86. 7. noctua aurago.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* basi apiceque fuscae , litura flavescens. In medio fascia lata dentata flava. *Posticæ* cineræ.

*Larva* nuda grisea , lineolis obliquis fuscis. Quies quatuor hebdomadum.

Sulphurago. N. ( la sulphurée ) cristata , alis deflexis flavis , punctis numerosis strigisque fuscis.

*Wien. Verz.* 86. 8. noctua sulphurago.

*Hab. in Austriæ betula. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* pallide flavæ , punctis baseos fuscis. In medio strigæ duæ , anteriore majore , posteriore valde undata. Pone strigam anteriorem annuli duo fusci. Margo fusco punctatus.

*Larva* nuda , albida , capite flavo. Quies 17 dierum.

Cerago. N. ( la cirée ) cristata , alis deflexis flavis fusco subfasciatis posticis albis.

*Wien. Verz.* 86. 9. noctua cerago.

*Hab. in Germaniæ Salice. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedentibus affinis , at maculæ latiores fere fascias constituunt. *Thorax* flavus , crista in altero sexu elevata , acuminata.

Rutilago. N. ( l'éclatante ) cristata , alis deflexis flavis ferrugineo strigosis , fascia baseos apicisque fusca.

*Wien. Verz.* 86. 4. noctua rutilago.

*Hab.* in Europæ populo.

*Desc.* Media. *Corpus* fuscum, abdomine albido. *Alæ anticae* flavæ, strigis numerosis atomisque ferrugineis, maculisque ordinariis distinctis. Fascia baseos lata ad marginem interiorem totam basin occupat.

Luteago. N. ( le fouci ) cristata, alis deflexis flavis, strigis duabus dentatis fuscis.

*Hab.* in Russia Meridionali. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Antennæ* ferrugineæ, rachi alba. *Alæ anticae* flavescens, strigis duabus in medio ad marginem interiorem fere coeuntibus, valde dentatis, fuscis. *Posticæ* albidæ.

Ferrugo. N. ( la rouillée ) cristata, alis deflexis ferrugineis, macula media fusca, lunula alba.

*Hab.* Kilix. *D. Daldorff.*

*Desc.* Statura omnino præcedentium. *Alæ anticae* ferrugineæ, in medio macula fusca & in hac lunula alba. Pone fasciam striga e punctis vix conspicuis nigris. *Posticæ* fuscae. Subtus omnes argentæ nitidæ.

Flavago. N. ( la blonde ) cristata, alis deflexis flavissimis, punctis fasciaque lata fuscis.

*Hab.* Kilix. *D. Daldorff.*

*Desc.* Statura & summa affinitas N. *cereago*. *Caput* fuscum. *Thorax* antice fuscus, postice cristatus, flavus. *Alæ anticae* flavissimæ, punctis aliquot fuscis. Macula magna baseos ad marginem exteriorem fusca. Pone medium fascia lata, sinuata, fusca, in qua puncta tria costalia,

flava. Pone hanc striga e punctis parvis fuscis. *Alæ posticæ* cinereæ.

**Silvago. N.** ( la clairette ) cristata , alis deflexis luteis , puncto medio fusco strigaeque postica punctorum nigrorum.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* flavæ , vix strigosæ , puncto magno medio fusco & pone hoc striga e punctis sex nigris. *Alæ posticæ* albæ.

**Concha. N.** ( la dorée ) cristata , alis deflexis purpurascentibus , maculis duabus punctisque apicis aureis.

*Knock Beytr. I. tab. I. fig. 2. plañna*  
*C. aureum.*

*Hab. in Austriæ plantis.*

*Desc.* Caput & thorax antice ferruginea. *Antennæ* pallidæ. *Alæ anticæ* purpurascentes , lineola baseos , maculis magnis duabus in medio punctisque quatuor versus apicem aureis. *Posticæ* pallidæ.

**Lumina. N.** ( la folaire ) cristata , alis deflexis cinereis , macula marginali atra utrinque auro marginata maculaque aurea.

*Wien. Verz. 314. 8. noctua lumina.*

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis N. *bractea* , at minor. Caput & thorax grisea. Abdomen basi fasci- culis pilorum. *Alæ anticæ* cinereæ , macula in medio marginis tenuioris magna atra , utrinque striga aurea terminata. Externe in apice macula magna aurea & in hac macula nigra.

**Bractea. N.** ( la feuille-d'or ) cristata , alis deflexis variegatis , macula magna media aurea nitida.

Wien. Verz. 314. 7. noctua bractea.

Hab. in Europâ australi. D. Zschuck.

Desc. Statura omnino N. festucae. Caput & thorax obscure ferruginea. Alae anticae cinereo, fusco ferrugineoque variae. In medio macula magna, angulata, nitida aurea. Posticae cinerae.

Moneta. N. ( la riche ) cristata, alis deflexis aureis, strigis undatis annuloque geminato argenteo.

Hab. in Austriâ montosis. D. Schieffermyller.

Desc. Magnitudo N. festucae. Thorax cristatus griseus, punctis nigris. Alae anticae aureae, strigis atomisque fuscis, apice obscuriores. In medio annulus duplicatus argenteus quadro fusco notatus. Posticae cinerae.

Aemula. N. ( la rivale ) cristata, alis deflexis dentatis, nigro cinereoque variegatis, lineola media duplicata argentea.

Hab. in Austria. D. Schieffermyller.

Desc. Statura & summa affinitas N. gamma, at alae omnes nigro cinereoque variegatae. Signum medio alae inscriptum parvum, minus distinctum. Posticae basi cinerae, apice fuscae.

Divergens. N. ( la divergente ) cristata, alis deflexis integris, anticis griseis medio fuscis, signo albo inscriptis, posticis fulvis margine fusco.

Hab. in Austriâ montosis. D. Schieffermyller.

Desc. Affinis praecedentibus, at minor. Alae anticae cinerascens, macula magna fusca ad medium marginis inte-

rioris & in hac signum album. *Postica* fulvæ, margine fusco.

Argentina. N. ( l'argentine ) cristata , alis deflexis griseis , vitta lata abbreviata argentea.

*Hab. in* Russia australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Parva. *Corpus* pilosum album. *Alæ antica* griseæ , vitta lata fere marginali argentea a basi ultra medium ducta , nitida. *Postica* niveæ.

Consona. N. ( la doublée ) cristata , alis deflexis integris virescentibus nitidulis , strigis duplicatis albis , anteriore inflexa , maculisque duabus apicis fulvis.

*Hab. in* Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis sequenti affinis , at minor & maculæ tantum duæ distinctæ apicis fulvæ.

Illustis. N. ( l'illustre ) cristata , alis deflexis integris viridi cinereoque nitidulis , maculis tribus ferrugineis distinctis.

*Hab. in* Germania Australiori. *D. Zschuck.*

*Desc.* Similis N. *meticulosæ* , at paullo minor. *Corpus* obscure cinereum. *Thorax* valde cristatus , antice , parum ferrugineus. *Alæ antica* cinereo , viridi carneoque variegatæ , nitidæ & ad marginem posticum maculæ tres distinctæ ferrugineæ , strigis duabus pallidis inclusis. *Postica* cinereæ.

Flamma. N. ( l'ardente ) cristata , alis deflexis ferrugineo flavoque variis , maculis ordinariis confluentibus.

*Hab. in* Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minor B. oo. *Alæ antica* ferrugineo flavoque variegatæ , apice albido

striatæ. In medio maculæ ordinariæ interne lineola albida cinctæ. *Posticæ* fuscæ, subtus rufescentes, puncto strigaeque fuscis.

**Serici.** N. ( la foyeuse ) cristata, alis deflexis albis, strigis tribus nigris, posticis luteis, punctis strigaeque nigris. *Thunb. aet. Holm.* 1781. 243. tab. 5. fig. 12. noctua serici.

*Hab.* in Laponia culta sericum præbens. *Desc.* Magnitudo N. morl. Corpus album, collari sanguineo. *Alæ anticæ* albæ, strigis tribus arcuatis nigris.

**Or.** N. ( la striée ) cristata, alis deflexis cinereis fusco undatis, macula media grisea.

*Wien. Verz.* 87. 5. noctua or.

*Hab.* in Austriæ populo. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ anticæ* cinereæ, strigis numerosis undatis, imprimis baseos, fuscis. In medio macula magna transversa grisea. *Posticæ* obscuræ.

*Larva* virescens, capite brunneo, margine antico atro.

**Diluta.** N. ( la délayée ) cristata, alis deflexis cinereis, fasciis duabus ferrugineis obsoletis punctoque medio albo.

*Wien. Verz.* 87. 6. noctua diluta.

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ* cinereæ, basi fascia ferruginea, postice striga fusca terminata, pone medium fascia altera minus distincta striga fusca terminata. *Subtus* cinereæ, striga fusca. *Thorax* cinereus.

*Larva* pallida, linea dorsali fusca, capite atro.



**Ruficollis.** N. (le collier-roux) cristata, alis deflexis obscure cinereis, fasciis duabus obscurioribus, thorace antice brunneo.

*Wien. Verz.* 87. 7. noctua ruficollis.

*Hab. in quercu robore. D. Schieffermyller.*

*Desc. Antennæ thoraxque antice ferruginea. Abdomen cinereum. Alæ posticæ cinereæ.*

*Larva nuda, dorso plumbeo, lateribus albis nigro punctatis.*

**Abrotani.** D. (de l'auronne) cristata, alis deflexis fusco-cinereis, strigis undatis nigris, costa punctis quatuor albis.

*Wien. Verz.* 73. 3. noctua abrotani.

*Ræf. inf.* 3. tab. 51. larva.

*Hab. in Artemisia abrotano. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura N. absinthii. Antennæ ferrugineæ. Thorax cinereus, margine antico albido, striga tenuissima nigra. Alæ anticæ cinereo fuscoque variæ, strigis undatis nigris. Maculæ ordinariæ in medio. Puncta quatuor alba in margine crassiori. Posticæ cinereæ nitidulæ.*

*Larva viridis ferrugineo maculata, tuberculis dorsalibus conicis.*

**Purpurina.** N. (la purpurine) cristata, alis deflexis purpurascentibus basi flavis.

*Wien. Verz.* 88. 9. noctua purpurina.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Affinis N. delphinii, at distincta.*

*Alæ anticæ basi flavescerites, apice purpureæ, striga una alterave. Posticæ fuscae.*

**Geographica.** N. (la géographique) cristata, alis deflexis fusco variis, strigis duabus postice coeuntibus niveis, apice striatis.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Thorax cinereus, punctis duobus albis. Alæ anticæ fuscescentes, basi macula albida. In medio strigæ duæ dentatæ ad marginem tenuiorem coeuntes, niveæ. Margo posticus albo friatus.*

**Hyperici. N.** ( du millepertuis ) cristata, alis deflexis nigro substriatis fusco cinereoque variis, macula baseos oblonga albida.

*Wien. Verz. 76. 10. noctua hyperici.*

*Hab. in Austriæ hyperico. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Antennæ nigræ. Thorax pallidus, strigis duabus abbreviatis nigris. Abdomen fuscum. Alæ anticæ variegatæ, macula magna oblonga alba interne linea nigra terminata. In medio maculæ ordinariæ, postica majori veniformi. Margo albo nigroque striatus. Posticæ fuscae nitidulæ. Pedes albo annulati.*

*Larva violacea, dorso lineis tribus albis interruptis.*

**Linariæ. N.** ( de la linaire ) cristata, alis deflexis fusco cinereis, apice albo nigroque striatis, maculis ordinariis niveis.

*Wien. Verz. 73. 6. noctua linariæ.*

*Hab. in antirrhino linaria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Caput antice albidum. Thorax griseus, margine antico albo striga parva nigra. Alæ fusco cinereoque variæ, apice albo nigroque striatæ, striis albis terminantibus. In medio maculæ ordinariæ niveæ, annulo parvo atro cinctæ. Posticæ pallidæ, margine fusco.*

*Larva* linea dorsali flava lateralibusque striis albis nigrisque , capite cinereo nigro punctato.

An *N. linaria*. *D. de Geer* species distincta?

**Brunnea.** *N.* ( la brune ) cristata , alis deflexis fuscis , macula media transversa flava , margine brunneo.

*Wien. Verz.* 83. 15. noctua brunnea.

*Hab. in Piso arvensi. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus* subtus brunneum. *Thorax* fuscus. *Abdomen* supra cinereum. *Ala antica* fuscæ , maculis aliquot , imprimis marginis exterioris , fuscis. In medio , loco maculæ ordinariæ posticæ , macula transversa flava. Margo alæ ipse brunneus. *Postica* fuscæ , margine brunneo.

*Larva* nuda brunnea albo maculata lineaque laterali cærulescente , capite nigro , lineis duabus albis.

**Culta.** *N.* ( la parée ) cristata , alis deflexis undatis fuscèscendentibus , punctis duobus albis , anteriore duplicata , thoracis marginibus albis.

*Hab. in pyro sylvestri. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Palpi* subtus albi. *Antennæ* ferrugineæ. *Caput* niveum , striga punctisque atris. *Thorax* fuscus , margine antico lateribusque albis parum nigro maculatis. *Abdomen* cinereum. *Ala antica* fuscæ , albo nigroque parum albidæ nigro punctatæ. In medio maculæ duæ magnæ ordinariæ , anteriore duplicata. Margo posticus albo fuscoque varius. *Postica* albæ , litura ani nigricante. *Tibia antica* albæ , nigro punctatæ , tarsis nigris albo annulatis.

*Larva* obscure variegata , lineis utrinque duabus undatis nigris , ano quadri-dentato.

Compta. N. ( l'ajustée ) cristata , alis deflexis fuscis nigro undatis , fascia media lata alba.

*Wien. Verz.* 70. 5. noctua compta.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedentibus minor. *Caput & thorax* fusco alboque varia. *Abdomen* cinereum. *Alæ anticae* fuscae , nigro undatae , basi parum albicant , fascia lata in medio & striga postica fere obsoleta albis. *Posticae* fuscae , basi pallidiores. *Tarsi* nigri , albo annulati.

Prasina. N. ( la verte ) cristata , alis deflexis fusco viridique variis , lituris duabus albis , thoracis crista duplici.

*Wien. Verz.* 82. 11. noctua prasina.

*Hab. in cochlearia armoracia. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ* fuscae , nigro parum undatae viridique variae. *Liturae* duæ magnæ , altera ad basin , altera pone medium. *Posticae* fuscae , ciliis albis , *subtus* puncto strigaeque undata nigris.

*Larva* subviolacea , dorso nigro maculato , stigmatibus albis , capite fusco.

Lucipeta. N. ( la dame ) cristata , alis deflexis obscure cinereis , strigis undatis maculisque ordinariis flavescentibus.

*Wien. Verz.* 71. 2. noctua lucipeta.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Caput & thorax* hirta , obscure cinerea , immaculata. *Alæ* obscure cinereae , strigis punctisque undatis flavescentibus. In medio maculae ordinariae ,

ordinariæ , altera orbiculata , altera veniformi.

**Pyrophila.** N. ( la pyrophile ) cristata , alis cinereis lunulis maculisque fuscis , posticis fuscis nitidulis.

*Wien. Verz.* 71. 4. noctua pyrophila.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedente minor. *Corpus* cinereum ; *thorax* striga interrupta fusca. *Alæ* cinereæ , strigis tribus lunularum fuscarum. Maculæ ordinariæ fere obsoletæ. Margo posticus nigro punctatus. *Alæ posticæ* fuscae nitidæ , supra immaculatæ ; *subtus* pallidiores , lunula strigaeque fuscis.

**Xantographa.** N. ( la xantographe ) cristata , alis deflexis testaceis , maculis ordinariis flavis.

*Wien. Verz.* 83. 26. noctua xantographa.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino N. *oleraceæ* , at paullo minor. *Caput* , *thorax* , *alæ anticæ* obscure testaceæ , maculis ordinariis flavescentibus , postice striga punctorum nigrorum. *Posticæ* , uti & *abdomen* , cinereæ.

**Convergens.** N. ( la convergente ) cristata , alis deflexis subdentatis griseo-fuscis apice cinereis , angulo ani macula fulva.

*Wien. Verz.* 84. 8. noctua convergens.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ anticæ* ultra medium fusco griseoque variæ , basi lineola atra. In medio maculæ ordinariæ , posteriori veniformi lunula obsoleta alba , apice cinereæ , macula anuli ferruginea punctisque marginalibus nigris.

*Larva* cærulefcens , lineis punctisque  
albis , capite brunneo.

*Alchymista*. N. ( l'alchimifte ) cristata , alis deflexis  
dentatis nigris atro undatis apice ciner-  
ascentibus , posticis basi maculisque  
duabus marginalibus albis.

*Wien. Verz.* 89. 9. noctua alchymista.

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc.* Affinis N. *leucomelas* , at paullo  
major. *Corpus* atrum , dorso cristato.  
*Alæ* nigræ , strigis quatuor undatis  
atris apice striga cinerascete , quæ  
versus angulum ani maculam format.  
*Posticæ* nigræ , macula magna baseos  
duabusque minoribus marginalibus albis.  
Subtus omnes nigræ , posticis basi albis  
puncto nigro.

*Serena*. N. ( la claire ) cristata , alis deflexis  
albidis , fascia utrinque flavo maculata.

*Wien. Verz.* 84. 4. noctua perlata.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Corpus* albidum , atomis  
fuscis. *Alæ anticæ* basi albæ , punctis  
aliquot nigris ; in medio fuscae , qui  
color utrinque striga undata flavescete  
terminatur maculis ordinariis albidis ;  
apice albæ , striga nigra fuscaque ,  
costa albo nigroque punctata.

*Ligustri*. N. ( du troene ) cristata , alis deflexis  
fusco virescentique variis nigro sub-  
undatis , macula magna postica albida.

*Wien. Verz.* 70. 1. noctua ligustri.

*Hab. in Austriae ligustro. D. Schieffer-  
myller.*

*Desc.* Paullo minor N. *aprilina*. *Thorax*  
albo nigroque varius. *Alæ anticæ*  
obscuræ , variegatæ. In medio macula



ordinaria annulo albo cincta. Versus apicem macula magna alba. Margo ipse albo variegatus, nigro punctatus.

*Larva* pilosa, viridis, flavo lineata.

**Stichica.** N. ( la pupillée ) cristata, alis deflexis albo fuscoque variis, apice nigro striatis, stigmatibus subocellatis, posteriori veniformi.

*Hab.* Hamburgi. *Dr. Schulz.*

*Desc.* Media. *Antennæ* fulcæ. *Thorax* cristatus, strigis fere indistinctis albis fuscisque alternis. *Alæ anticae* albo fuscoque variæ, versus apicem striis septem abbreviatis atris & in medio stigmata ordinaria annulo atro cincta, anteriori orbiculato, posteriori veniformi. *Alæ posticæ* nigricantes, margine albo.

**Perla.** N. ( la perlée ) cristata, alis deflexis cinereis nigro undatis, maculis duabus fuscis.

*Wien. Verz.* 70. 3. noctua perla.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis videtur N. *algæ*. *Alæ anticae* supra obscure cinereæ, strigis undatis nigris. In medio maculæ duæ magnæ fulcæ. *Posticæ* albidæ, puncto centrali fusco.

**Tridens.** N. ( de l'abricotier ) cristata, alis deflexis cinereis, maculis atris trifidis, posticis albidis.

*Wien. Verz.* 67. 1. noctua tridens.

*Hab.* in Austriae pruno Armeniaco. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis N. *psi*, at larva diversissima.

*Larva* nigra, lateribus rubro punctatis

lineaque dorsali sulphurea , tuberculo conico porrecto.

**Auricoma, N.** ( de la ronce bleuâtre ) cristata , alis deflexis , anticis cinereo fuscis , strigis characteribusque nigris , pedibus apice albo annulatis.

*Wien. Verz.* 67. 6. noctua auricoma.

*Hab. in Austriae rubo caesio. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *N. psi*, at omnia obscuriora. *Ala postica* albidiores.

*Pedes* albidii, apice fusci, albo annulati.

*Larva* pilosa atra, verrucis fulvis, pilis capitis caudæque albis, dorsi aureis.

**Euphorbiae, N.** ( de l'euphorbe ) cristata , alis deflexis cinereis fusco undatis , maculis ordinariis , anteriore orbiculata , posteriori veniformi albidis.

*Wien. Verz.* 67. 4. noctua euphorbiae.

*Hab. in Austriae euphorbia. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media. *Caput & thorax* hirta cinerea. *Ala cinerea*, striga baseos brevissima, altera ante medium undata, tertia pone medium incurva. In medio pallidiores, maculis ordinariis distinctis annulo fusco cinctis. Margo fusco punctatus.

*Larva* pilosa virescens, maculis dorsalibus atris, collari lunula ferruginea.

**Megacepha-N.** ( la mégacéphale ) cristata , alis deflexis cinereis nigro undatis , macula unica orbiculata albida.

*Wien. Verz.* 67. 5. noctua megacephala.

*Hab. in salice. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media affinis *N. euphorbiae*.

*Antennae* nigrae. *Caput & thorax* hirta,

cinerea. *Abdomen* albidum. *Alæ anticae* obscure cineræ, strigis variis undatis nigris. In medio macula ordinaria unica. Margo fusco punctatus. *Posticae* albæ, subtus puncto centrali fusco.

*Larva* pilosa fusca ferrugineo maculata; capite corpore latiore segmentoquo postico macula sulphurea.

**Pistacina. N.** ( de la centauree scabieuse ) cristata; alis deflexis cinereis apice obscurioribus undatis, posticis fuscis.

*Wien. Verz.* 77. 1. noctua pistacina.

*Hab. in* centaurea scabiosa. *Mus. D. Schieffermyller.*

**Desc.** Rustica media. *Corpus* griseum. *Alæ* cineræ strigatæ, basi parum pallidiores, punctis nigris; apice obscuriores, striga undata pallida posteriorique e punctis nigris.

*Larva* nuda scabra viridis, punctis lineaque laterali albis.

**Baja. N.** ( de la belladone ) cristata, alis deflexis ferrugineis, puncto parvo baseos geminatoque apicis nigris.

*Wien. Verz.* 77. 3. noctua baja.

*Hab. in* atropa belladonna. *Mus. D. Schieffermyller.*

**Desc.** Rustica media. *Palpi* ferruginei apice pallidi. *Thorax* ferrugineus. *Abdomen* cinereum. *Alæ anticae* ferrugineæ, puncto baseos distincto atro; in medio paullo obscuriores, maculis ordinariis & apice versus marginem exteriorem puncta duo approximata atra. *Posticae* fuscae, ciliis ferrugineis.

*Larva* cinereo fuscoque varia, lineis tribus dorsalibus albis, laterali flavescente.

Rubricosa. N. ( de la patience sauvage ) cristata ;  
 alis deflexis fuscescentibus , costa alba  
 fusco maculata , apice fusca , punctis  
 albis.

Wien. Verz. 77. 4. noctua rubricosa.

Hab. in rumice acuta. D. Schieffermyller.

Desc. Media. Caput & thorax hirta , flavescentia. Alæ anticæ fuscescentes , cinereo undatæ , margine tenuiori baseos rufescente. Costa ultra medium albida , maculis tribus nigris , apice fusca , punctis parvis duobus albis. Subtus obscuræ.

Larva grisea , linea dorsali pallida segmentoquo singulo punctis duobus albis.

Erythrocephala. N. ( l'érythrocéphale ) cristata , alis deflexis ferrugineis cinereo fuscoque undatis , macula posteriori nigro punctata , capite rufo.

Wien. Verz. 77. 5. noctua erythrocephala.

Hab. in plantagine. D. Schieffermyller.

Desc. Caput rufescens. Thorax subcristatus , fuscus. Alæ rufescentes , cinereo fuscoque undatæ. Costa baseos cinerea. In medio maculæ ordinariæ , quarum posterior punctis aliquot marginalibus atris. Posticæ fuscae , margine ciliato. Subtus anticæ limbo cinereo ; posticæ cineræ puncto strigaque undata fusca.

Polygona. N. ( du plantain ) cristata , alis deflexis subundatis , extus fusco nigroque variis , intus pallidis , thorace variegato.

Wien. Verz. 98. 16 noctua polygona.

Hab. in plantagine. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Thorax fusco ferrugineoque varius , postice linea utrinque obliqua , atra. Alæ anticæ subundatæ , ferrugineo fuscoque variæ , maculis

ordinariis; intus cinereæ, fusco undatæ.

Costa punctata. *Posticæ* albidæ.

*Larva* nuda viridis, linea laterali albida  
stigmatibusque fulvis.

**Simulans.** N. ( l'ardoisée ) cristata, alis deflexis  
obscurè cinereis nitidulis, strigis undatis  
fuscis, posteriore punctata.

*Hab.* in Germania. D. Schneider.

*Desc.* Media. *Caput* & *thorax* obscura;  
abdomine pallidiore. *Alæ anticæ* cinereæ,  
nitidæ, strigis undatis obscurioribus,  
marginali punctata. *Posticæ*  
fuscae, nitidulæ.

**Acetosellæ.** N. ( de la petite-oseille ) cristata, alis  
deflexis helvolis, strigis duabus obliquis  
cinereis, posticis fuscescentibus,  
margine brunneo.

*Wien. Verz.* 84. 1. noctua acetosellæ.

*Hab.* in rumice acetosella. D. Schieffermyller.

*Desc.* *Antennæ* rufescentes. *Caput* &  
*thorax* helvola. *Alæ anticæ* helvolæ,  
strigis duabus postice convergentibus  
cinereis. Inter strigas has maculæ  
ordinariæ. *Posticæ* fuscae, margine  
brunneo.

*Larva* nuda dorso fulvo, striis duabus  
longitudinalibus fuscis, lateribus rufescentibus,  
capite rufo, lineis duabus  
purpureis atro punctatis.

**Conigera.** N. ( l'étoilée ) cristata, alis deflexis  
flavescentibus, strigis duabus fuscis  
punctoque medio albo trigono.

*Wien. Verz.* 84. 3. noctua conigera.

*Hab.* in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

*Desc.* Minor N. turca. *Antennæ* flavescentes,  
*Alæ anticæ* flavescentes, striga

baseos recurva ; in medio punctum trigonum album , postice striga obliqua ; *posticæ* obscuræ.

*Larva* grisea albo nigroque lineata , capite fusco , segmento primo atro , lineis tribus albis.

**Albipuncta.** N. ( du grand plantain ) cristata , alis deflexis cinereis , lunula media albæ strigisque duabus lunularum fuscæ.

*Wien. Verz.* 64. 4. noctua albipuncta.

*Hab.* in plantagine majori. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Corpus cinereum. *Alæ anticæ* cinereæ , interdum parum rufescentes , strigis duabus e lunulis interruptis fuscis. Inter has strigas lunula albida.

*Larva* grisea , albo lineata nigroque punctata , primo segmento fusco , lineis tribus albis.

**Flavicincta.** N. ( la mandarine ) cristata , alis dentatis deflexis fusco cinereoque variis fulvo punctatis.

*Wien. Verz.* 72. 2. noctua flavicincta.

*Raf. inf.* 1. pap. 2. tab. 54. 55.

*Hab.* in pruno ceraso. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minor N. *polyodon.* Caput cinereum , basi parum fulvum. *Thorax* cinereus , atomis fuscis fulvisque. *Alæ anticæ* fusco cinereoque variegatæ , punctis sparsis fulvis. Costa albo punctata. *Posticæ* cinereæ , supra striga , subtus puncto strigæque fuscis.

*Larva* viridis , linea laterali pallida.

**Perflua.** N. ( la dentelée ) cristata , alis deflexis subdentatis cinereis , fascia lata , atræ puncto ocellari.

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*



*Desc.* Magna. *Caput* & *thorax* fusca.  
*Alæ anticae* subdentatae cinerascens,  
 fascia in medio lata utrinque dentata  
 atra, & in hac punctum parvum nigrum  
 annulo cinereo cinctum. Margo posticus  
 obscurior, lunulis fuscis. *Posticae* fuscae.

**Fumosa.** N. ( l'enfumée ) cristata, alis deflexis  
 nigricantibus, striga postica punctorum  
 alborum.

*Wien. Verz.* 81. 18. noctua fumosa.

*Hab. in Austria.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Nimis N. *nigricans* affinis. Differt  
 tantum striga postica punctorum cus-  
 pidatorum alborum. *Corpus* totum  
 nigricans.

**Aurita.** N. ( l'auriculée ) cristata, alis deflexis  
 fusco nitidulis, fascia media repanda  
 cinerea, capite bi-thorace quadri-  
 dentato.

*Hab. in Hispania.* D. Vahl.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino B.  
*strigulae*, at omnino hujus generis. *Caput*  
 cinereo hirtum, denticulis duobus  
 erectis e fasciculis pilorum. *Thorax* iti-  
 dem quatuor elevatis validis. *Alæ*  
 fusco-nitidulae, in medio fascia lata  
 repanda cinerea, apice albo nigroque  
 striatae.

**Calvaria.** N. ( la garantie ) cristata, alis deflexis  
 fuscis, strigis tribus undatis cinereis  
 maculae media testacea.

*Wien. Verz.* D. Schieffermyller noctua  
 calvaria.

*Desc.* Media. *Corpus* griseum. *Palpi* magni  
 reflexi fere pyralidum. *Alæ anticae*  
 obscurae, fuscae, strigis tribus undatis  
 maculisque duabus marginalibus albidis.

In medio inter frigas punctum parvum  
maculaque posterior magna fulva, &  
in hac puncta duo parva nigra. *Postica*  
fusca, subtus albo undata.

**Ridens. N.** ( l'agréable ) cristata, alis deflexis  
viridi-fusco alboque variis, macula  
baseos strigisque duabus undatis albis,  
antennis flavescentibus.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura & magnitudo *N. rumicis*.  
*Caput & thorax* virescentia albo irro-  
rata. *Antennæ* flavescentes. *Abdomen*  
pallidum. *Alæ* viridi-fusco alboque  
variæ, macula magna distincta alba  
baseos ad marginem exteriorem, quæ  
strigam undatam albam attingit. Pone  
maculas ordinarias striga altera undata  
alba. Versus apicem strigæ lineolis  
albis lunulisque atris.

**Asteris. N.** ( de l'aster de la Chine ) cristata, alis  
integris striatis cinereis, marginibus  
nigris, exteriore punctis tribus nigris.

*Wien. Verz.* 312. 10. noctua asteris.

*Hab. in astere Chinesi. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *N.*  
*verbasci*, at alæ integræ. *Antennæ* supra  
albæ, subtus ferrugineæ. *Alæ* in medio  
pallidæ, lateribus fuscis. In costa puncta  
tria alba; in margine tenuiori lunula  
alba. *Postica* fusca, disco ciliisque albis.

**Chamomillæ. N.** ( de la camomille ) cristata, alis anticis  
lanceolatis striatis canis, punctis duobus  
centralibus minutissimis nigris, subtus  
immaculatis.

*Wien. Verz.* 73. 3. noctua chamomillæ.

*Hab. in chamomilla, flores excedens. D.*  
*Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *N. umbraticæ*, vix distinguenda, at larva diversissima. *Antennæ* ferruginæ. *Caput* fuscum, strigis cinereis. *Thorax* hirtus cinereus, striga antica marginali nigra. *Abdomen* griseum, basi fasciculis aliquot dorsalibus. *Alæ anticæ* supra striatæ canæ, in medio punctis duobus hirsutissimis costaque punctis tribus cinereis. *Subtus* cinereæ, punctis tribus costalibus albis. *Posticæ* striatæ, cinereæ, ciliis albis; *subtus* immaculatæ, lunula parva centrali fusca.

*Larva* nuda cinerea, utrinque lineolis duabus incurvis ferrugineis in singulo segmento. Junior flavo alboque maculata.

**Tanaceti. N.** ( de la tanaïsie ) cristata, alis lanceolatis striatis canis, lineolis duabus atris, posticis albis subtus immaculatis.

*Wien. Verz.* 73. 5. noctua tanaceti.

*Hab.* in tanaceti vulgaris floribus. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis *N. chamomillæ*. *Antennæ* ferruginæ, basi albidæ. *Caput* cinereum. *Thorax* cinereus, striga antica fusca. *Abdomen*, basi albidum. *Alæ anticæ* striatæ canæ, lineola a basi fere ad medium ducta, & alia in medio brevior, apice parum flexa. Puncta tria costalia. *Subtus* obscuræ nitidæ. *Posticæ* albæ, supra margine nigricante, subtus immaculatæ.

*Larva* nuda cinerascens, nigro punctata flavoque lineata, similis larvæ *N. verbasci*.

**Lactucæ. N.** ( la laitue ) cristata, alis anticis striatis lanceolatis canis fusco obsolete

undatis, subtus fuscis, posticis disco albo.

*Wien. Verz.* 76. 7. noctua lactucae.

*Hab. in lactuca sativa. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Summa affinitas N. umbraticae.

Striga antica thoracis interrupta. Alae striatae, undis aliquot fuscis, at absque punctis centralibus costalibusque. Subtus fuscae basi margineque pallidae, punctis tribus costalibus albidioribus. Posticae fuscae, disco albicante.

*Larva* atra, annulis lateralibus albis lineaque dorsali maculari fulva, capite atro, linea antica bifida alba.

**Lactea.** N. ( la laiteuse ) cristata, alis deflexis niveis nitidis immaculatis.

*Hab. in Russia Australiori. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino N. umbraticae, at duplo minor. Antennae, caput, thorax alba, immaculata. Alae omnes nivae, nitidae, omnino immaculae.

**Lithoxylaea.** N. ( du poirier ) cristata, alis deflexis dentatis cinereis fusco maculatis, margine postico fusco.

*Wien. Verz.* 75. 2. noctua lithoxylaea.

*Hab. in Pyro. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. Corpus cinereum. Thorax linea dorsali brunnea. Alae anticae dentatae, cinerae, maculis punctisque obsoletis fuscis. Margo posticus tenuissime fuscus. Subtus cinerae, margine tenuiori nitido. Posticae cinerae, margine postico fusco, subtus immaculae.

**Petrificata.** N. ( du chêne ) cristata, alis dentatis griseo fuscoque nebulosis, posticis fuscis, capite antice quadrifido.

*Wien. Verz.* 75. 3. noctua petrificata.

*Hab. in Austria quercu. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura & magnitudo N. lithoxylaeæ. Antennæ fuscæ. Caput antice dentibus quatuor distinctis. Thoracis crista itidem bifida. Alæ anticæ dentatæ, cinereo fuscoque variæ, maculis ordinariis pallidis.*

*Larva nuda viridis, linea dorsali candida lineolisque albis sparsis, stigmatibus niveis annulo nigro cinctis, capite viridi.*

**Rhizolitha.** N. ( la rhizolite ) cristata, alis subdentatis cinereis, lineola baseos intermediaque atris, thoracis crista bifida.

*Wien. Verz. 75. 6. noctua rhizolitha.*

*Hab. in quercu. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magnitudo præcedentis. Caput cinereum, transverse bifidum. Thorax hirtus, cinereus, lunula marginali antica nigra. Crista erecta, bifida. Alæ griseæ, lineola baseos distincta atra, in medio lunulæ lineolaque nigræ, apice puncta nigra. Posticæ supra fuscæ, subtus cinereæ, puncto medio strigaeque postica fuscis.*

*Larva subpilosa viridis, albo irrorata, linea dorsali cærulescente.*

**Conformis.** N. ( du bouleau blanc ) cristata, alis dentatis griseis, lineolis duabus atris, abdomine subtus brunneo.

*Wien. Verz. 76. 7. noctua conformis.*

*Hab. in betula alba. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Antennæ nigricantes. Caput & thorax hirta fusca. Abdomen hirtum, imprimis subtus brunneum. Alæ anticæ griseo vix undatæ. In medio*

alæ lineolæ duæ utrinque bifidæ , exte-  
riori adnata macula rufescente. *Posticæ*  
obscuræ. Subtus *omnes* cinereæ , rufo  
nitentes , puncto medio strigaque pos-  
tica fuscis.

**Advena.** N. ( l'étrangere ) cristata , alis deflexis  
dentatis cinereo fuscoque variis , tho-  
racis crista bifida.

*Wien. Verz.* 77. 11. noctua advena.

*Hab. in* betula alba. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna , cinereo fuscoque varia ,  
postice striga abbreviata nigra. In medio  
maculæ ordinariæ *Posticæ* fuscæ. Tho-  
racis crista elevata , bifida quasi cana-  
liculata.

**Basilinea.** N. ( le trait noir ) cristata , alis deflexis  
fusco griseis undatis , lineola baseos  
atra , thoracis cristata bifida.

*Wien. Verz.* 78. 12. noctua. basilinea.

*Hab. in* Austria. *Schieffermyller.*

*Desc.* Color variat vel ferrugineus vel  
griseus , distincta lineola parva flexuosa  
atra baseos. *Antennæ* albidæ.

**Radicea.** N. ( des racines ) cristata , alis de-  
flexis variegatis , striga postica dentata  
alba , thoracis cristata elevata bifida.

*Wien. Verz.* 81. 15. noctua radicea.

*Hab. in* graminum radicibus. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Antennæ* fuscæ. *Caput &*  
*thorax* ferruginea , striga antica atra.  
*Alæ antica* dentatæ , variegatæ , li-  
neola atra baseos. In medio marginis  
tenuioris litura alba lineola atra , apice  
striga valde dentata albida. *Posticæ*  
basi albidæ , apice fuscæ. *Subtus* apice  
rufescentes.



*Larva nuda cinerea, maculis elevatis, capite caudaque atris.*

**Lamda. 257. N.** ( lamda ) cristata, alis deflexis fusco-cinereis, lincola baseos duabusque in medio atris.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino N. *psi.* Caput & thorax obscure cinerea, valde cristata. *Alæ anticæ* obscure cinereæ, nitidæ, fascia baseos mediisque obsoletis obscurioribus. Lineola atra ad basin duæque in medio, interiori longiori.

### Geometræ.

**Buplevraria. G.** ( du buplevre ) pectinicornis, alis dentatis viridibus, striga sesquialtera alba, margine fusco punctato.

*Wien. Verz. 97. 4.* phalæna buplevraria.

*Knoch. Beytr. 1. tab. 1. fig. 1.* phalæna sesquistriata.

*Hab. in Austriæ buplevro. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino *G. vernariæ*. *Alæ* valde dentatæ, virides, anticis strigis duabus, posticis unica albis. Margo posticus fusco punctatus.

**Roboraria. G.** ( du roure ) pectinicornis alis dentatis griseis, atomis strigisque numerosis fuscis.

*Wien. Verz. 101. 1.* phalæna roboraria.

*Hab. in quercu. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna tota grisea, atomis strigisque undatis fuscis. *Subtus* alæ albidæ, lunulis fuscis.

*Larva* griseo-fusca, linea dorsali arcuatusque singuli segmenti obscurioribus.

**Confortaria. G.** ( l'affermie ) *pectinicornis* alis *dentatis* griseis fusco strigosis , posticis puncto oblongo ocellari albido.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis , paullo minor , grisea atomis strigisque fuscis distincta , puncto oblongo albo annulo fusco cincto in medio *alæ posticæ*. Subtus *omnes* griseæ , puncto medio strigique fuscis.

**Conspersaria. G.** ( la criblée ) *pectinicornis* , alis *rotundatis* cinereis , atomis numerosis fuscis.

*Wien. Verz. 106. 8. phalæna conspersaria.*

*Hab. in Austriæ salvia pratensi. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo *G. piniariæ* , tota cinerea , atomis numerosis fuscis. Interdum punctum medium subocellatum , fuscum. *Mas* , antennis minus *pectinatis* , albidior.

*Larva* caudata albida , rufo striata , cauda bidentata.

**Adspersaria. G.** ( l'arrosée ) *pectinicornis* , alis omnibus luteis fusco irroratis.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino *G. limbariæ* , at *alæ omnes* supra subtusque luteæ , atomis numerosissimis fuscis.

**Lichenaria. G.** ( du lichen ) *pectinicornis* , alis viridi cinereoque variis , strigis duabus nigris , anteriore incurva , posteriore undato flexuosa.

*Wien. Verz. 100. 8. phalæna lichenaria.*

*Hab. in Austriæ lichenibus. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.*

*Desc.* Parva tenera. *Alæ anticæ* cinereæ, viridi colore, imprimis in medio, mixto. Striga ante medium atra, recurva & altera valde flexuosa undata versus marginem. Margo ipse nigro punctatus. *Posticæ* griseæ, striga undata punctisque marginalibus fuscis.

*Larva* scabra viridis aut cinerea, luteo varia, lateribus atro maculatis, pedibus anticis macula atra, puncto viridi.

*Variat* color larvæ secundum colorem lichenum.

Cineraria. G. ( la cendrée ) pectinicornis, alis anticis griseis, strigis duabus nigris, posticis cinereis, striga unica.

*Wien. Verz.* 100. 10. phalæna cineraria.

*Hab. in* ryffo candelario. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva, tenera, grisea, margine nigro punctato.

*Larva* fusca, dorso cinereo, maculis transversis albis.

Capreolaria. G. ( du sapin ) pectinicornis, alis griseis, fascia saturatiore, puncto medio lineolaque apicis nigris.

*Wien. Verz.* 105. 2. phalæna capreolaria.

*Hab. in* pino picea. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura G. *defoliariæ*, at minor. *Antennæ* pectinatae fuscae. *Alæ anticæ* griseæ sive cinereæ, atomis fuscis. In medio fascia lata postice sinuata, obscurior & in hac punctum nigrum. In apice lineola nigra. *Posticæ* cinereæ, strigis atomisque fuscis. Subtus omnes cinereæ, anticis puncto, posticis puncto strigaque punctorum nigrorum.

Murinaria. G. ( la grife ) pectinicornis , alis griseis , strigis duabus punctoque medio fuscis.

*Wien. Verz.* 105. 4. phalæna murinaria.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva , tenera. *Corpus* griseum.

*Alæ omnes* griseæ ; *anticæ* strigis duabus subundatis punctoque medio fuscis ; *posticæ* puncto medio strigique postica fuscis. *Subtus omnes* griseæ , immaculatæ.

Pedaria. G. ( de l'aulne ) pectinicornis , alis griseo-virescentibus fusco irroratis , pedibus albo annulatis , fœmina aptera.

*Hab. in betula alno. D. Hybner.*

*Desc.* Obscura. *Alæ* griseæ , viridi colore nitentes , maculis atomisque fuscis. *Posticæ* albidiores , strigis atomisque obscurioribus. *Pedes omnes* grisei , albo annulati.

Hispidaria. G. ( la hérissée ) pectinicornis , alis cinereo-fuscis , striga undata obscuriore , margine albo punctato , antennis flavis.

*Wien. Verz.* 99. 4. phalæna hispidaria.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *G. hirtaria* , at paullo minor. *Corpus* hirtum , griseo-fuscum. *Antennæ* flavæ. *Alæ* obscuræ , striga media undata obscuriore. Margo albo punctatus.

Nivearia. G. ( la neigeuse ) pectinicornis , alis niveis immaculatis , anticis subtus fusciscentibus.

*Wien. Verz.* 116. 4. phalæna nivearia.

*Scop. carn. phalæna niveata.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Antennæ fuscæ. Alæ omnes albæ, supra immaculatæ, subtus anticae fuscescentes.*

Pluviaria. G. ( l'inégale ) pectinicornis, alis cinereis fusco irroratis, strigis anticarum duabus, posticarum unica fuscis.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc. Media. Antennæ pectinatæ, rachi pallida. Corpus cinereum. Alæ omnes cineræ, parum lutescentes. Anticæ strigis duabus; posticæ unica fuscis. Subtus concolores, at anticis loco strigæ anticæ macula oblonga disci.*

Smaragdaria. G. ( l'émeraudine ) pectinicornis, alis viridibus, anticis strigis duabus punctoque medio albis.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura G. prasinaria. Antennæ pectinatæ, fuscescentes. Alæ omnes virides, anticis striga baseos e lunulis duabus cohærentibus alba. In medio punctum album & postice striga undata alba. Posticæ immaculatæ. Subtus omnes virentes, striga pallida.*

Carbonaria. G. ( du bry des murs ) pectinicornis, alis rotundatis fuscis flavo subfasciatis, apice setaceis.

*Wien. Verz. 103. 5. phalæna carbonaria.*

*Hab. in bryo murali. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Antennæ pectinatæ, apice setacæ. Caput & thorax nigra. Alæ omnes fuscæ, strigis undatis obscurioribus aliisque flavis, quæ ad marginem tenuiorem macula magna flava terminantur.*

Nitidaria. G. ( la brillante ) pectinicornis , alis argenteis , anticis strigis duabus obliquis fuscis.

*Hab. in Russia Australiori. D. Boeter.*

*Desc. Minor G. betulariæ. Corpus album.*

*Antennæ parum pectinatæ. Alæ anticæ argentiæ , nitidæ , strigis duabus obliquis fuscis. Posticæ immaculatæ , subtus atomis strigique postica fuscis.*

Prodromaria. G. ( la précocce ) pectinicornis , alis albis nigro punctatis , fasciis duabus latis fuscis.

*Wien Verz. 99. 1. phalæna prodromaria.*

*Hab. in Germaniæ quercu , tilia.*

*Desc. Statura omnino G. betulariæ. Caput album , antennis nigris albo annulatis.*

*Thorax hirtus albus , fasciis duabus abbreviatis nigris. Abdomen griseum.*

*Alæ albæ nigro punctatæ , fasciis duabus fuscis nigro marginatis. Mas minor , pallidior.*

*Larva geometra mox cinerea , mox fusca , mox ferruginea , capite carneo.*

*Puppa folliculata brunnea sub terra.*

Lignaria. G. ( des bois ) pectinicornis , alis nigricantibus griseo subfasciatis.

*Hab. in Saxoniz ligno putrido. Mus. D. Romani.*

*Desc. Alæ omnes nigricantes , strigis numerosis griseis.*

*Larva geometra nigra , lineis quatuor punctorum nigrorum.*

Artefaria. G. ( l'acolée ) pectinicornis , alis griseis , striga obliqua alba maculaque ferruginea.

*Wien. Verz. 102. 2. phalæna artefaria.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*



*Desc.* Minor. *Alæ antica* griseæ, pone medium striga obliqua albida & pone hanc macula ferruginea strigæ contigua. *Postica* immaculata.

*Aureolaria*. G. ( des buissons ) pectinicornis, alis flavissimis, strigis tribus margineque fuscis.

*Wien. Verz.* 102. 8. phalæna aureolaria.

*Hab.* in Austriæ vicia dumetorum. D. Schiëffermyller.

*Desc.* Parva. *Alæ omnes* concolores flavæ, anticis strigis tribus, posticis duabus margineque fuscis.

*Larva* tenuis, glabra, albida, dorso obscuriore, linea fusca.

*Gilvaria*. G. ( du millefeuille ) pectinicornis, alis anticis flavescens, fascia obliqua atomisque fuscis.

*Wien. Verz.* 102. 10. phalæna gilvaria.

*Hab.* in achillæa, millefolio. D. Schiëffermyller.

*Desc.* Paullo præcedente major. *Alæ antica* flavescens, fascia a medio marginis tenuioris ad apicem ducta. *Postica* albidæ.

*Larva* obscure cinerea, ferrugineo lineata lineaque dorsali albida.

*Pygmaria*. G. ( la pygmée ) pectinicornis, alis cinereis, basi fusca striga atra terminata.

*Hab.* Kilix. D. Daldorf.

*Desc.* Parva. *Antennæ* pectinatae. *Corpus* cinereum. *Alæ antica* basi fusca & hic color terminatur striga atra; tunc cinereæ, striga postica una alterave fusca; *subtus* cinereæ, lunula centrali fusca.

Horridaria. G. ( la négresse ) pectinicornis , alis  
nigris nitidulis , strigis obscurioribus.  
*Wien. Verz.* 100. 7.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. Corpus atrum , immacula-  
tum. *Alæ omnes* nigræ , nitidulæ ,  
strigis aliquot obscurioribus.

*Antennis setaceis.*

Flexula. G. ( la sinuée ) *Sp. inf.* 2. 254. 69.  
phalæna sinuata.

*Wien. Verz.* 64. 3. phalæna flexula.

*Larva* virescens , collo gibbo clavato ,  
cauda acuminata , capite pedibusque  
rufescentibus.

Rhamnata. G. ( du nerprun ) feticornis , alis den-  
tatis fuscescentibus , fascia media den-  
tata obscuriore , lunula atra , puncto  
strigique fuscis.

*Wien. Verz.* 109. 2. phalæna rhamnata.

*Hab. in Austriæ rhamno cathartico. Mus.*  
*D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ omnes* obscuræ , ci-  
nereo valde undatæ , imprimis basi  
apiceque. In medio *alæ anticæ* lunula  
parva nigra. Subtus *omnes* cinereæ ,  
puncto medio strigique postica undata  
fuscis.

*Larva* viridis , linea dorsali fusca , seg-  
mentorum marginibus flavis , capite  
fusco.

Dubitata. G. ( l'incertaine ) feticornis , alis obs-  
curis fusco cinereoque undatis , nervis  
albo punctatis.

*Wien. Verz.* 109. 3. phalæna dubitata.

*Hab. in Austriæ rhamno cathartico. Mus.*  
*D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis præcedenti affinis, differt tamen alis obscuris fusco pallidoque undatis, nervis albo punctatis. *Alæ posticæ* haud concolores uti in præcedente, sed cinereæ, nervis albo punctatis apice striga pallida nigraque. Subtus cinereæ, lunula media punctisque nervorum fuscis.

*Larva* viridis, fusco pallidoque sublineata, laterali flava.

**Furcata. G.** ( de la viorne cotonneuse ) feticornis, alis dentatis fusco - griseis, fascia lata dentata obscuriore.

*Wien. Verz.* 108. 1. phalæna furcata.

*Hab.* in viburno lantana. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Antennæ* intus ferrugineæ. *Alæ omnes* dentatæ obscure griseæ. Ante medium fascia lata utrinque dentata obscurior & pone hanc striga obsoleta pallida. Subtus *omnes* basi obscuræ, apice pallidiores.

*Larva* livida, carneo undata nigroque punctata, postice denticulorum tribus paribus, intermedio minori.

**Lividata. G.** ( la livide ) feticornis, alis dentatis griseis nigro undatis punctoque medio subocellari.

*Wien. Verz.* 108. 3. phalæna obscurata.

*Hab.* in rubo cælio Austriæ. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ omnes* valde dentatæ, griseæ, strigis obsoletis interruptis nigris. In medio punctum subocellatum album. Subtus cinereæ, striga undata apicis nigra.

*Larva* fusca albo punctata, postice bidentata, capite cinereo.

**Pyraliata.** G. ( du caille-lait jaune ) feticornis , alis flavis , strigis quatuor undatis fuscis , posteriori maculari.

*Wien. Verz.* 117. 1. phalæna pyraliata.  
*Hab. in Austria Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino G. populatæ. Alæ anticæ flavæ , strigis quatuor , quarum tres undatæ , quarta vero macularis. Subtus puncto medio , striga postica maculaque apicis fuscis. Posticæ supra pallidiores , striga fusca. Subtus puncto medio strigisque duabus fuscis.

**Aurantiata.** G. ( l'orangée ) feticornis , alis ferrugineo-fuscis , cinereo substrigosis , posticis aurantiis , puncto centrali fusco.

*Frank. Beytr.* 2. 1. 457. tab. phalæna diversata.

*Wien. Verz.* 315. 14.

*Hab. in Germania. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magnitudo & statura G. prunatæ. Alæ anticæ fuscae , ferrugineo parum nitentes. Costa cinereo punctata , quæ in strigas obsoleta excurrit. Posticæ aurantiæ , fusco irroratæ , puncto medio magno distincto margineque fuscis. Subtus anticæ aurantiæ , atomis punctoque medio fuscis. Posticæ atomis numerosioribus strigaque postica fuscis. Fœmina pallidior , alis magis rotundatis.

**Rubidata.** G. ( la rougeâtre ) feticornis , alis anticis fuscis , fasciis duabus ferrugineis.

*Wien. Verz.* 113. 22. phalæna rubidata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Paullo minor G. miata. Alæ anticæ basi fuscae , tunc fascia lata ferruginea ; demum fuscae ad marginem tenuiorem

cineraſcentes fuſco parum undatæ; denique fascia altera ruſa poſtice cinereo undata, apice fuſcæ.

**Spartiatæ.** G. ( du genêt ) feticornis, alis oblongis fuſcis, vitta albida, poſticipis cinereis.  
*Fyeſl. arch. 2. tab. 5. phalæna ſpartiatæ.*  
*Hab. in Germaniæ ſpartio. Muſ. D. Romani.*

*Deſc.* Diſtincta alis obliquis longioribus fuſcis, vitta pallida, poſtice præterea ſtriga albida.

*Larva* viridis aut flava, linea laterali alba.  
*Puppa* brunnea.

**Berberatæ.** G. ( de l'épine-vinette ) fetinicornis, alis anticis cinereis, faſciis tribus fuſcis, poſteriori nigro undata.

*Vien. Verz. 113. 23. phalæna berberatæ.*

*Hab. in Aſtriæ berberis vulgari. D. Schieffermyller.*

*Deſc.* Media. *Alæ anticæ* cineræ, faſciis duabus ante medium fuſcis. Pone medium tertia magis obſoleta nigro undata. Ala apice terminatur lineola nigra. *Poſticæ* cineræ.

*Larva* ſcabra fuſco ruſo alboque variegata.

**Illibatæ.** G. ( la vierge ) feticornis, alis omnibus albis immaculatis.

*Wien. Verz. 116. 5. phalæna illibatæ.*

*Hab. in Aſtria. Muſ. D. Schieffermyller.*

*Deſc.* Minor G. *albicillatæ.* *Alæ omnes* albæ immaculatæ.

**Diverſatæ.** G. ( la croifée ) feticornis, alis omnibus fuſco-cinereis, lineis ſtrigisque albis diverſatis.

*Wien. Verz. 107. 7. phalæna diverſatæ.*

*Hab. in Aſtria. Muſ. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino *G. clathrata*; differt tamen manifeste alis omnibus concoloribus fusco - cinereis, lineis baseos strigisque apicis albis.

*Afinata.* *G.* ( la grifette ) feticornis, alis griseo-cinereis immaculatis.

*Wien. Verz.* 116. 2. phalæna griseata.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ omnes* griseæ immaculatæ. Statura & magnitudo *G. charophyllata*.

*Procellata.* *G.* ( la brouillée ) feticornis, alis anticis albis, fasciis tribus fuscis, media dimidiata, postica marginali, macula alba.

*Wien. Verz.* 114. 1. phalæna procellata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ anticæ* albæ, fasciis tribus, altera baseos, media dimidiata & tertia marginali fuscis. Costa fere tota fusca. Striga undata maculaque magna albæ in fascia marginali. *Posticæ* albæ, margine fusco. *Caput & thorax* fusca. *Abdomen* albidum.

*Reticulata.* *G.* ( la reticulée ) feticornis, alis anticis fuscis albo reticulatis.

*Wien. Verz.* 114. 3. phalæna reticulata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magnitudo *G. fluctuata*. *Alæ anticæ* fuscae, strigis lineisque variis albis reticulatæ. *Posticæ* obscure cinereæ, apice strigis albidis.

*Centaureata.* *G.* ( de la centaurée ) feticornis, alis albidis, macula costali fusca, lunula atra.

*Wien. Verz.* 114. 7. phalæna centaureata.

*Hab. in centaureæ icabiosæ floribus. D. Schieffermyller.*



*Desc.* Parva. *Alæ anticæ* albæ, atomis aliquot fuscis. In medio costæ macula magna fusca & in hac lunula atra. *Posticæ* albæ, puncto medio. *Larva* viridis, rubro maculata.

*Aduftata.* G. ( du fufain ) seticornis, alis anticis albidis, fasciis duabus fuscis, posteriore repanda cinereo undata.

*Wien. Verz.* 114. 9. phalæna aduftata.

*Hab. in* Austriæ evonymo Europæo.

*D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. Fascia altera baseos, altera fere marginalis.

*Larva* viridis, macula marginali alba rubro punctata.

*Propugnata.* G. ( la fortifiée ) seticornis, alis anticis cinereis, fasciis duabus ferrugineis, posteriore nigro marginata.

*Wien. Verz.* 112. 7. phalæna propugnata.

*Hab. in* Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo *G. quadrifasciata*. *Alæ anticæ* cineræ, fascia parva baseos ferruginea. In medio fascia latior, quæ utrinque nigro marginata. *Posticæ* cineræ, apice fusco undatæ.

*Fulvata.* G. ( la fauve ) seticornis, alis anticis griseis, fascia media sinuata rufescente.

*Hab. in* Suecia. *D. de Paykull.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* obscure griseæ, litura baseos fasciaque media rufescentibus. *Posticæ* cineræ.

*Rusticata.* G. ( la rustique ) seticornis, alis albidis, anticis fascia lata fusca, omnibusque puncto centrali nigro.

*Wien. Verz.* 113. 15. phalæna rusticata.

*Hab. in* Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis præcedentibus, at triplo minor. *Alæ anticæ* albidæ, fascia media lata fusca & in hac punctum atrum. *Posticæ* albidæ, puncto medio atro.

**Mellinata.** G. ( du miel ) feticornis, alis flavo-testaceis, fascia media obsoleta obscuriore.

*Hab.* in Austria. *Mus.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Media. *Alæ* fere unicolores testaceæ, parum flavescentes. In medio fascia fere obsoleta, marginibus obscurioribus. *Posticæ* pallidiores.

**Linariata.** G. ( de la linair ) feticornis, alis anticis ferrugineo cinereoque fasciatis, medio fascia lata, apice maculis fuscis.

*Wien. Verz.* 113. 10. phalæna linariata.

*Hab.* in antirrhino linaria. *Mus.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Minuta. *Alæ anticæ* basi cinereæ, fascia lata ferruginea, in medio fascia lata fusca, puncto centrali atro; tunc fascia ferruginea cinereæ juncta & in hac maculæ duæ fuscæ. *Posticæ* fusco cinereoque variæ.

*Larva* flava, maculis dorsalibus pedibusque rubris.

**Hexapterata.** G. ( du hêtre ) feticornis, alis fusco griseoque variis, posticis albis basi duplicatis.

*Wien. Verz.* 109. 10. phalæna hexapterata.

*Hab.* in fago sylvatica. *Mus.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Media. *Alæ anticæ* griseæ fusco undatæ, imprimis basi apiceque; in medio parum dilutiores lunula fusca.

*Posticæ* albæ , ad basin alæ nota rotundata , alba , immaculata. Subtus omnes cinereæ , puncto medio fusco.

**Psittacata.** G. ( du tilleul ) feticornis , alis anticis viridibus nigro undatis , fasciis duabus cinereo ferrugineoque variis.

*Wien. Verz.* 112. 8. phalæna psittacata.

*Hab. in Austriæ tilia. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino G. *alchemillatæ*.

*Alæ anticæ* virides , nigro undatæ. Ante medium fascia lata albo ferrugineoque varia , & pone medium altera itidem albo ferrugineoque varia. *Posticæ* fuscæ , subtus cinereæ , puncto strigisque fuscis.

**Moniliata.** G. ( la coquille ) feticornis , alis omnibus cinereis , strigis nigris fasciæque postica fusca , striga moniliformi cinerea.

*Wien. Verz.* 117. 10. phalæna moniliata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ omnes* cinereæ , strigis anticæ quatuor ; posticæ tribus nigris. Inter ultimas strigas fascia obsoleta obscurior , striga moniliformi cinerea. Margo ipse nigro punctatus.

**Euphorbiata.** G. ( de l'Euphorbe ) feticornis , alis fusco cinereis immaculatis.

*Wien. Verz.* 116. 9. phalæna Euphorbiata.

*Hab. in Austriæ euphorbia. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ* immaculatæ , mox obscuriores , mox pallidiores.

**Lavigata.** G. ( la luisante ) feticornis , alis griseis , fasciæ striga punctisque marginalibus fuscis.

*Wien. Verz.* 117. 10. phalæna lævigata.  
*Scop. Ent. carn.* phalæna lævigata.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Minuta.

Sagittata. G. ( l'Archer ) feticornis , alis fuscescentibus , fasciis duabus atris albo marginatis , posteriori dentem exferente.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura & magnitudo G. sociatæ.  
*Alæ anticæ* fuscæ ferrugineo mixtæ.  
 Fascia baseos parva atra , albo marginata & in medio altera major itidem atro albo marginata , quæ retrorsum dentem validum exferit. *Posticæ* cineræ , striga pallidiore.

Luteata. G. ( la jaunie ) feticornis , alis pallide flavis ferrugineo fasciatis punctoque medio fulvo.

*Wien. Verz.* 110. 18. phalæna luteata.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura G. rubricatæ. *Alæ omnes* pallide flavæ , fasciis plurimis undatis ferrugineis. In medio *alæ anticæ* punctum fulvum.

Ornata. G. ( l'ornée ) feticornis , alis niveis , puncto medio margineque postico undato fuscis.

*Wien. Verz.* 117. 14. phalæna ornata.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Nimis G. cineratæ affinis , at alæ magis nivæ & margo posticus minus niger.

Rubricata. G. ( la rougie ) feticornis , alis purpurascentibus , strigis undatis fuscis.

*Wien. Verz.* 110. 19. phalæna rubricata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. *Alæ omnes* purpurascens,  
 strigis quatuor fuscis, quarta pallidiore.  
*Subtus* concolores, at striga baseos  
 deest.

Ochreatea. G. ( de la fétuque durette ) feticornis,  
 alis flavescens, strigis numerosis  
 obscurioribus.

*Wien. Verz. 110. 20. phalæna ochreatea.*

*Hab. in festuca duriuscula Austriæ. D.*  
*Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ omnes* flavescens,  
 strigis undatis obscurioribus. *Subtus*  
 concolores, at obscuriores.

Extremata. G. ( la terminée ) feticornis, alis albidis,  
 fascia baseos lunula media maculaque  
 postica nigris.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minuta. *Alæ anticæ* albidæ, fascia  
 baseos lata nigra albo undata. In medio  
 lunula nigra & versus apicem macula  
 magna fusca.

Scutata. G. ( l'écussonnée ) feticornis, alis cinereis,  
 puncto medio fasciaque postica punc-  
 torum ocellatorum fuscis.

*Wien. Verz. 117. 12. phalæna scutata.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ omnes* cinereæ, basi  
 subimmaculatæ, in medio puncto fusco.  
*Posticæ* striga undata fusca, cui ad-  
 hærent puncta subocellata. Margo nigro  
 punctatus.

Osseata. G. ( la salie ) feticornis, alis albis obs-  
 curius undatis, puncto medio nigro,  
 anticis causta ferruginea.

*Wien. Verz. 110. 22. phalæna osseata.*

*Desc.* Parva. *Corpus* cinereum, thorace antice ferrugineo. *Alæ omnes* pallidæ, apice strigis undatis obscurioribus & in medio punctum nigrum. *Costa alæ antica* ferruginea.

*Albulata. G.* ( la blanchâtre ) feticornis, alis anticis niveis, strigis undatis obscurioribus.

*Wien. Verz.* 109. 12. phalæna albulata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis *G. immutata*, sed distincta alis posticis anticis haud concoloribus, sed albis immaculatis. Subtus *antica* obscuræ; *postica* albæ puncto strigisque obscurioribus.

*Nassata. G.* ( la coupée ) feticornis, alis anticis fuscis, fascia media undata nivea, striga fusca.

*Wien. Verz.* 109. 13. phalæna nassata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ antica* fuscæ, in medio fascia lata alba, & in hac striga parva fusca. *Postica* cinereæ, *subtus* albidæ, margine fusco.

*Pufillata. G.* ( le croissant-noir ) feticornis, alis fuscis cinereo subundatis, lunula media atra.

*Wien. Verz.* 110. 26. phalæna pufillata.

*Hab. in Austria junipero. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ antica* fuscæ, undis numerosis cinereis. In medio lunula magna atra. Subtus *omnes* fuscæ.

*Larva* viridis, pallido lineata.

*Puppa* viridis.

*Repandata. G.* ( la sinueuse ) feticornis, alis cinerascens, anticis tribus undatis punctoque medio fuscis.

*Wien.*



*Wien. Verz.* 120. 2. phalæna repândalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* cinereum, abdomine albidò. *Alæ anticæ* cinerascens, striga parva ante medium, tunc puncto in medio, deinde striga valde flexuosa & tandem striga incurva fuscis. *Posticæ* albo hyalinæ; striga flexuosa fusca.

Verbascata. G. ( de la molene ) seticornis, alis flavescens : anticis strigis tribus punctoque medio fuscis.

*Wien. Verz.* 121. 5. phalæna verbascalis.  
*Hab. in verbasco thapsus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura G. *urticæ*, at paullo minor. *Alæ omnes* flavæ, anticis strigis tribus punctoque medio fuscis. Margo fuscescens, ciliis argenteis.

Sambucata. G. ( du fureau ) seticornis, alis fuscis, maculis hyalinis sparsis.

*Wien. Verz.* 124. 14. phalæna sambucalis.  
*Hab. in Austria sambuco. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ omnes* fuscae, maculis hyalinis. Postice striga flexuosa macularis flavescens.

Candidata. G. ( la blanche ) seticornis, alis niveis, strigis undatis fuscis punctisque duobus atris.

*Wien. Verz.* 316. 46. phalæna nivealis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Caput niveum. *Alæ nivææ*. Punctum parvum baseos atrum. Postice strigæ tres undatæ fuscae, in quarum anteriore punctum geminatum atrum, *Posticæ* albæ, strigis duabus fuscis.

Luctuata. G. ) la singuliere ) feticornis, alis anticis fusco-virescentibus, fasciis duabus albis punctoque centrali nigro.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *De Hybner.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ* omnes fusco-virescentes; fascia ante medium sordide alba; in medio punctum nigrum fasciæque altera alba undata fusco strigosa. *Posticæ* cinereæ, puncto centrali strigisque fuscis.

## P Y R A L I D E S.

### *Alis forficatis.*

Marginalis. P. ( la bordée ) palpis recurvatis, alis atris, posticis margine luteo.

*Wien. Verz.* 69. 13. 317. 48. phalæna marginalis.

*Hab.* in Europa australiori. *Mus. D. Romani.*

*Desc.* Hujus generis videtur. Corpus totum atrum nitidum, solo margine alæ posticæ luteo.

Bombycalis. P. ( la pectinée ) palpis antennis pectinatis brevioribus, alis cinereo-rufis, strigis duabus albidis, posticis luteis, margine nigro.

*Wien. Verz.* 120. 6. phalæna bombycalis.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis bombycibus. *Antennæ* valde pectinatae nigrae. *Corpus* cinereum. *Alæ anticæ* cinereo-rufescentes, fasciæ obliqua pone medium albida. Costa albo punctata. *Posticæ* flavescens, macula magna apicis nigra.

Crassalis. P. ( l'épaisse ) alis anticis fuscescentibus apice cinereis, punctis ocellaribus nigris.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc. Major. Alæ anticæ* fuscæ, margine  
 tenuiore albo maculato. Margo posticus  
 imprimis interne cinerascens, punctis  
 aliquot obsoletis ocellaribus fuscis.  
*Posticæ* fuscæ.

Sophialis. P. ( du thalitron des boutiques ) alis  
 glabris fusco cinereoque variegatis, pos-  
 ticus cinereis margine postico fuscis.

*Hab. in Austriæ sisymbrio sophia. D.*  
*Schieffermyller.*

*Desc. Media. Alæ anticæ* fusco cinereoque  
 variegatæ; *posticæ* cinereæ, margine  
 postico fusco & in hoc margine puncta  
 aliquot alba.

Variegalis. P. ( la variée ) alis glabris fusco cinereo-  
 que variis, fascia postica fusca distincta.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Alæ anticæ* cinereo fuscoque  
 variegatæ indistincte. Apice fascia dis-  
 tincta fusca. *Posticæ* griseæ. Subtus  
*anticæ* fuscæ; *posticæ* albidæ.

Sericealis. P. ( la foyeuse ) alis glabris flavis,  
 macula media fusca.

*Wien. Verz. 122. 18. phalæna sericealis.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magnitudo & statura fere P. for-*  
*ficalis. Alæ anticæ* ochraceæ, macula  
 magna media fusca & in hac puncta  
 duo parva atra. Margo posticus albo  
 punctatus. *Posticæ* pallidæ.

Trinalis. P. ( la trinaire ) alis glabris flavis,  
 maculis tribus disci margineque postico  
 fuscis.

*Wien. Verz. 317. 47. phalæna trinalis.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* flavæ, margine postico fusco. In medio disci maculæ tres fusæ 2, 1, posteriori majori tranverso. *Posticæ* pallidiores, margine fusco.

Alpinalis. P. ( l' alpine ) alis anticis obscure cinereis, macula media alba.

*Wien. Verz.* 123. 24. phalæna alpinalis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo præcedentium. *Alæ anticæ* cinereæ, macula media nivea. *Posticæ* fuscescentes, macula majori nivea. Subtus *anticæ* fusæ, macula media alba; *posticæ* niveæ, margine postico fusco.

Punctalis P. ( la ponctuée ) alis cinerascens, puncto medio niveo strigisque postica fusca.

*Wien. Verz.* 123. 25. phalæna punctalis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedente duplo fere minor. *Alæ anticæ* cinerascens, obscuræ, puncto parvo medio albo & pone hoc striga undata obscurior. *Posticæ*, uti omnes subtus, cinereæ.

Nitidalis. P. ( la brillante ) alis fuscis, strigibus duabus flavescens.

*Wien. Verz.* 129. 36. phalæna nitidalis.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. Corpus fuscum. *Alæ anticæ* fusæ, nitidulæ, strigibus duabus flavescens, quæ ad marginem exteriorem crassiores. Costa inter strigas purpurascens flavo punctatas. *Posticæ* fusæ, strigibus duabus pallidis. Subtus fusæ, anticis macula marginali flava, posticis striga incurva pallida.

Ramalis. P. ( la dentelée ) palpis subrecurvatis ,  
 alis olivaceis , fascia postica dentata  
 pallida.

Wien. Verz. 120. 14. phalæna dentalis.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Alæ anticæ olivacæ , in  
 medio fascia obliqua ad marginem  
 exteriorem repanda dentes numerosos ,  
 acutos emittens , pallida. Margo pos-  
 ticus fusco striatus. Posticæ pallidæ ,  
 margine parum flavescens. Subtus  
 anticæ fuscæ ; posticæ pallidæ.

Ænealis. P. ( la bronzée ) alis fuscis nitidulis im-  
 maculatis , capite ferrugineo.

Wien. Verz. 123. 26. phalæna ænealis.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Media inter congeneres. Corpus  
 fuscum , capite ferrugineo. Alæ anticæ  
 fuscæ , cupro nitidulæ , immaculatæ ;  
 posticæ fuscæ.

Palealis. P. ( la verdâtre ) alis anticis virescentibus  
 immaculatis.

Wien. Verz. 123. 27. phalæna palealis.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Præcedentibus major. Alæ anticæ  
 virides , immaculatæ ; posticæ exalbidæ.

Ochrealis. P. ( l'ochracée ) alis flavescens imma-  
 culatis.

Wien. Verz. 123. 28. phalæna ochrealis.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Minor præcedente. Alæ anticæ  
 ochraceæ ; posticæ fuscæ , immaculatæ.

Elatalis. P. ( l'élargie ) alis anticis albis , costa  
 interrupta submarginali fasciaque fuscis.

Wien. Verz. 121. 9. phalæna elatalis.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller

*Desc.* Media. *Corpus* album. *Alæ anticae* albæ, costa usque ad medium fusca, in medio alba punctis duobus fuscis, apice fusca. Versus marginem posticum fascia lata fusca. Margo ipse nigro punctatus. *Posticæ* fuscæ, costa pallida apice fusco punctata; *posticæ* albidæ, lunula media strigataque postica fuscis.

Pudoralis. P. ( la vierge ) alis anticis albis, vitta rosea.

*Wien. Verz.* 124. 40. phalæna pudoralis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva at distincta. *Alæ anticae* albæ, vitta rosea quæ tamen basin haud attingit. *Posticæ* obscure cinereæ.

Flavalis. P. ( la jaunâtre ) alis anticis sulphureis, strigis duabus maculaque media veniformis fuscis.

*Wien. Verz.* 121. 7. phalæna flavalis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Caput & thorax* flava. *Abdomen* cinereum. *Alæ anticae* sulphuræ, striga antica obsoleta, flexuosa, fusca. In medio macula veniformis & pone hanc striga altera. *Posticæ* pallidiores, striga unica fusca. Subtus omnes cinereo fuscoque variæ.

Polygonalis. P. ( la liférée ) alis anticis cinereis, margine postico inaurato.

*Wien. Verz.* 121. 8. phalæna polygonalis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ* cinereæ, costa anticarum usque ad medium obscuriore. Margo posticus fusco-aureus. *Posticæ* apice tantum inauratæ.

Politalis. P. ( l'unie ) alis fuscis, fascia media maculaque marginali flavis.



*Wien. Verz.* 121. 4. phalæna politalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. *Alæ anticæ* basi fuscæ,  
 litura parva flava, in medio fascia lata  
 flava & in hac annuli duo connati  
 fusci. Apice fuscæ, macula una alte-  
 rave flava.

Curtalis. P. ( la courte ) alis flavo-cinerascentibus,  
 striga postica ferruginea.

*Wien. Verz.* 120. 8. phalæna curtalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. *Corpus* cinereum. *Alæ omnes*  
 flavo cineræ, striga fere obsoleta, fer-  
 ruginea versus marginem posticum.

Cespitalis. P. ( des buissons ) alis anticis obscuris  
 variegatis, posticis nigris, strigis dua-  
 bus flavis.

*Wien. Verz.* 223. 32. phalæna cespitalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Magnitudo P. *purpuralis*. *Alæ an-  
 ticæ* colore variant.

Porphyrals. P. ( la marbrée ) alis fuscescentibus,  
 macula costali fulva, posticis atris,  
 striga albida.

*Wien. Verz.* 317. 50. phalæna porphyralis.  
*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura & summa affinitas P. *pur-  
 puralis*. *Alæ anticæ* basi obscure fuscæ,  
 maculis duabus indistinctis obscuriori-  
 bus, apice obscure purpurascens.  
 Macula magna costalis fulva colores  
 hos distinguit. *Posticæ* atræ, striga alba.  
*Subtus* basi albidæ, striga nigra, apice  
 fuscæ, strigis albidis.

Punicalis. P. ( la rouge ) alis purpureis, lineola  
 baseos punctisque duobus mediis flavis.

*Wien. Verz.* 317. 49. phalæna punicalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *P. purpuralis*. *Alæ antica* obscure purpureæ, lineola basæos & in medio punctis duobus flavis.

4-Punctalis. *P.* ( la quadripunctuée ) alis fuscis, anticis maculis duabus fulvis.

*Wien. Verz.* 124. 42. phalæna 4-punctalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura *P. purpuralis*. *Alæ omnes* fuscæ. Maculæ duæ fere oppositæ fulvæ in alis anticis ; *postica* immaculatæ.

Pollinalis. *P.* ( la poudrée ) alis pulverulentis atris, lineola basæos punctisque duobus albis.

*Wien. Verz.* 124. 44. phalæna pollinalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *P. atrali*, at *alæ* magis pulverulentæ, maculæ magis approximatae & lineola basæos distincta. *Thorax* niger, immaculatus.

Alpestralis. *P.* ( le petit deuil ) alis nigro-cærulefcentique variis, posticis nigris.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Abdomen atrum, cingulis albis. *Alæ antica* nigro-cærulefcentibus variegatæ. *Postica* nigræ, margine tenuiore pallescente. *Subtus* basi cinereæ, apice fuscæ.

### *Tortrices.*

Vernana. *T.* ( la printanière ) alis rhombeis pallide virefcentibus, posticis albis, margine virefcente.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *T. viridana*; differt tamen corpore albo, alarum colore

teneriori , posticis albis , margine tantum virescente.

Vahliaua. T. ( la Valh ) alis rhombeis virescentibus , lineola alba , posticis atris , macula media margineque albis.

*Hab. in Holsatia.*

*Desc.* Statura fere bombycis. *Antennæ* crassæ , nigræ. *Corpus* nigrum. *Alæ anticæ* virescentes , lineola a basi ultra medium ducta alba. *Posticæ* atræ , margine antico & postico maculaque media albis. Subtus omnes atræ , margine , omni maculaque media albis.

Sponsana. T. ( l'épousée ) alis griseis , atomis rufescentibus.

*Wien. Verz.* 129. 1. phalæna sponsana.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ* griseæ , atomis plurimis vix conspicuis rufescentibus , quæ fere strigas obliquas formant.

Hermannia- T. ( l'Hermann ) alis ferrugineis fusco  
na. irroratis.

*Wien. Verz.* 315. 30. phalæna Hermanniana.

*Hab. in Austriæ rubo fruticoso. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Major P. *rosanæ*. *Alæ anticæ* ferrugineæ , atomis maculisque numerosis fuscis. *Posticæ* fusæ.

Inundana. T. ( l'agréable ) alis anticis griseo fuscoque undatis , puncto medio niveo.

*Wien. Verz.* 132. 6. phalæna inundana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Corpus* fuscum. *Alæ anticæ* fusco griseoque tenuissime variegatæ & in medio puncto niveo distincto. *Posticæ* fusæ.

Pasquagana. T. ( de l'aubépine-forbier ) alis ferrugineis immaculatis.

*Wien. Verz.* 318. 21. phalæna Pasquagana.

*Hab.* in cratægo terminali. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura magna T. *rosanæ*. Caput & thorax ferruginea. *Alæ anticæ* ferrugineæ, immaculatæ. *Posticæ* cinereæ.

Ceretana. T. ( de la cire ) alis albis, fasciis tribus fuscis, tertia abbreviata.

*Wien. Verz.* 129. 3. phalæna ceretana.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. Corpus fuscum. *Alæ anticæ* albæ, fascia baseos fusca, secunda in medio obliqua, tertia ad marginem crassiolem abbreviata. *Posticæ* obscuræ.

Pilleriana. T. ( la Piller ) alis anticis aureis, fasciis duabus obliquis fuscis.

*Wien. Verz.* 126. 2. phalæna Pilleriana.

*Hab.* in Stachys Germaniæ. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ anticæ* aureæ, fasciis duabus fuscis. *Posticæ* fuscæ.

*Variat* alis fere totis aureis absque fasciis.

*Piller*, Jesuita, olim professor Theresianus, nunc præpositus in Hungaria.

Costana. T. ( la marginale ) alis pallide testaceis, maculis duabus costalibus fuscis.

*Wien. Verz.* 127. 5. phalæna costana.

*Hab.* Hafniæ. *D. de Schæffstedt.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino T. *forsteranæ*, at *alæ* magis planæ. Caput & thorax pallide testacea immaculata. *Alæ anticæ* pallide testaceæ, margine exteriori maculis duabus costalibus punctoque indistinctis nigris.

*Lævigana*. T. ( du charme ) alis anticis fusco-testaceis , macula media ferruginea.

*Wien. Verz.* 129. 12. phalæna lævigana.

*Hab. in Austriæ Carpino. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ anticæ* obscure testaceæ , strigis vix conspicuis maculaque magna media ferrugineis. *Posticæ* fuscae , macula apicis ferruginea.

*Pflugiana*. T. ( la Pflug ) alis fuscis , arcu communi dorsali anguloque ani niveis.

*Hab. Hafniæ. Dr. Pflug.*

*Desc.* Statura & magnitudo T. *Udmaniana*. *Caput & thorax* fusca. *Alæ* fuscae , arcu magno interne crassiori , communi anguloque ani niveis. Postice ad marginem crassiore strigæ aliquot obliquæ abbreviatæ , fere obsoletæ , argentæ. *Posticæ* nigricantes. *Subtus* cinerea.

*Variegana*. T. ( la variée ) alis albis , macula communi dorsali margineque postico fuscis.

*Wien. Verz.* 130. 6. phalæna variegana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Caput & thorax* alba , abdomine flavescente. *Alæ anticæ* macula communi in medio dorsali fusca atomis nigris. Margo posticus fuscus , maculis obscurioribus.

*Trapezana*. T. ( la trapézoïde ) alis testaceis , macula communi dorsali cinerea , strigis testaceis.

*Hab. Hafniæ. Dr. Pflug.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Caput* cinerascens. *Thorax* testaceus. *Alæ* testaceæ fere unicolores , macula magna dorsali cinerea & in hac strigæ abbreviatæ testaceæ. *Subtus* cinerea.

Ocellana. T. ( l'oculée ) alis pallidis, fascia baseos maculaque communi dorsali lituraque apicis fuscis.

Wien. Verz. 330. 7.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Parva. Corpus fuscum. Alæ anticæ pallidæ cinereæ, fascia lata baseos, macula communi versus posteriora lituraque in medio marginis postici fuscis. Costa punctis fuscis. Alæ posticæ fuscæ.

Viburnana. T. ( de la viorne cotonneuse ) alis fusco-griseis nitidis immaculatis, posticis fuscis.

Wien. Verz. 128. 15. phalæna viburnana.

Hab. in viburno lantana. D. Schieffermyller.

Desc. Magna statura præcedentium. Caput & thorax fusca. Alæ fusco-griseæ, nitidulæ, immaculatæ; posticæ nigricantes, margine albicante.

Profundana. T. ( l'enfoncée ) alis cinereo fuscoque variegatis, macula communi dorsali alba.

Wien. Verz. 132. 1. phalæna profundana.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Affinis T. Brunichanæ, at alæ anticæ supra cinereo fuscoque variegatæ. Costa nigro punctata. Posticæ fuscæ.

Jaquiniana. T. ( la Jaquin ) alis anticis aureis, macula dorsali communi punctisque costalibus albis.

Wien. Verz. 132. 4. phalæna Jaquiniana.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Parva. Alæ anticæ aureæ, macula magna communi albida. Costa albo punctata.



**Trauniana. T.** ( la Traune ) alis anticis nigricantibus ,  
macula communi dorsali flava.

*Wien. Verz.* 132. 3 phalæna Trauniana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ anticæ* nigricantes, in  
medio macula magna communi flava,  
postice striga fere obsoleta aurea & in  
hac puncta quatuor costalia flava.

**Woeberana. T.** ( la Woeber ) alis fusco aureoque  
variis, costa strigis argenteis nume-  
rosis.

*Wien. Verz.* 126. 9. phalæna Woeberana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino *T. arcuana*. *Alæ*  
*anticæ* strigis fuscis aureisque indis-  
tinctis contortuplicatis, apice macula  
obsoleta fusca, lineolis aureis. Costa  
strigis numerosis argenteis, nitidis.  
*Posticæ* fuscae, margine interiori baseos  
albido.

Baro de *Woeber*, Jesuita, olim professor  
Theresianus, nunc pastor Viennensis.

**Buoliana. T.** ( la Buol ) alis anticis fulvis, strigis  
albis subreticulatis.

*Wien. Verz.* 128. 16. phalæna Buoliana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ anticæ* fulvæ, strigis plurimis  
albidis, basi imprimis fere reticulatis,  
ultima distincta. *Posticæ* fuscae.

Baro *Buol* Viennensis.

**Decimana. T.** ( la décimale ) alis anticis fulvis ar-  
genteo strigosis, fascia punctisque  
tribus flavis.

*Wien. Verz. app.* 300. phalæna deci-  
mana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Major. Caput & thorax fulva, *Alæ*

*antica* fulvæ, strigis quinque argenteis; secunda interrupta. Fascia lata flava ad basin. Maculæ duæ oppositæ flavæ in medio & quarta magna transversa ante apicem. *Postica* nigræ.

Beumannia- T. ( la Beaumann. ) alis anticis flavis, fasciis duabus ferrugineis argento marginatis subanastomosantibus, posteriore interrupta.

Wien. Verz. 126. 6.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Statura præcedentium. Caput & thorax ferruginea. Alæ anticae flavæ, fasciis duabus in medio fere anastomosantibus ferrugineis argento utrinque marginatis. *Postica* fuscæ.

Beumann, senator Lipsiensis.

Variana. T. ( la mélangée ) alis anticis ferrugineo fuscoque variis, posticis fuscis apice fulvis.

Hab. Kilix. D. Daldorf.

Desc. Media. Alæ anticae fusco ferrugineoque variæ; *postica* fuscæ apice fulvæ. Subtus omnes fuscæ apice fulvæ.

Rufana. T. ( la rousse ) alis griseo-rufescentibus, macula marginali fusca punctoque medio albo.

Wien. Verz. 129. 8. phalæna rufana.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Magna in hoc genere. Caput & thorax fusca. Alæ anticae griseo-rufescentes, macula magna oblonga marginali fusca. In medio alæ punctum album, quod maculam fuscam attingit. *Postica* cinereæ.

Roborana. T. ( du roure ) alis cinereis, maculis

duabus marginalibus testaceis , baseos minore.

*Hab. in Hafniæ quercu. D. de Sehestedt.*

*Desc.* Majuscula. *Caput* cinerem , antennis nigricantibus. *Thorax* cinereus , maculis tribus magnis ferrugineo-testaceis. *Alæ anticæ* obscure cinereæ , maculis duabus , altera baseos minore , altera media , triangulari testaceis. *Alæ* subtus dilutiores.

Saldonana. T. ( la Saldoner ) alis anticis virescentibus , vitta abbreviata flava , posticis atris , macula baseos albida.

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc.* Media. *Corpus* fuscum , abdomine apice cinereo. *Alæ anticæ* virescentes , vitta a basi ultra medium flavescente. *Posticæ* atræ , macula magna margineque albis. Subtus omnes atræ , macula margineque omni albis.

Gerningana. T. ( la Guerning ) alis rufescentibus ; fasciis duabus obliquis fuscis , posteriore terminali.

*Wien. Verz. 318. 23. phalæna Gerningana.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis T. *oporana*. *Antennæ* pectinatae. *Alæ anticæ* rufescentes , fasciis duabus latis fuscis , anteriore in medio , posteriore marginali.

Rivagana. T. ( la barrée ) alis anticis griseis , strigis duabus mediis cinereis punctoque fulvo.

*Wien. Verz. 130. 17. phalæna rivagana.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ* griseæ , mox obscuriores , mox punctis aliquot fuscis adspersæ ; in medio strigæ duæ undatæ

cinereæ & inter has punctum parvum  
fulvum. *Posticæ* fuscæ.

Conspersana. T. ( la criblée ) alis anticis niveis ,  
maculis atomisque nigris sparsis.

*Wien. Verz.* 130. 14.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ anticæ* nivæ , ma-  
culis parvis atomisque innumeris ni-  
gris. *Posticæ* cinereæ. *Corpus* niveum.

Strigulana. T. ( la régulière ) alis anticis cinereis ,  
atomis numerosissimis fuscis.

*Wien. Verz.* 130. 15.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino præ-  
cedentis , at *corpus* fuscum & *alæ*  
cinereæ , atomis fuscis.

Steinkelne- T. ( la Steinkelner ) alis anticis cinereis ,  
rana. linea flexuosa atra disci.

*Wien. Verz.* 130. 16.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ anticæ* cinereæ , in  
medio disci linea magna flexuosa  
atra.

*Steinkelner* , Jesuita , olim professor The-  
resianus.

Niveana. T. ( la neigeuse ) alis anticis argenteis ,  
strigis duabus obliquis elevatis , mar-  
gine postico nigro punctato.

*Hab. in Suecia. D. de Paykull.*

*Desc.* Magna. *Corpus* album. *Alæ anticæ*  
argenteæ , strigis duabus obliquis e  
squamis elevatis. Margo *alæ* posticus  
striga punctorum nigrorum. *Posticæ*  
supra fuscæ.

Cristana. T. ( la crête ) alis anticis fuscis , margine  
interiori

interiori albo punctoque medio fasciculato elevato.

*Wien. Verz.* 129. 10. phalæna cristana.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc. Magna. Alæ anticæ fuscæ, margine*  
*tenuiori late albo. In medio punctum*  
*album e fasciculo pilorum elevatorum*  
*fuscorum. Posticæ cinereæ. Caput &*  
*thorax albida.*

**Punctulana. T.** ( la ponctuée ) alis anticis scabris fuscis, vitta media interrupta obscure cinerea.

*Wien. Verz.* 130. 13. phalæna punctulana.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc. Magna. Caput & thorax fusca. Alæ*  
*anticæ, punctis numerosis elevatis,*  
*sparsis, nigris, fuscescentes, vitta lata*  
*obscure cinerea in medio interrupta.*  
*Posticæ obscuræ.*

**Elevana. T.** ( l'inégale ) alis anticis cinereis scabris, macula baseos fusca.

*Wien. Verz.* 130. 12. phalæna scabrana.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc. Magna. Caput & thorax cinerea.*  
*Alæ anticæ cinereæ, punctis elevatis*  
*sparsis, scabræ. Macula magna baseos*  
*fusca. Posticæ albidæ, immaculatæ.*

**Romanana. T.** ( la Romain ) alis virescentibus albo scabris, lunula media atra.

*Hab. in Germania Australiori. D. Romanus.*

*Desc. Affinis præcedenti. Alæ anticæ*  
*virescentes, punctis plurimis elevatis*  
*albis. In medio lunula magna atra.*  
*Alæ posticæ fusco-cinereæ. Abdomen*  
*cinereum, linea laterali fusca.*

Borana. T. ( la fasciculée ) alis cinereo fuscoque variis , punctis elevatis nigris sparsis.

*Hab. in Suecia. D. Paykull.*

*Desc. Magna. Caput cinereum. Thorax fuscus , lobo antico cinereo. Alæ anticæ basi cinereæ , striga e punctis fasciculatis elevatis nigris , apice fuscae , macula magna ad angulum ani liturisque costalibus cinereis. Puncta plurimæ parva sparsa elevata atra. Subtus albidæ.*

Paykulliana. T. ( la Paykull ) alis albidis , macula triangulari communi baseos atra.

*Hab. in Suecia. D. Paykull.*

*Desc. Media. Corpus album. Alæ anticæ albidæ , macula magna baseos triangulari communi atra. Margo posticus fuscescit.*

Daldorfiana. T. ( la Daldorf ) alis anticis fuscis , apice aureis.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc. Parva. Corpus fuscum , immaculatum. Alæ anticæ fuscae , apice fulvæ siye aureæ , nitidæ. Posticæ , uti omnes subtus , fuscae , immaculatæ.*

Schumacher- T. ( la Schumacherd ) alis anticis nigris , fascia media atomisque posticis albis.  
rana.

*Hab. in Hafniæ nemoribus. D. de Schestedt.*

*Desc. Statura omnino T. Fabriciana , at paullo major. Caput & thorax nigra. Alæ anticæ nigræ , fascia media parva sinuata atomisque plurimis posticis albis. Subtus fuscae , punctis quatuor costalibus albis.*

Penkleriana. T. ( la Penkler ) alis anticis cinereo



fuscoque reticulatis, macula apicis fusco - grisea, strigis duabus argenteis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus cinereum. Alæ anticæ fusco cinereoque subtilissime reticulatæ. In medio macula obscura annulis duobus fuscis. In apice macula magna grisea fusca, strigis duabus argenteis, quæ tamen marginem exteriorem variegatum haud attingunt.*

*Penkler, baro Viennensis, in Theresiano studia & Entomologiam colens.*

**Bierkandra- T.** ( la Bierkandr ) alis fusco aureoque variis, strigis cinereis basi argenteo lineatis apice punctatis.

*Thumb. inf. Suec. 24. tab.*

*Tinea. Bierkandrella* alis fuscis nigro undulatis, punctis sparsis argenteis.

*Hab. in inula falicina Sueciæ. D. Paykull.*

*Desc. Statura & summa affinitas T. conwaganæ. Antennæ albo nigroque annulatæ.*

*Thorax aureus, linea laterali argentea.*

*Alæ basi aureæ, lineolis duabus argenteis, tunc striga cinerea interne bifida,*

*denique fusco-cinereo fuscoque variæ*

*punctis argenteis numerosis. Caput &*

*pedes alba, punctis fusco-argenteis.*

*Abdomen fuscum.*

*Larva viridis, lateribus flavescens*

*rete fabricat & metamorphosin saliens*

*sub terra se condit.*

**Lipsiana. T.** ( la Lipsicoise ) alis griseo - fuscis, puncto medio albo, pupilla atra.

*Wien. Verz. 129. 9. phalæna Lipsiana.*

*Hab. Lipsiæ. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Alæ anticæ griseo-fuscæ, atomis paucis nigris. In medio alæ*

punctum orbiculatum album, pupilla  
atra. *Posticæ* cinereæ.

**Abietana.** T. ( du sapin ) alis fusco alboque variis,  
margine exteriori albo punctata.

*Hab. in Sueciæ abiete. D. Paykull.*

*Desc. Media. Caput & thorax fusca.*

*Alæ anticæ* fusco alboque variegatæ,  
costa sola punctis distinctis albis.

**Undana.** T. ( l'ondée ) alis fuscis, fasciis tribus  
cinereis, secunda extrorsum bifida.

*Wien. Verz. 131. 21. phalæna rivulata.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Affinis T. rivullana, at duplo minor  
& fascia secunda extrorsum bifida.*

**Scopoliana.** T. ( la Scopoli ) alis fuscis, arcubus  
duobus dorsalis albis.

*Wien. Verz. 129. 11. phalæna Scopoliana.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Caput & thorax fusca. Alæ  
anticæ ferrugineo-fuscæ. In medio arcus  
magnus dorsalis albus, & versus api-  
cem alius magis cinereus minusque  
arcuatus. Litræ aliquot parvæ albidæ  
ad costam.*

**Mygindana.** T. ( la Mygind ) alis anticis griseis,  
strigis posticis fulvis.

*Wien. Verz. 131. 28. phalæna Mygindana.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus cinereum. Alæ anticæ  
cinereæ, pone medium strigis aliquot  
distinctis fulvis. Posticæ obscure cinereæ.*

**Tripunctana.** T. ( la triponctué ) alis anticis fuscis  
apice albis, margine punctisque tribus  
distinctis fuscis.

*Wien. Verz. 131. 35. phalæna tripunctana.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura omnino *T. cynosbanæ*. *Alæ*  
*anticæ* basi fuscæ, apice albæ, mar-  
 gine tamen postico fusco. Ante mar-  
 ginem interne maculæ. duæ fuscæ &  
 inter has & marginem puncta tria  
 fusca.

Mitterba- T. ( la Mitterbach ) alis fusco rufo-  
 chiana. que variis, striga dorsali abbreviata  
 alba.

*Wien. Verz.* 129. 17. phalæna Mitterba-  
 chiana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. *Alæ anticæ* fusco-rufæ. In  
 medio striga communis dorsalis abbre-  
 viata alba. Margo exterior & posticus  
 albo liturati.

Mediana. T. ( la bimaculée ) alis fuscis, maculis  
 duabus flavis.

*Wien. Verz.* 128. 14.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. *Corpus* fuscum. *Alæ anticæ*  
 fuscæ, macula magna oblonga baseos  
 ad marginem interiorem & alia versus  
 apicem orbiculata flavis. *Posticæ* nigri-  
 cantes.

Achatana. T. ( l'agathe ) alis anticis fuscis apice  
 cinereis, maculis duabus ferrugineis.

*Wien. Verz.* 131. 27. phalæna achatana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Media. *Caput & thorax* fusca. *Alæ*  
*anticæ* basi fuscæ immaculatæ, apice  
 cinereæ, maculis duabus magnis fer-  
 rugineis, altera ad marginem tenuio-  
 rem ante apicem, altera in ipso apice  
 marginis crassioris. Costa albo punc-  
 tata, *Posticæ* cinereæ.

*Boeberana*. T. ( la Boéber ) cinerea , alis depresso , disco communi baseos atro.

*Linn. Syst. nat.* 2. 288. 374. in *Suec.* 1377. phalæna nifella alis superioribus cinereo nebulosis , macula communi ovata nigra.

*Hab.* in Daniæ quercu. *D. Lund.*

*Desc.* Statura & magnitudo T. *applanæ*. *Antennæ* albo nigroque annulatæ. *Caput* & *thorax* cinerea , immaculata. *Alæ anticæ* a basi ultra medium interne nigræ , margine exteriori cinereo , apice cinereæ margine obscuriore. *Corpus* cinereum , pedibus nigricantibus.

*Populana*. T. ( du peuplier ) alis anticis fuscis , apice auro argentoque strigosis , macula dorsali alba , puncto fusco.

*Hab.* in Sueciæ populo. *D. Paykull.*

*Desc.* Affinis T. *Jaquinianæ* videtur. *Corpus* fuscum. *Alæ anticæ* basi cinereo-fuscæ , immaculatæ ; in medio dorsi macula magna communis triangularis alba , puncto medio fusco ; apice auro argentoque strigosa , punctis costalibus albis.

### *Tinea.*

*Gigantella*. T. ( la teigne-géant ) alis anticis cinereo flavescens , posticis albis immaculatis.

*Wien. Verz.* 135. 27. *tinea gigantella.*

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna in hoc genere. *Palpi* porrecti. *Caput* & *thorax* flavescens. *Abdomen* cinereum. *Alæ anticæ* cinereo flavescens , immaculatæ. *Posticæ* albæ.

Centuriella. T. ( l'entourée ) alis oblongis cinereis  
fusco subfasciatis , macula flavescente.

*Wien. Verz.* 319. 63. tinea centuriella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffer-  
myller.*

*Desc.* Statura T. *sociellæ* , at paullo  
minor. *Alæ* cinereæ , litura marginali  
in medio fusca , postice fascia una  
alterave fusca & in hac macula magna  
flavescens. *Posticæ* cinereæ , margine  
fusco.

Plumbella. T. ( la plombée ) alis anticis plumbeis ,  
macula media punctis numerosis apice-  
que fuscis.

*Wien. Verz.* 139. 34. tinea plumbella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffer-  
myller.*

*Desc.* Nimis affinis T. *padellæ*. Differt  
tamen alis puncto medio majori dis-  
tincto & apice fuscis.

Nitidella. T. ( la brillante ) alis anticis argenteis ,  
lineola baseos arcuque communi dorsali  
fuscis.

*Wien. Verz.* 137. 58. tinea nitidella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva statura T. *cornellæ*. *Alæ*  
*antica* argenteæ nitidæ , lineola baseos  
lunulaque communi fuscis.

Roscida. T. ( la régulière ) alis luteis , anticis nigro  
punctatis , posticis maculatis , thorace  
atro.

*Wien. Verz.* 68. 7. noctua roscida.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis T. *irvorellæ* , at duplo minor.

*Corpus* totum atrum , ano solo fulvo.

*Alæ antica* trifariam nigro punctatæ ,  
maculis marginalibus fuscis.

**Pastulella. T.** ( la pointillée ) alis anticis atris , punctis ferrugineis flavisque numerosis.

*Cram. inf.* 31. *tab.* 372. *fig.* L. phalæna punctella.

*Hab.*

*Desc.* *Alæ posticæ* pallescentes , limbo nigro.

**Perlella. T.** ( la perlée ) alis cinereis , puncto medio strigisque punctorum abbreviata nigris.

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo *T. lutarellæ*.

*Alæ omnes* supra pallide cinereæ , puncto nigro in medio versus marginem interiorem , & pone hoc striga obliqua e punctis quatuor nigris , quæ tamen marginem tenuiorem haud attingit.

**Guttella. T.** ( l'étoilée ) alis atris , anticis punctis albis numerosis.

*Sp. inf. app.* 509.

*Wien. Verz.* 319. 60. tinea antracinella.

*Hab.* in Europæ cedo acri.

*Desc.* *Antennæ* pectinatae.

**Vinetella. T.** ( des vignobles ) alis anticis fuscis , lineolis tribus argenteis , intermedia longiori interrupta.

*Hab.* Dresdæ. *Mus. D. Romani.*

*Desc.* Statura omnino *T. pinetellæ*. *Palpi* valde porrecti , longitudine thoracis.

*Alæ* fuscae , lineis tribus aut quatuor argenteis. *Posticæ* tenuissimæ , nigrae , valde fimbriatæ.

**Argyrella. T.** ( la riche ) alis striatis argenteis fuscae nitidulis.

*Wien. Verz.* 135. 28. tinea argyrella.

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*



*Desc.* Magna. *Caput & thorax* argenteo nitida. *Abdomen* cinereum. *Alæ* argenteæ fusco-nitidæ. *Posticæ* cinereæ.

Margaritella. T. ( la tranchée ) alis fuscis , linea unica albissima.

*Wien. Verz.* 134. 5.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino T. *culmellæ* ; differt tamen alis anticis linea unica , sive vitta læte alba postice latiore. *Posticæ* cinereæ.

Conchella. T. ( l'interrompue ) alis anticis fuscis , linea unica interrupta albissima.

*Wien. Verz.* 134. 6. tinea conchella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis omnino præcedenti , at linea albissima in medio interrupta maculas duas format fere uti in T. *pinetella*. *Alæ posticæ* cinereæ.

Falsella. T. ( la confuse ) alis anticis fusco albo-que variegatis , posticis cinereis.

*Wien. Verz.* 134. 16.

*Hab. in Saxonia. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Caput & thorax* cinerea. *Abdomen* fuscum , nitidulum. *Alæ anticæ* , striis fuscis albisque indistinctis , abbreviatis. *Posticæ* cinereæ , immaculatæ.

Tristella. T. ( la triste ) alis anticis griseo-fuscis , immaculatis.

*Wien. Verz.* 134. 17. tinea tristella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* , uti *alæ anticæ* , griseo-fuscæ , immaculatæ. *Posticæ* cinereæ.

Daphnella. T. ( du garou ) alis anticis cinereis ,

costa inæqualiter purpurascente punctisque mediis atris.

*Wien. Verz.* 136. 37 tinea daphnella.

*Hab. in Austria daphne. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Caput & thorax albida. Alæ anticæ cinereæ, costa inæqualiter purpurascente. In medio litura fusca punctis duobus suboccellaribus atris, exteriori minuto. Margo posticus atro punctatus. Posticæ cinereæ.*

**Mucronella.** T. ( la pointue ) alis lanceolatis cinereis, vitta fusca.

*Wien. Verz.* 136. 45. tinea mucronella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Palpi porrecti. Corpus cinereum. Alæ anticæ lanceolatæ, acuminatæ, cinereæ, vitta lata fusca ante marginem exteriorem. Posticæ exalbidæ.*

**Maurella.** T. ( la More ) nigra, alis anticis atris nitidulis.

*Wien. Verz.* 142. 11. tinea maurella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Corpus nigrum. Alæ anticæ atræ, nitidulæ, immaculatæ.*

**Anella.** T. ( l'annulaire ) alis anticis griseis, vitta obsoleta ferruginea punctisque duobus centralibus suboccellatis.

*Wien. Verz.* 135. 30. tinea anella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Caput & thorax cinerea, immaculata. Abdomen ferrugineum. Alæ anticæ griseæ, costa obscuriore. Vitta obsoleta ferruginea ante costam & in medio puncta duo albida annulo fusco cincta. Posticæ cinereæ.*

Fagella. T. ( du hêtre ) alis anticis griseis , strigis atomisque fuscis.

*Wien. Verz.* 134. 34. tineæ fagella.

*Hab. in Austria fago sylvatica. D. Schieffermyller.*

*Desc. Major. Mas* alis griseis, striga antica posticaque punctisque mediis fuscis.

*Fœmina* alis anticis lanceolatis obscurioribus fusco irroratis.

Palumbella. T. ( la cendrée ) alis anticis cinereis , fasciis duabus ferrugineis nigro marginatis.

*Wien. Verz.* 138. 15. tineæ palumbella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Corpus* griseum. *Alæ anticæ* cineræ , fasciis duabus cinereis , quarum anterior punctis duobus in medio strigique postica notata , posterior antice striga undata marginata. *Posticæ* cineræ.

Abietella. T. ( du sapin ) alis anticis fuscescentibus ; strigis duabus lunulaque media pallida.

*Wien. Verz.* 138. 16. tineæ abietella.

*Hab. in Austria abiete. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura magna præcedentis. Corpus* griseum. *Alæ anticæ* fuscescentes , strigis duabus undatis pallidis , quarum posterior antice nigro marginata. In medio lunula pallida. Margo posticus nigro punctatus. *Posticæ* cineræ.

Tetricella. T. ( la sombre ) alis griseo-fuscis nitidulis immaculatis.

*Wien. Verz.* 138. 22. tineæ tetricella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Alæ omnes* fusco nitidulæ immaculatæ.

Flavifrontel- T. ( le front-jaune ) alis anticis fusco-  
la. cinereis immaculatis , capite flavo.

*Wien. Verz.* 143 22. tinea flavifrontella.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Magna. Caput flavum. Thorax &  
alæ anticæ cinereæ , immaculatæ. Pos-  
ticæ albidæ.

Hemedactyl- T. ( la demi-dactyle ) alis linearibus pal-  
lella. lide testaceis , rufo irroratis.

*Wien. Verz.* 124. 41. tinea hemedactyl-  
lella.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. Statura præcedentium. Alæ  
lineares ; anticæ testaceæ apice rufes-  
centes ; posticæ fuscæ.

Funerella. T. ( la coquette ) alis nigris , margine  
tenuiori basi albis , punctis duobus  
nigris.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Media. Alæ anticæ nigræ , mar-  
gine interiori ultra medium albo ,  
punctis duobus nigris distinctis. Macula  
alba in medio marginis exterioris. Pos-  
ticæ nigræ basi albæ. Caput album ,  
puncto verticis nigro. Thorax albus ,  
punctis tribus anticis nigris.

Striatella. T. ( la striée ) alis griseo-fuscis , anticis  
albo lineatis , posticis ciliatis imma-  
culatis.

*Wien. Verz.* 135. 26. tinea striatella.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. Caput & thorax nivea. Alæ  
obscuræ griseæ , linea longitudinali alba  
a basi fere ad apicem ducta ; alia  
obliqua brevis ad basin aliaque ad  
apicem. Posticæ pilis longioribus ciliatæ ,  
fuscæ , immaculatæ.

**Pectinella. T.** ( la pectinée ) alis cinerascensibus ,  
 arcu punctoque dorsalibus albidioribus.

*Hab. in Suecia. D. Paykull.*

*Desc. Alæ cinerascens, nitidulæ, lunula media punctoque postico communibus albidis.*

*Fæmina magis obscura.*

**Tripunctella. T.** ( la triponctuéée ) alis cinereis , punctis  
 disci tribus fuscis.

*Wien. Verz. app. tinea tripunctella.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media Alæ anticæ cineræ, nitidulæ, punctis disci tribus fuscis 2, 1. Margo posticus nigro punctatus. Posticæ pallidiores. Caput, thorax anusque ferruginea.*

**Cuspidella. T.** ( les croissants ) alis anticis atris , lunulis  
 duabus punctoque flavescensibus.

*Wien. Verz. 140. 53. tinea cuspidella.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus atrum, thoracis margine antico flavescens. Alæ anticæ atræ, lunula basæ & apicis flavis & in posteriori hac punctum flavum. Posticæ valde ciliatæ nigræ.*

**Dimidiella. T.** ( la partagée ) alis anticis fuscis , disco  
 flavo , puncto subocellari atro.

*Wien. Verz. 141. 73.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Caput & thorax flava. Abdomen fuscum. Alæ anticæ fuscæ, disco flexuoso flavo postice marginem anteriorem attingente. Punctum parvum subocellatum atrum in medio alæ.*

**Muscalella. T.** ( la fulvicéphale ) alis fuscis , maculis

duabus dorsalibus albis , capite fulvo ;  
antennis pectinatis.

*Wien. Verz.* 143 28. tinea muscalella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Caput* fulvum, antennis pectinatis fuscis. *Alæ* fuscae, maculis duabus communibus albis, anteriore majore. Punctum parvum ad marginem exteriorem.

**Bifasciella. T.** ( la bifasciée ) alis fusco nitidulis , fasciis duabus albis , posteriore interrupta , capite rufo.

*Hab. in Dania. D. de Schestedt.*

*Desc. Media. Caput* rufum. *Alæ anticae* fuscae, nitidae, fasciis duabus albis, anteriore ad marginem crassiorē dilatata, posteriore & maculis duabus oppositis composita. *Posticae* cineræ, immaculatæ.

**Rupella. T.** ( la ruficéphale ) alis fusco-aureis , maculis quatuor marginalibus albis , capite rufo.

*Wien. Verz.* 320. 45. tinea rupella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Caput* rufum. *Alæ* fusco-aureæ, maculis quatuor magnis albis, duabus ad marginem exteriorem, duabus ad interiorem.

**Prælatella. T.** ( la violette ) alis violaceis , striga punctisque duobus oppositis albis.

*Wien. Verz.* 320. 46. tinea prælatella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura* præcedentis. *Alæ* violaceæ nitidulae, striga media maculæque duabus versus apicem oppositis albis. *Caput* ferrugineum.



**Denifella. T.** ( la bariolée ) alis fuscescentibus, lineolis fasciaque albis.

*Wien. Verz.* 138. 23. tinea denifella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino T. *Geoffroyella*.

*Palpi* magni recurvi, albi, margine fusco. *Alæ anticae* pallide fuscae, lineolis duabus baseos, in medio fascia lata ad marginem crassiores late bifida & versus apicem striga obliqua abbreviata albis. *Posticae* nigrigantes, immaculatæ.

**Tunbergella. T.** ( la Tunberg ) alis auratis, maculis fasciaque media purpureis.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc.* Parva. *Corpus* nigrum. *Antennæ* breves, nigræ. *Alæ anticae* aureæ, nitidæ. *Maculæ* duæ purpureæ ante medium ad marginem crassiores. In medio fascia lata purpurea ad marginem crassiores bifida, versus apicem denique adhuc macula purpurea. *Alæ posticae* auratæ, immaculatæ.

**Fibulella. T.** ( l'éclatante ) alis rubro-aureis, macula communi flava.

*Wien. Verz.* 143. 33. tinea fibulella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minuta. *Caput*, cum antennis brevibus, nigrum. *Alæ anticae* rubro-aureæ, nitidæ, macula magna communi flava.

**Exiguella. T.** ( la petite ) alis anticis fusco cinereoque griseis, striga alba.

*Wien. Verz.* 141. 21. tinea exiguella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minuta.

Alpella. T. ( la montagnarde ) alis flavis , maculis olivaceis.

Wien. Verz. 135. 21. tineæ alpella.

Hab. in Austriæ montolis. D. Schieffermyller.

Desc. Statura omnino T. lucellæ. Caput & thorax flava immaculata. Alæ anticæ flavæ , maculis aliquot olivaceis. Costa punctata. Posticæ cinereæ.

Nyctimerella. T. ( la découpée ) alis anticis niveis ;  
la. vitta communi dorsali dentata macu-

lisque costalibus atris. Aluc. 9.

Wien. Verz. 130. 38. tineæ nyctimerella.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Caput & thorax alba. Alæ anticæ niveæ , vitta dorsali dentata atra costaque atro maculata , ad basin litura , in medio macula magna puncto albo , tunc macula transversa fere geminata & tandem lineola apicis. Posticæ fuscæ.

Betulinella. T. ( de l'agaric du bouleau ) alis albidis  
apice fusco variis.

Hab. in bolito betulino Sueciæ. D. Paykull.

Desc. Statura omnino T. granelle , at duplo major. Caput & thorax albida. Alæ postice adscendentes basi albidæ , apice variegatæ. Aluc. 13.

Perficella. T. ( du pêcher ) alis anticis emarginatis  
sulphureis , strigis abbreviatis obscurioribus.

Wien. Verz. 319. 67. tineæ perficella.

Hab. in Austriæ persica. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Statura & magnitudo T. asperellæ. Caput & thorax flava Abdomen cinereum. Alæ anticæ apice emarginatæ sulphureæ ,

fulphureæ, strigis duabus abbreviatis marginis tenuioris obscurioribus. *Postica* cineræ; ciliis albis. *Aluc.* 16.

Enzenberg. T. ( l'Enzenberg ) alis emarginatis fuscis; gella. vitta media argentea.

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc.* Mediâ. Palpi porrecti. *Alæ* angustæ, fuscæ, vitta media argentea, quæ tamen marginem posticum haud attingit. In vitta hac lineolæ aliquot fuscæ. Margo posticus alæ emarginatus. *Postica* cineræ, immaculatæ. *Aluc.* 22.

Pilella. T. ( la brune ) alis fuscescentibus immaculatis, antennis longissimis.

*Wien. Verz.* 142. . tinea pilella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo T. *Swammerdamellæ*. *Antennæ* albidæ, basi flavescentes. *Aluc.* 24.

Erxlebellia. T. ( l'Erxlebell ) antennis mediocribus unicoloribus, alis anticis fusco-aureis, posticis nigris, capite fulvo.

*Hab. Goettingæ. Dr. Schulz.*

*Desc.* Nimis affinis videtur T. *calthellæ*. *Antennæ* mediocres, pallescentes. *Caput* fulvum. *Thorax* & *alæ antica* fusco-aureæ, margine postico obscuriore. *Pedes postici* longiores, fulvi. *Aluc.* 27.

Promulella. T. ( la bordée ) antennis mediocribus, alis anticis fusco-aureis, posticis flavis, margine nigro.

*Wien. Verz.* 142. 17. tinea promulella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo T. *calthellæ*, distincta alis posticis flavis margine nigro. *Aluc.* 29.

Vindella. T. ( l'albicorne ) alis viridi-aureis , corpore atro , antennis longis albis.

*Wien. Verz.* 142. 4. tinea vindella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Vix satis a T. *Reaumurella* distincta. *Aluc.* 33.

Cuprella. T. ( la cuivreuse ) alis cupro-aureis nitidis , antennis longissimis.

*Wien. Verz.* 320. 44. tinea cuprella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Vix satis distincta a T. *Reaumurella*. Differt tantum alarum colore rubro cupreo. *Aluc.* 35.

Formosella. T. ( la jolie ) alis anticis ferrugineo-flavis , strigis duabus abbreviatis obliquis albis , posteriore majore.

*Wien. Verz.* 140. 47. tinea formosella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ anticæ* flavo ferrugineoque variæ. Strigæ duæ ad marginem crassiore abbreviatæ , obliquæ posteriore majore. *Posticæ* fuscæ. *Antennæ* albo annulatæ. *Aluc.* 39.

Festiculla. T. ( la leucocéphale ) alis anticis albis , maculis duabus fuscis apice flavis.

*Wien. Verz.* 319. 80. tinea festiculla.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Palpi* albi basi fusci. *Caput* niveum. *Alæ anticæ* fere lineares basi albæ , apice flavæ ; in medio maculæ duæ fuscæ annulo albo cinctæ , una pone alteram. *Posticæ* fuscæ.

#### *Alucita.*

Calodactyla. A. ( la calodactyle ) alis fissis fuscis , anticis subfalcatis fissis fulvo maculatis , posticis tripartitis.

*Wien. Verz.* 146. 4. alucita calodactyla.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticae*  
 cinereo - fuscae, apice obscuriores,  
 macula magna fulva. Margo interior  
 dentatus, posticus fissus. *Posticae* tripar-  
 titæ nigræ. *Pedes* albo annulati.

Rhododac- A. ( la rhododactyle ) alis fissis flaves-  
 centibus, strigis albis, anticis bifidis,  
 tyla. posticis tripartitis.

*Wien. Verz.* 146. 5. alucita rhododactyla.  
*Hab. in Saxoniae ross. D. Zschuck.*  
*Desc.* *Alæ anticae* flavæ basi obscuriores,  
 strigis duabus albis, anteriore obliqua,  
 usque ad strigam posteriorem fissæ.  
*Posticae* tripartitæ, lobis duobus ante-  
 rioribus flavescentibus, tertio albo  
 macula magna ante apicem ferruginea.  
*Corpus* ferrugineum, *thoracis* lateribus  
 flavescentibus.

Migadactyla. A. ( la migadactyle ) alis fissis albidis  
 fusco maculatis, anticis fissis, posticis  
 tripartitis.

*Wien. Verz.* 146. 8. alucita migadactyla.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* al-  
 bum. *Alæ anticae* albidæ fusco macu-  
 latæ; *posticae* fuscæ. *Pedes* albi, fusco  
 maculati.

Ochrodactyla. A. ( l'ochrodactyle ) alis patentibus li-  
 nearibus indivisis, anticis griseis,  
 posticis nigris.

*Wien. Verz.* 145. 1. Alucita ochrodactyla.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva *Abdomen* basi rufescens. *Alæ*  
 immaculatæ.

## NEUROPTERA.

*Libellula.*

Depressa. 5. L. *Obs.* Larva in humo spongiosa impalpabili lutosa degens tardigrada, ore bivalvi, valvis virescentibus, rostro inflexo maxilloso, abdomine trigono, *subtus* fulvescente, *pedibus* ciliatis. *Scop.*

Grandis. 9. L. *Obs.* Quisquis sua specimina aliter describit & qualibet icone singulare quid, nec cæteris proprium observatur. Interdum *larva* eadem, nascendi tempus idem unaque semper & eadem proportio partium. Specimen nostrum exacte denuncians descriptio nulla hucusque data, cum tamen *abdomen* gerat attenuatum ex lato principio ut L. *quadrifasciata*, thoracem abdomini concolorem hirsutumque, ut L. *grandis*, maculasque flavas abdominales, ut L. *forcipata*; unde ego sane judico species spurias in hoc genere vel admissas fuisse, vel earum historiam de novo inchoandam, cum differentiæ a coloribus petiti non sufficiant. *Scop.*

*Myrmeleon.*

Libelluloides. i. M. *Obs.* Nostra specimina Brutia ad figuram D. de Geer. & magnitudinem figuræ D. Sulzers æquant, colore autem diversa sunt; nam *alæ* hyalinæ nigropunctatæ & maculatæ sunt. *Corpus* nigrum, hirsutum totum, cauda forcipata, unde nisi novam constituent speciem, pro insigni saltem varietate habenda. D. Vincent Petagn. speciem insect. Ulter. Calabr. n. 149.



Barbarum. 5. M. *Obs.* 1°. Variat 1°. maculis flavis;  
2°. maculis cæruleis loco flavarum;  
3°. maculis albis.

*Obs.* 2°. In omnibus corpus totum nigrum  
hirsutum, cauda forcipata. *Antennæ*  
nodosæ, porrectæ, longæ, clavatæ,  
clava suborbiculata truncata, cyathii-  
formi. *D. Vincent. Petagn. p. 30.*

Italicum. 6. M. Delendum. In nova enim *Mantiff.*  
*Ascalaphus italicus myrmeleon longi-*  
*corn. fynon.*

### *Raphidia.*

Mantispa. 2. M. *Obs.* Ex hoc genere raphidiam  
mantispam rejecit *D. Fab. & ad mantis*  
genus transtulit.

## H Y M E N O P T E R A.

### *Tenthredo.*

Punctata. 93. T. *Desc. Corpus* cæruleo - nigrum. *An-*  
*tennæ* nigræ. *Abdomen* nigrum, primo  
& ultimo segmento flavo in medio  
maculatis. *Mas.*

Bifasciata. 94. T. *Desc. Caput labiumque* superius nigra.  
*Antennæ* basi flavæ. *Thorax* lineolis  
duabus luteis. *Abdomen* nigrum, fasciis  
duabus luteis; *subtus* flavum. *Pedes*  
flavi, genubus nigris. *Postici* nigri.

Trifasciata. 95. T. *Desc. Præcedenti* affinis. Nigra.  
*Thorax* lineis duabus flavis ante alarum  
ortum. *Abdomen* nigrum, primi,  
quinti, sexti, ultimi marginibus flavis.  
*Alæ* fuscæ. *Pedes* lutei, *posteriorum*  
genubus tarsisque nigris.

Virgata. 96. T. Desc. *Antennæ* nigræ, articulis primis duobus luteis. *Caput* nigrum. *Thorax* niger, macula flava utrinque ante alas. *Alæ* fuscæ, margine exteriori incrassato. *Abdominis* segmenta 2, 3, 5, omnino nigra. *Pedes* lutei, *tarsis* femoribusque inferne nigris.

*Sirex.*

Juvencus. 3. S. Obs. Variat antennis nigris & flavis. Schæff. icon. t. 305. f. 3. urocerus.

Camelus. 4. S. Obs. Variat antennis nigris thoraceque longioribus: marem forsan descripsit Linn. *Fæminæ* aculeus corpore toto longior.

*Ichneumon.*

Sugillatorius. 1. I. Variat pedibus totis nigris.

Mandator. 134. I. An diversus ichn. mandator Linn. ?

Fuscicornis. 266. I. Obs. Hæc species sequentesque apteræ vel saltem foemina aptera, inde citationes duplicantur.

Compressus. 1. ( le comprimé ) ater, abdomine compresso segmentorum marginibus flavis, antennis pedibusque luteis.

Hab. in Suecia.

Desc. Affinis ichn. variegator. *Antennæ* flavæ, articulo primo ultimisque nigris. *Caput* & *thorax* atra, immaculata. *Abdomen* compressum, breve, atrum, segmentorum marginibus flavescens. *Alæ* albidæ. *Pedes* lutei, femoribus omnibus basi, posticis totis nigris. *M. app.*

*Sphex.*

Clavipes. 2. *S. Obs.* Synonymia *D. Fab.* forsan delenda, species enim. *Desc. n. 20.* diversa videtur.

Gibba. 13. *S. Obs.* Nomen triviale mutandum, ne confundatur cum sph. *gibba* Linn. Lege *cingulata*, le *Mandarin*.

Clypeata. 34. *S. Variat* fasciis tribus abdominis interruptis & integris.

Gibba. 40. *S. Obs.* Nimis affinis sph. *fuscæ*.

4-Maculata. *S.* ( le quadrimaculé ) hirta nigra, abdomine maculis quatuor fuscis.

*Drury. inf. 2. t. 39. f. 2.*

*Vincent. Petagn. n. 160.*

*Hab. in America Boreali. In Ulter. Calab. Vincent. Petagn.*

*Desc. Caput & thorax atra, pilis rarioribus hirta. Alæ fuscæ, violaceo colore nitentes. Abdomen oblongum, segmento secundo tertioque maculis duabus magnis, orbiculatis, flavis. Margines segmentorum ciliati.*

*Obs. 1. Cum hac specie convenit D. Vincent. Petagn. specimen, diversum tantum macularum colore qui in suo flavus est.*

*Obs. 2. Ex Massilia nobis missa, sed exotica visa fuit. V.*

2-Maculata. *S.* ( le bimaculé ) hirta atra, abdomine maculis duabus luteis, antennis flavis,

*Vincent. Petagn. n. 161.*

*Hab. in America Boreali M. D. Yeats. In Ulter. Calabr.*

*Desc. Antennæ flavæ, primo articulo*

nigro. *Corpus* hirtum, nigrum; maculæ duæ glabræ, luteæ in tertio *abdominis* segmento. *Alæ* apice fuscæ.

*Obs.* Nostrium specimen huic apprimè respondet tantumque maculæ in nostro fulvæ sunt. *Alæ* fuscæ, violaceo colore nitentes.

### *Chrysis.*

*Ænea*. C. ( la bronzée ) glabra ænea nitida, pedibus antennisque fuscis. *M.* 15.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura parva omnino *C. aurata*, at tota ænea nitida, *antennis* *pedibusque* fuscis. *Alæ* apice fuscæ.

### *Vespa.*

Vulgaris. 2. V. *Variat.* Rarius minor, *scutello* bipunctato.

Gallica. 5. V. *Pedes* flavi, *femoribus* nigris.

Coarctata. 8. V. *Abdomen* nigrum, segmentis margine flavis, primo secundoque bipunctato.

Bifasciata. 11. V. Aliam simillimam vidit Hafniæ *D. Fab.* at labio, punctis duobus anticis, *thoracis* lineolaque transversa *scutelli* flavis. *Pedes* ferruginei.

### *Apis.*

Centuncularis. 4. A. *Schæff. icon.* t. 252. f. 6, 7.

Terrestris. 95. A. *Schæff. icon.* t. 251. f. 7.

Sorboensis. 109. A. *Schæff. icon.* t. 251. f. 6.

*Mutilla.*

**Brutia. 11. M.** ( la Brutienne ) nigra, thorace rufo, abdomine maculis sex cinguloque albo argenteis. *D. Vincent. Petagn.* inf. speciem. *tab. f. xxxviii.*

*Hab. in Europa.* In Ulteriore Calabria.

*Desc. Aptera.* Corpus vespa vulgari majus, nigrum, hirsutum. *Antennæ* capite longiores, bicolores. *Thorax* parallelipipedus rufus, antice niger. *Abdomen* conicum, primo secundoque segmento maculis tribus tertioque cingulo albo argenteis, segmentis postremis subtus albicantibus.

**Littoralis. 12. M.** ( la maritime ) nigra, thorace rufo, abdomine antice macula biloba alba, segmentorum quinque posticorum marginibus albis. *Ibid. f. xxxvii.*

*Hab. in Europa.* In Ulteriore Calabria.

*Desc. Aptera.* Corpus præcedenti minus nigrum, hirsutum. *Caput* nigro-testaceum. *Maxillæ* porrectæ nitidæ uti & oculi. *Antennæ* subulatæ testaceæ, capitis longitudine. *Thorax* rufus parallelipipedus. *Abdomen* conicum, antice macula biloba alba marginibusque quinque posticorum segmentorum fascia alba. *Pedes* testacei. Magnitudo speciminum varia, forte varietas sexus; affinis M. *Europææ*, sed diversa species.

## D I P T E R A.

*Tipula.*

**Rufipes. 50. T.** *Obs. Desc. Faun. Suec.* omnino concurrat, at magnitudo T. *plumosæ*.

Thomæ. 63. T. Schæff. icon. t. 209. f. 6. 7.

*Musca.*

Hypoleon. 6. M. Fab. stratiomys 12. scutello bidentato flavo, corpore nigro flavo variegatur.

Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 481. n. 10. stratiomys atra, thorace abdomineque maculis flavis.

Scop. 912. musca rara.

Schæff. icon. t. 14. f. 15.

Obs. Musca hæc in D. Fab. speciebus enunciata fuit, sed synonymiam non memoraveram. V.

Diadema. 18. M. Obs. Varietas e Dania duplo major accepta, at vix distincta.

Mutica. 45. M. Eadem quæ n. 21 describitur; prima igitur delenda est.

Gibbosa. 98. M. Schæff. icon. t. 200. f. 1.

Maculata. 153. M. Antennis plumatis cinerea, thorace abdomineque maculis numerosis nigris.

Obs. Musca hæc sub nomine M. vulpinæ in speciebus D. Fab; sed separavit hæc species in M. nov. nomen triviale Linn. conservavit; musca igitur vulpina species diversa.

Vulpina. M. ( la rusée ) antennis plumatis, thorace lineato, abdomine ferrugineo, nigro maculato.

Hab. in Europa Boreali.

Desc. Frons nigra, oculorum orbita argentea. Thorax pilosus, ater, lineis quatuor longitudinalibus cinereis. Scutellum



*tellum* nigrum, margine ferrugineo.  
*Abdomen* ferrugineum, maculis plurimis nigris sparsis anoque cinereo punctis duobus nigris; *subtus* nigrum, lateribus ferrugineis. *Alæ* subfuscae. *Pedes* nigri.

Cæmeterio-200. M. Antennis setariis nigro - ænea, abdomine depresso atro nitido, alis nigricantibus M. syrph. 59. musc. spec. 39. quid?

Serrata. 204. M. *Variat* in Suecia duplo minor. D. Paykull.

Nobilitata. 215. M. *Schæff.* icon. t. 26. f. 5.

Colombaf- M. ( la pestiférée ) atra, abdominis incisuris tibiis tarsisque albis.

*Pall. itin. app.* 23. bibio sanguinaris.

*Griff. itin.* Oestrus.

*Hab.* in Servia, Bannatu in initio veris & sub fine æstatis copiosissima provincens, obruit pecora & intrat partes nobiles venenatoque morfu intra 4, 5, horas ea enecat. Arcetur fumo.

*Desc.* Culice pipiente duplo minor. *Corpus* nigrum. *Abdomen* incisuris albidis.

*Femora* nigra, tibiis tarsisque albidis.

*Rhag.* 15. Mant.

### *Tabanus.*

Haußtellatus. 18. T. An Mauritanus *Syst.*?

*Linn. Desc.* *Corpus* mediæ magnitudinis. *Rostrum* porrectum, longitudine fere corporis. *Oculi* unicolores, nigro-subcærulefcentes. *Antennæ* ferrugineæ. *Thorax* niger, pilis testaceis. *Abdominis* segmentum, a minimum nigrum;

*b* ferrugineum, macula in medio nigra;  
*c-h* nigrum, margine postico testaceo:  
*Alæ* hyalinæ, maculis variis fuscis:  
*Pedes* ferruginei.

*Conops.*

*Aculeata*. 6. *C. Obs. Schæff. icon. t. 228. f. 8.*

*Afilus.*

*Barbarus*. 2. *A. Obs. Femora nigra.*

*Teutonus*. 6. *A. Obs. Pedes rufi, apicibus nigris.*

*Nigerrimus*. *A. (le charbon) totus ater glaber;*  
*alis nigris, costa atra.*

*Hab. in Europa.*

*Desc.* Nihil in hoc insecto alterius,  
 quam nigri coloris. *Enum.*

*Tomi quarti ultimique finis.*

1840-1841

1841-1842

1842-1843

1843-1844

1844-1845

1845-1846

1846-1847

1847-1848

1848-1849

1849-1850

1850-1851

1851-1852

1852-1853

1853-1854

1854-1855

1855-1856

1856-1857

1857-1858

1858-1859

1859-1860

1860-1861

1861-1862

1862-1863

1863-1864

1864-1865

# ANALYTICA COMPARATAQUE

D. D.

LINNÆI, DE GEERI, GEOFFROYI, FABRICII

## ENTOMOLOGICIARUM SYNOPSIS.

*D. Linnæi.*

*D. de Geeri.*

APTERA.

APTERES.

LEPISMA.

LA FORBICINÉ.

*Pedes* VI cursorii.

*Pedes* 6.

*Os* palpis 2 setaceis & 2 capitatis.

*Oculi* 2 compositi.

*Palpi* 4.

*Cauda* setosa, setis extensis.

*Antennæ* setaceæ.

*Corpus* squamis imbricatum.

*Cauda* filis 3.

*Corpus* squamis tectum.

PODURA.

LA PODÛRE.

*Pedes* VI cursorii.

*Pedes* 6.

*Oculi* II compositi ex octo-  
nis.

*Oculi* 2 compositi ex 8.

*D. Geoffroyi.**D. Fabricii.*

APTERES.

SYNISTATA PARTIM;  
PARTIM ANTLIATA.

LA FORBICINE.

LEPISMA.

*Pedes* sex, origine lata &  
squamosa.*Oculi* duo.*Os* tentaculis duobus mobili-  
bilibus.*Antennæ* filiformes.*Abdominis* cauda tripilis.*Corpus* squamis tectum.*Palpi* inæquales.*Labium* rotundatum, mem-  
branaceum, emarginat-  
tum.*Antennæ* setaceæ.

LA PODURE.

PODURA.

*Pedes* sex.*Oculi* duo.*Insect.* Tom. IV.*Palpi* subclavati.*Labium* bifidum.

a ij.

*D. Linn.**D. de Geeri.**Cauda* bifurca, saltatrix,  
inflexa.*Antennæ* setaceæ elongatæ.*Antennæ* filiformes.*Cauda* bifurcata sub abdomine inflexa, saltatrix.Famil. 1. *Antennis* rectiusculis, articulis 4.

— 2. . . . . fractis, articulis 4 pluribus.

## TERMES.

## LE TERME.

*Pedes* VI cursorii.*Oculi* II.*Antennæ* setaceæ.*Os* maxillis duabus.*Obs.* 1. Ex observationibus *D. Spartmanni* constat species nonnullas individua alata habere, inde ex apteris ad movendum esset hoc genus.*Obs.* 2. Omnium insectorum mirabilius termes capense : moribus, industria, sagacitate vere stupendum. *D. Spart. itin.* V.*Pedes* 6.*Oculi* 2 reticulati.*Antennæ* setaceæ 1. filiformes, thorace longiores.*Os* dentibus 2 & palpis 4 mobilibus.*Obs.* Dans le troisième de mes mémoires, j'ai décrit sous le nom de fausses-friganes deux insectes à quatre ailes, trouvés à Surinam, & absolument semblables en figure, aux termes ailés du Cap de Bonne-Espérance, mais l'un & l'autre d'une espèce différente. Selon les apparences, ces deux insectes paroissent donc être aussi des termes ailés & non des fausses-friganes, comme je le croyois alors. Plus on observe les insectes, & plus on est confondu par les variétés infinies qu'ils nous offrent. Tom. VII, p. 50.



*D. Geoffroyi.*

*Antennæ* filiformes.  
*Abdominis cauda* bifurca,  
 inflexa, saltatrix.  
*Corpus* squamis tectum.

Famil. 1. Globosæ.

—— 2. Longæ.

*D. Fabricii.*

*Antennæ* setaceæ.

*Palpi* quatuor subclavati.

*Labium* bifidum.

*Antennæ* filiformes. *Mant.*

## POU DU BOIS.

*Obs.* Inter pediculos ordinatum, sed excepto *D. Schluga*, alii Entomologi genus *Linn.* admitterunt, nec mirum, quod divisionem systematicam & generum spectat definitionem, & virum *Geoffroy Parisiensem*, utpoteque in ea materie aliis omnibus palmam huc usque eripuit, sequar. *Prim. Linn. cognitionis insectorum*, p. 20.

## TERMES.

*Labium* corneum, quadridum, laciniis linearibus acutis.

*Antennæ* moniliformes.

*Obs.* Inter hemerobium & myrmeleon ordinavit hoc genus *D. Fab.* hemerobiumque marginalem *Syst.* & ad termes reduxit; termes contra pulsatorium, ad hemerobium. *V.*

# VI ANALYTICA ET COMPARATA

*D. Linnæi.*

*D. de Geeri.*

## PEDICULUS.

## LE POU.

*Pedes* VI ambulatorii.

*Oculi* II.

*Os* ex aculeo exserendo.

*Antennæ* longitudine thoracis.

*Abdomen* depressum, sublobatum.

*Pedes* 6.

*Oculi* 2.

*Antennæ* longitudine thoracis.

*Abdomen* depressum.

## LE RICIN.

*Obs.* An ricinus genus proprium? solis enim dentibus a pediculo *Syst.* differre videtur. V.

*Pedes* 6.

*Oculi* 2.

*Antennæ* filiformes, longitudine circiter capitis.

*Dentes* 2 sub capite.

*Abdomen* depressum.

## PULEX.

## LA PUCE.

*Pedes* VI saltatorii.

*Oculi* II.

*Antennæ* filiformes.

*Os* rostro, inflexo, setaceo, aculeum recondente.

*Abdomen* compressum.

*Pedes* 6 postici longi, saltatorii.

*Oculi* 2.

*Proboscis* brevis recurva.

*Antennæ* filiformes.

*Annuli* ventris cute cartilaginea tecti.

## ACARUS.

## LA MITTE.

*Pedes* VIII.

*Oculi* II ad latera capitis.

*Tentacula* duo, articulata, pediformia.

*Obs.* Septem *D. de Geer.* familiæ a nullo Entomologo receptæ fuerunt; falsæ enim differentiæ ab alimento desumptæ. V.

*Pedes* VIII.

*Oculi* II.

*Rostrum* breve capitis.

*Tentacula* II pediformia, articulata.

Famil. I. *Viâualium.*

— 2. *Mammalium.*

— 3. *Avium.*

— 4. *Insectorum.*

*D. Geoffroyi.**D. Fabricii.*

## LE POU.

## PEDICULUS.

*Pedes sex.**Oculi duo.**Antennæ filiformes.**Abdomen simplex,**Os haustello absque proboscide.**Haustellum retractile, recurvum.**Antennæ subulatæ.**Obs. Le pou du bois, termines pulsatorium Linn. V.**Haustellum retractile, recurvum.**Antennæ. . . . . Mantiss.*

## LA PUCE.

## PULEX.

*Pedes sex saltatorii.**Oculi duo.**Os inflexum.**Antennæ filiformes.**Abdomen simplex, subrotundum.**Os rostro inflexo.**Vagina quinque articulata, seta unica.**Laminæ duæ ovatæ, basin rostri tegentes.**Antennæ moniliformes.**Inter rhyngota.*

## LA TIQUE.

## ACARUS.

*Pedes octo.**Oculi duo.**Antennæ simplices, rostro breviores.**Os haustello absque proboscide.**Vagina bivalvis, cylindrica.**Palpi duo, longitudine haustelli.*

## LA PINCE.

*Pedes VIII.**Oculi II.**Haustellum vagina bivalvi, cylindrica.*

*D. Linnæi.*

*D. de Geeri.*

Famil. 5. *Vegetabilium.*

— 6. *Vagabundi.*

— 7. *Aquatici.*

PHALANGIUM.

LE FAUCHEUR.

*Pedes* VIII.

*Oculi* verticis duo contigui, duo laterales.

*Frons* antennis pediformibus.

*Abdomen* rotundatum.

*Pedes* VIII.

*Oculi* II.

*Chelæ* II didactylæ in capitis antica parte.

*Tentacula* II pediformia.

*Abdomen* ovale.

*Chelæ* 2 frontales parvæ.

*Palpi* 2 cheliformes ad latera capitis.

*Corpus* oblongum ecaudatum.

ARANEÆ.

L'ARAIGNÉE.

*Pedes* VIII.

*Oculi* VIII.

*Os* unguibus s. retinaculis duobus.

*Palpi* duo articulati, masculis genitalibus capitatis.

*Anus* papillis textoriis.

*Pedes* VIII.

*Oculi* VIII.

*Forceps* articulatus capitis.

*Tentacula* II articulata pediformia.

*Mammillæ* II ani, netrices, mobiles.

*D. Geoffroyi.*

*Antennæ* cheliformes, rostro longiores.

*D. Fabricii.*

*Palpi* duo longitudine haustelli.

*Antennæ* filiformes. *Mant.*

## TROMBIDIUM.

*Palpi* duo incurvi, apice acutissimo.

*Labium* concavum maxillas recipiens.

*Antennæ* setaceæ.

## LE FAUCHEUR.

*Pedes* VIII.

*Oculi* II.

*Antennæ* angulosæ.

*Tentacula* duo longa, antenniferformia.

## PHALANGIUM.

*Palpi* porrecti, incurvi.

*Maxilla* superior chelifera.

*Antennæ* nullæ.

## L'ARAIGNÉE.

*Pedes* octo.

*Oculi* octo.

## ARANEÆ.

*Palpi* incurvi, maris clavati.

*Labium* breve, apice rotundatum.

*Antennæ* nullæ.

*D. Linnæi.**D. de Geeri.*

Famil. 1. Retiariæ, telas  
circulares, regulares,  
retiformes, verticales  
nent.

— 2. *Textoriæ* telas irre-  
gulares nent.

— 3. *Vestiariæ* telas re-  
gulares horizontales con-  
ficiunt.

— 4. *Aranea lupus* nul-  
las telas conficit. *Pedes*  
*posteriores* longiores. Ra-  
pinam cursitando rapit.

— 5. *Aranea phalan-*  
*gium* nullas telas confi-  
cit. *Pedes* subæquales.  
Insiliendo rapit.

## SCORPIO.

## LE SCORPION.

*Pedes* VIII, insuper *chela*  
2 frontales.

*Oculi* VIII, horum 3 ad  
latus utrumque thora-  
cis, 2 in tergo.

*Palpi* II cheliformes.

*Cauda* elongata, articu-  
lata, terminata mucrone  
rigido.

*Pedines* duo subtus, inter  
pectus & abdomen.

*Pedes* VIII.


*Oculi* VIII l. VI.

*Chela* II cheliformes.

*Cauda* longa terminata,  
aculeato mucrone.

*Pedines* duo subtus inter-  
pectus & abdomen.



*D. Geoffroyi.**D. Fabricii.*Fam. I. Oculi *lunati*Fam. I. *Oculis* ::::

— 2. . . . . ::::

— 2. . . . in *quadrum*

— 3. . . . . ::::



— 4. . . . . ::::

— 3. . . . in *duas* lineas


— 5. . . . . ::::



— 6. . . . . ::::

— 4. . . . in *tres* lineas

— 7. . . . . ::::



— 8. . . . . ::::

— 5. . . . in *triangula*  
*varia dispositi*— 9. *Oculis* tantum *fenis*— 10. *Oculis* -----

## SCORPIO.

*Obs.* Genus hoc in *Inf.*  
*Parif. D. Geoff.* non re-  
peritur; scorpiones enim  
in Gallia Austr. vivunt.

*Palpi anteriores* cheliferi.  
*Labium* bifidum.

*Palpi* duo porrecti, cheli-  
feri.

*Labium* bifidum.

*Antennæ* nullæ. *Mant.*

*D. Linnæi.*

*D. de Geeri.*

Famil. I. Ocalis 6:

— 2. . . . . 3.

CANCER.

LE CRABE.

*Pedes* VIII (10 f. 6 raro)  
infuper manus 2 chelatae.

*Oculi* II distantes, plerisque  
pedunculati, elongati,  
mobiles.

*Palpi* II cheliferi.

*Cauda* articulata, inermis.

*Pedes* X (rarius 8) quorum  
anticum par chelatum.

*Antennæ* setaceæ breves.

*Oculi* II pedunculati, mobiles.

*Palpi* II articulati.

*Thorax* latus planiusculus.

*Cauda* triangularis ovata,  
recurvata & corpori appressa.

Famil. I. *Brachyuri* thoracelævi  
lateribus integerrimo.

— 2. . . . . thoracelateribus  
inciso.

— 3. . . . . thoracesupra  
hirsuto aut spinoso.

— 4. . . . . thoracesupra  
spinoso.

— 5. . . . . thoraceinæquali.

— 6. Parasitici, caudaphylla.

— 7. *Macrouri* thoracelævi.

Famil. I. Thorax lævis,  
margine integro.

— 2. . . . . marginedentato.

— 3. . . . . supraspinosus.

L'ÉCRÉVISSE.

*Pedes* X, quorum anticum  
par chelatum.

*Oculi* II pedunculati, mobiles.

*Palpi* II articulati.

*Thorax* cylindrico-convexus.

*Cauda* extensa, terminata  
laminis foliaceis.

*D. Geoffroyi.**D. Fabricii.*

## CANCER.

*Palpi* quatuor os obte-  
gentes.*Antennæ* quatuor filifor-  
mes, *posticis* articulo  
ultimo bifido.

---

*Antennæ* quatuor, breves,  
filiformes, articulo ulti-  
mo bifido. *Mant.***Famil. 1.** *Thorace* lævi ;  
lateribus integerrimis.— 2. . . . . lævi ,  
lateribus incis.— 3. . . . . supra  
hirsuto aut spinoso.

## PAGURUS.

*Antennæ* quatuor pedun-  
culatæ, inæquales, *an-*  
*teriores* setacæ, *poste-*  
*riores* filiformes, articulo  
ultimo bifido.*Obs.* Sub hoc genere omnes  
*Syst. cancri parasitici ma-*  
*crourusque spinosus. V.*

*D. Linnæi.*

*D. de Geeri.*

Famil. 8. Thorace inæquali.

— 9. . . . . aculeato.

— 10. . . . . manibus  
didactylis, thorace oblon-  
go.

Famil. 1. Thorace lævi l:  
inermi.

— 2. . . . . spinosol:  
muricato.

— 3. Parasitici in testis  
inhabitantes.

MONOCULUS.

*Pedes* natatorii.

*Corpus* crusta tectum.

LE MONOCLE.

*Pedes* ramosi, natatorii.

*Brachia* II articulata, ra-  
mosa.

*D. Geoffroyi.**D. Fabricii.*

## LE CRABE.

## ASTACUS.

*Pedes X, primi cheliformes.**Ocelli II.**Antennæ filiformes.**Cauda foliosa.**Corpus crusta tectum.**Antennæ quatuor pedunculatæ.**Anticæ elongatæ setaceæ.**Posticæ fissæ.*

## SCYLLARUS.

*Antennæ duæ filiformes, articulo ultimo bifido.**Squamæ duæ arcuatæ loco posticarum.*

## SQUILLA.

*Antennæ quatuor subæquales.**Anteriores pedunculatæ, setaceæ.**Posticæ pedunculatæ, pedunculo quadriarticulato, setaceæ, fissæ.*

## GAMMARUS.

*Antennæ quatuor simplicissimæ, sessiles, pedunculatæ.**Anticæ breviores, subulatae.**Posticæ setaceæ.*

## LE MONOCLE.

## MONOCULUS.

*Pedes VI.**Oculus unus.**Palpi IV postici auriformes.**Antennæ sæpius ramosæ.*

*D. Linnæi.*

*D. de Geer.*

*Oculi* approximati, testæ  
innati.

*Corpus* testæ bivalvi con-  
chiformi.

*Oculi* capitis congesti, uni-  
cum mentientes.

*Cauda* furcata plerisque.

Famil. I. *Brachiis* ramosis  
extra testam.

— 2. . . . .  
intra testam.

— 3. . . . . simplici-  
bus extra testam, *cauda*  
furcata exserta.

— 4. *Cauda* simplici  
recta ad apicem corporis,  
exserta.

## ONISCUS.

## LE CLOPORTE.

*Pedes* XIV.

*Antennæ* setaceæ.

*Pedes* XIV.

*Oculi* II reticulati.

*Antennæ* II filiformes,  
fractæ.

*Corpus* ovatum, articula-  
tum.

## SCOLOPENDRA.

## LA SCOLOPENDRE.

*Pedes* numerosi, totidem  
utrinque quot corporis  
segmenta.

*Antennæ* setaceæ.

*Palpi* duo articulati.

*Corpus* depressum.

*Corpus* depressum, articu-  
latum.

*Pedes* numerosi, totidem  
utrinque quot segmenta  
corporis.

*Antennæ* setaceæ.

*D. Geoffroyi.*



*D. Geoffroyi.**D. Fabricii.**Antennæ* multiplices, setis plurimis lateribus.*Corpus* crusta tectum.*Palpi* IV.— *postici* auriformes.*Antennæ* sæpius fissæ. *Mant.*

## LE BINOCLE.

*Pedes* VI.*Oculi* II.*Antennæ* simplices setaceæ.*Cauda* bifida.*Corpus* crusta tectum.

## LE CLOPORTE.

## ONISCUS.

*Pedes* XIV.*Antennæ* II fractæ.

## L'ASELLE.

*Labium* quadrifidum, laciniiis intermediis palpi-geris.*Antennæ* setaceæ.*Palpi* inæquales.— *postici* longiores.*Pedes* XIV.*Antennæ* quatuor fractæ, duæ longiores.*Maxilla* truncata, denticulata.*Labium* bifidum. *Mantiss.*

## LA SCOLOPENDRE.

## SCOLOPENDRA.

*Pedes* ad minimum viginti quatuor, sæpe plus.*Corpus* planum.*Antennæ* filiformes, articulis brevibus plurimis.*Palpi* filiformes, inter maxillas connati.*Labium* dentatum fissum.*Antennæ* setaceæ.

*D. Linnæi.*

*D. de Geeri.*

*Oculi* plures , distincti ,  
hemisphærici.

*Dentes* 2 curvati.

*Palpi* 2 articulati sub ca-  
pite.

JULUS.

LE JULE.

*Pedes* numerosi , duplo  
utrinque plures quam  
corporis segmenta.

*Antennæ* moniliformes.

*Palpi* duo articulati.

*Corpus* semicylindricum,

*Corpus* cylindricum , arti-  
culatum.

*Pedes* numerosi , segmentis  
utrinque duplo plures.

*Antennæ* filiformes, breves.

*Oculi* 2 reticulati.

*Dentes* 2.

*D. Geoffroyi.**D. Fabricii.*

## LE JULE.

*Pedes* plusquam centum.*Corpus* teres, cylindricum.*Antennæ* articulis quinque.

## JULUS.

*Labium* crenatum emarginatum.*Antennæ* clavato - acuminatæ.*Labium* crenatum emarginatum.*Antennæ* moniliformes.*Mantiss.*

*Obs.* Aliquorum generum notas características aliquoties mutavit celeb. *Fab.* has differentias plerumque retuli, ut discant tyrones genus non facile condendum esse, mutationesque has magnum Entomologum annuntiare. Reipsa, quis primo intuitu, systema novum in lucem edendo, omnes generis systemati conformes, characteres agnoscet? Variavit immortalis *Linn.* variabuntque omnes veri Entomologi, usquedum character vere naturalis inveniatur. Ille solus immutabilis qui opi-

*D. Fabricii.*

nionis amantissimus, veritatem ardenti amore non prosequitur. Erraverunt fere omnes illustrissimi Scriptores : sed errores agnoverunt & abjecerunt ; inde philosophiæ rei que naturæ, etiam errando, utilissimi. V.

T O M I   I I I

# NOMENCLATOR

## ENTOMOLOGUS,

INSECTORUM SYSTEMATIS NATURÆ GENERA,  
SPECIES LINN. ANTIQUAS RECENTIORESQUE  
NUPERRIME DETECTAS,  
NECNON PRÆCIPUORUM ENTOMOLOGORUM  
SYNONYMIAM,  
ORDINE ALPHABETICO INDICANS.  
ABBREVIATIONES.

\* . . . . Species novas designat.

*D. F.* . . . . D. Fabricium.

*Enum.* . . . . Austriæ Insectorum Enumerationem.

*Scop.* . . . . Entomologiam Carniolicam.

*Geoff.* . . . . Insectorum Parisiensium Historiam.

*Ent. parif.* . . Entomologiam Parisiensem.

*V.* . . . . Nostrium Musæum.

D. Linn. Pag.

Gall.

## LIBELLULA.

## DEMOISELLE.

<i>Ænea.</i>	6	L'Aminthe. . . . .
<i>Albidella.</i>	* 15	La Life. V.
<i>Cancellata.</i>	5	La Philis. . . . .
<i>Cecilia.</i>	* 11	La Cécile. <i>Geoff.</i>
<i>Cyanea.</i>	* 9	La Henriette. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Depressa.</i>	4	La Sylvie. . . . .
<i>Plaveolata.</i>	3	L'Éléonore. . . . .
<i>Forcipata.</i>	8	La Caroline. . . . .
<i>Fridrichs Dalensis.</i>	* 11	L'Agathe. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Frumenti.</i>	* 11	La Catherine. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Fulva.</i>	* 10	La Crispine. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Grandis.</i>	7	La Julie. . . . .
<i>Hafnienfis.</i>	* 10	La Danoise. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Juncea.</i>	8	La Lifette.
<i>4-Maculata.</i>	1	La Françoisse. . . . .
<i>Pedemontana.</i>	* 9	La Piémontoise. <i>Fab.</i> . .
<i>Pratenfis.</i>	* 10	La Bergere. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Puella.</i>	13	L'Amélie. . . . .
<i>Rubicunda.</i>	4	La Laïs. . . . .
<i>Rubra.</i>	* 11	La Pudique. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Sanguinea.</i>	* 10	La Ninon. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Tenella.</i>	* 15	La Thérèse. V.
<i>Triedra.</i>	* 10	La Gertrude. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Variegata.</i>	* 11	La Rosalie. <i>Faun. Frid.</i>
<i>Victoria.</i>	* 11	La Victoire. <i>Geoff.</i> . .
<i>Virgo.</i>	12	La Louise. . . . .
<i>Vulgata.</i>	3	La Claire. . . . .
<i>Vulgatissima.</i>	5	La Justine. . . . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

DEMOISELLE.

DEMOISELLE.

LIBELL.  
AESHNA,  
AGRION.

Demoiselle dorée L'Aminthe. . . ead.  
verte.

. . . . . ead.

. . . . . La Sylvie. . . ead.

. . . . . L'Éléonore. . . ead.

Demoiselle à taches La Caroline. . . Aeshna. 1.  
d'un verd-céladon.

Demoiselle à ailes La Julie. . . Aeshna, 2.  
jaunes.

. . . . . La Françoise. . . ead.

. . . . . ead.

Demoiselle verte, La Dorothée. Agrion, 2.  
à taches bleues.

. . . . . ead.

. . . . . La Victoire.

. . . . . La Louise. L'Ulrique. Agrion, 1.

. . . . . ead.

. . . . . La Justine. . . ead.

D. Linn. . . . . Pag. Gall.

EPHEMERA. ÉPHÉMERE.

Albipes.	* 23	L'Albipede. <i>Enum.</i>
Bioculata.	18	La Tuberculée. . . . .
Culiciformis.	20	La Culiciforme. . . . .
Danica.	* 18	La Danoise. <i>Faun. Frid.</i>
Diptera.	21	La Diptere. . . . .
Flava.	* 22	La Dorée. <i>Enum.</i> . . . .
Fusca.	19	La Brunette.
Gemmata.	* 23	La Perlée. <i>Scop.</i>
Halterata.	* 18	La Ceinture. <i>F.</i> . . . .
Horaria.	20	L'Ephémère. . . . .
Lutea.	17	La Jaune. . . . .
Maculata.	* 22	La Tachetée. <i>V.</i>
Marginata.	17	La Bordée. . . . .
Nervosa.	* 22	La Nerveuse. <i>D. de Geer.</i>
Nigra.	19	La Noire. . . . .
Parvula.	* 23	Le demi-Deuil. <i>Scop.</i>
Speciosa.	* 22	La Belle. <i>Enum.</i>
Striata.	21	La Striée. . . . .
Vespertina.	17	La Noire. Lege la Délicate.
Vulgata.	16	La Commune. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

ÉPHÉMERE.

ÉPHÉMÉRÉ.

EPHEM.

. . . . . Ephém. jaune à deux  
filets & ailes reti-  
culées. . . . ead.  
. . . . . Ephém. à deux filets  
& ailes blanches. ead. 10.

Ephém. à deux ailes  
& à bande brune. . . . . ead.  
. . . . . Ephém. à deux filets  
& ailes reticulées.

Ephém. à ceinture  
blanche. . . . . ead.  
. . . . . Ephém. à deux filets  
& ailes marginées. ead.  
. . . . . Ephém. à trois filets  
& ailes reticulées. ead.

Ephém. noire à ailes  
blanches. Ephém. à trois filets  
& ailes brunes. ead.  
Ephém. grise en  
dessous. . . . . Venosa. 6.  
. . . . . ead.

. . . . . Ephém. à deux filets  
& ailes brunes. ead.  
. . . . . Ephém. noire à trois  
filets. . . . ead.  
Ephém. Commune. Ephém. à trois filets  
& ailes tachetées. ead.

*D. Linn. Pag.**Gall.*

## PHRYGANEÆ.

## FRIGANE.

Albicornis.	* 36	L'Albicorne. <i>Scop.</i>
Albifrons.	33	Le Front blanc.
Analís.	* 39	La Marquée. <i>F.</i> . . .
Atra.	* 44	La Savoyarde. . . .
Azurea.	32	L'Azurée. . . .
Bicaudata.	24	La double Queue. . . .
Bicolor.	* 42	La Bicolor. <i>Enum.</i>
Bilineata.	34	La Bilinéaire. . . .
Bimaculata.	30	La Bimaculée. . . .
Bimaculata.	* 37	La Bimaculée. <i>Scop.</i>
Binervosa.	* 44	La Binerveuse. <i>De Geer.</i>
Collaris.	* 42	Le Collier. <i>Enum.</i>
Ciliaris.	32	La Ciliée. . . .
Cylindrica.	* 45	La Cylindrique. <i>De Geer.</i>
Digitata.	* 42	La Digitée. <i>Enum.</i>
Dubia.	* 38	La Douteuse. <i>Scop.</i>
4-Fasciata.	* 40	La Quadrifasciée. <i>F.</i> . .
Ferruginea.	* 36	La Rouillée. <i>Scop.</i>
Filosa.	33	La Filiforme. . . .
Flava.	35	La Jaune.
Flavicornis.	* 27	La Flavicorne. <i>V.</i>
Flavilatera.	* 31	La Dilatée. . . .
Fuliginosa.	* 38	La Fuligineuse. <i>Scop.</i>
Funerea.	* 43	La Pleureuse. . . .
Fusca.	34	La Brune. . . .
Grammatica.	26	La Turque. . . .
Grandis.	29	La Grande. . . .
Grisea.	28	La Grise. . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

FRIGANE.

FRIGANE.

PHRYGA-  
NEA.

. . . . . ead.

. . . . . *Ent. paris.*

. . . . . ead.

. . . . . La Perle brune, à  
raies jaunes. . . Semblis. 6.

. . . . . ead.

Frigane noire à . . . La Frigane à anten-  
bandes. . . nes panachées. ead.

Frigane à deux ner-  
vures tachetées.

. . . . . Puffila ?

Fausse-Frigane cy-  
lindrique.

. . . . . ead.

. . . . . ead. ?

. . . . . L'Hémérobe aqua-  
tique.

. . . . . Frigane-mouche en  
deuil.

. . . . . ead.

. . . . . La Perle brune à  
pattes jaunes. An?

Frig. à deux points  
blancs. . . , . . . ead.

Frig. grise à points  
noirs. . . . . ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Hirta.	* 40	La Hériffée. <i>F.</i> . . .
Interrupta.	* 40	L'Interrompue. <i>F.</i> . . .
Lineola.	* 41	La Linéaire. <i>Enum.</i> . . .
Longicornis.	33	La Longicorne. . . .
Lugubris.	* 44	L'Enfumée. . . . .
Marginata.	32	La Bordée. . . . .
Martia.	* 39	La Précoce. <i>Scop.</i>
Minuta.	35	La Petite. . . . .
Musciformis.	* 44	La Mouche. <i>Geoff.</i> . .
Nebulosa.	25	La Nébuleuse. . . . .
Nigra.	31	La Noire. . . . .
Nigro-nervosa.	* 45	Les Nervures noires. <i>D. Geer.</i>
Nitida.	* 42	La Brillante. <i>Faun. Frid.</i>
Obfuscata.	* 37	L'Obscure. <i>Scop.</i> . . .
Occulta.	* 43	La Cachée. <i>Faun. Frid.</i>
Pallipes.	* 40	La Pallipede. <i>F.</i> . . .
Pectinicornis.	* 39	La Pectinée. <i>Scop.</i>
Phalænoides.	25	La Phalénoïde. . . . .
Pilosa.	* 40	La Velue. <i>F.</i> . . . .
Plumbea.	* 43	La Plombée. <i>Geoff.</i> . .
Pyrulina.	* 38	La Pyraloïde. <i>Scop.</i>
Regelationis.	* 39	La Pressée. <i>Scop.</i>
Reticulata.	27	La Reticulée. . . . .
Rhombica.	29	Le Rhombe. . . . .
Ruficrus.	* 36	La Tuberculée. <i>Scop.</i>
Saltatrix.	35	La Sautieuse.
Striata.	28	La Striée. . . . .
Testacea.	* 38	La Testacée. <i>Scop.</i>
Tineoides.	* 37	La Tinéoïde. <i>Scop.</i>



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	Frig. demi-Deuil.	
	<i>Ent. paris.</i> . .	ead.
Frig. grise à points noirs. An ?		
. . . . .	Frig. à ailes tache- tées & longues antennes. . .	ead.
. . . . .	<i>Ent. Paris.</i>	
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	Frigane-mouche de couleur pâle.	
Fausse-Frigane cen- drée. . . . .	La Perle brune à ailes pâles. . .	Semblis. 7.
Frig. noir-bleuâtre à ailes courbées.	La Frigane à ailes ponctuées. . .	ead.
Frig. brune à ner- vures noires.		

*Lege l'Obscurcie.*

. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	Semblis. 5.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	Frigane plombée à ailes fauves.	
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	Frigane panachée.	ead.
. . . . .	F. de couleur fauve.	ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Tripunctata.	* 26	La Triponctué. <i>Scop.</i>
Umbrosa.	35	L'Obscure.
Uncinata.	* 26	La Crochue. <i>Enum.</i>
Variegata.	* 37	La Bigarrée. <i>Scop.</i> . .
Variegata.	* 44	La Marbrée. . . .
Venosa.	* 43	La Veinée. <i>Geoff.</i> . . .
Viridis.	* 41	La Verdâtre. <i>F.</i> . . .
Viridis.	* 43	La Verte. <i>Geoff.</i>
Wæneri.	33	La Suédoise.

## HEMEROBIUS.

## HÉMÉROBE.

Abdominalis.	* 54	L'Imperceptible. <i>F.</i> . .
Albus.	47	Le Blanc. . . . .
Aphidioides.	* 55	L'Aphidioïde. <i>Enum.</i>
Bipunctatus.	52	Le Biponctué. . . . .
Chrysops.	47	Le Porte-Or. . . . .
Fasciatus.	* 54	Le Fascié. <i>F.</i> . . . .
Flavicans.	50	Le Jaunâtre. . . . .
Flavus.	* 55	Le Jaune. <i>Scop.</i>
Fulvicephalus.	* 55	Le Fulvicéphale. <i>Scop.</i>
Hirtus.	48	Le Hérissé. . . . .
Humuli.	49	Du Houblon. . . . .
Longicornis.	* 53	Le Longicorne. <i>F.</i> . .
Lutarius.	50	L'Aquatique. . . . .
Maculatus.	* 54	Le Tacheté. <i>F.</i> . . . .
Nemoralis.	* 55	Le Sauvage. <i>Faun. Frid.</i>
Nitidulus.	* 53	Le Brillant. <i>F.</i> . . .
Obscurus.	* 56	L'Obscur. <i>Faun. Frid.</i>
Paganus.	49	Le Payfan.
Parvulus.	* 56	Le Roux. <i>Faun. Frid.</i>
Pedicularius.	51	Le Pédiculaire. . . .
Perla.	46	La Perle. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

.	.	.	.	.	.	.	.	.	ead.
.	.	.	.	.	.	F. marbrée à pattes			
						panachées. Ent.			
						parif.			
.	.	.	.	.	.	Frig. noire à ailes			
						pâles veinées.			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semblis. 9.
.	.	.	.	.	.	Frigane verte.			

## HÉMERÔBE.

## HÉMÉROBE.

HEMEROB.

• • • • •	• • • • •	id.
• • • • •	• • • • •	id.
• • • • •	• • • • •	id. 13.
Hém. verd, tacheté	Hémérobe à ailes	
de noir. • • •	ponctuées. • • •	id.
• • • • •	• • • • •	<i>Mantiiff.</i> 13.
• • • • •	• • • • •	id.

Hém. gris, tacheté	
de brun. . . . .	id.
. . . . .	id.
. . . . .	id.
H. aquatique noir. . . . .	Semblis 8.
. . . . .	id. <i>M.</i>
. . . . .	id.

Pou du bois.	Le Pou du bois.	Pulfatorius.
. . . . .	Le Lion des puce-	
	rons.	id:

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Phalænoides.	48	Le Phalénoïde. . . . .
6-Punctatus.	49	Le Sixpunctué. . . . .
4-Punctatus.	* 54	Le Quadripunctué. <i>F.</i> . . .
Raphidioides.	* 56	Le Raphidioïde. <i>V.</i> . . .
Rufus.	* 56	Le Roux. <i>V.</i> . . . . .
Striatulus.	* 53	Le Strié. <i>F.</i> . . . . .
Varius.	* 56	Le Varié. <i>V.</i> . . . . .

## MYRMELEON.

## MYRMELEON.

Australe.	* 62	L'Austral. <i>F.</i> . . . . .
Barbarum.	61	L'Africain. . . . .
Formicarium.	59	Le Fourmilion. . . . .
Formicalynx.	61	Le Formicalynx. . . . .
Italicum.	* 62	L'Italien. <i>F.</i> . . . . .
Libelluloides.	57	Le Libelluloïde. . . . .
Longicorne.	58	Le Longicorne. . . . .
Lugdunense.	* 63	Le Lyonnais. <i>V.</i> . . . . .
Occitanicum.	* 63	Le Languedocien. <i>V.</i> . . .
Pantherinum.	* 62	La Panthere. <i>F.</i> . . . . .

## PANORPA.

## MOUCHE-SCORPION.

Communis.	64	La Commune. . . . .
Coa.	65	L'Insulaire. . . . .
Germanica.	65	L'Allemande. . . . .
Hyemalis.	65	L'Hyémale. . . . .
Tipularia.	* 66	La Tipule. <i>F.</i> . . . . .

## RAPHDIA.

## RAPHDIE.

Mantispa.	67	La Raphidie-Mante. . . . .
Notata.	* 68	La Tacherée. <i>F.</i> . . . . .
Ophiopfis.	66	La Raphidie. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Hémer. phalenoïde. . . . .	id.
. . . . . La Frigane à ailes	
. . . . . ponctuées. . . . .	id.
. . . . .	id. <i>M.</i>
. . . . .	id.

FOURMILION.

FOURMILION.

MYRMEL.  
ASCALAP.

. . . . .	id. <i>M.</i>
. . . . .	Ascalaph. r.
. . . . . Le Fourmilion. . . . .	id.
Fourmilion à ailes	
sans taches. . . . .	id.
<i>Delendum.</i> . . . .	id.
Fourmil. moucheté. . . . .	id.

. . . . .	id. <i>M.</i>
-----------	---------------

MOUCHE-SCORP.

MOUCHE-SCORP.

PANORPA.

Mouche - Scorpion	La Mouche - Scor-	
commune. . . . .	pion. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.

RAPHIDIE.

RAPHIDIE.

RAPHIDIA.

. . . . .	<i>Mantis</i> 37.
. . . . .	ead.
Raphidie commune. . . . .	ead.
<i>Insect. Tomus IV.</i>	c

D. Linn. Pag.

Gall.

## CYNIPS.

## CINIPS.

Adscendens.	* 77	Le Relevé. <i>F.</i> . . . .	5
Amerinæ.	74	Du Saule pentandrique. .	
Aterrima.	* 75	Le Charbon. <i>Enum.</i>	
Aurata.	* 77	Le Doré. <i>Faun. Frid.</i>	
Capreæ.	74	Du Saule - Marceau. . .	
Cardui.	* 77	Du Chardon. <i>Faun. Frid.</i>	
Fagi.	73	Du Hêtre. . . . .	
Glechomæ.	70	Du Glécome-Lierre. . .	
Hieracii.	70	De l'Eperviere.	
Inanita.	74	Le Diaphane.	
Phragmitis.	* 76	Des Roseaux. <i>Enum.</i>	
Potentilla.	* 77	De la Potentille <i>Geer.</i> .	5
Quercus baccarum.	70	Des Baies. . . . .	
Quercus Corticis.	72	De l'Ecorce.	
Quercus Folii.	71	Des Feuilles. . . . .	
Quercus Gemmæ.	73	Des Boutons. . . . .	5
Quercus Inferus.	71	L'Abrité. . . . .	
Quercus Pedunculi.	72	Du Péduncule. . . . .	
Quercus Petioli.	72	Du Fétiole. . . . .	5
Quercus Ramuli.	72	Des Rameaux.	
Quercus Surculi.	* 75	Des Rejetons. <i>Enum.</i>	
Rosæ.	69	De la Rose. . . . .	5
Rubi.	75	Le Porte - Or. . . . .	
Salicis Strobili.	74	Du Cône du Saule. . .	



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

CINIPS.

CINIPS.

CYNIPS.

. . . . . *Mantiff.*  
ead.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . Cinips de la Galle du  
Lierre terrestre. ead.

ead.

. . . . . Cin. de la Galle en  
chapeau du Chêne. ead.

. . . . . Le Diplolepe de la  
Galle ronde &  
dure du Chêne. ead.

. . . . . , Cin. de la Galle en  
rose du Chêne.

Lege Abrité. . . . . ead.

. . . . . Cin. de la Galle en  
pomme des extrê-  
mités des bran-  
ches du Chêne. ead.

. . . . . Cinips de la Galle  
en grappe du  
Chêne. . . . ead.

. . . . . Le Diplolepe du  
Bédégua. . . ead.

. . . . . Le Cin. Porte-Or. ead.

c ij

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Viminalis.	73	Du Saule à feuilles longues.
Viridis.	* 76	Le Verd. <i>Faun. Frid.</i>
TENTHREDO.		MOUCHE-A-SCIE.
Abietis.	91	Du Sapin. . . . .
Albicincta.	* 102	La Cordeliere. <i>Enum.</i>
Albicornis.	* 110	L'Albicorne. <i>F.</i> . . . .
Alneti.	* 105	Des Aulnées. <i>Scop.</i>
Alni.	95	De l'Aulne. . . . .
Americana.	82	L'Américaine. . . . .
Amerinæ.	80	Du Saule pentandrique. .
Annularis.	* 117	L'Annulaire. <i>V.</i>
Annularis.	* 101	L'Annulaire. <i>Enum.</i>
Annulata.	* 86	L'Annulée. <i>F.</i> . . . .
Apicaris.	* 116	La Ferrugineuse. . . .
Astroites.	* 116	L'Etoile d'Or. . . . .
Atra.	94	Le Velours noir. . . .
Betulæ.	* 112	Du Bouleau. <i>Geer.</i> . .
Betulæ.	120	Du Bouleau. . . . .
Bicincta.	97	La double Ceinture.
Bicolor.	* 85	La Bédaude. <i>Enum.</i>
Bifasciata.	* 114	La Bifasciée. <i>Geoff.</i> . .
Blanda.	* 111	L'Agréable. <i>F.</i> . . . .
Cærulescens.	* 115	La Bleuâtre. <i>Geoff.</i> . .
Campestris.	94	La Champêtre.

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . ead.

MOUCHE-A-SCIE. MOUCHE-A-SCIE. TENTHR.

. . . . . Mouche-à-Scie noire avec le milieu du ventre fauve. ead.

. . . . . M.-à-Scie noire à pattes argentées.

. . . . . *Geoff. præced. var.?* ead.

. . . . . ead.

L'Américaine. . . . . ead.

M.-à-Scie , frelon roux. *Lege* 948. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . Mouche-à-Scie fauve-à points jaunes. *Ent. paris.*

. . . . . *Ent. paris.* M.-à-Scie noire à pattes fauves. ead.

M.-à-Scie jaune & noire du Bouleau.

Mouche-à-Scie feticorne rousse , à derriere noir. . . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie à deux bandes jaunes.

. . . . . ead.

. . . . . Mouc.-à-Scie noir-bleuâtre.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Capreæ.	122	Du Saule.- Marceau. . . .
Carbonaria.	99	La Charbonniere. . . .
Cephalotes.	* 83	La Tête-noire. <i>F.</i> . . .
Cerasti.	91	Du Ceriner. . . . .
Ciliaris.	85	La Ciliaire. . . . .
Cincta.	97	La Ceinture. . . . .
Cingulata.	* 107	La Mandarine. <i>Scop.</i> . . .
Connata.	* 84	L'Epaulette. <i>Enum.</i> . . .
Cordata.	* 115	Le Porte-Cœur. <i>Geoff.</i> . .
Costalis.	* 110	La Liserée. <i>F.</i> . . . .
Craffa.	* 102	L'Épaisse. <i>Enum.</i> . . . .
Crocea.	* 113	La Safranée. <i>Geoff.</i> . . .
Cynobasti.	119	Du Rosier. . . . .
Dealbata.	* 104	La Blanchie. . . . .
Depressa.	* 124	L'aplatie. <i>Enum.</i> . . . .
Dorsata.	* 89	Le Dos-Noir. <i>F.</i> . . . .
Enodis.	84	La Violette. . . . .
Erythrogona.	* 105	L'Érythrogone. <i>Enum.</i> . .
Erythrocephala.	117	L'Érythrocéphale. . . .
Fasciata.	82	La Fasciée. . . . .
Femorata.	78	La Difforme. . . . .
Ferruginea.	* 101	La Ferrugineuse. <i>Enum.</i> . .
Flava.	121	La Jaune. . . . .
Flavicornis.	* 103	La Flavicorne. <i>F.</i> . . . .
Fuliginosa.	* 104	La Fuligineuse. <i>Enum.</i> . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .	La Bedeaude du	
	Saule. . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
Mouche-à-Scie de		
la Larve limace. . . . .		ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	Le Frêlon à épau-	
	lettes.	
. . . . .	Mouche - à - Scie	
	Porte-Cœur.	
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	M.-à-Scie fafranée.	
. . . . .	Mouche - à - Scie à	
	jambes variées.	ead.
M.-à-Scie feticorne	M.-à-Scie à ventre	
noire , à ventre	& pattes fauves	
jaune.	& corcelet pa-	
	naché.	
. . . . .	. . . . .	ead.
M.-à-Scie bleue ,		
à ailes bleues. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	M.-à-Scie noire à	
	genoux fauves.	ead.
M.-à-Scie feticor-		
ne , à tête jaune. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
M. - à - Scie frelon	Frêlon noir à	
noir , à grosses	échancrure. . .	ead.
cuisse. <i>Lege 944.</i>		
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Fulvinenia.	* 106	L'Entourée. <i>Enum.</i>
Fulviventris.	* 105	La Précocée. <i>Enum.</i>
Furcata.	* 86	La Fourchue. <i>V.</i>
Germanica.	* 109	L'Allemande. <i>F.</i> . . .
Hæmatodes.	* 105	L'Enfanglantée. <i>Enum.</i>
Hæmorroidalis.	* 23	L'Hémorroïdale. <i>F.</i> . .
Impura.	* 108	La Mulâtre. <i>Scop.</i>
Inanita.	* 125	La Diaphane. <i>V.</i>
Intercus.	121	La Mineuse.
Juniperi.	88	Du Genévrier. . . .
 Labiata.	 * 115	 La Labiée. <i>Geoff.</i> . . .
 Lateralis.	 * 110	 La Latérale. <i>F.</i> . . .
Linearis.	* 124	La Linéaire. <i>Enum.</i>
Livida.	98	La Livide. . . .
 Longicornis.	 * 125	 L'Extraordinaire. . . .
 Longicornis.	 * 125	 La Longicorne. <i>Geoff.</i> .
Lonicæræ.	122	Du Chevre-feuille.
Lucorum.	81	La Sauvage. . . .
Lucorum.	* 123	La Sibylle. <i>F.</i> . . .
Lutea.	79	La Jaune. . . .
 Luteicornis.	 * 108	 La Lutéicorne. <i>F.</i> . . .
4 Maculata.	* 110	La Quádrimaculée. <i>F.</i> .
Maculata.	* 114	La Tachetée. <i>Geoff.</i> .
 Marginata.	 79	 La Bordée. . . .
Mefomela.	93	La Mésomele. . . .
Montana.	* 106	La Montagnarde. <i>Enum.</i>
Morio.	* 111	La Négresse. <i>F.</i> . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie à bouquet. *Ent. parif.* ead.

. . . . . M.-à-Scie noire à pattes & corcelet variés de jaune.

. . . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie à antennes blanches au bout. . . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie à corps alongé. *Ent. par.*

. . . . . M.-à-Scie à longues antennes.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

M.-à-Scie frelon  
jaune. . . . .

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie noire  
à ventre jaune  
noir en haut &  
en bas.

. . . . . ead.

. . . . . Vaga 46.

. . . . . ead.

21ij *Tom. III. NOMENCLATOR*

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
<b>Multifasciata.</b>	*	114	La Rayée. <i>Geoff.</i> . . .
<b>Nassata.</b>		100	L'Écuffonnée. . . . .
<b>Nemoralis.</b>		118	La Faune. . . . .
<b>Nigra.</b>		98	La Noire. . . . .
<b>Nigrata.</b>	*	112	La Noircie. <i>Geer.</i> . . .
<b>Nitena.</b>		82	La Brillante. . . . .
<b>Obscura.</b>	*	84	L'Obscure. <i>F.</i> . . . .
<b>Ochroptera.</b>	*	113	L'Ochroptere. <i>Geoff.</i> . .
<b>Opaca.</b>	*	111	L'Opaque. <i>F.</i> . . . .
<b>Ovata.</b>		95	L'Ovale. . . . .
<b>Padi.</b>		91	Du Prunier à grappe.
<b>Palmata.</b>	*	116	La Palmée. . . . .
<b>Papillofa.</b>	*	112	La Mamelonnée. <i>Geer.</i> .
<b>Pavida.</b>	*	109	La Craintive. <i>F.</i> . . .
<b>Perlata.</b>	*	116	La Perlée. . . . .
<b>Pini-Rufa.</b>	*	88	La Rouffe. <i>D. Geer.</i> . .
<b>Pini-Minor.</b>	*	87	La Petite. <i>D. Geer.</i> . .
<b>Pini.</b>		87	Du Pin. . . . .
<b>Pini.</b>	*	112	Du Pin. <i>De Geer.</i> . . .
<b>Pœcilechroa.</b>	*	110	L'Arlequine. <i>Enum.</i> . .
<b>Populi.</b>		119	Du Peuplier. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

• • • • • Mouche-à-Scie à  
ventre rayé.

• • • • • ead.

• • • • • ead.

Mouche-à-Scie à  
larve noire.

M.-à-Scie bleue à  
jambes jaunes.

• • • • • ead.

• • • • • ead.

• • • • • M.-à-Scie noire  
à ailes jaunes.

• • • • • ead.

Mouche-à-Scie co-  
tonneuse.

• • • • • ead.

• • • • • Mouche-à-Scie aux  
pieds blancs.

M.-à-Scie, à anten-  
nes barbues ; la  
Petite. *Lege* 933,  
t. 35.

M.-à-Scie, à cein-  
ture rousse.

• • • • • ead.

• • • • • M.-à-Scie perlée.  
*Ent. paris.*

Mouche-à-Scie, à  
antennes barbues  
rousses.

Mouche-à-Scie, à  
antennes barbues  
la Petite.

Mouche-à-Scie, à  
antennes barbues;  
la Grande.

M.-à-Scie noire  
à antennes pecti-  
nées. • • • • ead.

M.-à-Scie du sapin.

• • • • • ead.



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . M.-à-Scie à pro-  
longement. *Ent.*  
*paris.*

. . . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie noire  
marquée de jaune  
sur le premier &  
& dern. anneaux  
du ventre.

. . . . . ead.

M.-à-Scie jaune & Mouche-à-Scie du  
noire du Rosier. . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie à points  
jaunes au corce-  
let & milieu du  
ventre fauve.

M.-à-Scie guêpe. M.-à-Scie à quatre  
bandes jaunes. . ead.

M.-à-Scie jaune & M.-à-Scie safran-  
noire du Saule. née à tête noire. ead.

M.-à-Scie des Galles  
rondes du Saule.

M.-à-Scie des Galles  
ligneuses du Saule.

. . . . . ead.

Mouche-à-Scie de  
la Scrophulaire. ead.

Mouche-à-Scie à  
larges pattes. . . . . ead.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Sericea.		82	La Soyeuse. . . . .
Signata.	*	107	La Marquée. <i>Scop.</i>
Signata.	*	123	La Marquée. <i>F.</i> . . .
Solitaria.	*	101	La Solitaire. <i>Enum.</i> . .
Stellata.	*	115	L'Étoile. <i>Geoff.</i> . . .
Sylvatica.		118	La Sauvage. . . . .
Temula.	*	107	Du Perfil. <i>Scop.</i>
Thoracica.	*	116	La Variée. . . . .
Tibialis.	*	117	La Tibiale. <i>V.</i>
Trifasciata.	*	114	La Trifasciée. <i>Geoff.</i> . .
Tristis.	*	83	La Triste. <i>F.</i> . . . .
Ulmi.		121	De l'Orme.
Ustulata.		85	La Brûlée. . . . .
Vafra.		119	La Rufée. . . . .
Vernalis.	*	115	La Printannière. <i>Geoff.</i> .
Vespiformis.	*	103	La Vespiforme. <i>Enum.</i>
Viennensis.	*	103	La Viennoise. <i>Enum.</i>
Viridescens.	*	116	La Verdâtre. <i>Geoff.</i> . .
Viridis.		94	La Verte. . . . .
Virgata.	*	114	La Vergée. <i>Geoff.</i> . . .
Vitellinæ.		81	L'Apothicaire. . . . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*Fab.*

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie noire à  
pattes & milieu  
de ventre fauves.

. . . . . M.-à-Scie noire à  
ventre bordé de  
taches jaunes.

M.-à-Scie félicorne  
noire à pattes  
jaunes. . . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie à pattes  
fauves & taches  
blanch. *Ent. par.*

. . . . . M.-à-Scie à trois  
bandes jaunes.  
. . . . . ead.

M.-à-Scie bleue à  
jambes noires. . . . . ead.  
. . . . . ead.

. . . . . M.-à-Scie noire à  
corcelet rouge.

. . . . . M.-à-Scie noire à  
ventre bordé de  
vert.

. . . . . La Lettre hébraïque  
verte. . . . . ead.

. . . . . Mouche-à-Scie à  
deux bandes noi-  
res sur le ventre.

. . . . . ead.

*D. Linn. Pag. Gall.*

**SIREX.**

**UROCERE.**

Camelus.	* 129	Le Chameau. . . . .
Dromedarius.	* 131	Le Dromadaire. <i>F.</i> . . .
Fantoma.	* 131	Le Fantôme. <i>F.</i> . . .
Fuscicornis.	* 130	Le Fuscicorne. <i>F.</i> . . .
Gigas.	126	Le Géant. . . . .

Juvenus.	128	Le Taureau. . . . .
----------	-----	---------------------

Magus.	* 130	Le Magicien. <i>F.</i> . . .
Mariscus.	129	L'Enflé. . . . .
Pacca.	* 131	L'Étoile. <i>F.</i> . . . .
Pygmæus.	129	Le Pygmée. . . . .
Reflexus.	* 133	Le Réfléchi. <i>V.</i>
Spectrum.	128	Le Spectre. . . . .

Struthiocamelus.	* 132	L'Autruche. <i>V.</i>
Tabidus.	* 132	Le Foible. <i>F.</i> . . . .
Troglodyta.	* 132	Le Troglodyte. <i>F.</i> . . .

**ICHNEUMON.**

**ICHNEUMON.**

Abrogator.	* 183	Le Destructeur. <i>Enum.</i>
Acicularis.	* 214	L'Aiguillette. <i>Geoff.</i> . .
Acuminator.	* 180	L'Aiguiseur. <i>F.</i> . . . .
Acutorius.	* 158	L'Anguleux. <i>V.</i>
Adulator.	* 182	Le Pantomime. <i>V.</i>
Affectator.	* 174	Le Cambré. . . . .

Agricolator.	175	Le Laboureur.
Albatorius.	* 156	Le Blanchi. <i>V.</i>

*D. Geer.*

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

ICHNEUMON-  
BOURDON.

UROCERE.

SIREX.

. . . . .	. . . . .	id.
. . . . .	. . . . .	<i>M.</i> id.
. . . . .	. . . . .	<i>M.</i> id.
. . . . .	. . . . .	<i>M.</i> id.
Ichneum.-Bourdon, à ventre demi- noir & dem. jaune.	L'Urocere. . . .	id.
Ichneum.-Bourdon, noir-bleuâtre luisant.	. . . . .	id.
. . . . .	. . . . .	<i>M.</i> id.
. . . . .	. . . . .	id.
. . . . .	. . . . .	<i>M.</i> id.
. . . . .	. . . . .	id.

Ichneum.-Bourdon, à jambes rouffes.	. . . . .	id.
--	-----------	-----

. . . . .	. . . . .	id.
. . . . .	. . . . .	<i>M.</i> id.

ICHNEUMON. ICHNEUMON ICHNEUMON  
ET CINIPS.

. . . . .	Ichn. l'Aiguillette.	id.
-----------	----------------------	-----

. . . . .	Ichn. noir à pattes postérieures gros- ses & milieu du ventre fauve.	id.
-----------	---	-----

# I. Tom. III. NOMENCLATOR

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Albipes.	*	214	Du Cirfe. <i>Geoff.</i> . . .
Albus.	*	214	Le Blanc. <i>Geoff.</i> . . .
Alveariformis.	*	213	La Ruche. <i>Geoff.</i> . . .
Ambiguorius.	*	157	L'Équivoque. <i>V.</i>
Ambulatorius.	*	139	Le Vagabond. <i>F.</i> . . .
Amictus.	*	203	L'Habillé. <i>F.</i> . . .
Anceps.	*	204	Le Douteux. <i>V.</i>
Annulatorius.	*	149	Ce Jouailler. <i>F.</i> . . .
Aphidum.		208	Des Pucerons. . . . .
Apicarius.	*	189	Le Mélanure. <i>Geoff.</i> . .
Apparitorius.	*	145	Le Bedeau.
Apterus.	*	217	L'Aptere. <i>Geoff.</i> . . .
Apum.	*	211	Le Rufé. <i>D. Geer.</i> . . .
Araneorum.	*	211	Des Araignées. <i>Geer.</i> .
Araneorum.	*	216	Le Hardi. <i>Geoff.</i> . . .
Arlequinatus.	*	191	L'Arlequiné. . . . .
Armatorius.	*	140	Le Fourbisseur. <i>F.</i> . . .
Arrogator.	*	175	Le Vernisseur. <i>F.</i> . . .
Atomus.		210	L'Atome.
Atratorius.	*	142	Le Noir. <i>V.</i>
Basilaris.	*	141	Le Basilaire. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Ichn. noir à corps  
allongé & ovale,  
à jambes d'une  
feuille-morte jau-  
nâtre.

Ichneumon noir à  
pattes blanchâtres.

. . . . .

Ichneumon blanc.

. . . . .

Ichn. à coque en  
forme de rayons  
de ruche.

. . . . .

. . . . . id.  
. . . . . id.

Ichn. des Pucerons.

L'Ichneumon des  
Pucerons. id.

. . . . .

Ichn. jaune à pointe  
du corcelet noir.

. . . . .

Ichn. noir à pattes  
& base des an-  
tennes fauve, &  
femelle sans ailes.

Ichn. noir-verdâtre  
des Abeilles ma-  
çonnes.

Ichn. des Araignées.

. . . . .

Ichn. à anneaux sur  
le ventre, & fe-  
melle sans ailes.

. . . . .

Ichn. à pattes arle-  
quinées. *Ent. par.*

. . . . .

. . . . . id.  
. . . . . id.

. . . . .

Ichneumon. Basilaire.  
*Ent. parif.*

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Bedeguaris.		205	Du Bédéguar. . . . ?
Bicolor.	*	204	Le Bicolor. <i>V.</i>
Bicolor.	*	218	Le Tranché. <i>V.</i>
Bidentorius.	*	150	L'Armé. <i>F.</i> . . . . ?
Bifasciatus.	*	192	Le Bifascié. <i>Geoff.</i> . . .
Bimaculatus.	*	140	Le Bimaculé. <i>Enum.</i>
Bipartitus.	*	142	Le Mi-Parti. . . . ?
Brachyurus.	*	154	Le Court. <i>Enum.</i>
Cælestis.	*	142	Le Céleste. . . . . ?
Cæpæ.	*	192	De l'Oignon. <i>Geoff.</i> . .
Cantator.	*	218	Le Crieur. <i>D. Geer.</i> . . ?
Carpini.	*	217	De la Charmille. <i>Geoff.</i> .
Cavator.	*	196	Le Creusé. <i>V.</i>
Cephalator.	*	195	Le Monstrueux. <i>V.</i>
Cinctipes.	*	187	Le Garotté. <i>D. Geer.</i> . . ?
Cinctorius.	*	151	Le Ceinturonnier. <i>F.</i> . .
Cinctus.		199	L'Entouré. . . . . ?
Circumflexus.	*	199	Le Circonflexe. . . . .
Cirrogafter.		153	Le Cirrogastrique. . . .
Cylindrator.	*	180	Le Rouleur. <i>F.</i> . . . ?
Cynipedis.		207	Des Cynips. . . . .
Coccorum.		207	Des Gallinsectes. . . .
Colorator.	*	196	Le Barbouilleur. <i>V.</i>



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Ichneumon doré du  
Bédéguar.

Le Cinips doré à  
queue, du Bédé-  
guar lisse. . .

*M. id.*

. . . . . id.

. . . . . Ichn. noir à deux  
bandes sur les ailes.

. . . . . Ichn. à ventre mi-  
partie. *Ent. parif.*

. . . . . Ichn. Céleste étoilé.  
*Ent. parif.*

. . . . . Ichn. à pattes, &  
milieu du ventre  
fauves.

*id.*

. . . . . Ichn. à pattes va-  
riées de fauve, &  
femelle fans ailes.

Ichn. noir à tarfes  
jaunes au milieu.

. . . . . id.

. . . . . Ichn. à deux bandes  
sur les ailes. .

*id.*

. . . . . id.

. . . . . Ichn. jaune à tête  
& corcelet noirs,  
avec la pointe  
jaune.

. . . . . id.

. . . . . id.

Ichn. vert à anten-  
nes en massues.

. . . . .

*id.*

*D. Linn.      Pag.      Gall.*

Compunctor.      167    Le Piqueur. . . . .

Compunctator.      \* 180    Le Dangereux. *Enum.*  
Compunctor.      \* 187    Le Traître. *Geoff.* . . . .

Comitator.      159    Le Suivant. . . . .

Conicus.      \* 212    Le Conique. *F.* . . . .  
Consecutorius.      \* 156    Le Découpé. *V.*  
Constrictorius.      137    L'Enchaîné.  
Corculatorius. *Lege f. 3.*    Le Porte-Cœur. *V.*  
- - - -      \* 158  
Coruscator.      166    Le Brillant. . . . .  
Cothurnatus.      \* 163    Le Comédien. *Enum.*  
Coxator.      \* 193    Le Hanché. *V.*  
Crassipes.      \* 188    Le Crassipède. . . . .  
Crispatorius.      138    Le Friseur. . . . .  
Croceatorius.      \* 143    Le Safrané. *V.*  
Cruciator.      \* 197    L'Inquiétant. *V.*  
Culpatorius.      136    Le Méchant. . . . .  
Cunctatorius.      \* 149    Le Temporiseur. *Scop.*  
Curtus.      \* 163    Le Raccourci. *Enum.*  
Debellator.      \* 161    Le Conquérant. *F.* . . .  
Debellator.      \* 184    Le Conquérant. *Enum.*  
Deceptorius.      \* 142    Le Trompeur. *Scop.*  
Decorator.      \* 195    Le Décorateur. *V.*  
Defensorius.      \* 156    Le Spadassin. *V.*  
Deliratorius.      147    L'Extravagant. . . . .

Delusor.      168    Le Moqueur. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

• • • • • Ichn. noir à queue  
de la longueur du  
corps & ventre  
lisse. . . . . *M. id.*

• • • • • Ichn. à pattes fau-  
ves & courte  
queue.

Ichneumon noir. Ichn. noir à an-  
neaux blancs aux  
antennes. . . . . *id.*

• • • • • *id.*

• • • • • *id.*

• • • • • Ichneumon Sphecx. *id.*

• • • • • *id.*

• • • • • *id.*

• • • • • Ichn. noir à pieds  
rougeâtres , &  
pointe du corce-  
let blanche. . . . . *id.*

• • • • • I. noir à pattes &  
mil. du vent. fauves  
& p. de derr. noirs. *id.*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Denigrator.	165	Le Ramoneur. . . . .
Dentatus.	* 200	Le Défendu. <i>F.</i> . . . .
Depressator.	* 196	L'Aplati. <i>V.</i>
Desertor.	165	Le Déserteur. . . . .
Designatorius.	147	L'Ordonnateur. . . . .
Dimidiator.	* 162	Le Tailleur. <i>F.</i> . . . .
Dumetorum.	* 164	Des Buiffons. <i>Geoff.</i> . .
Edictorius.	147	Le Crieur. . . . .
Elegantulus.	* 181	L'Élégant. <i>Enum.</i>
Elongator.	* 175	L'Alongé. <i>F.</i> . . . .
Enervator.	171	Le Languissant.
Exarator.	169	Le Traceur. . . . .
Excitator.	* 185	L'Excitateur. <i>Scop.</i>
Exhortator.	* 162	L'Incitateur. <i>F.</i> . . . .
Extensor.	169	Le Filiforme. . . . .
Extensorius.	135	Le Coureur. . . . .
Extricator.	* 193	Le Développé. <i>V.</i>
Falcator.	* 173	Le Faucheur. <i>F.</i> . . . .
Falcatorius.	* 151	Le Faucheur. <i>F.</i> . . . .
Falculator.	* 194	Le Moissonneur. <i>V.</i>
Falsator.	* 164	Le Déguisé. <i>V.</i>
Fasciator.	* 175	L'Interrompu. <i>F.</i> . . . .
Fasciatorius.	* 149	Le Fascié. <i>F.</i> . . . .
Fasciatus.	* 192	Le Fascié. . . . .
Fasciatus.	* 205	Le Fascié. . . . .
Femoralis.	* 188	Le Gorgé. <i>Geoff.</i> . . . .



<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Femoratus.	* 204	L'Hydropique. V.
Ferrugineus.	* 141	Le Rouillé. <i>Enum.</i>
Fischeri.	* 163	Le Fischer. <i>Enum.</i>
Flavipes.	* 191	Le Flavipede. . . . 1
Flavifrons.	* 182	Le Distingué. <i>Enum.</i> . . 2
Fomentator.	171	Le Baigneur. . . . 3
Forcipatus.	* 203	Le Taillandier. V.
Formicatus.	200	La Fourmi. . . . .
Fornicator.	* 176	Le Voûté. <i>F.</i> . . . .
Fossorius.	148	Le Fossoyeur. . . . .
Fraudatorius.	* 144	Le Courtifan. V.
Funereus.	* 141	Le Funebre. <i>Geoff.</i> . . .
Fuscatus.	* 200	Le Rembruni. <i>F.</i> . . . .
Fuscornis.	* 215	Le Fuscorne. <i>D. Geer.</i>
Fuscus.	148	Le Brun. . . . .
Fusorius.	148	Le Frondeur. . . . .
Gallarum.	206	Des Galles. . . . .
Geniculatus.	* 188	Le Géniculé. <i>Geoff.</i> . . .
Gladiator.	* 161	Le Gladiateur. <i>Scop.</i> . .
Glaucopterus.	* 199	Le Glaucoptere. . . . .
Globatus.	209	Le Tourneur. . . . .
Globiceps.	* 211	Le Globuleux. <i>D. Geer.</i> . .
Glomeratus.	210	Le Fileur. . . . .
Gravidator.	172	Le Fécond. . . . .
Gregarius.	* 213	Le Social. <i>Enum.</i> . . . .
Illecebrator.	* 194	L'Attrayant. V.



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

• • • • •	Ichn. à ventre fauve & pattes jaunes. <i>Ent. parif.</i>	
• • • • •	Ichn. noir à pattes fauves & devant de la tête jaune.	
• • • • •		<i>M. id.</i>
• • • • •		<i>id.</i>
• • • • •		<i>id.</i>
• • • • •		<i>id.</i>
• • • • •	Ichn. noir avec la pointe du corce- let & le milieu des antennes blancs.	
• • • • •		<i>id.</i>
Ichn. non ailé , à antennes brunes.	• • • • •	<i>Agilis.</i>
• • • • •	<i>i</i> • • • • •	<i>id.</i>
• • • • •		<i>id.</i>
• • • • •	Ichn. noir à pattes fauves & genoux blancs.	
• • • • •		<i>id.</i>
Ichn. à coton blanc.	Ichn. à coton blanc.	<i>id.</i>
Ichn. verd - doré à tête ronde.		
Ichneumon noir à jambes jaunes.	Ichn. à coton jaune.	<i>id.</i>
• • • • •		<i>id.</i>

ix      *Tom. III. NOMENCLATOR*

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Imitator.	*	197	L'Analogue. <i>V.</i>
Impositor.	*	186	L'Impositeur. <i>Scop.</i> . . .
Impregnator.	*	183	L'Ébaucheur. <i>Enum.</i> . . .
Impugnator.	*	183	Le Hardi. <i>Enum.</i> . . .
Incrassatorius.	*	158	Le Crafficorne. <i>V.</i> . . .
Incubitor.		160	Le Pareffeux. . . . .
Inculcator.		172	Le Paveur. . . . .
Inflammatorius.	*	143	L'Enflammé. <i>V.</i> . . .
Infractorius.		136	Le Destructeur. . . . .
Inguinalis.	*	154	L'Alongé. <i>Geoff.</i> . . .
Inquisitor.	*	185	L'Enquêteur. <i>Scop.</i> . . .
Insector.	*	184	L'Insecteur. <i>Enum.</i> . . .
Insignitor.	*	164	Le Remarquable. <i>V.</i> . . .
Intercus.	*	213	Le Mineur. <i>Enum.</i> . . .
Inversus.	*	191	L'Inverse. <i>Geoff.</i> . . .
Irrorator.	*	178	Le Jardinier. <i>F.</i> . . .
Jaculator.		173	L'Archer. . . . .
Junci.	*	155	Du Jonc. <i>Geoff.</i> . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . Ichn. noir à ventre  
couleur de cerise.

. . . . . Ichn. noir à ventre  
& pattes fauves,  
& anneau blanc  
aux antennes. . id.

. . . . . Ichn. noir à pattes  
& ventre fauves. id.

. . . . . id.  
. . . . . Ichn. noir à pattes  
fauves & points  
blancs à la base  
des cuisses.

. . . . . Ichn. noir à pattes  
antérieures ci-  
tronnées & ventre  
fauve en dessous.

. . . . . Ichn. noir à plaque  
de poils bruns sur  
le ventre. . . id.

I. noir à antennes Ichn. tout noir à  
courtes & gros- pattes postérieu-  
ses & jambes pos- res très-longues  
térieures longues & grosses. . . id.  
& très-grosses.

. . . . . Ichn. noir à pointe  
du corcelet jaune,  
pattes & milieu  
du ventre fauve.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Melanophthalmus.	* 203	Le Melanophthalme. <i>Enum.</i>
Melanops.	* 201	Le Bruni. <i>Enum.</i>
Melanopteros.	* 189	Le Mélanoptère. <i>Geoff.</i>
Menfurator.	* 177	Le Mefureur. <i>F.</i> . . .
Migrator.	* 162	Le Paffager. <i>F.</i> . . .
Moderator.	170	Le Modérateur. . . .
Molitorius.	137	L'Entrepreneur. . . .
Mofchator.	* 179	Le Parfumeur. <i>F.</i> . . .
Motatorius.	* 139	L'Inconfant. <i>F.</i> . . .
Mufcarum.	205	Des Mouches. . . .
Mutillarius.	* 201	Le Mutille. <i>F.</i> . . .
Mutillarius.	* 217	Le Mutillaire. <i>F.</i> . . .
Myftacatus.	* 183	Le Grenadier. <i>Enum.</i>
Necator.	* 179	Le Meurtrier. . . .
Niger.	* 214	Le Noir. <i>Geoff.</i> . . .
Nigro-Caudatus.	* 187	Le Caudataire. <i>De Geer.</i>
Nigroculus.	* 202	Le Noirci. <i>Enum.</i>
Notatorius.	* 159	Le Marqueur. <i>V.</i> . . .
Obfufcator.	* 197	L'Obscurci. <i>V.</i> . . .
Obfcurus.	* 189	L'Obscur. <i>Geoff.</i> . . .
Occifor.	* 184	Le Boucher. <i>Enum.</i>
Ochrocephalos.	* 214	L'Ochrocéphale. <i>Geoff.</i>
Oculator.	* 177	L'Oculifte. <i>F.</i> . . .
Ofculatorius.	* 151	L'Ofculateur. <i>F.</i> . . .
Ovulorum.	209	Des Œufs. . . .
Pectinicornis.	210	Le Pectiné. . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Guêpe - Ichneumon  
des chemins.

Ichn. noir avec les  
trois anneaux an-  
térieurs du ven-  
tre rougeâtre, &  
les ailes noires.

ead.

. . . . .

Guêpe dorée à cor-  
celet vert & der-  
niers anneaux du  
ventre lisses. .

ead.

Guêpe dorée-bleue  
à tache noire. .

. . . . .

ead.

. . . . .

. . . . .

ead.

. . . . .

Guêpe dorée-verte.

ead.

. . . . .

. . . . .

ead.

. . . . .

Guêpe dorée à cor-  
celet vert & der-  
niers anneaux du  
ventre épineux.

ead.

Guêpe dorée à ven-  
tre cramoisi.

Guêpe dorée à cor-  
celet vert & der-  
niers anneaux du  
ventre épineux.

ead.

. . . . .

. . . . .

*M.* ead.

. . . . .

Guêpe dorée à cor-  
celet mi-partie de  
rouge & de vert.

ead.

. . . . .

. . . . .

*M.* ead.

. . . . .

. . . . .

ead.

. . . . .

. . . . .

. . . . .

G. dorée-verte. An?

*D. Linn. Pag. Gall.*

V E S P A.

Abbreviata.	* 281	La Courte. V.
Arvensis.	269	La Campagnarde. . . .

Bicincta.	* 280	La Cordeliere. V.
Bidens.	271	L'Epineuse. . . . .
Bifasciata.	270	La Bifasciée. . . . .
Biglumis.	271	L'Armée. . . . .
Bipunctata.	* 276	La Biponctué. F. . . .
Campestris.	270	La Champêtre. . . . .
Ciliata.	* 283	La Ciliée. V.
6-Cincta.	* 278	La Cordée. F. . . . .
5-Cincta.	* 283	La Chinoise. V. . . .
Chrysoptera.	* 284	La Chrysoptere. V.
Chrysoptera-Armata.	* 284	La Chrysoptere. V.
Coarctata.	268	L'Étranglée. . . . .

Crabro.	262	Le Frelon. . . . .
Crabro medius.	* 273	Le moyen Frelon. <i>De Geer.</i>
Dimidiata.	* 278	La Bedeaud. F. . . .
Gallica.	266	La François. . . . .

Hirsutissima.	* 284	La Velue. V.
Histris.	* 282	L'Arlequine. V.
Ligata.	* 280	L'Enchaînée. <i>Faun. Frid.</i>
Lunulata.	* 285	Les Lunules. V.
Maculata.	* 274	La Tachetée. <i>Scop.</i>
Minuta.	272	La Petite. . . . .
Muraria.	267	Des Murailles. . . . .
Nigricornis.	* 283	La Nigricorne. V.
Norwegica.	* 275	La Norvégienne. F. . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Guêpe - Ichneumon  
à filet bossu.

Guêpe à premier  
anneau du ventre  
en poire & trois  
bandes jaunes. .

*ead.*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

*ead.*

*ead.*

*ead.*

*ead.*

*ead.*

. . . . .  
. . . . .

*Grabro 7.*  
*M. Crab. II.*

. . . . .  
Grand Frelon.  
Moyen Frelon.

Guêpe à premier  
anneau du ventre  
en poire & le se-  
cond en cloche.

*ead.*

La Guêpe-Frelon.

*ead.*

. . . . .  
. . . . .

*Crabro 12.*

Guêpe à anneaux  
bordés de jaune  
& deux taches  
jaunes. . . .

*ead.*

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

*M. Chalc. 3.*  
*ead.*

*ead.*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Oculata.	* 275	L'Oculée. <i>F.</i> . . . .
Parietina.	272	La Menuifiere. . . . .
Parietum.	265	Des Cloifons. . . . .
2-Pustulata.	* 280	La Bipustulée. <i>V.</i>
6-Pustulata.	* 281	La Sixpustulée. <i>V.</i>
Rufa.	264	La Rouffe. . . . .
Ruficornis.	* 278	La Ruficorne. <i>F.</i> . . . .
Sexfasciata.	* 276	La Sixfasciée. <i>F.</i> . . . .
Spinipes.	267	La Porte-Épine. . . . .
Subterranea.	* 277	La Gnome. <i>F.</i> . . . .
Sylvestris.	* 274	La Sauvage. <i>Scop.</i>
Triangulum.	* 276	La Dorfale. <i>F.</i> . . . .
Tricincta.	* 279	La Bizarre. <i>Enum.</i>
Tricuspидata.	* 280	La Trompeuse. <i>V.</i>
Tridens.	* 275	Le Trident. <i>F.</i> . . . .
Tridentata.	* 277	L'Armée. <i>F.</i> . . . .
Trifasciata.	* 279	La Trifasciée. <i>F.</i> . . . .
Unguiculata.	* 282	L'Onguiculée. <i>V.</i>
Uniglumis.	271	La Redoutable. . . . .
Vulgaris.	263	La Vulgaire. . . . .

A P I S.

Acervorum.	325	Des Monceaux. . . . .
Ænea.	291	La Bronzée. . . . .
Agilissima.	* 301	L'Agile. <i>Enum.</i>
Agrestis.	* 317	La Rustique. <i>F.</i> . . . .
Agrorum.	* 328	La Campagnarde. <i>Enum.</i>
Agrorum.	* 328	Des Champs. <i>F.</i> . . . .
Alpides.	* 313	L'Alpiede. <i>F.</i> . . . .
Alpina.	325	L'Alpine.

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

ead.

Guêpe à cinq ban-  
des jaunes sur le  
ventre , la pre-  
miere éloignée  
des autres.

ead.

ead.

*M. Bembex.*

9.

ead.

ead.

Crabro 4.

ead.

ead.

Crabro 1.

*M.* ead.

Crabro 16.

Guêpe commune.

ead.

ead.

Abeille verdâtre &  
cuivreuse.

*Andrena* 3.

*M. Noma-*  
*da* 3.

*M.* ead.

ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Annulata.	297	La Musquée. . . . .
Argillacea.	* 329	L'Architecte. <i>Scop.</i> . . .
Atra.	* 306	Le Velours noir. <i>Scop.</i>
Bicineta.	* 305	La Cordeliere. <i>Enum.</i>
Bicolor.	* 329	La Bicolor. <i>Enum.</i> . . .
Bicolor.	* 315	La Bicolor. <i>F.</i> . . . . .
Bicornis.	288	Le Diable. . . . .
Brachiptera.	* 331	La Brachiptere. <i>V.</i>
Bryorum.	* 299	La Maçonne. <i>Enum.</i> . . .
Cærulea.	* 319	La Bleue. <i>V.</i>
Cærulescens.	291	La Bleuâtre. . . . .
Calcarata.	* 308	L'Éperonnée. <i>Scop.</i>
Carbonaria.	287	La Charbonniere.
Cariosa.	298	La Dépravée.
Centuncularis.	237	La Menuisiere. . . . .
Cetii.	* 300	La Soufflée. <i>Enum.</i>
Cineraria.	287	La Cendrée. . . . .
Cingulata.	* 314	L'Entourée. <i>F.</i> . . . . .
Clavicornis.	286	La Clavicorne.
Cœcutiens.	* 312	Le Lynx. <i>F.</i> . . . . .
Collium.	* 330	Des Collines. <i>Scop.</i>
Conica.	297	La Conique. . . . .
Convexa.	* 299	La Convexe. <i>Enum.</i>
Cryptarum.	* 325	Des Cavernes. <i>F.</i> . . . .
Cunicularia.	294	La Mineuse. . . . .
4-Dentata.	296	La Quadridentée. . . . .
Elongata.	318	L'Alongée. <i>V.</i>
Fabriciana.	290	La Fabricius. . . . .
Farfarsequa.	* 307	Du Tussilage. <i>Scop.</i>
Ferruginata.	298	La Rouillée.
Ferruginea.	* 316	La Ferrugineuse. <i>F.</i> . . .
Flavipes.	* 317	La Flavipede. <i>F.</i> . . . .
Florentina.	* 310	La Florentine. <i>F.</i> . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Lege *Fab. 8. f. 30.* . . . . . ead.

. . . . . Abeille noire à ventre fauve.

. . . . . *Andrena* 4. ead.

. . . . . Abeille-Maçonne à poils roux.

. . . . . *Andrena* 1.

. . . . . Abeille Charpen-  
tiere à ventre  
velu & roux en-  
dessous. . . .

ead.

. . . . . ead.

. . . . . *Nomada* 8,

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . *M.* ead.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . *Nomada* 5.

. . . . . *M.* ead.

. . . . . *M.* ead.

. . . . . ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Florifomnis.	289	La Sybarite. . . . .
Frontalis.	* 330	La Frontale. V.
Fulva.	* 329	La Fauve. <i>Enum.</i>
Fulvipes.	* 320	La Fulvipede. V.
Fulviventris.	* 305	La Bedeaude. <i>Enum.</i> . . .
Fufcescens.	* 320	La Brunette. V.
Gallica.	* 319	La Françoisse. V.
Gibba.	* 314	La Bossue. <i>F.</i> . . . .
Hæmorrhœa.	* 310	La Rouillée. <i>F.</i> . . . .
Hæmorrhoidalis.	* 315	L'Hémorrhoidale. <i>F.</i> . . .
Hattorfiana.	* 314	L'Hattorf. <i>F.</i> . . . .
Helvola.	290	La Rougeâtre. . . . .
Hemisphærica.	* 305	L'Hémisphérique. <i>Enum.</i>
Hirsuta.	* 327	La Hérissée. <i>F.</i> . . . .
Hirta.	* 301	La Mandarine. <i>Enum.</i>
Hispanica.	* 327	L'Espagnole. <i>F.</i> . . . .
Hortensis.	* 318	La Jardinière. <i>Geoff.</i> . . .
Hortorum.	322	Des Jardins. . . . .
Hypnorum.	324	Des Hypnes. . . . .
Interrupta.	* 311	L'Interrompue. <i>F.</i> . . . .
Interrupta.	* 318	La Fasciculée. . . . .
Ireos.	* 310	De l'Iris. <i>F.</i> . . . .
Labiata.	* 314	La Labiée. <i>F.</i> . . . .
Lagopoda.	295	La Lagopode. . . . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

ead.

Abeille noire à ventre brun & lisse.

*Nomada* 6.

ead.

*Andrena* 13.

ead.

*Andrena* 5.

*M.* ead.

*M.* ead.

Abeille à pattes jaunes & anneaux du ventre blancs.

Ab. à couronne du corcelet citron & extrémité du ventre mi-partie de citron & blanc.

ead.

Ab. à couronne & extrémité du corcelet & haut du ventre citron & l'extrém. du ventre blanche ?

ead.

ead.

Abeille à houppe blanche. *Ent. paris.*

ead.

*Andrena* 2.

ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Lapidaria.	323	Des Pierres. . . . .
Leucostoma.	* 300	Le Demi-Deuil. <i>Enum.</i>
Leucozonia.	* 300	L'Hermipée. <i>Enum.</i>
Lineata.	* 317	La Rayée. <i>F.</i> . . . .
Lingularia.	* 313	L'Horrible. <i>F.</i> . . . .
Longicornis.	285	La Longicorne. . . . .
Lucorum.	324	Des Taillis. . . . .
Luctuosa.	* 299	Le Deuil. <i>Enum.</i>
Lunulata.	* 320	La Turque. <i>V.</i>
Maculata.	* 311	La Tachetée. <i>F.</i> . . . .
Manicata.	296	Les Manchettes. . . . .
Marginata.	* 314	La Bordée. <i>F.</i> . . . .
Maxillofa.	289	La Formidable. . . . .
Mellifica.	231	L'Abeille. . . . .
Minuta.	* 306	La Petite. <i>Enum.</i>
Mniorum.	* 327	Des Mnies. <i>F.</i> . . . .
Montana.	* 308	La Montagnardé. <i>Scop.</i>
Muraria.	* 317	La Solitaire. <i>Geoff.</i> . .
Muscorum.	324	De la Mouffe. . . . .
Nemorum.	* 326	La Sauvage. <i>F.</i> . . . .
Nemorum.	* 330	Des Bois. <i>Scop.</i>
Pascuorum.	* 330	Des Pâturages. <i>Scop.</i> . .
Pilipes.	* 309	L'Aigrette. <i>F.</i> . . . .
Præcox.	* 308	La Printannière. <i>Scop.</i>
Pratorum.	322	Des Prés. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .	Ab. noire avec les derniers anneaux du ventre fauves.	ead.
. . . . .		
. . . . .		<i>M. Noma-</i>
. . . . .		da 3.
. . . . .	Abeille à longues antennes. . .	ead.
. . . . .		ead.
. . . . .		ead.
. . . . .		ead.
. . . . .	A. à cinq crochets.	ead.
. . . . .		Andrena 4.
. . . . .		ead.
. . . . .	Abeille domestique ou des ruches. .	ead.
. . . . .		ead.
. . . . .		ead.
. . . . .	Abeille bleuâtre à ailes nébuleuses.	
. . . . .	Abeille fauve à ventre jaune & extrémité fauve.	ead.
. . . . .		ead.
Lege t, 8. f. 27.		
. . . . .	Ab. grise à levres jaunes & à houp- pe aux pattes du milieu. An ?	ead.
. . . . .	A. noire à couronne du corcelet citron & extrémité du ventre fauve. .	Arbustorum.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Pratorum.	* 326	Des Prairies. <i>F.</i> . . . .
Pubescens.	* 312	La Cotonneuse. . . . .
Punctata.	* 312	La Ponctué. <i>F.</i> . . . .
Purpurascens.	* 319	La Pourprée. <i>V.</i> . . . .
Quadricincta.	* 312	La Quadrifasciée. <i>F.</i> . . . .
Quadrifasciata.	* 319	La Quadrifasciée. <i>V.</i> . . . .
Retusa.	288	L'Émouffée. . . . .
Riparia.	* 307	Des Rivages. <i>Scop.</i> . . . .
Rostrata.	294	Le Museau. . . . .
Rotundata.	* 315	L'Arrondie. <i>F.</i> . . . .
Ruderata.	* 326	Des Gravier. <i>F.</i> . . . .
Rufa.	* 328	La Rouffe. <i>Enum.</i> . . . .
Rufa.	288	La Rouffe. . . . .
Ruficornis.	298	La Ruficorne. . . . .
Rufipes.	* 316	La Rufipede. <i>F.</i> . . . .
Sabulosa.	* 307	La Pressée. <i>Scop.</i> . . . .
Sanguinolenta.	* 306	La Sanguinolente. <i>Enum.</i> . . . .
Scutellaris.	* 313	L'Écussonnée. <i>F.</i> . . . .
Seminuda.	* 327	La Semi-Velue. <i>F.</i> . . . .
Senilis.	* 327	La Vieille. <i>F.</i> . . . .
Sibirica.	* 326	La Sibérienne. <i>F.</i> . . . .
Sordida.	* 306	La Tachée. <i>Scop.</i> . . . .
Soroeensis.	* 326	La Dancise. <i>F.</i> . . . .
Sphegoides.	* 303	La Sphégoïde. <i>Enum.</i> . . . .
Subterranea.	325	La Gnome. . . . .
Succincta.	290	La Rubanée. . . . .
Sylvarum.	323	Des Forêts. . . . .
Sylvarum.	* 329	Des Forêts. <i>Scop.</i> . . . .
Terrestris.	341	La Terrestre. . . . .
Thoracica.	* 315	L'Ardente. <i>F.</i> . . . .
Trispinosa.	* 316	L'Épineuse. <i>F.</i> . . . .

<i>D. Geer.</i>	<i>D. Geoff.</i>	<i>D. Fab.</i>
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	Bembex 3.
.	.	M. ead.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	Nomada 4.
.	.	M. ead.
.	.	Thoracica ?
.	.	Nomada 2.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	ead.
.	.	Andrena 13?
.	.	ead.
.	Ab. noire à ventre brun vers l'ex- trémité. . . .	ead.
.	Ab. mineuse à cor- celet roux & velu.	Andrena 18.
.	.	ead.
.	Ab. à couronne du corcelet & haut du ventre citron & l'extrémité du ventre blanche.	ead. ead. M. ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Truncorum.	289	Des Cloisons.
Tumulorum.	286	Des Tombeaux. . . . .
Variegata.	* 311	La Variée. <i>F.</i> . . . .
Variegata.	294	La Variée. . . . .
Vespiformis.	* 304	La Vespiforme. <i>Enum.</i>
Vespoïdes.	* 302	La Vespoïde. <i>Enum.</i>
Violacea.	321	La Violette. . . . .

### FORMICA.

Cespitum.	336	Des Gazons. . . . .
Didyma.	* 338	La Doublée. <i>F.</i> . . . .
Flava.	* 338	La Jaune. <i>Geer.</i> . . . .
Flavipes.	* 337	La Flavipede. <i>Geoff.</i> . . .
Fusca.	334	La Brune. . . . .
Fuscoptera.	* 337	La Bedeaude. <i>Geoff.</i> . . .
Herculeana.	332	L'Hercule. . . . .
Nigra.	334	La Noire. . . . .
Obsoleta.	335	La Passée. . . . .
Pratensis.	* 338	Des Prés. <i>D. Geer.</i> . . . .
Pubescens.	* 338	La Velue. <i>F.</i> . . . .
4-Punctata.	337	La Ponctué. . . . .
Rubra.	335	La Rouge. . . . .
Rufa.	332	La Rouffe. . . . .
Tuberum.	* 339	La Nouée. <i>F.</i> . . . .
Vaga.	* 339	La Vagabonde. <i>Scop.</i>
Viatica.	* 339	Des Chemins. <i>F.</i> . . . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

[illegible]

Abeille Gigantesq. Abeille Perce-Bois. ead.

Fourmi brune à								
aiguillon. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	ead.
. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	ead.
Fourmi jaune. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	ead.

Fourmi jaune . . . . .	Fourmi noire à antennes & pattes jaunes.	ead.
Grande F. noire. . . . .	F. toute brune.	ead.
. . . . .	Grande Fourmi à ailes à moitié brunes.	

.	.	.	.	.	.	.	.	.	e ad.
Pet.	Fourmi	noire.	Fourmi	toute	noire.				e ad.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	e ad.
e ad.	<i>Lege</i>	1080.							

Fourmi rougeâtre à	ead.
aiguillon.	ead.

Grande Fourmi des bois.	Fourmi brune à corcelet fauve. .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.

..... M. ead.

MUTILLA.

Acarorum.	341	Des Tiquès. . . . .
Arenaria.	* 342	Des Sablonnières. . . . .
Argentata.	* 343	L'Argentée. V. . . . .
Calva.	* 343	La Chauve. V. . . . .
Europæa.	346	L'Européenne. . . . .
Formicaria.	342	La Fourmi. . . . .
Halenfis.	* 342	De Hall. F. . . . .
Maura.	341	La Maure. . . . .
Melanocephala.	* 344	La Mélanocéphale. V. . . . .
Rufipes.	* 342	La Rufipede. F. . . . .

DIPTERA.

OESTRUS.

Bovis.	345	Des Bœufs. . . . .
Elaphi.	* 349	Du Cerf. Enum.
Hæmorrhoidalis.	347	L'Hémorrhoidal. . . . .
Lineatus.	* 349	Le Rayé. V.
Nafalis.	347	Le Nafal. . . . .
Ovis.	348	Des Moutons. . . . .
Tarandi.	346	Des Rennes. . . . .

TIPULA.

Agarici.	* 393	De l'Agaric. D. Geer. .
Albimana.	* 367	La Gantée. F. . . . .
Amphibia.	* 394	L'Amphibie. D. Geer. .
Annulata.	361	L'Entourée. . . . .
Annulata.	374	L'Annulaire. . . . .
Arundineti.	364	Des Roseaux. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Ichn. roux non-ailé  
à antennes noires. . . . . Ichn. 128.  
M. ead.  
Lege f. 33.

. . . . . ead.  
. . . . . Ichn. 130.  
. . . . . ead.  
. . . . . ead.  
. . . . . M. ead.

Oestre des tumeurs Oestre des Bœufs. id.  
du Bœuf.

Oestre de l'intestin L'Oestre du fonde-  
du Cheval. ment des Chevaux. id.

. . . . . id.  
. . . . . Oestre des Moutons. id.  
. . . . . id.

Tipule de l'Agaric  
à antennes fili-  
formes.

. . . . . M. ead.  
Tipule amphibie.

. . . . . ead.  
. . . . . Cineta 41.  
. . . . . ead.

*Insect. Tom. IV.*

g

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Atomata.	* 403	La Ponctuéée. <i>Faun. Frid.</i>
Atrata.	360	La Prolongée. . . . .
Aurea.	* 372	La Dorée. <i>Faun. Frid.</i>
Barbicornis.	365	La Demi-Panachée.
Berberina.	* 392	De l'Épine-Vinette. <i>Enum.</i>
Bifasciata.	* 369	La Bifasciée. <i>Enum.</i>
Bilineata.	* 403	La Doublée. <i>Faun. Frid.</i>
Bimaculata.	361	La Bimaculée. . . . .
Bipunctata.	386	La Biponctuéée.
Boleti.	* 371	Du Bolet. <i>Scop.</i>
Brevicornis.	379	La Bordée. . . . .
Buxi.	* 399	Du Bouis. <i>Geoff.</i> . . . .
Chrysanthem.	* 391	Du Chrysantheme. <i>F.</i> . . .
Cimicoides.	* 371	La Cimicoïde. <i>Scop.</i>
Cinerea.	* 366	La Cendrée. <i>F.</i> . . . .
Conica.	* 398	La Conique. <i>Geoff.</i> . . . .
Contaminata.	357	La Tachée. . . . .
Convallium.	* 400	Du Muguet. <i>Scop.</i>
Cornicina.	349	La Bruyante. . . . .
Crocata.	354	La Safranée. . . . .
CrySTALLINA.	* 394	La Cristalline. <i>D. Geer.</i> . . .
Culiciformis.	385	Le Culiciforme. . . . .
Culiciformis.	* 394	Tipule-Cousin. <i>D. Geer.</i> . . .
Degener.	* 401	L'Intruse. <i>Scop.</i>
Dorsalis.	* 366	La Dorsale. <i>F.</i> . . . .
Ensicornis.	363	L'Ensicorne.
Erythrocephala.	* 396	L'Érythrocéphale. <i>D. Geer.</i>

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Tipule-Ichneumon. . . . . ead.

Tipule à ailes à  
deux taches. . . . . ead.

Tip. à ventre jaune. . . . . ead.

. . . . . Scatopse du Bouis.

. . . . . *M.* ead.

. . . . . ead.

. . . . . Tipule noire à ailes  
noires.

. . . . . Tip. noire à taches  
jaunes & ailes  
maculées. . . ead.

Tipule jaune tache-  
tée de noir. Tip. jaune à points  
noirs , rangés en  
trois bandes sur  
le ventre. . . ead.

Tipule à bandes  
jaunes. Tipule variée de  
brun , de jaune  
& de noir. . . ead.

Tipule de la Larve  
cristalline.

. . . . . ead.

Tirule Culiciforme.

. . . . . ead.

Tipule à grande  
tête rouge.

C      *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Fasciata.	* 397	La Verte. <i>Gcoff.</i> . . .
Fasciata.	* 400	La Fasciée. <i>Scop.</i>
Fasciata.	362	La Fasciée. . . . .
Fasciculata.	* 388	La Fasciculée. <i>F.</i> . . .
Febrilis.	380	La Dépravée. . . . .
Fenêtralis.	* 401	Des Fenêtres. <i>Scop.</i>
Ferruginata.	379	La Rouillée. . . . .
Ferruginea.	* 400	La Ferrugineuse. <i>Scop.</i>
Flabellicornis.	* 389	L'Éventail. <i>F.</i> . . . .
Flavescens.	362	La Jaunâtre. . . . .
Flavicans.	* 403	La Flavipede. <i>F.</i>
Flavipes.	* 367	La Flavipede. <i>F.</i> . . .
Flexilis.	375	La Souple. . . . .
Florilega.	381	La Flore. . . . .
Forcipata.	* 390	La Prolongée. <i>F.</i> . . .
Fungorum.	* 393	Des Champignons. <i>D. Geer.</i>
Fulvipennis.	* 370	L'Aile fauve. <i>D. Geer.</i> .
Geniculata.	* 391	L'Agenouillée. <i>F.</i> . . .
Gramina.	* 399	Des Graminées. <i>Scop.</i>
Hemerobioides.	* 401	L'Hémérobioïde. <i>Scop.</i>
Hiemalis.	* 393	L'Hiemale. <i>D. Geer.</i> . .
Hirta.	383	La Hérissée. . . . .
Hortorum.	356	La Jardinière. . . . .
Hortulana.	381	La Jardinière. . . . .
Johannis.	379	La Saint-Jean. . . . .
Juniperina.	384	Du Génévrier. . . . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .	Tip. verte à bandes transverses sur les ailes.	
. . . . .		ead.
. . . . .		ead.
. . . . .	Le Bibion de Saint- Marc , noir. .	ead.
. . . . .		Brevicornis.
. . . . .		ead.
. . . . .		ead.
. . . . .		<i>M.</i> ead.
. . . . .	Tipule à pattes en forme d'antennes sans anneaux. .	ead.
. . . . .	Le Bibion de Saint- Marc , rouge.	
. . . . .		ead.
Tipule des Cham- pignons.		
Tip. à ailes fauves.		
. . . . .		<i>M.</i> ead.
Tipule d'hiver.		
Tipule hérissée.	Bibion à ailes fran- gées & couvertes de taches nébu- leuses. . . .	ead.
Tipule des jardins.	. . . . .	ead.
. . . . .	Bibion de Saint- Marc , rouge. .	ead.
Tip. de Saint-Jean.	. . . . .	ead.
Tipule des Galles du Génévrier. .	. . . . .	ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Ichneumonea.	* 392	L'Ichneumon. <i>Enum.</i>
Idriensis.	* 370	D'Idria. <i>Scop.</i>
Immaculata.	* 398	L'Immaculée. <i>Geoff.</i> . .
Incarnata.	385	L'Incarnat.
Inquieta.	* 400	L'Inquiète. <i>Scop.</i>
Iris.	* 402	L'Iris. <i>Faun. Frid.</i>
Labacensis.	* 401	La Jaune. <i>Scop.</i>
Lacustris.	* 399	Des Lacs. <i>Scop.</i>
Latrinarum.	* 396	Des Latrines. <i>D. Geer.</i> .
Lineata.	* 403	La Rayée. <i>Faun. Frid.</i>
Littoralis.	373	La Maritime. . . . .
Longicornis.	386	La Longicorne. . . . .
Loti.	* 396	Du Lotier. <i>D. Geer.</i> . .
Lunata.	358	La Lunule. . . . .
Macrocephala.	377	La Macrocéphale. . . .
Maculata.	* 370	La Tachetée. <i>D. Geer.</i> .
Marci.	377	La Saint-Marc. . . . .
Marcifulvipes.	* 396	De Saint - Marc à cuisses rouffes. <i>D. Geer.</i> . .
Minutissima.	387	L'Imperceptible.
Monilis.	376	La Cerclée. . . . .
Monoptera.	364	La Monoptere. . . . .
Motitatrix.	374	L'Agitée. . . . .
Nigra.	360	La Noire. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . Tipule brune à ailes  
blanches.

Tipule des latrines.

. . . . . Tip. brune à ventre  
de couleur verte  
en devant. . . ead.  
. . . . . ead.

Tipule des fleurs du  
Lotier.

Tipule à Lunule. Tip. à ailes cendrées  
avec une tache  
blanche margi-  
nale. . . . ead.  
. . . . . ead.

Tipule tachetée.

Tipule noire de  
Saint - Marc. . . . . Hortulana.

Tip. de Saint-Marc  
à cuisses rouffes.

. . . . . Tip. à pattes d'ar-  
lequin. . . . ead.  
. . . . . ead.

. . . . . Tipule à pattes en  
forme d'antennes,  
ornée d'un an-  
neau blanc. . . ead.

. . . . . Tipule noire à ailes  
brunes. . . . ead.

CIV. TOM. III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Nigra-Aquatica.	* 395	L'Aquatique noire. <i>D. Geer.</i>
Notata.	383	La Marquée.
Ocellaris.	362	L'Oculée. . . . .
Ochreata.	* 369	La Bigarrée. <i>Enum.</i>
Oleracea.	355	Le Tailleur. . . . .
Pallida.	* 389	La Pâle. <i>F.</i> . . . .
Pallipes.	* 391	La Pallipede. <i>F.</i> . . . .
Palustris.	385	Des Marais. . . . .
Pectinicornis.	350	La Pectinée. . . . .
Pedella.	* 394	La Bedeade. <i>D. Geer.</i> . . . .
Pennicornis.	388	La Plume. . . . .
Perficariæ.	383	De la Perficaire. . . . .
Phalænoides.	382	La Phalénoïde. . . . .
Phragmitidis.	* 369	Du Roseau commun. <i>Enum.</i>
Pilicornis.	* 390	La Pilicorne. <i>F.</i> . . . .
Pilicornis.	* 391	La Pilicorne. <i>F.</i> . . . .
Pilipes.	* 368	La Pilipede. <i>F.</i> . . . .
Pini.	* 395	Du Pin. <i>D. Geer.</i> . . . .
Plicata.	* 368	La Plissée. <i>Enum.</i>
Plicata.	* 402	La Papillaire. <i>Faun. Frid.</i>
Plumbea.	* 366	La Plombée. <i>F.</i> . . . .
Plumosa.	372	La Panachée. . . . .
Pomonæ.	* 389	La Fruitiere. <i>F.</i> . . . .
Pratensis.	358	Des Prés. . . . .
Pulicaris.	387	La Puce. . . . .
6-Punctata.	* 366	La Six-Ponctée. <i>F.</i> . . . .
Punctata.	* 397	La Quadri-Ponctée. <i>Geoff.</i>

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

T. aquatique noire.

. . . . . ead.

Tipule des prés.      Tipule à bords des  
                                 ailes bruns. . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . *M.* ead.

. . . . . ead.

Tipule Aurore à  
taches noires. . . . . ead.

Tipule Bedeaude. . . . . ead.

. . . . . ead.

Tipule Phalénoïde.      Bibion à ailes fran-  
                                 gées & sans ta-  
                                 ches. . . . . ead.

. . . . . *M.* ead.

. . . . . *M.* ead.

. . . . . *M.* ead.

Tipule du Pin.

. . . . . Tipule de couleur  
                                 plombée à ailes  
                                 blanches. . . ead.

Tipule annulaire.      Tipule à corcelet  
Lege p. 379.              vert & point mar-  
                                 ginal noir sur les  
                                 ailes. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . Tip. brune à quatre  
                                 points bruns sur  
                                 les ailes.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Punctata.	* 369	La Ponctuéée. <i>Enum.</i>
Puppivaga.	* 392	L'Errante. <i>Enum.</i>
Pufilla.	377	La Délicate. . . . .
Putris.	380	Des Immondices.
Quadrinodula.	343	La Quadrinodulée. . . .
Quadrinodia.	* 402	Les Quatre-Nœuds. <i>Scop.</i>
Regelationis.	363	La Précocée. . . . .
Replicata.	364	La Repliée. . . . .
Reticulata.	* 397	La Reticulée. <i>Geoff.</i> .
Rufipes.	386	La Rufipède.
Riparia.	* 403	Des Rivages. <i>Faun. Frid.</i>
Rivosa.	352	La Sinuée. . . . .
Scathopse.	* 398	Le Scatopse. <i>Geoff.</i> . .
Sericea.	387	La Soyeuse. . . . .
Sinuata.	* 365	L'échancrée. <i>F.</i> . . . .
Spinata.	* 402	L'Épineuse. <i>Faun. Frid.</i>
Stercoraria.	* 395	Du Fumier. <i>D. Geer.</i> .
Stictica.	* 388	La Bigarrée. <i>F.</i> . . . .
Tendens.	* 388	La Rufée. <i>F.</i> . . . .
Tenera.	* 402	La Délicate. <i>Faun. Frid.</i>
Terrestris.	359	La Terrestre.
Tessellata.	* 397	La Marquetée. <i>Geoff.</i> .
Thomæ.	379	La Thomas. . . . .
Transversalis.	* 372	La Transversale. <i>V.</i>
Tremula.	375	La Tremblante. . . . .
Triangularis.	* 365	La Triangulaire. <i>F.</i> . .
Tripunctata.	* 367	La Triponctuéée. <i>F.</i> . .
Turcica.	* 367	La Turque. <i>F.</i> . . . .
Varia.	* 390	La Variée. <i>F.</i> . . . .
Variegata.	357	La Variée. . . . .
Variegata.	* 398	La Variée. . . . .
Velata.	* 402	La Hérissée. <i>Faun. Frid.</i>
Venosa.	* 368	La Nerveuse. <i>Enum.</i>
Verna.	* 392	La Vernale. <i>Enum.</i>
Veris.	* 402	La Précocée. <i>Faun. Frid.</i>



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .		ead.
Tip. à quatre taches. . . . .		ead.
. . . . .		ead.
Tip. à ailes pliées. . . . .		ead.
Tipule bigarrée. . . . .	T. à ailes reticulées.	
Tipule à bandes. . . . .	Tipule à ailes panachées. . . . .	ead.
. . . . .	Scatopse noir. . . . .	
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
T. noire du fumier. . . . .		ead.
. . . . .		ead.
. . . . .	Tipule à ailes en Damier. . . . .	
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	M. ead.
. . . . .	. . . . .	M. ead.
Tipule variée. . . . .		ead.
. . . . .	Tip. à pattes noires & jamb. blanches.	

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gal.</i>
Vernans.	* 390	La Vernale. <i>F.</i> . . .
Vibratoria.	375	La Vibrante. . . .
Virens.	376	La Verdâtre.
Viridula.	376	La Vive. . . .
Zonata.	* 389	L'Entourée. <i>F.</i> . . .

**MUSCA.**

**MOUCHE.**

Adunata.	* 540	L'Y. . . . .
Ænea.	* 420	La Semi-Bronzée <i>F.</i> . .
Ænea.	* 522	La Bronzée. <i>Scop.</i> . .
Æstiva.	* 547	De l'Été. <i>Faun. Frid.</i>
Æstivans.	503	L'Inquiète. . . . .
Æthiops.	* 421	L'Éthiopienne. <i>F.</i> . . .
Albipes.	* 426	L'Albipède. <i>Geoff.</i> . .
Albifrons.	472	La Frontale.
Albimana.	* 459	La Propre. <i>F.</i> . . . .
Albifeta.	* 517	La Vieille. <i>Scop.</i>
Alni.	* 514	De l'Aulne. <i>Scop.</i>
Amentaria.	* 477	Des Chatons. <i>Scop.</i>
Angelicæ.	* 475	De l'Angelique. <i>Scop.</i>
Anilis.	414	La Vieille. . . . .
Annulata.	* 540	La Mariée. <i>Geoff.</i> . . .
Annulata.	* 546	L'Entourée. <i>Enum.</i> . .
Annulata.	* 418	La Cerclée. <i>D. Geer.</i> .
Anthrax.	* 427	Le Charbon. <i>Enum.</i>
Apiaria.	* 432	La Pseudo-Abeille. <i>F.</i> .
Aphidioides.	* 523	L'Aphidiioïde. <i>Scop.</i>
Apiformis.	* 455	L'Apiforme. <i>D. Geer.</i> .
Apiformis.	* 543	L'Apiforme. <i>Enum.</i>
Apivora.	* 480	L'Apivorne. <i>D. Geer.</i> .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . ead.  
. . . . . ead.

. . . . . ead.  
. . . . . ead.

. . . . . Mouche à antennes  
en Y. *Ent. parif.*

. . . . . Bibio 4.  
Némotele à genoux  
jaunes.

. . . . . *M.* ead.  
. . . . . Bibio 13.  
. . . . . *M.* armée noire à  
pattes blanches. Stratiomys  
13.

. . . . . Syrphus 63.

. . . . . Bibio 8.  
. . . . . Mouche verdâtre à  
anneaux blancs  
aux tarfes.

. . . . . An *Geoff.* 63.  
Némotele à an-  
neaux jaunes.

. . . . . Syrphus 5.

Mouche Abeille.

Mouche du nid des  
Bourdons.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Aquatica.	*	538	L'Aquatique. <i>Geoff.</i> . . .
Arbustorum.		436	Des Arbustes. . . . .
Arcuata.		440	L'Arquée. . . . .
Arcuata.	*	530	La Tranchée. <i>F.</i> . . .
Argirostoma.	*	544	La Riche. <i>Enum.</i>
Arnicae.		504	De l'Arnique. . . . .
Arnicae Scorpioides.	*	514	De l'Arnique Scorpioïde. <i>Scop.</i>
Arrogans?		496	L'Arrogante. . . . .
Affelliformis.	*	537	La Cloporte. <i>Geoff.</i> . .
Afiliformis.	*	456	L'Afiliforme. <i>F.</i> . . .
Aterrima.	*	548	Le Charbon. <i>V.</i>
Atra.	*	551	La Partagée. <i>V.</i>
Atrata.	*	426	Le Deuil. <i>F.</i> . . . .
Atropos.	*	460	Atropos. <i>Enum.</i>
Aurata.	*	547	La Dorée. <i>Faun. Frid.</i>
Aurata.	*	533	La Dorée. <i>F.</i> . . . .
Aurifrons.	*	549	La Riche. <i>V.</i>
Autumnalis.	*	480	L'Automnale. <i>D. Geer.</i> .
Balteata.	*	454	L'Alternée. <i>D. Geer.</i> .
Bicincta.		439	La Cordelière. . . . .
Bicolor.		511	La Bicolor. . . . .
Bidentata.	*	429	La Bidentée. <i>V.</i>
Bifasciata.	*	462	La Bifasciée. <i>Enum.</i>
Bilineata.	*	550	La Bilinéaire. <i>V.</i>
Bipunctata.	*	517	La Biponctué. <i>Scop.</i>
Bombylans.	*	429	La Grondeuse. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .	Mouche à bord des ailes jaunâtres & trois points noirs sur chacune.	
. . . . .		Syrphus 15.
Mouche Armée. <i>Lege p. 125.</i>	Mouche imitant la Guêpe, à longues antennes.	Syrphus 31.
. . . . .	. . . . .	<i>M. ead.</i>
Mouc. du Doronic.		
. . . . .	. . . . .	<i>ead.</i>
. . . . .	M. noire à deux bandes blanches sur les ailes.	
. . . . .	. . . . .	Syrphus 24.
. . . . .	. . . . .	Rhagio 11.
. . . . .	. . . . .	<i>M. ead.</i>
Mouc. d'Automne.	. . . . .	Corvina 21.
Mouche à bandes.	Mouche à bandes jaunes alternati- vement plus lar- ges sur le ventre.	
M. à deux bandes.	. . . . .	Syrphus 30.
. . . . .	M. à corcelet vert & ventre bleu.	

. . . . . : Syrphus 1.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Buccata.	* 518	La Joufflue. <i>Scop.</i>
Cadaverina.	468	La Dorée. . . . .
Cæruleophtalmica.	* 513	Les Yeux-Bleus. <i>Scop.</i>
Cærulefcens.	* 464	La Bleuâtre. <i>V.</i>
Cæfar.	467	César. . . . .
Cæfarina.	* 473	La Céfarienne. <i>Scop.</i>
Canicularis.	488	La Caniculaire. . . . .
Canina.	* 481	La Canine. <i>F.</i> . . . .
Cannabina.	* 520	Du Chanvre. <i>Scop.</i>
Capitata.	* 524	La Grosse-Tête. <i>D. Geer.</i>
Cardui.	507	Du Chardon. . . . .
Carnaria.	470	La Carnivore. . . . .
Cellaris.	491	Des Celliers. . . . .
Cœmteriorum.	489	Des Cimétieres. . . . .
Cerafi.	506	Des Bigarreux. . . . .
Chamæleon.	404	Caméléon. . . . .
Charaëteristica.	* 541	La Charaëteristique. <i>Geoff.</i>
Chorea.	* 526	La Danfeufe. <i>F.</i> . . . .
Chryforrhæe.	* 522	L'Alchimifte. <i>Scop.</i>
Cibaria.	496	La Friande.
Ciliata.	* 428	La Ciliée. <i>V.</i>
Cimicoides.	* 527	La Cimicoïde. <i>F.</i> . . . .
Cincta.	* 419	L'Entourée. <i>D. Geer.</i>
Cincta.	* 424	La Noircie. <i>F.</i> . . . .
Cinerea.	510	La Cendrée.
Clauda.	* 463	La Boiteufe. <i>V.</i>
Clavata.	* 534	La Maffue. <i>F.</i> . . . .
Clavicrus.	* 545	L'Estropiée. <i>Enum.</i>

*D. Geer.*



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Petite Mouc. dorée.	Mouche dorée à corcelet bleu & ventre vert. .	ead.
M. dorée commune.	M. dorée commune.	ead.
. . . . .	. . . . .	B, ead. 10.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
Mouc. à grosse tête.		
Mouc. du Chardon.	Mouche à zizzag sur les ailes. .	ead.
Grande Mouche vivipare.	La grande Mouche à extrémité du ventre rougeâtre.	ead.
. . . . .	La M. du Vinaigre.	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
M. des Bigarreux.	. . . . .	ead.
Stratiome - Camé- léon.	La Mouche-Armée à ventre plat, chargé de six lu- nules. . . . .	Stratiom. 12.
. . . . .	Mouc. à caractères noirs.	
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	
. . . . .	. . . . .	M. ead.
Némotele à cein- ture.		
. . . . .	. . . . .	Rhagio 12.
. . . . .	. . . . .	
. . . . .	. . . . .	M. ead.

<i>D. Cinn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Claviformis.	* 537	La Claviforme. <i>Geoff.</i>
Clavipes.	409	La Clavipede. . . . .
Coalescens.	* 540	La Réunion. <i>Geoff.</i> . . .
Coccinea.	* 426	La Satinée. <i>Geoff.</i> . . .
Coleoptrata.	* 479	La Coléoptrée. <i>Scop.</i>
Colossus.	* 474	La Colossale. <i>Scop.</i>
Combinata.	502	La Combinée. . . . .
Compressa.	* 532	L'Aplatie. <i>F.</i> . . . .
Conopsoïdes.	414	La Conopsoïde. . . . .
Corileti.	* 478	Des Coudriers. <i>Scop.</i>
Corni.	* 475	Du Cornouiller. <i>Scop.</i>
Corrigiolata.	496	L'Étroite. . . . .
Crabroniformis.	* 428	La Crabroniforme. <i>V.</i>
Craffipes.	* 461	La Craffipede. <i>Enum.</i>
Cribrata.	* 517	La Criblée. <i>V.</i>
Cristata.	* 527	La Huppée. <i>F.</i> . . . .
Crociata.	* 543	La Croisée. <i>Geoff.</i> . . .
Cruentata.	* 462	L'Enfanglantée. <i>Geoff.</i> .
Cucularia.	497	La Compagne. . . . .
Cupraria.	493	La Cuivreuse. . . . .
Curforia.	* 516	La Coureuse. <i>Scop.</i>
Cyanea.	* 547	L'Azurée. <i>Faun. Frid.</i>
Cylindrica.	* 525	La Cylindrique. <i>D. Geer.</i>
Cynipsea.	501	La Cynipsoïde. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*Fab.*

. . . . .	Mouche à corcelet noir, à gros ven- tre jaune & ailes fumées.	
. . . . .	M. - Armée noire, à ventre & cuisses jaunes. . . .	Stratiom. II.
. . . . .	Mouche à antennes réunies.	
. . . . .	M. - Armée à cor- celet rouge satiné.	Stratiom. 2.
. . . . .		ead.
. . . . .		M. ead.
. . . . .		Syrphus 38.
. . . . .		ead.
. . . . .		M. ead.
. . . . .	Mouc. jaune à ailes bleuâtres & croi- sées.	
. . . . .	M. noire à bande rouge transverse sur le ventre.	
. . . . .		ead.
Némotele cuivreu- se.	Mouche dorée à tache brune sur les ailes. . . .	ead.
Mouc. cylindrique. . . . .		M. Brassica- ria.
Mouche Cinipsoïde. . . . .		ead.
		h ij

cxvj TOM. III. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Dauci.	* 534	De la Carotte. <i>F.</i> . . .
Deceptoria.	* 512	La Trompeuse. <i>Scop.</i>
Denigrata.	409	La Noircie.
Depressa.	* 548	L'Aplatie. <i>V.</i>
Devia.	441	L'Égarée. . . . .
Diadema.	413	Le Diadème. . . . .
Diaphana.	* 528	La Diaphane. <i>F.</i> . . .
Diophtalma.	442	La Diophtalme. . . .
Dioscoidea.	* 534	La Dioscoïde. <i>F.</i> . . .
Domestica Minor.	* 524	La petite Mouche Domestique. <i>D. Geer.</i> . . .
Domestica.	471	La Domestique. . . . .
Dorsalis.	* 530	La Dorsale. <i>F.</i> . . .
Elata.	* 482	L'Hydrocéphale. <i>F.</i> . .
Elegans.	* 464	L'Élégante. <i>V.</i>
Elongata.	* 549	L'Alongée. <i>V.</i>
Elongata.	* 457	L'Alongée. <i>F.</i> . . . .
Erratica.	444	L'Errante.
Erythrocephala.	* 534	L'Erythrocéphale. <i>F.</i> . .
Æstivationis.	438	De l'Été.
Falcata.	* 513	La Courbée. <i>Scop.</i>
Fallax.	438	La Trompeuse. . . . .
Fallax.	* 542	La Trompeuse. <i>Geoff.</i> .
Fasciata.	* 419	La Fasciée. <i>D. Geer.</i> . .
Fasciata.	* 424	La Fasciée. <i>F.</i> . . . .
Fasciata.	* 546	La Fasciée. <i>Faun. Frid.</i> .
4-Fasciata.	* 528	La Quadrifasciée. <i>F.</i> . .
4-Fasciata.	* 536	La Quadrifasciée. <i>Geoff.</i> .
5-Fasciata.	* 536.	La Cinqfasciée. <i>Geoff.</i> .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . ead.

. . . . . Syrphus 34.

. . . . . Rhagio 10.

. . . . . ead.

. . . . . Syrphus 45.

. . . . . *Mantiff.*

Petite Mouche Do-  
mestique.

Grande Mouche

Domestique. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . Syrphus 42.

. . . . . *M.* ead.

*M.* à derriere roux. . . . . Syrphus 26.

. . . . . Mouche noire avec  
un trait noir sur  
la moitié du bord  
extérieur de l'aile.

Némotele à bandes.

. . . . . Rhagio 5.

. . . . . ead.

. . . . . Mouc. jaune à qua-  
tre bandes brunes  
sur les ailes.

. . . . . Mouc. noire à cinq  
bandes noires sur  
les ailes.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Fasciolata.	* 455	La Fasciolée. <i>D. Geer.</i> . . . .
Femorata.	453	La Difforme. . . . .
Fenestralis.	410	Des Fenêtres. . . . .
Festivals.	* 523	La Vive. <i>Scop.</i>
Festiva.	444	L'Agréable. . . . .
Fera.	484	La Farouche. . . . .
Ferruginea.	* 417	La Rouillée. <i>Scop.</i>
Fimetaria.	498	Du Fumier. . . . .
Fimetorum.	* 542	Des Fumiers. <i>Geoff.</i> . . . .
Flava.	502	La Jaune. . . . .
Flaves cens.	* 433	La Jaunâtre. <i>Geoff.</i> . . . .
Flavicans.	* 547	La Jaunâtre. <i>Faun. Frid.</i>
Flavicornis.	* 458	La Flavicorne. <i>F.</i> . . . .
Flavipes.	* 419	La Flavipede. <i>D. Geer.</i> . . . .
Flavipes.	* 425	La Bizarre. <i>F.</i> . . . .
Florea.	434	La Flore. . . . .
Florescentiæ.	508	De la Floraison.
Formosa.	* 417	La Belle. <i>Scop.</i>
Frit.	492	Du Frit. . . . .
FronDESCENTiæ.	509	De la Foliaison.
Frutetorum.	* 456	Des Taillis. <i>F.</i> . . . .
Fulvipes.	* 541	La Fulvipe. <i>Geoff.</i> . . . .
Fumigata.	* 477	L'Enfumée. <i>Scop.</i>
FunebriS.	* 483	La Funebre. <i>F.</i> . . . .
Fungorum.	* 478	Des Champignons. <i>Scop.</i>
Furta.	472	La Voleuse.



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

M. à bandelettes.

• • • • • Syrphus 37.

Némotele des Fe-  
nêtres. • • • • •

ead.

Mouche à bandes  
citron.

Mouche imitant la  
Guêpe à courtes  
antennes. • • •

Syrphus 47.

• • • • •

M. noire à ventre  
jaune, noir dans  
le milieu. • • •

ead.

• • • • •

• • • • •

ead.

• • • • •

Mouc. noire à ailes  
brunes & yeux  
rouges.

Mouche jaune.

Mouche jaune aux  
yeux noirs. • • •

ead.

• • • • •

Volucelle à ventre  
jaunâtre.

• • • • •

• • • • •

Syrphus 49.

Némotele à jambes  
jaunes.

• • • • •

• • • • •

Rhagio 7.

Mouche des Fleurs.

• • • • •

Syrphus 11.

• • • • •

• • • • •

ead.

• • • • •

• • • • •

Syrphus 17.

• • • • •

Mouche noire à  
pattes fauves.

• • • • •

• • • • •

M. ead.

Mouche des Cham-  
pignons.

CXX *Tom. III. NOMENCLATOR*

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Fusca.		511	La Brune. . . . .
Fusca.	*	461	La Brune. <i>Enum.</i>
Geniculata.	*	526	La Coudée. <i>D. Geer.</i> .
Geographica.	*	538	La Géographie. <i>Geoff.</i> .
Germinationis.		505	La Printaniere. . . . .
Gibbosa.	*	525	La Bossue. <i>D. Geer.</i> . .
Gibbosa.		446	La Bossue. . . . .
Glaucia.		445	La Verdâtre. . . . .
Globosa.	*	458	La Ronde. <i>F.</i> . . . .
Globulipes.	*	541	L'Estropiée. <i>Geoff.</i> . . .
Graminum.	*	530	Des Graminées. <i>F.</i> . . .
Grisea.		511	La Grise.
Grossa.		485	La Grosse. . . . .
Grossificationis.		500	Des Pépinières. . . . .
Grossipes.		453	La Monstrueuse.
Guttata.	*	541	L'Étoilée. <i>Geoff.</i> . . .
Hæmorrhoidalis.	*	548	L'Hémorrhoidale. <i>V.</i>
Hederaceæ.	*	535	Du Lievre. <i>Geoff.</i> . . .
Helenii.	*	536	De l'Inule Hélénienne. <i>Geoff.</i>
Heraclei.		507	De la Berce.
Hieracii.	*	532	De l'Épervière. <i>F.</i> . . .
Hirsuta.	*	427	La Velue. <i>V.</i>
Hirsuta.		509	La Velue.
Hirta.	*	420	La Velue. <i>D. Geer.</i> . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . Mouche brune à  
bandes transver-  
ses blanchâtres  
sur le ventre.

Némotele à genoux  
jaunes.

. . . . . Mouche à ailes géo-  
graphiques.

Mouche bossue.

. . . . . ead. Syrphus 55.

. . . . . Syrphus 53.

. . . . . Syrphus 56.

. . . . . Mouc. à tarfes an-  
térieurs très-gros.

. . . . . ead.

Mouc. gigantesque. . . . . N°. 30. ead.  
& non 4.

. . . . . M. à ailes noires &  
tache blanche à  
l'extrémité. . . ead.

. . . . . M. à tache blanche  
sur le ventre.

. . . . . M. noire à base des  
ailes & du ventre  
fauve.

. . . . . Mouc. à ailes reti-  
culées avec deux  
taches noires.

. . . . . ead.

Némotele velue.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Hortulana.	* 519	Des Jardins. <i>Scop.</i>
Hottentotta.	410	La Hottentotte. . . . .
Hydroleon.	406	Hydroléon. . . . .
Hyoscyami.	504	De la Jusquiame. . . . .
Hypoleon.	407	Hypoléon. . . . .
Ichneumonoides.	* 543	L'Ichneumonoïde. <i>Geoff.</i> .
Ichneumonea.	442	L'Ichneumon. . . . .
Inanis.	465	La Vide. . . . .
Intersecta.	* 539	L'Entrecoupée. <i>Geoff.</i> .
Intricaria.	437	L'Embrouillée. . . . .
Iridata.	* 516	De l'Iris. <i>Scop.</i>
Labiata.	* 532	La Labiée. <i>F.</i> . . . .
Lacustris.	* 519	Des Étangs. <i>Scop.</i> . . .
Lamed.	* 545	Le Lamed. <i>Enum.</i>
Lappona.	431	La Laponne. . . . .
Larvarum Minor.	* 524	La petite Mouche des Chenilles. <i>D. Geer.</i> . . .
Larvarum.	487	Des Larves. . . . .
Larvata.	* 537	La Masquée <i>Geoff.</i> . . .
Latro.	* 533	La Fripponne. <i>F.</i> . . .
Leucocephala.	* 550	La Leucocéphale. <i>V.</i>
Libatrix.	* 521	La Prudente. <i>Scop.</i>

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Némol. Hottentotte. . . . .		Bibio 16.
Stratiome - Hydro-léon. . . . .	Mouche - Armée à ventre vert. . . . .	Stratiom. 7.
Mouc. du Pifenlit. . . . .		Umbellatarum.
. . . . .	Mouche - Armée noire, à taches jaunes. . . . .	Stratiom. 10.
. . . . .	M. noire à pattes jaunes & ventre alongé, semblable à un Ichneumon. . . . .	
. . . . .	. . . . .	Syrphus 39.
. . . . .	La Némot. à bande. . . . .	ead.
. . . . .	M. à corcelet noir taché de jaune & ventre jaune à bandes noires. . . . .	
Mouc. Embrouillée. . . . .		Syrphus 22.
. . . . .	. . . . .	M. ead.
Némotele bronzée. . . . .		
Mouche Laponne. . . . .		Syrphus 4.
Petite Mouche des Chenilles. . . . .		
Grande Mouche des Chenilles. . . . .		ead.
. . . . .	M. cendrée à quatre bandes noires sur les ailes, dont la troisième est divisée en deux. . . . .	
. . . . .		ead.

cxxiv *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Lineata.	* 423	La Tracée. <i>F.</i> . . .
Lineata.	* 531	L'Ictérique. <i>F.</i> . . .
Lineata.	* 539	La Rayée <i>Geoff.</i> . . .
Longicornis.	* 425	La Longicorne. <i>F.</i> . . .
Longicornis.	* 458	La Longicorne. <i>Geoff.</i> . . .
Longipes.	* 478	La Difforme. <i>Scop.</i>
Longipes.	* 542	La Longipede. <i>Geoff.</i>
Lucida.	* 522	La Luisante. <i>Scop.</i>
Lucorum.	439	La Sauvage. . . .
Lugubris.	* 421	La Lugubre. <i>F.</i> . . .
Lugubris.	* 458	La Lugubre. <i>F.</i> . . .
Lunula.	* 433	La Lunaire. <i>V.</i>
Lupulina.	* 483	Du Houblon. <i>F.</i> . . .
Luteola.	* 523	La Jaunâtre. <i>Scop.</i>
Lychnidis.	* 535	Du Lichnis. <i>F.</i> . . .
Maculata.	* 425	La Tachetée. <i>F.</i> . . .
Maculata.	* 418	La Tachetée. <i>D. Geer.</i> . . .
Maculata.	* 433	La Tachetée. . . .
Maculata.	471	La Tachetée. . . .
4-Maculata.	* 533	La Quadrimaculée. <i>F.</i> . . .
Marginalis.	* 542	La Marginale. <i>Geoff.</i> . . .
Marginata.	* 421	La Bordée. <i>F.</i> . . .
Marginata.	* 528	La Bordée. <i>F.</i> . . .
Maritima.	* 520	La Maritime. <i>Scop.</i>
Martia.	* 474	La Printanière. <i>Scop.</i>



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

• • • • •	• • • • •	Rhagio 4.
• • • • •	• • • • •	ead. 95 & non 91.
• • • • •	Mouche dorée à trois paires de raies blanches sur le ventre.	
• • • • •	• • • • •	Rhagio 9.
• • • • •	M. à tache brune sur le bord de l'aile & point noir au milieu.	
• • • • •	M. à point marginal sur les ailes & pattes jaunes.	
• • • • •	• • • • •	Syrphus 25.
• • • • •	• • • • •	M. Bibio 8.
• • • • •	• • • • •	Syrphus 50.
• • • • •	• • • • •	M. ead.
• • • • •	• • • • •	M. ead.
• • • • •	• • • • •	Rhagio 8.
Némotele à tache jaune sur les ailes.		
• • • • •	La Volucelle à ta- che noire. <i>Ent.</i> <i>parif.</i>	
Mouche tachetée.	• • • • •	Vulpina.
• • • • •	• • • • •	M. ead.
• • • • •	M. à point marginal brun sur les ailes.	
• • • • •	• • • • •	Bibio 6.
• • • • •	• • • • •	ead.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gali.</i>
Maura.	409	La Maure. . . . .
Meditabunda.	* 527	La Quadriponctué. <i>F.</i> .
Melanura.	* 484	La Mélanure. <i>Enum.</i>
Mellina.	450	La Mielleuse. . . . .
Menthastri.	448	De la Menthe. . . . .
Metallina.	* 458	La Métallique. <i>F.</i> . . .
Meteorica.	491	La Météorique. . . . .
Meticulosa.	* 520	La Meticuleuse. <i>Scop.</i>
Meridiana.	467	La Méridienne. . . . .
Merulina.	* 520	La Noire. <i>Scop.</i>
Microleon.	405	Microléon. . . . .
Minuta.	* 535	La Petite. <i>F.</i> . . . .
Morio.	408	Le Morio. . . . .
Mortuorum.	468	La Chrysoféphale. . . .
Muraria.	* 515	Des Murs. <i>Scop.</i>
Murina.	* 461	La Souris. <i>Enum.</i>
Musitans.	* 431	La Bruyante. <i>F.</i> . . .
Mutabilis.	441	La Variable. . . . .
Mutica.	* 423	La Désarmée. <i>F.</i> . . .
Myiacea.	430	Le Pseudo-Bourdon. . .
Nectarea.	416	La Friande.
Nectarea.	* 460	Des Nectaires. <i>F.</i> . . .
Nemorum.	435	Des Bois. . . . .
Nigra.	* 420	La Noire. <i>D. Geer.</i> . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Némotele maure.	. . . . .	Bibio 12.
. . . . .	. . . . .	ead.
Mouche mielleuse.	Mouche à points jaunes triangulai- res sur le ventre.	Syrphus 61.
M. de la Menthe.	M. à pointe du cor- celet & bandes sur le ventre de cou- leur jaune. . .	Syrphus 59.
. . . . .	. . . . .	Syrphus 52.
Mouc. des Vaches.	. . . . .	ead.
Mouc. Méridienne.	Mouc. noire à base des ailes jaunes.	ead.
Stratione - Micro- léon.	M. armée à ventre plat & brun. . .	Stratiom. 3.
. . . . .	. . . . .	M. ead.
Némotele Éthio- pienne.	M. à ailes noires bordées de blanc ondé. . . . .	Bibio 11.
Mouc. à tête dorée.	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	Syrphus 32.
. . . . .	. . . . .	Syrphus 33.
. . . . .	. . . . .	Stratiom. 14.
Mouche - Bourdon.	. . . . .	Syrphus 2.
. . . . .	. . . . .	M. Syrp. 74.
Mouc. des jardins.	M. cendrée à ban- des blanches sur le ventre & deux grandes taches jaunes sur le pre- mier anneau. .	Syrphus 13.
Némotele noire.		

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Nigra.	* 432	La Noire. <i>Geoff.</i> . . .
Nigricans.	509	La Noirâtre.
Nigrita.	* 475	La Négresse. <i>Scop.</i>
Nitens.	* 549	La Brillante. <i>V.</i>
Nobilitata.	* 421	La Livrée. <i>F.</i> . . .
Nobilitata.	495	La Noble. . . . .
Noctiluca.	445	La Phosphorique. . . .
Notata.	* 527	La Rayée. <i>F.</i> . . . .
Nova.	* 427	La Nouvelle. <i>Enum.</i>
Oestracea.	437	L'Oestre. . . . .
Onopordinis.	* 531	Du Pédane. <i>F.</i> . . . .
Oppidana.	* 523	L'Espion. <i>Scop.</i>
Orbicula.	* 459	La Sphérique. <i>F.</i> . . .
Orbiculata.	* 539	L'Orbiculée. <i>Geoff.</i> . .
Ornithovora.	* 518	L'Ornithovore. <i>Scop.</i>
Pallida.	* 482	La Pâle. <i>F.</i> . . . .
Pallida.	509	La Pâle.
Palustris.	* 521	Des Marais. <i>Scop.</i>
Pantherina.	407	La Panthere.
Parietina.	499	La Marbrée. . . . .
Pellucens.	466	La Transparente. . . .
Pelluceus.	* 432	La Talqueuse. . . . .
Pendula.	433	La Pendante. . . . .
Personnata.	* 537	La Déguisée. <i>Geoff.</i> . .
Petronella.	494	La Courtisane. . . . .
Pinaestri.	* 454	Du Pin. <i>D. Geer.</i> . . .
Pipiens.	451	La Crieuse. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . La Volucelle à ventre tout noir.

. . . . . Bibio 7.

. . . . . Mouc. verte cuivreuse à ailes mi-partie de brun & de blanc. . .

ead.

. . . . . Syrphus 54.

ead.

Mouche Oefstre. . . . . Syrphus 23.

ead.

. . . . . *M. Syr.* 65.

. . . . . M. à points jaunes sur le ventre.

. . . . . *M.* ead.

. . . . . Mouche à ailes marbrées. . . ead.

M. Transparente. La Voluc. à ventre blanc en devant. ead.

*Deleatur.*

Mouche Pendante. M. à corcelet strié & bandes jaunes interrompues sur le ventre. . . Syrphus 10.

. . . . . M. cendrée à points & ailes marbrées. ead.

Mouche du Pin.

Mouche Crieuse. M. à grosses cuisses. Syrphus 65.

*Inseâ. Tomus IV.*

i

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Pirastri.		447	Du Rosier. . . . .
Placida.	*	547	La Tranquille. <i>Faun. Frid.</i>
Plebeia.		404	La Plébéïenne. . . . .
Plebeia.	*	482	La Plébéïenne. <i>F.</i> . . .
Plombea.	*	463	La Plombée. <i>Geoff.</i> . . .
Plumata.		430	Le Plumet. . . . .
Plumipes.	*	515	La Plumipede. <i>Scop.</i>
Pluvialis.		489	La Pluviale. . . . .
Podagrica.	*	457	La Podagre. <i>F.</i> . . . .
Pœcilopectera.	*	545	La Péciloptère. <i>Enum.</i>
Polita.		493	La Lisse. . . . .
Potentillæ.		510	De la Potentille.
Præceps.	*	514	L'Agile. <i>Scop.</i>
Pubera.		494	La Nubile. . . . .
Pulicaria.	*	543	La Puce. <i>Geoff.</i> . . . .
Pullata.	*	547	La Pauvre. <i>Faun. Frid.</i>
Punctata.	*	545	La Ponctué. <i>Enum.</i>
Punctulata.	*	479	La Pointillée. <i>Scop.</i> . . .
Punctata.	*	465	La Pointillée. <i>Faun. Frid.</i>
Punctata.	*	424	La Ponctué. <i>F.</i> . . . .
5-Punctata.	*	545	La 5-Ponctué. <i>Enum.</i>
Putris.		492	Du Fromage. . . . .
Quadripunctata.		503	La Quadriponctué. . . . .
Radicum.		487	Des Racines. . . . .
Rara.	*	416	La Rare. <i>Scop.</i>
Resinella.	*	546	De la Ph. Résinelle. <i>Enum.</i>
Reticulata.	*	529	La Réticulée. <i>F.</i> . . . .
Ribesii.		446	Du Groseiller. . . . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Mouche du Rosier. Mouche à six taches  
blanches en croi-  
sant sur le ventre. Syrphus 58.

. . . . . Bibio 5.  
. . . . . ead.

. . . . . M. brune bronzée.  
Mouche à plumet.

Mouc. de la pluie. Mouche cendrée à  
points noirs. ead.  
. . . . . Syrphus 43.

Némotele dorée. . . . . ead.

. . . . . ead.  
. . . . . M. noire à pattes  
jaunes & bord  
des ailes exté-  
rieur noir.

Mouche. panachée.

. . . . . : . . . . : M. Rhag. 10.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . ead.

. . . . . M. à ailes reticu-  
lées à bandes? . ead.

M. du Grofeiller. M. à 4 bandes jau-  
nes sur le ventre  
dont la première  
est interrompue. Syrphus 57.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Roralis.		490	La Matinale. . . . .
Rosarum.	*	460	Des Rosiers. <i>F.</i> . . . .
Rostrata.	*	528	Le Musée. <i>F.</i> . . . .
Rotundata.		486	L'Arrondie. . . . .
Rufa.	*	418	La Rouffe. <i>D. Geer.</i> . . . .
Rufa.	*	476	La Rouffe. <i>Scop.</i> . . . .
Ruficornis.	*	458	La Ruficorne. <i>F.</i> . . . .
Rufifrons.	*	529	La Timide. <i>F.</i> . . . .
Rufiventris.	*	476	La Xanthrogastrique. <i>Scop.</i>
Rufo-maculata.	*	525	La Rouffie. <i>D. Geer.</i> . . . .
Rustica.	*	482	La Rustique. <i>F.</i> . . . .
Sabaea.	*	422	La Savoyarde. <i>F.</i> . . . .
Saltatrix.		454	La Sauteuse. . . . .
Saltuum.		500	Des Bois.
Scolopacea.		411	La Bécasse. . . . .
Scolopacina.	*	429	La Bécassine. <i>V.</i>
Scripta.		449	L'Imprimée. . . . .
Scybalaria.		497	Des Immondices. . . . .
Segnis.		452	L'Indolente. . . . .
Semiluctifera.	*	463	Le Demi-Deuil. <i>V.</i>
Seminationis.	*	530	La Pointillée. <i>F.</i> . . . .
Sepulcralis.		473	La Sépulcrale.
Serrata.		490	Des Latrines. . . . .
Serratulæ.		503	De la Sarrete. . . . .
Sericea.	*	540	La Soyeuse. <i>Geoff.</i> . . . .
Sexdentata.	*	423	La Sixdentée. <i>F.</i> . . . .
Sigmoidæa.	*	535	Le Zigzag. <i>Geoff.</i> . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .	Mouc. toute noire.	
	<i>Lege</i> page 532. .	ead.
. . . . .	. . . . .	<i>M. Syrp.</i> 71.
. . . . .	. . . . .	ead.
Mouche arrondie.	Mouc. noire à ventre hémisphérique roux, tacheté de noir. . . . .	ead.
Némotele rousse.		
Mouche rousse.		
. . . . .	. . . . .	<i>Syrphus</i> 48.
. . . . .	. . . . .	ead.
M. à taches rousses. . . . .	. . . . .	<i>Lateral.</i> ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	<i>Bibio.</i> 18.
<i>Deleatur</i> n°. 512.	Mouche jaune à bandes noires?	
Némotele Bécasse. . . . .	. . . . .	<i>Rhagio</i> 1.
. . . . .	. . . . .	<i>Syrphus</i> 62.
. . . . .	. . . . .	ead.
Mouc.-à-Segment.	M. dorée à ventre brun & noir. .	<i>Syrphus</i> 36.
. . . . .	. . . . .	ead. <i>Musca</i> 90 & non 96.
Mouc. des latrines. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	Mouc. cuivreuse à pattes blanches.	
. . . . .	. . . . .	<i>Stratiom.</i> 12.
. . . . .	M. à ailes reticulées avec une tache en zigzag.	

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Smaragdina.	* 540	La Chlorocéphale. . .
Solstitialis.	507	De la Bardane. . .
Sonchi.	505	Du Laitron.
Spatula.	* 417	La Spatule. <i>Scop.</i>
Speculifera.	* 464	Porte-Miroir. <i>V.</i>
Sphegea.	* 457	La Sphégiforme. <i>F.</i> . .
Spinifera.	* 541	La Porte-Épine. <i>Geoff.</i> .
Spinipes.	* 517	La Spinipede. <i>Scop.</i>
Splendens.	* 424	La Brillante. <i>F.</i> . . .
Squamata.	* 547	L'Écailleuse. <i>Faun. Frid.</i>
Stellata.	* 535	L'Astérique. <i>Geoff.</i> . .
Stercoraria.	498	La Merdivore. . . .
Strigata.	* 422	La Sillonnée. <i>F.</i> . . .
Strumosa.	* 518	La Scrophuleuse. <i>Scop.</i>
Stylata.	* 529	Le Stilet. <i>F.</i> . . . .
Subsultans.	489	La Sautillante. . . . .
Suecica.	510	La Suédoise.
Sylvarum.	439	La Sauvage. . . . .
Syngenesiæ.	* 531	De la Syngénéfie. <i>F.</i> . .
Tarda.	411	La Lourde.
Tan.	* 484	Le Tan. <i>Enum.</i>
Temula.	* 513	Du Cerfeuil. <i>Scop.</i>
Tenax.	436	Le Pourceau. . . . .
Tentaculata.	* 481	La Tâteuse. <i>D. Geer.</i> . .
Terrestris.	500	La Terrestre.
Tesselata.	* 537	L'Échiquier. <i>Geoff.</i> . .
Tessacea.	* 481	La Fauve. <i>D. Geer.</i> . .
Thymastri.	* 459	Du Thym. <i>F.</i> . . . .
Tigrina.	* 422	La Tigrée. <i>F.</i> . . . .
Tigrina.	* 526	La Dénaturée. <i>F.</i> . . .
Tipulæa.	* 542	La Tipule. <i>Geoff.</i> . . .
Tipuliformis.	* 425	La Tipuliforme. <i>F.</i> . .
Transfuga.	448	La Transfuge.

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .	Mouc. à tête verte. <i>Ent. paris.</i>	
Mouche de la Bar- dane.	Mouche des têtes de Chardons.	ead.
. . . . .		
. . . . .		Syrphus 40.
. . . . .	Mouche noire à pattes épineuses.	
. . . . .		
. . . . .		<i>M. Strat.</i> 3.
. . . . .	Mouche-à-l'Étoile.	
Mouc. Merdivore.	Mouc. Merdivore.	ead.
. . . . .		Stratiom. 4.
. . . . .		
. . . . .		ead.
. . . . .		ead.
. . . . .		
. . . . .		Syrphus 27.
. . . . .		ead.
. . . . .		
Mouche Pourceau.	Mouche Apiforme.	Syrphus 19.
Mouche-à-Barbes.		
. . . . .	Mouche à ailes reti- culées de brun.	
Mouche fauve.	. . . . .	ead.
. . . . .		Syrphus 60.
. . . . .		Stratiom. 6.
. . . . .		ead.
. . . . .	<i>M. grise</i> à pattes longues & jaunes.	
. . . . .		<i>Rhagio</i> 6.

CXXXVj *To m. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Tremula.	486	Du Tremble. . . . .
Trifasciata.	* 483	La Trifasciée. <i>Enum.</i>
Trilineata.	406	La Rayée. . . . .
Trimaculata.	* 536	La Trimaculée. <i>Geoff.</i> .
Tringaria.	413	La Triplée. . . . .
Tuberculata.	* 428	La Tuberculée. <i>V.</i>
Tuberculata.	* 550	La Tuberculée <i>V.</i>
Tuguriorum.	* 474	Des Chaumieres. <i>Scop.</i>
Tuffilaginis.	* 531	Du Tuffilage. <i>F.</i> . . . .
Uliginosa.	415	Des Marais. . . . .
Umbelliferarum.	* 523	Des Ombelliferes. <i>Scop.</i>
Umbrarum.	499	La Délicate. . . . .
Unguicornis.	* 477	L'Armée. <i>Scop.</i>
Ungulata.	495	La Crochue. . . . .
Urticæ.	506	De l'Ortie. . . . .
Vacua.	* 521	L'Affamée. <i>Scop.</i>
Variegata.	* 473	La Variée. <i>Scop.</i>
Vermileo.	412	Le Ver-Lion. . . . .
Vernicina.	* 514	La Vernissée. <i>Scop.</i>
Vespiformis.	413	La Vespiforme. . . . .
Vibrans.	501	La Vibrante. . . . .
Viduata.	494	La Veuve. . . . .
Virens.	* 518	La Verdâtre. <i>Scop.</i>
Viridata.	* 423	La Verte. <i>F.</i> . . . .
Viridescens.	* 548	La Verdâtre. <i>V.</i> . . . .
Viridescens.	* 463	La Verdâtre. <i>V.</i>
Violacea.	* 516	La Violette. <i>Scop.</i>
Vivipara minor.	* 480	La petite Vivipare. <i>D. Geer.</i>



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .		ead.
. . . . .	M.-Armée jaune à bandes noires.	Stratiom. 9.
. . . . .	M. à ailes jaunes, chargées de points & de trois taches brunes.	
. . . . .		Rhagio 2.
<i>Lege</i> 9-Maculata, la 9-Maculée.		
. . . . .	. . . . .	ead.
. . . . .	. . . . .	<i>M. Strat.</i> 201
. . . . .	. . . . .	ead.
Némotele bronzée.	Mouche dorée à trois nervures sur les ailes.	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
Ném. du Ver-Lion.	. . . . .	Rhagio 3.
Mouche-Guêpe.	. . . . .	Syrphus 46.
Mouche vibrante.	M. à ailes vibrantes ponctuées.	ead.
. . . . .	. . . . .	ead.
<i>Lege</i> Viridula.	? . . . .	Stratiomys 8
<i>L. Erythrocephala</i> , l'Erythrocéphale.		Viridula.
Petite Mouch. Vivipare.		

cxxxviiij *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Vomitoria.	469	La Nauséabonde. . . .
Vorax.	* 539	La Vorace. <i>Geoff.</i> . . .
Zonaria.	* 483	La Cerclée. <i>Enum.</i> . .

T A B A N U S.

Albipes.	* 561	L'Albipede. <i>Enum.</i>
Alpinus.	* 556	L'Alpin. <i>Scop.</i>
Arcticus.	* 561	L'Arctique. <i>Enum.</i>
Autumnalis.	552	De l'Automne. . . .
Bidentatus.	* 560	Le Bidenté. <i>F.</i> . . .
Bifasciatus.	* 557	Le Bifascié. <i>Geoff.</i> . .

Bispinosus.	* 560	L'Épineux. <i>F.</i> . . .
Borealis.	* 560	Le Norvégien. <i>F.</i> . .
Bromius.	553	Le Bruyant. . . .
Bovinus.	551	Des Bœufs. . . .

Cæcutiens.	555	L'Aveuglant. . . .
------------	-----	--------------------

Fasciatus.	* 560	Le Rayé. <i>D. Geer.</i> . .
Ferus.	* 556	Le Cruel. <i>Scop.</i>
Hauſtellatus.	* 558	Le Bombyloïde. <i>F.</i> . .
Hirſutus.	* 561	Le Hériffé. <i>V.</i>
Interſectus.	* 558	L'Entrecoupé. <i>Geoff.</i> . .

Italicus.	* 559	L'Italien. <i>F.</i> . . .
Lugubris.	556	Le Lugubre. . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Mouche bleue de la viande.	Mouche bleue de la viande.	ead.
. . . . .	Mouche brune à huit taches jaunes oblongues sur le ventre.	
5 . . . . .	Mouche-à-Zones.	

. . . . .	. . . . .	id. 5.
. . . . .	. . . . .	id. 25.
. . . . .	Taon à deux bandes noires sur les ailes.	
. . . . .	. . . . .	id. 26.
. . . . .	. . . . .	id. 21.
Taon tacheté . . . . .	. . . . .	id. 14.
Taon des Bœufs.	Taon à ventre jaunâtre & taches triangulair. blanches. . . . .	id. 3.
Taon Aveuglant.	Taon brun à côtes du ventre jaunes & ailes tachetées de noir. . . . .	id. 27.
Taon rayé.		
. . . . .	. . . . .	id. 2.
. . . . .	Taon noir à anneaux du ventre bordés de blanc.	
5 . . . . .	. . . . .	id. 15.
. . . . .	. . . . .	id. 28.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Maritimus.	* 557	Le Maritime. <i>Scop.</i>
Morio.	556	Le Morio.
Paganus.	* 559	Le Villageois. <i>F.</i>
Pellucens.	* 559	Le Transparent. <i>F.</i>
Pluvialis.	554	Le Pluvial.
Rufus.	* 557	Le Roux. <i>Scop.</i>
Ruficus.	552	Le Rustique.
Salinarius.	* 557	Des Salines. <i>Scop.</i>
Tarandicus.	552	Des Rennes.
Tropicus.	553	Le Tropicque.

## C U L E X.

Annulatus.	* 565	L'Annulaire. <i>F.</i>
Bifurcatus.	563	Le Fourchu.
Ciliaris.	563	Le Cilié.
Equinus.	564	Des Chevaux.
Fasciatus.	* 566	Le Fascié. <i>Faun. Frid.</i>
Flavescens.	* 566	Le Jaune. <i>Faun. Frid.</i>
Lutescens.	* 565	Le Jaunâtre. <i>F.</i>
Morio.	* 565	Le Morio. <i>F.</i>
Pipiens.	562	Le Commun.
Pulicaris.	564	Le Pygmée.
Reptans.	564	Le Rampant.
Stercoreus.	565	Le Sercoral.
Variegatus.	* 566	Le Varié. <i>Enum.</i>

## E M P I S.

Acephala.	* 572	L'Acéphale. <i>V.</i>
Æriva.	* 574	La Caniculaire. <i>Scop.</i>
Aurata.	* 571	La Dorée. <i>V.</i>

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . .	Taon à une seule bande noire pa- nachée.	
. . . . .		id. 18.
. . . . .		id. 12.
Taon Pluvial.	Taon à ailes brunes, piquées de blanc.	id. 23.
. . . . .	Taon gris, à jambes fauves. . . .	id. 17.
. . . . .		id. 8.
Taon Tropicue.	. . . . .	id. 20.
. . . . .		<i>M.</i> id. 2.
. . . . .		id. 2.
. . . . .		id. 7.
. . . . .		id. 3.
. . . . .		id. 6.
Cousin commun.	Cousin commun.	id. 1.
. . . . .	Cousin à trois ta- ches sur les ailes.	id. 4.
. . . . .		id. 5.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Borealis.	567	La Boréale. . . . .
Ciliata.	* 570	La Ciliée. <i>F.</i> . . . .
Cinerea.	570	La Pallipede. <i>F.</i> . . . .
Cinerea.	* 573	La Cendrée. <i>Scop.</i>
Craffipes.	* 570	La Craffipede. <i>Enum.</i>
Dubia.	* 574	L'Incertaine. <i>Scop.</i>
Ferruginea.	* 573	La Ferrugineuse. <i>Scop.</i>
Flava.	* 571	La Jaune. <i>Faun. Frid.</i>
Flavipes.	* 572	La Flavipede. <i>V.</i>
Forcipata.	568	L'Appendiculée. . . . .
Fulcrata.	* 574	La Printanière. <i>Scop.</i>
Lineata.	* 571	La Rayée. <i>V.</i>
Livida.	568	La Livide. . . . .
Maculata.	* 569	La Tachetée. <i>F.</i> . . . .
Marginata.	* 570	La Bordée. <i>F.</i> . . . .
Maura.	* 569	La Maure. <i>F.</i> . . . .
Mucronata.	* 572	La Pointue. <i>Scop.</i>
Nigra.	* 571	La Noire. <i>V.</i>
Pennipes.	567	La Plumipede. . . . .
Punctata.	* 573	La Ponctué. <i>Scop.</i>
Setosa.	* 573	La Soyeuse. <i>Scop.</i>
Stercorea.	569	La Stercorale. . . . .

# C O N O P S.

Aculeata.	578	Le Piquant. . . . .
Atomaria.	580	Le Pointillé.
Atra.	* 583	Le Charbonnier. <i>F.</i> . . .
Buccata.	581	L'Enflé. . . . .
Calcitrans.	576	Le Féroce. . . . .
Cinerea.	* 585	Le Cendré. <i>V.</i>
3-Fasciata.	* 582	Le Trifascié. <i>D. Geer.</i> .
Flavipes.	579	Le Flavipede. . . . .
Ferruginea.	579	Le Ferrugineux. . . . .

Hexagona.	* 584	L'Exagone. <i>Faun. Frid.</i> .
-----------	-------	---------------------------------



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Empis Boréale.	.	.	.	.	.	.	.	e ad. 1.
" " " "	.	.	.	.	.	.	.	M. ead.
" " " "	.	.	.	.	.	.	.	e ad. 6.

• • • • • ead. 3.

[illegible]

ead. 2.

ead. 8.

Conops à quatre  
bandes. . . . . ead. 2.

..... Мыopa 3.

• • • • • Мѣсяцъ 5.

Mouche piqueuse. Le Stomoxe. . . Stomoxys 4.

Con. à trois bandes.

L'Affile panaché de  
fauve & de noir,  
à ailes noires. . . Myopa 1.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gal.</i>
Irritans.	577	Le Méchant. . . . .
Lineata.	* 583	Le Rayé. <i>F.</i> . . . .
Lutea.	* 585	Le Jaune. <i>V.</i> . . . .
Macrocephala.	578	Le Macrocéphale. . . .
Nigra.	* 582	Le Noir. <i>D. Geer.</i> . . .
Palustris.	* 584	Des Marais. <i>Scop.</i> . . .
Petiolata.	580	Le Pétiolé. . . . .
Punctata.	* 584	Le Ponctué. <i>V.</i> . . . .
Pungens.	* 583	Le Méchant. <i>F.</i> . . . .
Rostrata.	576	Le Porte-Cône. . . . .
Rufipes.	* 582	Le Rufipede. <i>F.</i> . . . .
Sericea.	* 585	Le Soyeux. <i>V.</i> . . . .
Siberita.	* 583	Le Demi-Transparent. <i>F.</i>
Subcoleoptrata.	581	Le Déguisé. . . . .
Testacea.	580	Le Testacée. . . . .
Vesicularis.	577	Le Vésiculeux. . . . .

# A S I L U S.

Algirus.	586	L'Algérien. . . . .
Aquaticus.	* 596	L'Aquatique. <i>Scop.</i> . .
Ater.	588	Le Noir. . . . .
Barbarus.	586	L'Africain. . . . .
Barbatus.	* 593	Le Barbu. <i>Scop.</i> . . . .
Bombylius.	* 604	Le Bombyle. <i>V.</i> . . . .
Cinctus.	* 600	Le Cerclé. <i>F.</i> . . . .
Cingulatus.	* 600	L'Entouré. <i>F.</i> . . . .
Conopsoides.	* 595	Le Conopsoïde. <i>Scop.</i> .
Crabroniformis.	586	Le Frelon. . . . .
Culiciformis.	* 600	Le Culiciforme. <i>F.</i> . . .
Diadema.	* 599	Le Diadème. <i>F.</i> . . . .

*D. Geer.*

*D. Geer.*

*D. Gedff.*

*D. Fab.*

Stomoxys 5.  
Rhing. 2. *M.*

Conops à grosse tête. L'Afile à antennes en massue & ailes brunes. *Lege* 471. ead. 4.

Conops noir.

Stom. 6. *M.*  
Rhingia 1.  
ead. 3.

Stomoxys 3.  
Syrphus 12.  
Myopa 2.  
L'Afile à antennes en massue & ailes brunes bordées de blanc. ead.

id. 3.

L'Afile tout noir. id. 10.  
id. 4.

id. 29.  
id. 25.

Afile Frelon. L'Afile brun à ventre à deux couleurs. id. 5.  
id. 33.  
id. 11.

*Insect. Tom. IV.*

k

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Dorsalis.	* 597	Le Dorsal. <i>D. Geer.</i> . . .
Fasciculatus.	* 603	Le Fasciculé. <i>V.</i>
Ferox.	* 594	Le Féroce. <i>Scop.</i>
Flavipes.	* 604	Le Flavipède. <i>V.</i>
Flavus.	588	Le Jaune. . . . .
Forcipatus.	591	Le Menaçant. . . . .
Fulvus.	* 601	Le Fauve. <i>Geoff.</i> . . .
Fuscipes.	* 604	Le Fuscipède. <i>V.</i>
Germanicus.	590	L'Allemand. . . . .
Gibbosus.	587	Le Bossu. . . . .
Gilvus.	589	Le Roux. . . . .
Ignavus.	* 603	Le Paresseux. <i>Faun. Frid.</i>
Inquinatus.	* 597	Le Taché. <i>Scop.</i>
Linearis.	* 601	Le Rayé. <i>F.</i> . . . .
Lusitanicus.	593	Le Portugais.
Maculatus.	* 603	Le Trimaculé. <i>Faun. Frid.</i>
Maculatus.	* 596	Le Tacheté. <i>Scop.</i>
Marginatus.	590	Le Bordé. . . . .
Marmoratus.	* 602	Le Marbré. <i>Geoff.</i> . .
. . . . .		
Medius.	* 603	Le Moyen. <i>Faun. Frid.</i>
Morio.	592	Le Morio.
Niger.	* 596	Le Noir. <i>Scop.</i>
Niger.	* 598	Le Noir. <i>D. Geer.</i> . . .
Olandicus.	592	Le Cyindrique. . . . .
. . . . .		
Podagiricus.	* 602	Le Goutteux. <i>Enum.</i>
Punctatus.	* 599	Le Ponctué. <i>F.</i> . . .
Puillus.	* 596	Le Pygmée. <i>Scop.</i>
Rufipes.	* 595	Le Rufipède. <i>Scop.</i>

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Afile à dosier ver-  
dâtre . . . . .

Ephippium  
a 6.

Afile jaune. . . . .

id. 12.

Afile cendrée. . . . .

Afile cendré. . . . .

id. 18.

. . . . .

Afile velu de cou-  
leur fauve.

. . . . .  
Afile - Bourdon, . . . . .

id. 19.

Afile roux. . . . .

Afile noir à taches  
fauves sur le ventre.

id. 7.

id. 14.

. . . . .

*M. id.*

Afile bordé. . . . .

id. 16.

. . . . .

Afile noir lisse, à  
antennes, cuisses  
& balanciers fau-  
ves & ailes on-  
dées de brun.

Afile noir. . . . .

Afile noir lisse, à  
pattes & balan-  
ciers fauves & ai-  
les toutes noires.

id. 31.

. . . . .

id. 15.

cxlviii *Tom. III. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Rufipes.	* 598	Le Rufipede. <i>D. Geer.</i> .
Rufus.	* 597	Le Roux. <i>Scop.</i>
Tarsofus.	* 601	Les Tarses noirs. <i>Geoff.</i> .
Tenthredoideſ.	* 595	Le Tenthrédoïde. <i>Scop.</i>
Teutonius.	590	Le Chevalier. . . . .
Tipuloides.	591	Le Tipuloïde. . . . .
Undulatus.	* 601	L'Ondulé. <i>Geoff.</i> . . . .
Violaceus.	* 599	Le Violet. <i>F.</i> . . . .
Viridescens.	* 603	Le Verdâtre. <i>V.</i>

**B O M B Y L I U S.**

Ater.	607	Le Noir. . . . .
Fulvipes.	* 609	Le Fulvipede. <i>V.</i>
Fuscus.	* 607	Le Brun. <i>F.</i> . . . .
Griseus.	* 608	Le Gris. <i>F.</i> . . . .
Major.	605	Le Grand. . . . .
Medius.	606	Le Moyen. . . . .
Minimus.	* 608	Le Nain. <i>F.</i> . . . .
Minimus.	* 609	Le Pygmée. <i>Enum.</i>
Minor.	606	Le Petit. . . . .
Nudus.	* 609	Le Nud. <i>V.</i>
Verficolor.	* 608	Le Verficolor. <i>F.</i> . . . .
Virefcens.	* 608	Le Verdâtre. <i>F.</i> . . . .

**H Y P P O B O S C A.**

Avicularia.	610	Des Oifeaux. . . . .
-------------	-----	----------------------



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*Fab.*

Afile à patt. rouffes.

. . . . . Afile noir liffe à  
pattes fauves &  
pieds noirs.

. . . . . id. 27.

. . . . . Afile à pattes fau-  
ves alongées. id. 26.

. . . , . . . Afile noir velu à  
pattes & balanciers  
fauves & ailes noi-  
res ondées.

. . . . . id. 13.

. . . . . id. 6.

. . . . . id. 8.

. . . . . *M.* 11. id.

Bombylius à ailes Le Bichon. . . . id. 1.  
panachées.

Bombylius à ailes  
ponctuées. . . . . id. 3.

. . . . . *M.* 6. id.

. . . . . id. 5.

. . . . . *M.* 14. id.

. . . . . *M.* 12. id.

Hippobofque des

Oifeaux. . . . . ead. 2.

*k* *iiij*

c] T o m. III. N O M E N C L A T O R

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Corvi.		612	Du Corbeau.
Equina.		610	Des Chevaux. . . . .
Hirundinis.		611	Des Hirondelles. . . . .
Ovina.		611	Des Brebis. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*Fab.*

Hippobosque des	La Mouc.-à-Chien.	ead. 1.
Chevaux.		
. . . . .	La M.-Araignée.	ead. 3.
. . . . .		ead. 4.

*Finis Nomenclatoris Entomologi Tomi III.*



T O M I I V

# NOMENCLATOR

## ENTOMOLOGUS,

INSECTORUM SYSTEMATIS NATURÆ GENERA;  
SPECIES LINN. ANTIQUAS RECENTIORESQUE  
NUPERRIME DETECTAS,  
NECNON PRÆCIPUORUM ENTOMOLOGORUM  
SYNONYMIAM,  
ORDINE ALPHABETICO INDICANS.  
ABBREVIATIONES.

Species novas designat.

*D. F.* . . . . D. Fabricium.

*Enum.* . . . . Austriae Insectorum Enumerationem

*Scop.* . . . . Entomologiam Carniolicam.

*Geoff.* . . . . Insectorum Parisiensium Historiam.

*Ent. paris.* . . Entomologiam Parisiensem.

*V.* . . . . Nostrum Musæum.

D. Cinn. Pag; Gall.

APTERA.

LEPISMA.

Lineata.	* 3	La Rayée. F. . . .
Longicornis.	* 3	La Longicorne. Scop.
Polypoda.	2	La Polypede. . . .
Saccharina.	1	La Saccharine. . . .
Terrestris.	3	La Terrestre.

PODURA.

Ambulans.	9	L'Ambulante. . . .
Annularis.	* 10	L'Annulaire. Geoff. . . .
Aquatica.	8	L'Aquatique. . . .
Aquatica grisea.	* 10	L'Aquatique grise. D. Geer.
Arborea.	6	Des Arbres. . . .
Atra.	4	La Noire. . . .
Cincta.	7	L'Entourée. . . .
Fimetaria.	9	La Printanière. . . .
Lignorum.	* 11	Des Bois. F. . . .
Livida.	* 10	La Livide. Geoff. . . .
Longicornis.	* 10	La Longicorne. Geoff. . . .
Minuta.	5	La Petite. . . .
Monura.	* 11	La Monure. Enum.
Nivalis.	6	Dè la Neige. . . .
Plumbea.	5	La Plombée. . . .
Polypoda.	4	La Polypede. . . .
Pusilla.	8	La Bronzée. . . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

APTERE.

. . . . .	ead. 3.
. . . . . La Forbicine cylin-	
drique. . . . .	ead. 2.
Forbicine demi - Forbicine platte. .	ead. 1.
cyllindrique.	
Pod. non fauteufe. . . . .	ead. 17.
<i>Dcleatur.</i>	
Podure aquatique Podure noire aqua-	
noire. . . . .	ead. 15.
Podure aquatique	
grise , p. 28.	
Podure grise des Podure porte - an-	
arbres. <i>Lege</i> p. 21. neaux. . . . .	ead. 9.
Pod. brune ronde. . . . .	ead. 4.
. . . . .	ead. 11.
. . . . .	ead. 16.
. . . . .	ead. 13.
. . . . . Podure jaune à an-	
neaux noirs. . . . .	Annulata.
. . . . . Podure brune en-	
fumée.	
. . . . .	ead. 6.
Podure grise des	
arbres. . . . .	ead. 7.
Podure plombée. . Podure grise com-	
mune. . . . .	ead. 5.
. . . . .	ead. 3.
. . . . .	ead. 14.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Signata.		* 9	La Tachetée. <i>Geoff.</i> . . .
Termiformis.		* 13	La Termiforme. <i>Scop.</i> . . .
Vaga.		6	La Vagabonde. . . . .
Viatica.		* 10	Des Chemins. <i>Geoff.</i> . . .
Villosa.		7	La Velue. . . . .
Violacea.		* 10	La Violette. <i>Geoff.</i> . . .
Viridis.		4	La Verte. . . . .

# TERMES.

Fatidicum.		15	Le Prophete. . . . .
Florum.		* 15	Des Fleurs. <i>Scop.</i> . . .
Pulsatorium.		14	Le Balancier. . . . .
Sylvarum.		* 15	Des Forêts. <i>Scop.</i> . . .

# PEDICULUS.

Alaudæ.		* 40	De l'Alouette des Champs. <i>I num.</i>
Albiventris.		* 38	Du Roitelet. <i>Scop.</i> . . .
Anseris.		23	Des Oies. . . . .
Apis.		31	De l'Abeille. . . . .
Ardeæ.		24	Du Héron cendré. . . .
Afini.		21	De l'Ane. . . . .
Auritus.		* 35	L'Auriculé. <i>Scop.</i> . . .
Bidentatus.		* 37	Du Ramier. <i>Scop.</i> . . .
Bovis.		20	Du Taureau. . . . .
Canis.		* 33	Du Chien. <i>D. Geer.</i> . . .
Caponis.		29	Du Chapon. . . . .
Cerambycinus.		* 38	De l'Abeille-Violette. <i>Scop.</i>
Cervi.		19	Du Cerf. . . . .
Charadrii.		25	Du Pluvier vert. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

5 . . . . .	Podure noirâtre à taches fauves sur le ventre. . .	ead. 1.
. . . . .	. . . . .	ead. 8.
. . . . .	Pod. noire terrestre.	
. . . . .	Podure commune velue. . . .	ead. 11.
. . . . .	Podure violette.	
. . . . .	Podure verte aux yeux noirs. . .	ead. 2.

5 . . . . .	. . . . .	Hemer. 16.
-------------	-----------	------------

Pou du Bois.	Pou du Bois. . .	Hemer. 15.
--------------	------------------	------------

5 . . . . .	. . . . .	Motacillæ.
. . . . .	id. . . . .	id. 22.
. . . . .	. . . . .	id. 42.
. . . . .	id. . . . .	M. id.
. . . . .	. . . . .	id. 10.

. . . . .	. . . . .	id. 7.
Ricin du Chien.		

. . . . .	Pou de la Poule à ventre bordé de noir. . . . .	id. 35.
-----------	---	---------

. . . . .	. . . . .	id. 5.
. . . . .	. . . . .	M. id.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gali.</i>
Chloridis.	* 41	Du Verdier. <i>Enum.</i>
Ciconiæ.	25	De la Cicogne. . . . .
Citrinellæ.	* 41	De l'Ortolan. <i>Enum.</i>
Coccineus.	* 38	Des Hémérobès. <i>Scop.</i>
Columbæ.	30	Du Pigeon. . . . .
Colymbinus.	* 37	Du Grebe de riviere. <i>Scop.</i>
Corvi.	22	Du Corbeau. . . . .
Currucæ.	* 41	De la Fauvette babillarde. <i>Enum.</i>
Curvirostræ.	* 41	Du Bec-Croisé. <i>Enum.</i>
Cuspidatus.	* 37	Du Râle d'eau. <i>Scop.</i>
Cygni.	23	Du Cygne. . . . .
Dentatus.	* 35	Du Canard. <i>Scop.</i>
Dolichocephalus.	* 34	Du Lorient. <i>Scop.</i>
Emberizæ.	* 32	Du Bruant. <i>D. Geer.</i>
Equi.	21	Du Cheval. . . . .
Farionis.	31	De la Truite faumonée.
Fasciatus.	* 34	Du Coucou. <i>Scop.</i>
Fringillæ.	* 31	Du Pinçon. <i>D. Geer.</i>
Fulicæ.	25	De la Morelle. . . . .
Gallinæ.	28	De la Poule. . . . .
Gallinæ.	* 33	De la Poule. <i>D. Geer.</i>
Grassicornis.	* 35	Du Canard sauvage. <i>Scop.</i>
Gruis.	25	De la Grue. . . . .
Hæmatopi.	26	De l'Huitrier. . . . .
Hæmatopus.	* 33	De l'Autour. <i>Scop.</i>
Hirundinis.	31	Du Martinet. . . . .
Humanus.	17	De l'Homme. . . . .
Humanus capitis.	* 41	De la Tête. <i>D. Geer.</i>
Junceus.	* 37	Du Vaneau. <i>Scop.</i>
Infauſti.	22	Du Merle de Roche. . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . id. 28.

. . . . . Pou du Pigeon. . id. 36.

Ricin de la Cor- Pou du Corbeau. . id. 15.  
nille.

. . . . . id. . . . id. 21.

Ricin du Bruant. Pou du Moineau Orioli.  
Franc. . . . id. 37.  
. . . . . id. 9.

Ricin du Pinçon. . . . . Cuculi.  
. . . . . id. . . . M. id.

. . . . . Pou de la Poule à  
tête & corcelet  
pointu des deux  
côtés. . . . id 33 &  
non 3c.

Ricin de la Poule.  
*Lege Crafficornis.*

. . . . . id. 27.  
. . . . . id. 30.

. . . . . Strigis.  
. . . . . id. 40.

Le Pou ordinaire. Le Pou ordinaire. id. 1.  
Pou humain de la  
tête.

. . . . . id. 17.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Lagopi.	30	De la Gélinothe blanche. †
Maximus.	* 34	De la Buse. <i>Scop.</i> . . . †
Meleagridis.	27	Du Dindon. . . . .
Mergi.	* 32	Bu Plongeon. <i>D. Geer.</i> †
Moschatæ.	23	Du Canard masqué.
Musculi.	* 39	Des Souris. <i>Enum.</i>
Ocellatus.	34	De la Corneille. . . . .
Ortygometræ.	* 40	Du Roi de Caille. <i>Enum.</i>
Ovalis.	* 37	Du Courly. <i>Scop.</i>
Ovis.	19	De la Brebis.
Pari.	30	De la Mésange. . . . .
Pavonis.	26	Du Paon: . . . . .
Phasiani.	* 39	Du Faisan. <i>F.</i> . . . . .
Picæ.	23	De la Pie. . . . .
Plataleæ.	24	De la Spatule. . . . .
Porcelli.	18	Du Cochon-d'Inde.
Pubis.	18	Le Morpion. . . . .
Querquedula.	24	De la Sarcelle. . . . .
Recturvirostræ.	25	De l'Avosette. . . . .
Rostratus.	* 38	Du Taupé-Grillon. <i>Scop.</i>
Rubeculæ.	* 41	De la Rouge-Gorge. <i>Enum.</i>
Sternæ.	24	De la Mouette. . . . .
Suis.	18	Du Cochon.
Tetraonis.	29	Du Coq de bruyère. . . .
Tinnunculi.	21	De la Crécerelle. . . . .
Vituli.	21	Du Veau. . . . .

# P U L E X.

Irritans.	42	La Puce. . . . .
-----------	----	------------------

# A C A R U S.

Acarorum.	* 78	Des Mittes. <i>Enum.</i>
Alaudæ.	* 74	De l'Alouette. <i>Enum.</i>
Agaricorum.	* 65	Des Agarics. <i>Scop.</i>
Appendiculatus.	* 75	L'Appendiculée. <i>Enum.</i> <i>D. Geer.</i>



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*Fab.*

5 . . . . .		<i>M. id.</i>
6 . . . . .		<i>Buteonis.</i>
7 . . . . .	Le Pou du Dindon.	<i>id. 32.</i>
	<i>Lege p. 600.</i>	
Ricin du Plongeon.		
. . . . .		<i>Cornifis 16.</i>
. . . . .		<i>id. 38.</i>
. . . . .	<i>Lege page 600.</i>	<i>id. 31.</i>
. . . . .		<i>id. 34.</i>
. . . . .	<i>id.</i>	<i>id. 18.</i>
. . . . .		<i>M. id.</i>
. . . . .	Le Morpion.	<i>id. 2.</i>
. . . . .	<i>id.</i>	
. . . . .		<i>id. 29.</i>
. . . . .		<i>Gryllotalpæ,</i>
Ricin de la Mouette.		<i>id. 26.</i>
. . . . .		<i>M. id.</i>
. . . . .		<i>id. 12.</i>
. . . . .		<i>id. 8.</i>
Puce commune.	La Puce.	<i>ead.</i>

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Aphidum.	* 67	Des Pucerons. <i>D. Geer.</i> :
Aphidioides.	49	L'Aphidioïde. . . . .
Aquaticus.	53	L'Aquatique. . . . .
Aquaticus marginatus.	* 69	L'Aquatique à ailerons. <i>D. Geer.</i> . . . . .
Aquaticus maculatus.	* 69	L'Aquatique tachetée. <i>D. Geer.</i> . . . . .
Aquaticus globosus.	* 68	L'Aquatiq. ronde. <i>D. Geer.</i>
Avicularum.	* 66	L'Aviculaire. <i>D. Geer.</i> .
Baccarum.	57	Des Baies. . . . .
Cadaverum.	* 71	Des Cadavres. <i>Enum.</i>
Carduelis.	* 77	Du Chardoneret. <i>Enum.</i>
Caudatus.	* 63	La Prolongée. <i>D. Geer.</i> .
Coccinellæ.	* 64	Des Coccinelles. <i>Scop.</i>
Coccineus.	* 77	L'Écarlate. <i>Enum.</i>
Coleoptratorum.	59	Des Coléoptères. . . . .
Coleoptratus.	49	La Coléoptère. . . . .
Collurionis.	* 63	Du Lanier-Écorcheur. <i>Scop.</i>
Conservæ.	* 71	De la Conserve. <i>Enum.</i>
Cornicis.	* 62	De la Corneille. <i>Scop.</i>
Corticalis.	* 67	La Corticale. <i>D. Geer.</i> .
Craffipes.	46	La Craffipede. . . . .
Croceus.	62	La Safranée. . . . .
Culicis.	* 67	Des Cousins. <i>D. Geer.</i> .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Mitte des Pucerons.

. . . . . La Tique rouge des  
pierres à pattes  
antérieures fort  
longues. . . .

id. 19.

Mitte aquatique  
rouge.

La Tique rouge fa-  
tinée aquatique.

Trombidium  
tertium &  
*non septi-*  
*mum.*

Mitte aquatique à  
ailerons.

Mitte aquatique à  
taches.

Mitte aquatique  
ronde. . . . .

Trombid. 3.

Mitte des petits  
Oiseaux.

. . . . . id. 26.

Mitte à queue. . . . . Trombid. 4.

Mitte des Bour-  
dons.

Mitte des Coléop-  
teres. . . . .

id. 30.

Mitte à rebord.

Tique noire à ven-  
tre anguleux en  
devant. . . . .

id. 18.

Mitte de l'écorce  
des arbres.

Tique noire & lisse  
des pierres.

. . . . . id. 14.

. . . . . id. 40.

Mitte des Cousins.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Denticulatus.	* 76	La Dentelée. <i>Enum.</i>
Destructor.	* 72	La Mitte - Destructeur. <i>Enum.</i>
Domesticus.	* 65	La Domestique. <i>D. Geer.</i>
Dysenteriae.	51	La Dyssentérique. . . .
Elephantinus.	44	L'Éléphant. . . . .
Eruditus.	* 73	La Bibliomane. <i>Enum.</i>
Exulcerans.	52	De la Gale. . . . .
Foliorum.	* 77	Des Feuilles. <i>Enum.</i>
Formicarum.	* 64	Des Fourmis. <i>Scop.</i>
Fucorum.	* 70	Du Varec. <i>F.</i> . . . .
Fungorum.	61	Des Champignons. . .
Geniculatus.	53	La Géniculée. . . . .
Graminum.	* 75	Des Graminées. <i>Enum.</i>
Gymnopteronum.	58	Des Gymnopteres. . .
Hispanus.	* 70	L'Espagnole. <i>F.</i> . . .
Holofericeus.	54	La Satinée. . . . .
Holfatus.	* 70	L'Aplanie. <i>F.</i> . . . .
Lactis.	51	Du Lait. . . . .
Leucurus.	* 71	La Blanchâtre. <i>Enum.</i>
Lichenum.	* 65	Des Lichens. <i>Scop.</i>
Lichenis.	* 71	Du Lichen de terre. <i>Enum.</i>
Limacum.	* 77	Des Limaçons. <i>Enum.</i>
Lipsiensis.	* 70	La Saxonne. <i>F.</i> . . .
Littoralis.	61	Des Rivages. . . . .
Locusta.	* 63	De la Mélange bleue. <i>Scop.</i>
Longicornis.	60	La Longicorne. . . .
Motatorius.	48	La Mobile. . . . .
Muscarum.	57	Des Mouches. . . . .
Muscarum.	* 64	Des Mouches. <i>Scop.</i>
Musci.	* 77	De la Mouffe. <i>Enum.</i>
Muscorum.	* 65	Des Mouffes. <i>Scop.</i>
Natator.	* 70	La Tique-Nageur. <i>Enum.</i>
Nepesiformis.	* 64	La Cimicoïde. <i>Scop.</i>
Palipes.	* 69	La Pallipede. <i>F.</i> . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Mitte Domestique.

. . . . . id. 24.  
. . . . . id. 1.

Mitte de la Gale.

Le Ciron de la Gale.

Scabiei.

. . . . . id. 36.  
. . . . . id. 37.  
. . . . . id. 25.

Mitte des Demoi-  
selles.

Mitte rouge des  
Mouches. . .

id. 29.

. . . . .  
Mitte fatinée ter-  
restre.

. . . . .  
Tique rouge fatinée  
terrestre.

*M.* id.  
Trombid. 2.

. . . . . *M.* id.  
. . . . . id. 23.

. . . . . id. 8.  
. . . . . id. 35.

. . . . . La Pince rouge. . id. 34.  
. . . . . id. 17.

Mitte des Mouches.

Mitte brune des  
Mouches. . .

id. 28.

. . . . . id. 4.

clxvj TOM. IV. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Parasitus.	* 67	La Parasite. <i>D. Geer.</i>
Passerinus.	47	Des Moineaux. . . .
Phalangii.	* 66	Des Faucheurs. <i>D. Geer.</i>
Phalangoides.	* 68	La Phalangiforme. <i>D. Geer.</i>
Pici.	* 63	Du Pic moyen. <i>Scop.</i>
Piger.	* 65	Du Lichen des Hêtres. <i>Scop.</i>
Prægnans.	* 76	La Printanière. <i>Enum.</i>
Putrescentiæ.	* 77	De la Fermentation. <i>Enum.</i>
Radiatus.	* 62	Des Tortues. <i>Scop.</i>
Reduvius.	44	La Réduve. . . . .
Ricinus.	46	La Tique des Chiens. . .
Rubens.	* 76	La Rougeâtre. <i>Enum.</i>
Rupestres.	60	Des Pierres. . . . .
Salicinus.	61	Des Saules. . . . .
Sambuci.	* 78	Du Sureau. <i>Enum.</i>
Sanguisugus.	* 69	La Sangsue. <i>F.</i> . . .
Scaber.	61	La Chagrinée.
Siro.	50	De la Farine. . . . .
Squamofus.	* 66	L'Écailleuse. <i>D. Geer.</i>
Telarius.	50	La Tisserand. . . . .
Testudineus.	* 76	La Tortue. <i>Enum.</i>
Tremellæ.	61	De la Trémelle. . . .
Turdi.	* 63	Du Merle à collier. <i>Scop.</i>
Vegetans.	* 79	La Végétante. <i>Enum.</i>
Vesperilionis.	47	Des Chauve-Souris. . .
Vitis.	* 76	De la Vigne. <i>Enum.</i>
Zostera.	* 70	De l'Algue marine. <i>F.</i> .

PHALANGIUM.

Araneoides.	* 85	L'Aranéοide. <i>F.</i> . . .
Balænarum.	* 83	Des Baleines <i>F.</i> . . .
Bilineatum.	* 84	Le Rayé. <i>F.</i> . . . .
Bimaculatum.	* 84	Le Bimaculé. <i>F.</i> . . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Mitte Parasite.

Mitte des Moi- Tique de la Chauve-  
neaux. Souris. . . . id. 16.

M. des Faucheurs. . . . id. 31.

Mitte-Faucheur.

Mitte Réduve. . . . id. 3.

Mitte Ricinoïde. . LaTique des Chiens. id. 2.

. . . . id. 33.

. . . . id. 39.

. . . . id. 5.

Mitte de la farine. . . . id. 21.

Mitte à écailles.

Mitte Fileuse. Le Tisserand d'au-  
tomne. *Lcge* 626. id. 20.

. . . . id. 38.

. . . . id. 15.

. . . . id. 27.

. . . . id. 10.

. . . . Pycnogo-  
num 1.

. . . . id. 4.

. . . . id. 6.

clxviij TOM. IV. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Cancroides.	82	Faux Scorpion. . . . .
Cornutum.	81	Le Cornu. . . . .
Diadema.	* 84	Le Diadème. <i>F.</i> . . . .
Grossipes.	80	Le Grossipede.
Opilio.	80	Des Murailles. . . . .
Tricarinatum.	83	Le Tricarené. . . . .

A R A N E A.

Albini.	* 108	L'Albin. <i>Scop.</i>
Albo-Maculata.	* 117	La Huitmaculée. <i>D. Geer.</i>
Aldrovandi.	* 107	L'Aldrovande. <i>Scop.</i>
Angulata.	90	L'Angulaire. . . . .
Annularis.	* 128	L'Annulaire. <i>V.</i>
Aquatica.	102	L'Aquatique. . . . .
Arundinacea.	90	Des Roseaux.
Atrox.	* 117	L'Atroce. <i>D. Geer.</i> . . .
Aurantio-Maculata.	* 114	L'Orangée. <i>D. Geer.</i> . . .
Bimaculata.	98	La Bimaculée.
Bipunctata.	89	La Bipoctquée. . . . .
Blancardi.	* 113	La Blancard. <i>Scop.</i>
Brachiata.	* 125	La Difforme. <i>Faun. Frid.</i>
Calycina.	88	La Fleuriste.
Carnifex.	* 123	La Meurtriere. <i>F.</i> . . . .
Catesbei.	* 112	La Catesby. <i>Scop.</i>
Chelata.	* 125	La Chéliforme. <i>Faun. Frid.</i>
Cicatricosa.	* 115	La Cicatrisée. <i>D. Geer.</i> . .
Cinerea.	* 125	La Cendrée. <i>F.</i> . . . .
Citrea.	* 120	La Citronnée. <i>D. Geer.</i> . .
Clerckii.	* 109	La Clerk. <i>Scop.</i>
Conica.	* 115	La Conique. <i>D. Geer.</i> . . .

<i>D. Geer.</i>	<i>D. Geoff.</i>	<i>D. Fab.</i>
Faux - Scorpion • d'Europe.	Le Scorpion-Arai- gnée.	Scorpio 7.
Faucheur cornu.	id. teste <i>D. Fabricio.</i>	id. 3.
• • • • •	• • • • •	id. 5.
Fauc. des murailles.	Le Faucheur. • •	id. 2.
• • • • •	• • • • •	<i>M.</i> id. 6.

Araignée tachetée  
de blanc.

Araignée angulaire. • • • • • ead. 20.

Araignée aquatique. L'Araignée brune  
aquatique. • • ead. 32.

Araignée atroce.  
Araignée tachetée  
d'orangé.

Araignée à points  
concaves.

• • • • • ead. 36.

Araig. à cicatrices.

• • • • • ead. 44.

Araig. jaune-citron. L'Araignée citron.  
*Lege* n<sup>o</sup>. 2.

Araignée à ventre  
conique.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Corollata.		94	Des Fleurs.
Cucurbitina.		88	La Cucurbite. . . . .
Degeeri.	*	107	La Degéer. <i>Scop.</i>
Diadema.		86	La Porte-Croix. . . . .
Domestica.		91	La Domestique. . . . .
Dorsalis.	*	123	La Dorsale. <i>F.</i> . . . .
Dorsata.	*	122	La Hâlée. . . . .
Dumetorum.	*	126	Des Buissons. <i>Geoff.</i> . .
Extensa.		96	La Patte-Étendue. . . .
Fasciata.	*	125	La Fasciée. <i>Geoff.</i> . . .
Fimbriata.		97	Des Marais. . . . .
Foliata.	*	126	La Porte-Feuille. <i>Geoff.</i> .
Formicaria.	*	119	La Fourmi. <i>D. Geer.</i> . .
Formosa.	*	130	La Belle. <i>V.</i>
Forskaelii.	*	110	La Forschael. <i>Scop.</i>
Frischii.	*	108	La Frisch. <i>Scop.</i>
Fumigata.		94	L'Enfumée. . . . .
Furcata.	/*	129	La Fourchue. <i>V.</i>
Fusca.	*	115	La Brune. <i>D. Geer.</i> . . .
Globosa.	*	121	La Globuleuse. <i>F.</i> . . . .
Goedartii.	*	108	La Goédart. <i>Scop.</i>
Goezenii.	*	125	La Goézen. <i>Enum.</i>
Grossipes.	*	119	La Crassipede. <i>D. Geer.</i> .
Halsequitii.	*	111	L'Halsequist. <i>Scop.</i>
Holosericea.		98	La Satinée. . . . .
Horrida.	*	121	L'Horrible. <i>F.</i> . . . .
Joblotii.	*	113	La Joblot. <i>Scop.</i>
Jonstoni.	*	111	La Jonston. <i>Scop.</i>

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Araignée verte à  
points noirs.

Araignée à croix. L'Araignée à croix  
papale. . . . .

ead. 21.

Araig. Domestique. . . . . ead. 13.

. . . . . ead. 41.

. . . . . ead. 14.

. . . . . Araignée à feuille  
coupée.

Araignée Patte- Araignée à ventre  
Étendue. cylindrique &  
pattes de devant  
étendues. . . . .

ead. 1.

. . . . . Araignée brune à  
trois raies trans-  
versales sur le  
ventre.

ead. 40.

Araig. des marais. . . . .

. . . . . Arai. Porte-Feuille,

Araignée Fourmi,

. . . . . ead. 39.

Araignée brune.

. . . . . ead. 9.

Araignée à grosses  
pattes.

Araignée satinée.

. . . . . ead. 10.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Impressa.	* 122	L'Imprimée. <i>F.</i> . . . .
Intersecta.	* 126	L'Entrecoupée. <i>Geoff.</i> . .
Kalmii.	* 111	La Kalm. <i>Scop.</i>
Labyrinthica.	92	La Dédale. . . . .
Lævipes.	105	La Tigrée. . . . .
Latens.	* 120	La Cachée. <i>F.</i> . . . .
Leuwenhoekii.	* 106	La Leuwenhoek. <i>Scop.</i>
3-Lineata.	92	La Trirayée.
4-Lineata.	93	La Quadrirayée.
Lineata.	* 129	La Rayée. <i>V.</i>
Littoralis.	* 118	Des Rivages. <i>D. Geer.</i> .
Longipes.	* 124	La Longipede. <i>F.</i> . . .
Longipes.	* 127	La Longipede. <i>Geoff.</i> ..
Lupus.	* 127	Le Loup. <i>Geoff.</i> . . . .
Malpighii.	* 109	La Malpighi. <i>Scop.</i>
Marginata.	* 118	La Bordée. <i>D. Geer.</i> . .
Margravii.	* 113	La Margrave. <i>Scop.</i>
Marmorata.	* 122	La Marbrée. <i>F.</i> . . . .
Marmorata.	* 127	La Déchiquetée. <i>Geoff.</i> .
Merianæ.	* 107	La Mérian. <i>Scop.</i>
Moniligera.	* 128	La Porte-Anneau. <i>V.</i>
Montana.	95	La Renversée. . . . .
Mouffeti.	* 110	La Mouffet. <i>Scop.</i>
Myopa.	* 124	La Myope. <i>F.</i> . . . .
Nigrita.	* 121	La Nègresse. <i>F.</i> . . . .
Nocturna.	96	La Nocturne.
Notata.	95	La Fasciée.
Octopunctata.	89	La Huitponctué.
Osbekii.	* 110	L'Osbek. <i>Scop.</i>
Palustris.	103	Des Prés marécageux. .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

ead. 15.

Araignée à ventre  
roux rayé de noir  
& pattes arlequi-  
nées.

ead. 30.

Araignée tigrée. ead. 16.

ead. 5.

Araig. des rivages.

ead. 48.

Araignée rougeâtre  
à ventre jaune  
ponctué de noir.

Araignée-Loup.

Araignée bordée.

*Lege Marmorea.* Marmor. 22.

Araignée à feuilles  
découpées & dé-  
chiquetées.

Araignée renversée  
Domestique.

ead. 47.

ead. 8.

ead. 31.



<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Petiverii.	* 110	La Pétiver. <i>Scop.</i>
Phalangioides.	* 127	La Phalangioïde. . . ?
Pini.	* 119	Du Pin. <i>D. Geer.</i> . . ?
Podæ.	* 113	La Poda. <i>Scop.</i>
Pubescens.	* 123	La Cotonneuse. <i>F.</i> . .
Punctoria.	* 128	La Dangereuse. <i>V.</i>
Quadrinaculata.	* 114	La Quadrinaculée. <i>D. Geer.</i>
Quadrinaculata.	198	La Quadrinaculée. . .
Raji.	* 106	La Rai. <i>Scop.</i>
Reaumurii.	* 105	La Réaumur. <i>Scop.</i>
Redii.	* 107	La Redi. <i>Scop.</i>
Redimita.	93	La Couronnée. . . . .
Refupina Sylvestris.	* 116	La Renversée - Sauvage. <i>D. Geer.</i> . . . . .
Reticulata.	87	La Réticulée.
Riparia.	92	Des Rivages.
Roberti.	* 112	La Robert. <i>Scop.</i>
Roefelii.	* 108	La Roefel. <i>Scop.</i>
Rufipes.	95	La Rufipede.
Rufofasciata.	* 117	La Fasciée. <i>D. Geer.</i> . . ?
Rumphi.	* 112	La Rumphius. <i>Scop.</i>
Rupifris.	102	Des Pierres.
Ruricola.	* 118	La Campagnarde. <i>D. Geer.</i>
Saccata.	103	La Porte-Sac. . . . .
Sanguinolenta.	95	La Sanguinolente.
Scenica.	101	La Parée. . . . .
Schæfferi.	* 109	La Scheffer. <i>Scop.</i>

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . : Araig. Domestique  
femblable au Fau-  
cheur. *Ent. paris.*

Araignée du Pin.

. . . . . ead. 43.

Araignée à quatre  
taches blanches.

. . . . . ead. 23.

Araignée à couron-  
ne rouge.

Araignée Renver-  
sée-Sauvage.

Araignée à bande  
rouille.

Araignée de terre.

. . . . . Araignée cendrée à  
trois lignes blan-  
ches sur le cor-  
celet. . . . . ead. 38.

Araignée à bandes  
blanches.

Araig. fauteuse aux  
trois chevrons  
blancs. . . . . ead. 42.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gal.</i>
Scopulorum.	* 125	Des Écueils. <i>F.</i> . . .
Scorpiformis.	* 123	La Scorpiforme. <i>F.</i> . . .
Senoculata.	99	A six Yeux. . . . .
Sexpunctata.	97	La Sixpunctuée. . . . .
Signata.	* 120	La Marquée. <i>F.</i> . . . .
Sloanii.	* 112	La Sloane. <i>Scop.</i>
Swammerdamii.	* 106	La Swammerdam. <i>Scop.</i>
Tarantula.	100	La Tarentule. . . . .
Tricuspidata.	* 122	La Convergente. <i>F.</i> . . .
Triguttata.	* 122	La Triponctuée. <i>F.</i> . . .
Truncorum.	101	Des Troncs.
Tuberculata.	* 115	La Tuberculée. <i>D. Geer.</i> .
Udmanni.	* 111	L'Udmann. <i>Scop.</i>
Umbratica.	* 129	La Délicate. <i>V.</i>
Viatica.	104	La Voyageuse. . . . .
Virefcens.	104	La Verdâtre.
Viridissima.	* 116	La Verte. <i>D. Geer.</i> . . .
Vittata.	* 127	La Bandelette. <i>Geoff.</i> . .
Wilkii.	* 111	La Wilkes. <i>Scop.</i>

# S C O R P I O.

Europæus.	131	L'Européen. . . . .
-----------	-----	---------------------

# C A N C E R.

Alatus.	* 165	L'Ailé. <i>F.</i> . . . . .
Angulatus.	* 141	L'Anguleux. <i>F.</i> . . . .
Araneiformis.	* 166	L'Aranéiforme. <i>F.</i> . . .
Araneus.	142	L'Araignée. . . . .
Arctus.	159	L'Étroit. . . . .
Astacus.	153	L'Écrevisse. . . . .
Atomos.	164	L'Atome. . . . .
Auritus.	* 149	L'Auriculé. <i>F.</i> . . . . .
		<i>D. Geer.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. . . . .	ead. 50.
. . . . .	ead. 34.
Araig. à six yeux. . . . .	ead. 49.
. . . . .	ead. 35.
. . . . .	ead. 6.

. . . . .	ead. 45.
. . . . .	ead. 17.
. . . . .	ead. 33.

Araig. à tubercules,

Araig. brune bor- dée. . . . .	Araig. à pattes de devant longues & arlequinées. . . . .	ead. 12.
-----------------------------------	--	----------

Araig. toute verte. . . . . .	Araignée à bande rouge.
----------------------------------	----------------------------

Scorpion d'Europe. . . . .	id.
----------------------------	-----

. . . . .	Pagurus 6.
. . . . .	M. id.
. . . . .	Pagur. id. 7.
. . . . .	id. 40.
. . . . .	Scyllarus 1.
Écrevisse de riviere. L'Écrevisse. . . . .	Fluviatilis.
. . . . .	Gammarus
. . . . .	8 ?
. . . . .	id. 59.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Bernardus.		150.	Bernard - l'Hermite.
Boreas.	*	167.	Le Boréal. <i>F.</i>
Cancellus.	*	169	Le Sibérien. <i>F.</i>
Caput-Mortuum.		152	La Tête-de-Mort.
Carabus.		156	Le Carabé.
Chiragra.	*	149	Le Chiragre. <i>F.</i>
Condylitatus.	*	148	Le Crochu. <i>F.</i>
Corniger.	*	169	Le Porte-Corne. <i>F.</i>
Cornutus.		146	Le Cornu.
Crangon.		155	Crangon.
Cruentatus.		147	L'Enflanglanté.
Depressus.	*	142	L'Aplati. <i>F.</i>
Depurator.		139	L'Élargi.
Dodecos.		145	Le Formidable.
Eremita.		151	L'Hermite.
Esca.	*	170	L'Utile.
Gammarus.		152	La Langouste.
Germanus.		147	L'Allemand.
Gibbosus.	*	169	Le Boîssu. <i>F.</i>
Granarius.	*	136	Le Grain. <i>F.</i>
Granulatus.		139	Le Granulé.
Grapsus.		148	Le Tacheté.
Groenlandicus.	*	168	Le Groenlandois. <i>F.</i>
Grossipes.		161	Le Grossipede.
Harengum.	*	167	Des Harengs. <i>F.</i>
Hastatus.		145	Le Militaire.
Hexapus.		134	L'Exapode.
Hirtellus.		143	Le Hérissé.
Histro.	*	167.	L'Arlequin. <i>F.</i>
Homari.	*	166.	Du Homar. <i>F.</i>
Istrianus.	*	140.	L'Istrien. <i>Scop.</i>
Lanatus.		142.	Le Velu.
Locusta.		163	La Sauterelle.
Longicornis.		155	La Longicorne.
Linearis.		163	Le Linéaire.
Maja.		146	Le Maja.

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Écreville - Bernard -  
l'Hermite. . .

Pagur. 2.

Aftac. 12.

Gamm. 3.

Pagur. 9.

id.

*M. id.*

Gamm. 7.

id.

Aftac. 20.

id.

id.

Longirostr.

Pagur. id.

Gamm. 12.

Marinus.

id.

*M. Gam. id.*

*M.* id:

id.

id.

Aftacus 14.

Gammarus  
longicornis.

Aftacus 8.

id.

*Lege* Histrío.

*Astacus id.*

*Astacus* id.

id.

Gammær. 5.

id.

Gammar. 8,

id.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Mantis.	160	La Mante. . . . .
Mascaronius.	* 150	L'Aplani. <i>F.</i> . . . .
Medusarum.	* 170	Des Meduses. <i>F.</i> . . . .
Minutus.	134	La Nourrice. . . . .
Moenas.	138	Le Fou. . . . .
Muscosus.	143	L'Enveloppé.
Mutus.	133	Le Muet. . . . .
Narval.	* 166	Le Narval. <i>F.</i> . . . .
Nasutus.	* 148	Le Prolongé. <i>F.</i> . . . .
Norwagicus.	158	Le Norvégien. . . . .
Nugax.	* 169	Le Dilaté. <i>F.</i> . . . .
Nucleus.	137	La Noix. . . . .
Oculatus.	* 165	L'Oculé. <i>F.</i> . . . .
Pagurus.	140	L'Officinal. . . . .
Pelagicus.	136	De l'Océan. . . . .
Pennaceus.	154	L'Arlequin. . . . .
Personatus.	144	Le Caché.
Pisum.	133	L'Orbiculaire. . . . .
Puber.	146	Le Coronneux. . . . .
Pulex.	162	La Puce. . . . .
Puillus.	* 136	Le Nain. <i>F.</i> . . . .
Pygmæus.	* 141	Le Pygmée. <i>F.</i> . . . .
Rhomboides.	136	Le Romboïde. . . . .
Rostratus.	143	Le Museau. . . . .
Rugosus.	* 166	Le Ridé. <i>F.</i> . . . .
Salinus.	164	Des Salines. . . . .
Scorpio.	* 149	Le Scorpion. <i>F.</i> . . . .
Squilla.	155	La Squille. . . . .
Stagnalis.	164	Des Étangs. . . . .
Strigosus.	157	Le Strié. . . . .
Symnista.	157	Le Secrétaire. . . . .
Tettigonius.	* 168	L'Illandois. <i>F.</i> . . . .
Tribulus.	144	Le Tribule. . . . .
Tubularis.	151	Le Tubulaire. . . . .
Varius.	* 163	Le Varié. <i>F.</i> . . . .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Squille - Mante.			Squilla 1.
.	.	.	<i>M.</i> id.
.	.	.	Gamm. 12.
.	.	.	id.
.	.	.	id.
.	.	.	id.
.	.	.	<i>M.</i> Astac. 5.
.	.	.	id. 38 &
.	.	.	non 35.
Écrev. de Norwege.	.	.	Astacus. id.
.	.	.	Gamm. id.
.	.	.	id.
.	.	.	Pagurus 5.
.	.	.	id.
Crabe de l'Océan.	.	.	id.
.	.	.	Astacus 19.
.	.	.	id.
.	.	.	id.
Squille-Puce.	La Crevette des		Gamm. 6.
.	ruisseaux.	.	<i>M.</i> id.
.	.	.	<i>M.</i> id. 40.
.	.	.	id.
.	.	.	id.
.	.	.	Pag. 11 & non
.	.	.	Astacus 8.
.	.	.	Gamm. id.
.	.	.	id.
.	.	.	Astacus id.
.	.	.	Gamm. id.
Écrevisse striée.	.	.	Pagurus id.
.	.	.	<i>M.</i> Hippa 2.
.	.	.	Astacus id.
.	.	.	id.
.	.	.	Pagurus id.
.	.	.	Astacus id.

MONOCULUS.

Apus.	171	L'Armé. . . . .
Bispinosus.	* 175	L'Épineux. <i>D. Geer.</i> . . .
Conchaceus.	174	L'Ovale. . . . .
Elongatus.	* 176	L'Alongé. <i>D. Geer.</i> . . .
Exspinosus.	* 176	Le Foible. <i>D. Geer.</i> . . .
Gasteroftei.	* 177	Du Gasterofte. <i>Geoff.</i> . . .
Infusorius.	* 177	L'Imperceptible. <i>Enum.</i>
Lenticularis.	175	Le Lenticulaire.
Pediculus.	173	Le Pou branchu. . . . .
Piscinus.	171	Le Plumet. . . . .
Pulex.	172	La Puce branchue. . . . .
Quadricornis.	173	Le Quadricorne. . . . .

ONISCUS.

Albicornis.	* 186	L'Albicorne. <i>F.</i> . . . .
Aquaticus.	182	L'Aquatique. . . . .
Armadillo.	184	L'Armadille. . . . .
Afellus.	183	Le Cloporte. . . . .
Afilus.	178	L'Afile. . . . .
Affimilis.	183	L'Analogue. . . . .
Bicolor.	* 188	Le Bicolor. <i>V.</i> . . . .
2-Caudatus.	181	La Double-Queue. . . . .
Ceti.	180	De la Baleine. . . . .
Chelipes.	* 185	Le Porte-Pince. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

• • • • •	Le Binocle à queue en filets. . . .	id.
Monocle à coquille à deux pointes. . . .		id.
Monocle à coquille ovale. . . .	Le Monocle à co- quille longue. . .	id.
Monocle alongé.		
Monocle à coquille sans pointe.		
• • • • •	id.	

Monocle-Pou bran- chu. . . . .	Le Monocle à queue retrouffée. . . .	id.
• • • • •	Le Binocle à queue en plumet. . . .	id.
Monocle - Puce branchue. . . .	Le Perroquet d'eau. <i>Lege</i> p. 655. . .	id.
Monocle à quatre cornes. . . .	Le Monoc. à queue fourchue. . . .	id.

• • • • •	• • • • •	<i>M. id.</i>
Squille-Afelle. . . .	L'Afelle d'eau- douce. . . .	id.
• • • • •	Le Cloporte-Arma- dille. . . .	id.
Cloporte-Afelle. . . .	Le Clop. ordinaire.	id.
• • • • •	• • • • •	id.
• • • • •	• • • • •	id.
• • • • •	• • • • •	id.
Squille de la Ba- leine. . . .	• • • • •	id.
• • • • •	• • • • •	id.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Convexus.	* 187	Le Voûté. <i>D. Geer.</i> . . .
Entomon.	179	Entomon. . . . .
Macillatus.	* 186	Le Tacheté. <i>F.</i> . . . .
Marginatus.	* 187	Le Bordé. <i>V.</i> . . . .
Marinus.	181	Le Marin. . . . .
Muscorum.	* 187	Des Mouffes. <i>Scop.</i> . . . .
Oceanicus.	183	L'Océanique. . . . .
Oestrum.	178	L'Oestre. . . . .
Phyfodes.	179	Le Quadricorne. . . . .
Pfora.	173	L'Anti-Galeux. . . . .
Pustulatus.	* 186	Le Pustulé. <i>F.</i> . . . .
Scopulorum.	182	Des Écueils. . . . .
Serratus.	* 186	Le Dentelé. <i>F.</i> . . . .
Spinofus.	185	L'Épineux. . . . .
Variegatus.	* 188	Le Varié. <i>V.</i> . . . .

# SCOLOPENDRA.

Coleoptrata.	190	La Coléoptère. . . . .
Electica.	193	L'Électrique. . . . .
Ferruginea.	192	La Ferrugineuse. . . . .
Forficata.	191	La Forchue. . . . .
Gabrielis.	193	La Gabriele. . . . .
Lagura.	189	Le Pinceau. . . . .
Marina.	194	La Marine. . . . .
Morfitans.	191	La Mordante. . . . .

# JULUS.

Complanatus.	196	L'Aplati. . . . .
Ovalis.	195	L'Ovale. . . . .
Sabulosus.	17	Du Sable. . . . .
Terrestris.	195	Le Terrestre. . . . .
Varius.	198	Le Varié. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Cloporte voûté.

Squille-Entomon. . . . . id.

*Lege* Maculatus. . . . . id.

Squille marine. . . . . id.

. . . . . id.

. . . . . id. 4 &

*non* 3.

. . . . . id.

. . . . . id. 12 &

*non* 3.

. . . . . id.

. . . . . id.

. . . . . *M.* id.

. . . . . id.

. . . . . ead.

Scolopendre jaune. La Scolopendre à

*Lege* Electrica. vingt-huit pattes. ead.

Scolopendre rousse. . . . . ead.

Scolop. fourchue. La Scolopendre à

trente pattes. . ead.

. . . . . ead.

Jule à queue en pin-

ceau. La Scol. à pinceau. ead.

. . . . . ead.

Scolop. mordante. . . . . ead.

Jule aplati. . . . . Scolop. à 60 pattes. id.

. . . . . id.

. . . . . Jule à 240 pattes. id.

Jule à bandes. Le Jule à 200 pattes. id.

. . . . . id.





JOH. CHRIST. FABRICII  
PHILOSOPHIÆ ENTOMOLOGICÆ  
E P I T O M E.

Insectorum partes a Tyrone distinguendæ sunt  
quatuor : *Caput* , *Truncus* , *Abdomen* &  
*Artus*.

C A P U T.

Constat ore , oculis , fronte , gula , stematibus.

*Os*. Partes *oris* decem numeravit doctiss. Entomologus.

1°. *Clypeus* horizontalis capitis pars cornea , porrecta ,  
*os* superne tegens.

2°. *Labia os* inferne claudentia , ne hæusta eruant.  
*Labium* horizontale , capitis pars inferior porrecta.

3°. *Mandibulæ* duæ transversales , corneæ , latera *oris*  
superne includentes , a capitis substantia cornea  
propagatæ.

4°. *Maxillæ* , itidem duæ transversales sæpius mem-  
branaceæ , latera *oris* inferne includentes , a capitis  
substantia interiori desumptæ.

5°. *Galea* cylindrica , obtusa , fere vesiculosa , maxil-  
larum dorsum tegens. Differt a *maxilla* bifida , quod  
*galea* semper cylindrica , vesiculosa , maxillæ super  
incumbat , cum e contrario lacinia maxillæ anterior  
cornea , introrsum plena , maxillæ partem constituat.

6. *Palpi* duo , quatuor , sex , articulati , sensorii ,  
mobiles. *Antici* differunt a lacinia maxillæ bifidæ ,  
quod lacinia maxillæ nunquam articulata , mobilis ,  
sensoria , palpos tamen pro lacinia maxillæ facillime  
assumi e chrysomelis aliisque apparet.



7°. *Lingua spiralis* , inter palpos reflexos latens ; convoluta.

8°. *Rostrum* , vagina articulata univalvi , fetas plerumque tres continens.

9°. *Hauftellum* , fetis constans vagina aut nulla aut bivalvi inarticulata inclusis.

10°. *Proboscis* , carnosâ stipite cylindrica , rectâ capituloque dilabiato , retractili. Differt ab hauftello , quod proboscis semper bilabiata , hauftellum vero nunquam. Dispositionem insectorum artificialem a solis instrumentis cibariis desumpsit *D. Fab.*

*Oculi* , quibus vident colores , differunt quoad numerum , situm , connexionem , compositionem , figuram.

*Antennæ* articulatae , mobiles , sensoriae.

*Frons* superior capitis pars inter oculos , os & thoracem , & gula inferior inter os & pedus. Differunt substantia , figura , superficie , stematibus. Stemmata vocantur puncta tria elevata nitida in vertice frontis.

### *Truncus.*

Inter caput & abdomen constat thorace , scutello , pectore , sterno , a capite distinctus plerisque , cum capite tamen aliquando coalitus.

*Thorax* superior trunci pars.

*Scutellum* thoraci postice adhærens , inter alas porrectum.

*Pedus* , inferior seu prona trunci pars thoraci correspondet. Pectori plerumque pedes quatuor anteriores insectorum hexapodum inferuntur.

*Sternum* , linea pectoris longitudinalis , sæpe antice posticeque mucronatum.

### *Abdomen.*

Annulatum spiraculisque lateralibus pertusum , thoraci affixum. Superior abdominis pars dorsum audit , prona vero seu inferior venter.

Spiracula lateralia ad respirationem pertusa utrinque , tot , quot segmenta abdominis.

*Artus.*

**Artus** thoraci abdominique adhærentes sunt cauda ;  
aculeus , pedes , alæ , halteres , pectines.

**Ufus caudæ** ad ova ponenda , ad motum dirigendum ,  
vix unquam ad defensionem.

**Aculeus** abdomen terminans , bivalvis setam punctoriam  
rigidam exferens. Hymenopteris proprius , distinguitur  
a cauda , figura , valvulis , usu.

**Ufus** ad defensionem , plerisque ad ova ponenda ,  
imprimis ubi exesrtus est.

**Pedes** ad celeriozem motum arctioremque adhæfionem  
pectori abdominique affixi ; constant *coxa* , femore ,  
tibia , tarso.

Marum pedes anteriores sæpius ad arctiorem copulam  
elongati.

*Coxa thoraci aut pectori annexa.*

*Femur* , superior articulus pedum annectens.

*Femur* cum coxa articulatur.

*Tibia* , tertius pedis articulus inter femur & tarsum.

*Tarsus* , plerumque articulatus , pedem terminat. A nu-  
mero horum articulorum tarfi ordines insectorum  
desumfit *D. Geoff.*

*Alæ* ad celeriozem fugam thoraci affixæ sunt ; si crus-  
taceæ , *elytra* ; si molles , alæ vocantur.

*Elytra* , alæ binæ superiores , crustaceæ , abdomen  
tegunt. In quibusdam classibus connata sunt & tunc  
alæ posticæ & scutellum desunt.

*Alæ* membranaceæ nervosæ in lepidopteris squamis  
erectis , coloratis teguntur.

*Halteres* rudimenta alarum posticarum sub alis dipte-  
rorum constant aut capitulo petiolato , aut squama  
membranacea fornicata. Ufus ad æquilibrium melius  
observandum videtur.

*Pedines* bini inter abdomen & pectus adhærent , altero  
latere dentati sunt. Ufus adhuc plane latet.

*Metamorphosis.*

Comprehendit ovum , larvam , puppam & imaginem!

Metamorphosis quadruplex omnibus quidem convenit;  
cognitio ideo ejusdem insecti quadruplex.

Insecta metamorphosi a se invicem differentia nunquam  
idem genus & vix eandem classẽ intrabunt.

*Obs.* In synistatis & unogatis canonem hunc neglexit  
clariss. Entomologus. V.

*Ovum* tunicatum sub minima mole continet rudimentum  
animalculi futuri ejusque rudimentum.

Insecta omnia quantum novimus , ovipara , exceptis  
solis aphidibus , teste *Reaumurio* , vere oviparis &  
autumno viviparis.

*Larva* , ruptis ovi tunicis , prodiens infantiam insecti  
continet omnino sterilem.

*Larvæ* synonyma nunc obsoleta sunt , eruca , vermis.  
Rupta ultima larvæ tunica *puppa* prodit.

*Larva puppaque* metamorphoseos completæ partibus  
differentiisque omnino parentum gaudent.

*Metamorphosis* secundum variam larvæ & puppæ  
structuram varia.

*Completa* , larva & puppa currentibus , agilibus , omni-  
bus partibus imagini simillimis. *Aranea* , *cancer*.

*Semi-completa* , larva hexapoda agili , absque alis ;  
puppa agili alarum rudimentis. *Cimex* , *libellula*.

Constat capite , thorace , abdomine , pedibus , cauda.

*Incompleta* , larva hexapoda vel polypoda succulenta ,  
tarda ; constat capite , corpore , pedibus , cauda.

Puppa pedata , quiescens. *Scarabæus* , *apis* , *formica*.

*Obtectæ* , larva polypoda , agilis succulenta ; constat  
capite , corpore , pedibus , cauda ; puppa apoda ,  
quiescens , corticata , thorace abdomineque distinctis,  
*Lepidoptera*.

*Coarctata* , larva apoda , annulata , mobilis ; puppa  
apoda , immobilis. Coarctata intra globum parte  
nulla distinctum.

*Oestrus* , plurimarum muscarum species. Pleræque hujus

metamorphoseos larvæ lente festinant , visitant aphidibus cadaveribusque animalium. Exuvias haud exuunt metamorphosin subeuntes. Pleræque molles , albidæ. Puppæ corticata , immobilis , nullis partibus distincta , absque omni parte imaginis latentis.

*Sexus.*

Genitalia plurimorum insectorum in abdominis apice sita , *arana mas in palpis , fœmina sub abdominis basin.*

*Cancer mas & fœmina sub abdominis basin.*

*Libellula mas in pectore , fœmina in apice abdominis genitalia gerunt.*

*Androgyna & hermaphrodita in Entomologia nulla.*

*Mas generans , vivificans plerumque venere vaga prurit , polyandria rarior ; exemplum luculentissimum & forsan unicum in apum singulari republica.*

*Fœmina mari plerumque major , crassior ; exceptio rarissima uti in scarabæis. In polyandria principatum tenet , a spadonibus nutritur , exit raro satellitibus semper stipata , maribus ignavis circumdata.*

*Sexus imaginis in larva & puppa latentis quodam modo ab oculo consueto magnitudine & crassitie partium distinguitur , quum fœminæ plerumque majores , crassiores.*

- *Insecta venere exhausta brevi tempore pereunt. Mares mox post copulam , fœminæ vero post ovorum depositionem. Insecta pleraque annua vix per hyemem vivunt , exceptis solis aquaticis quibuscumque , uti Cancer , Monoculus quæ quotannis cum crusta laboriose senectutem exuunt. An forte larvæ & puppæ ? Sed ex quæ nuptias nondum celebrarunt , hybernæ it & sequenti vere iterum proveniunt.*

*Canon I.*

Fundamentum *Entomologiæ* duplex est , dispositio & denominatio.

Dispositio insectorum secundum vera scientiæ principia

fundamentum præbet denominationis. Fundamentum hoc si vacillat, totum tandem ruit ædificium.

Cardine hoc duplici tota nititur scientia Entomologica; qui ergo hos rite perspexerit, verus est *Entomologus*, alius non. Dispositio insectorum sistit divisiones sive conjunctiones eorum & est artificialis, quæ classes & ordines, vel naturalis, quæ genera, species & varietates docet.

Canon 2.

*Copula differentium haud semper eandem speciem demonstrat.*

*Coccinella bipunctata & quadripustulata.*

*Chrysomela alni & betulæ.*

Varietates flagellum sunt scientiæ, difficillime enim determinatur quid sit species, quid varietas, quum cultura insectorum rarior.

Canon 3.

*Varietates levissimas vix curat Entomologus, nisi sint sexus, quæ semper annotari merentur.*

*Icones igitur varietatum omnino inutiles & in luxuriam artis multiplicatæ. V.*

Classis est generum plurium convenientia.

Canon 4.

*Nomina classium continebunt caracterem essentialem suæ classis; sunt enim onera artis inevitabilia ideoque quantum fieri potest facilitanda, sed eadem lingua proponenda sunt.*

Canon 5.

*Classium nomina unico tantum constabunt vocabulo nec nimis composito; vitanda igitur nomina quæ plura quam duo vocabula continent.*

*Ordo est classium subdivisio, ne plura genera distinguenda simul*

simul & semel evadant , quam animus facile assequatur. Quo magis naturalis , eo etiam præstantior , tantummodo sit facilis & distinctus.

Canon 6.

*Contineant ordinum nomina characterem essentialem sui ordinis : sint omnia in eadem lingua proposita , ejusdemque classis iisdem partibus petenda.*

Canon 7.

*Ordo genera inter se magis affinia proxime collocabit , ut facilius distinguantur. Collocentur propius affinia , ut differentia eorum magis eluceat.*

Canon 8.

*Generum characteribus fixis tota nititur scientia Entomologica. Sint itaque constantes , sint solido inadificati fundamento.*

*Genera si rite determinata , firmo stat scientia talo , falsis vero generibus omnia confundi necesse est.*

Canon 9.

*Characteres generum omnium ab iisdem semper partibus desumendi.*

Canon 10.

*Character generis omnibus speciebus sub eodem genere militantibus conveniat.*

*Canon hic si læditur , omnis prostrernitur systematis & generum certitudo , hac vero detrusa semper vacillabit scientia.*

Canon 11.

*Antennæ ad generum characteres minus valent quam plurimi æstimant.*



Antennis ad genera distinguenda nimis adhæserunt antecessores omnes, generibus tamen semper apponendæ, quum systema faciliunt. In lepidopteris, necessario adhibendæ sunt antennæ, quum genera naturalis hujus classis difficillime determinantur.

Canon 12.

*Metamorphosis quidem nunquam generis characterem constituit nulloque modo præbere valet, quum characteres ab insecti perfecti partibus, non vero a mutatione varia structuræ desumi debeant.*

Probe tamen observanda est metamorphosis, quum viam rectam ad naturam ducat.

*Character* est definitio generis isque triplex datur, factitius, essentialis & naturalis.

Characterem generico distinguitur genus a reliquis omnibus, cum definitione ideo convenit.

*Essentialis* notam generis soli, cui applicatur, propriam & singularem administrat, ut genus mox ab omnibus reliquis ejusdem ordinis naturalis distinguat. Optimus est character essentialis, facillimus, at vix ubique possibilis.

Canon 13.

*Character essentialis quo brevior, quo distinctior eo, cæteris paribus, præstantior.*

*Character factitius* genus ab aliis generibus quidem tantum ordinis artificialis distinguit. Ad genera intra ordinem naturalem distinguenda assumit notas aut pauciores aut plures, quum contra *essentialis* nota unica genera ab omnibus reliquis sub eodem ordine naturali militantibus distinguit. Essentiali ideo longe postponendus nec unquam assumendus character *factitius*, ubi essentialis adduci potest.

Character *factitius* essentiali magis generalis omni generi applicabilis, essentialis vero in multis generibus adhuc deficit, e. gr. in lepidopteris vix eruendus.

*Obs.* In omnibus os lingua spirali palpisque absque



maxillis. *Palpi* characteresque alii ex instrumentis cibariis desumpti vix discrepant ideoque classis hæc adhuc elaboranda est. V.

*Character naturalis* notas omnes genericas possibiles allegat ideoque essentialem & factitium includit.

Canon 14.

*Generum est infallibilis custos character naturalis, semper immutabilis permanebit plurimis etiam novis generibus detectis, tantum excludantur notæ superflua, si novæ species a congeneribus in una altera ve parte diversæ recipiantur.*

*Character essentialis, novis detectis generibus, sæpius fallax evadit, naturalis nunquam, ideoque & character naturalis isque solus fundamentum generum in Entomologia firmum continet.*

Canon 15.

*Character naturalis, in omnibus licet diversissimis systematibus, immutabilis servari debet.*

Canon 16.

*Characteres, qui visu haud obtinentur, nullo modo obtinendi.*

Canon 17.

*Characteres a sono Entomologo vero omnino indigni.*

———— ab odore desumpti omnino rejiciendi.

———— a loco desumpti omnino ex Entomologia extirpandi.

Canon 18.

*Characteres generici a colore mutuati nullo modo valent.*

Canon 19.

*Characteres generici a comparatione cum alio insectorum genere desumpti nullo modo tolerandi.*

Tyronibus inservire studendum est, qui genera vix ulla noverint & illis comparatio semper obscura.

Canon 20.

*Characteres generici, qui non a numero, figura, situ & proportionem partium insectorum desumuntur, omnino excludendi.*

Canon 21.

*Genus unica specie constare potest, licet plurimis sapius componitur.*

Canon 22.

*Termini artis in characteribus genericis pari eligendi, obscuri, erronei & dubii omnino relegandi.*

Canon 23.

*Nomina vera insectis imponere Entomologis genuinis tantum in potestate est.*

Denominatio insectorum facillima quidem videtur, at difficillima tamen est, quum cognitionem generum omnium ante conditorum eorumque nominum supponat.

Nomina absurda insectis plurimis ab idiotis imposita sunt e. g.

Lucanus.	. . . . .	<i>Cervus volans.</i>
Coccinella.	. . . . .	<i>Gallina Mariæ.</i>
Scarabæus.	. . . . .	<i>Molitor.</i>
Bombyx.	. . . . .	<i>Libatrix, admirabilis, terribilis.</i>
Sphinx.	. . . . .	<i>Leopardus.</i>
Noctua.	. . . . .	<i>Meticulosa.</i>
Monoculus.	. . . . .	<i>Abyssus satanæ.</i>

Canon 24.

*Nomen classis & ordinis nunquam nomen infedī intrabunt, quāvis subintelligantur.*

Canon 25.

*Character genericus idem & idem nomen supponit, quum character definitionem & generis & nominis contineat.*

Canon 26.

*Nomen genericum in eodem genere unicum & semper idem erit.*

Character generis semper idem, ergo & nomen.

Silpha Linn.	. . . .	Peltis Geoff.
Buprestis Linn.	. . . .	Cucujus Geoff.
Empis Linn.	. . . .	Afilus Scop.
Afilus Linn.	. . . .	Erax Scop.
Lucanus Scop.	. . . .	Platycerus Geoff.
Lepisma Scop.	. . . .	Forficina Geoff.
Carabus Linn.	. . . .	Buprestis Geoff.

*Hæc nominum genericorum mutatio semper ansam confusionis præbet.*

Canon 27.

*Nomen genericum unum idemque ad diversa designanda genera assumtum altero loco excludendum erit.*

*Obs.* Canon hic sæpius læsus fuit : attelabus genus proprium in *Systemate* constituit, ad histeros male transtulerunt DD. Geoff. de Geer. subque atellabi nomine tenebrio fossor Linn. a D. de Geer. non rite ordinatus fuit. Cantharides in *cicindelas*, *cicindelæ* in buprestes non felicius in *hist. inf. par.* mutatæ fuerunt, &c. V.

Canon 28.

*Qui novum genus constituit, eidem nomen etiam imponere tenetur.*

Nomen est sonus generis ideoque absque nomine genus indicari non potest & absque nomine cognitio generis perit.

Canon 29.

*Nomina generica e duobus nominibus integris ac distinctis facta e republica plane releganda sunt.*

*Leo aphidis* Reaum. . . Hemerobius.  
*Musca cerambyx* Schæff. . Leptura , &c.

Canon 30.

*Nomina generica e duobus vocabulis distinctis & integris composita tolerari non debent.*

Canon 31.

*Nomina generica e duobus vocabulis latinis & compositis rejicienda sunt.*

*Formicaleo* D. Geoff. . . Myrmeleon.  
*Binoculus* D. Geoff. . . Monoculus.

Canon 32.

*Nomina generica hybrida e vocabulo græco & latino composita haud agnoscenda.*

*Monoculus* Linn.

*Obs.* Canon hic legitimus , generatio enim nominis hybrida nec ad græcam nec ad latinam linguam pertinet , inde Entomologia obscurissima. V.

Canon 33.

*Nomina generica cui syllaba una vel altera præponitur aut in fine additur , ut aliud plane genus quum antea significet , Entomologis indigna sunt.*

*Binoculus* Geoff. . . . Monoculus.  
*Cancellus* Raj. . . . Cancer.  
*Libelloides* Schæff.

Canon 34.

*Nomina generica contraria speciei alicui sui generis mala sunt, vix toleranda.*

*Bostrichus glaber.*

*Curculio nobilis.*

*Scarabæus arboreus.*

Canon 35.

*Nomina generica, quæ characterem essentialem, habitum aut proprietatem singularem insectorum sub genere militantium exprimunt, semper optima sunt.*

Canon 36.

*Nomen genericum dignum, alio licet aptiore permutare non licet.*

Canon 37.

*Nomina in veterum eruditione trita pleraque optima haud mutanda, quamvis interdum eorum derivationem ignoremus.*

*Abstineamus vero a tali mutatione in infinitum, quæ tantum modo confusionem & tandem ruinam scientiæ parit.*

Canon 38.

*Nomina generica nova haud fingenda, quamdiu synonyma digna in promptu sunt.*

Canon 39.

*Novum genus detectum novo nomine nominatur, quamvis antiqua nomina haud deessent.*

Canon 40.

*Nomina Entomologiæ generica omnia latinis litteris pingenda.*

Canon 41.

*Nomina generica sesquipedalia , enuntiatio difficilia & nauseosa , semper fugienda.*

Sesquipedalia dicimus verba , quæ plures quàm duodecim litteras continent.

Canon 42.

*Terminis artis loco nominum genericorum abuti inconsultum erit.*

Nomina trivialia a *Linnaeo* primo introducta , licet nominibus classicis & genericis magis libera sint , attamen quibusdam regulis limitata.

Canon 43.

Unico tantum constabunt vocabulo , nec nimis composito aut sesquipedali.

Canon 44.

*Nomina trivialia in oides definentia ad similitudinem cum alio genere exprimendam minus placent.*

Nascitur insectum nomine & nomen ex insecto , ambo vero ex proprio charactere , comparatio igitur nunquam admittenda. Habitus præterea fallit & in eodem genere interdum insecta , quæ habitu differunt , quo ipso comparatio fallax evadit.

<i>Erax conopsoides.</i>	}	<i>Scop.</i>
<i>— tenthedroides.</i>		
<i>Tipula hemerobioides.</i>	}	<i>Linn.</i>
<i>Lucanus caraboides.</i>		
<i>Musca conopsoides.</i>	}	
<i>Asilus crabroniformis.</i>		

Canon 45.

*Nomina trivialia nunquam gradum comparativum aut superlativum admittunt.*

Comparativus & superlativus comparisonem cum reliquis speciebus ejusdem generis indicant, quæ nullo modo admittenda.

Necydalis	major.	} Linn.
————	minor.	
————	minima.	
Bombylius	major.	} Linn.
————	medius.	
————	minor.	

Detegatur species necydalis & bombylii adhuc minor, tunc necydalis antea minima vocata major condit.

Canon 46.

*Nomina trivialia in eadem specie multiplicata, semper confusionem præbent ideoque omnino evitanda.*

Canon 47.

*Nomina trivialia a loco aut ab anni temporibus desumpta toleranda, quamvis haud optima.*

Locus & tempus insecti sunt maxime accidentalia, quamvis absque loco aut tempore cogitari possit. Insecta plerumque plurimis regionibus plurimisque anni temporibus communia.

Canon 48.

*Nomina trivialia a magnitudine desumpta haud optima ideoque non imitanda.*

Magnitudo a loco, a climate, ab alimento nimis variat ideoque species haud distinguit nec nomen intrare debent.

Majores & minores species deteguntur ideoque species quæ olim giganteæ aut pygmææ erant, intermediæ evadunt, quum magnitudo semper relativa.

Buprestis	gigantea.	} Linn.
————	minuta.	
Chrysomela	gigantea.	
————	minuta.	Fab.



## Canon 49.

*Nomina trivialia ad clarissimorum virorum memoriam conservandam introducta, sancte servanda.*

Hoc unicum & summum laboris præmium caste dispensandum ad imitamentum & ornamentum Entomologiæ.

*Obs.* Hunc canonem non optimo jure neglexerunt DD. de Geer. Geoff. nam hæc nomina virum de scientia bene meritum indicant. V.

## Canon 50.

*Nomina trivialia insectorum, quorum larvæ plantis viſitant, optime e plantis, quibus viſitant larvæ, desumuntur.*

Dant talia nomina pulchritudinem & nitorem scientiæ, ut mox constet, in quibus plantis quærenda, quomodo educanda sit larva, quibus plantis noceat & hoc eo solo nomine.

*Obs.* Licet plurimis plantis viſitent plurimæ larvæ, canon nihilominus adoptandus, tunc a plantis frequentius habitatis nomen sumendum. V.

## Canon 51.

*Nomina trivialia insectorum, quorum larvæ plantis haud viſitant, habitum aut differentiam exprimere deberent, ubi tale nomen tale invenitur, præstantissimum semper erit.*

Sphex cribraria.

—— clypeata.

Scarabæus nasicornis.

———— nuchicornis.

———— mobilicornis. Fab.

} Linn.

## Canon 52.

*Nomina trivialia nunquam absque summa urgente necessitate mutanda sunt.*

**Nomen vagum pro nomine vago**, uti pleraque sunt, substituere supervacaneum foret. Mutentur ideo nunquam, nisi cibus aut habitus aut character essentialis exprimi possint.

*Canon 53.*

*Differentiæ omnes, quæ insectum a congeneribus haud distinguunt, falsæ sunt.*

**Scarabæus totus niger**, capite inermi. *Le scarabé jayes* Geoff.

**Tota speciei cognitio nititur differentia** ideoque in hac condenda summa adhibenda diligentia, ne varietates in specierum numerum indicemus, aut species varietatum loco assumamus.

*Canon 54.*

*Differentia omnis a partibus insectorum haud ludentibus desumenda.*

**Varietates distinctas esse species**, nemo sanus facile dixerit.

**Erroneæ ideo omnes differentiæ specificæ**, quæ varietates loco speciei tradunt.

*Canon 55.*

*Differentia a magnitudine desumptæ nullo modo toleranda.*

**Magnitudo mutatur in animalibus**, uti in plantis, loco, climate, alimento ideoque species nunquam rite determinat, mensuratio ideo insectorum accuratissima in novissimis temporibus introducta minus placet, quum semper incerta speciem nunquam distinguat.

*Canon 56.*

*Notæ collatitiæ cum aliis speciebus diversi generis in differentia evitanda.*

**Differentia insectum tantum a congeneribus distinguit**, character vero ab insectis reliquorum generum.

Differentiæ ideo omnes malæ , quæ notitiam aliorum insectorum supponunt.

Tenebrio *molitor* carabi minoris statura & habitu Scop. &c.

Canon 57.

*Notæ collatitiæ cum aliis speciebus ejusdem generis malæ sunt.*

Noscatur insectum e differentia & differentia ex insecto , utrumque vero ex propriis notis in illa scriptis , in hoc delineatis. Tertium nullo modo admittendum.

Magistri est condere differentiam , tyronis ex ea noscere insectum.

Reliquæ species ejusdem generis non semper adsunt , ut comparentur.

Erroneæ ideo omnes sunt differentiæ notas collatitias continentes.

Scarabæus *cyathiger* , elytra paullo saturatiora quam in *solstitiali* Scop.

Buprestis *picta* , *guttata* subæqualis sed latior *pall.*

Canon 58.

*Inventoris aut alius cujuscumque nomen in differentia nunquam adhibeatur.*

Nomen inventoris haud ad notas sed ad historiam pertinet , differentiam ideo haud intrabit , at ad finem descriptionis aut synonymorum collocabitur , ne historia deficiat.

Differentias ideo omnes erroneas statuimus , quæ nomen inventoris continent.

Canon 59.

*Locus natalis species nunquam distinguit.*

Locus quidem insecto proximus , attamen varians , quum a loco in locum moveatur.

Variæ regiones sæpe eadem alunt insecta , uti America & Europa septentrionalis , uti Africa & Gallia australis. V.

Addatur vero locus, si constat, in fine synonymorum, ut innotescat unde desumendum sit insectum. Falsæ ergo omnes sunt differentiæ a regione, ab alimento, a solo, aut a frequentia desumptæ.

Canon 60.

*Differentiæ a larvæ & puppæ desumptæ ex Entomologia rejiciendæ.*

Differentias reales sæpe administrat larvæ, at raro insectorum metamorphosin cognoscimus. Larvæ præterea raro aut nunquam in musæis occurrunt, ideoque in differentia omittendæ.

In descriptione vero descriptio larvæ & puppæ optime additur, ut insectum in omni metamorphoscos statu cognoscatur.

Falsas ideo omnes vocamus differentias a larvæ aut puppæ desumptas.

Canon 61.

*Tempus insectorum differentias præbet semper erroneas.*

Tempus est insecti accidentale. Existit tempus haud in insecto, sed insectum in tempore.

Variat tempus secundum majorem aut minorem caloris gradum in diversis regionibus & diversis annis diversum.

Canon 62.

*Color in eadem specie mire ludit, hinc in differentia, nisi omnes aliæ notæ desunt, assumendus non erit.*

Color levissimas præbet differentias, visum oblectat ut infinite ludit. Variat in eodem individuo ætate, in eadem specie sexu aut casu.

*Cerambyx meridianus*; fœmina nigricans, mas testaceus. *Bombyx dispar*; mas alis fusco-griseis nebulosis, fœmina alis albis, lituris nigris.

*Bombyx lubricipeda* variat alarum colore & punctorum numero.

*Geometra piniaria*; mas alis fuscis, maculis 2 albis, fœmina alis ferrugineis, &c.

Accedit quod nunquam colores adæquate determinare aut verbis exprimere valeant. Nimia eorum est varietas & miscela.

Colorum systema quidem elaborarunt viri meritissimi Scopoli & Poda, at vacillans semper erit, quum eorum colores æque ludentes, ac ipsorum insectorum dentis tamen coloribus nondum insecta distinguere valemus. Seri forte nepotes essentialia specierum differentias detegent & tunc colores omnino excludendi.

*Canon 63.*

*Odorem nunquam differentiam distinctam tradere contendimus.*

Olfactus maxime obscurus inter omnes nostros sensus, examinat tenuissima corporum effluvia, quæ nunquam rite determinare valemus, quum limites haud admittant. Erroneæ igitur sunt omnes differentiæ quæ ab odore desumuntur.

*Canon 64.*

*Differentiæ quæ unicum tantum sexum comprehendunt, semper malæ.*

Sexus alter nunquam speciem constituit, ideoque proponat etiam differentia notas omni sexui communes, quum e differentia haud sexum sed speciem cognoscere debeamus, falsas ideo esse omnes scarabæorum differentias a cornubus sumtas, ichneumonum ab aculeo contendimus.

*Canon 65.*

*Differentiæ insectorum omnes, quæ a proprietatibus desumuntur, ludicræ.*

Insecta absque accidentalibus per se distinguere laboramus ideoque omnes notas quæ haud a corpore ipso desumuntur, plane rejiciendas esse credimus, quum nunquam characterem insecti essentialem contineant.

*Cimex lectularius*, rufus, compressus, domesticus,  
homini molestus.

Canon 66.

*Pubescencia differentias haud spernendas interdum offert.*  
Pubescencia comprehendit spinas & hirsutiem, quarum  
priora posteriori constantiores sunt.

Spinas reales præbere differentias e curculionibus,  
hispis, cerambycibus aliisque patet, quæ omnes  
spinis optime dignoscuntur.

Hirsuties interdum differentias exhibet haud ludicras,  
uti constat e buprestii *fasciculari* & *hirsuta* & aliis  
haud paucis.

Ad hirsutiem tamen haud confugiendum, nisi omnes  
aliæ viæ præclusæ sint. Abraditur enim facillime &  
insecta hirsuta ætate sæpius glabra evadunt.

Canon 67.

*Antennarum notæ differentias sæpe optimas suppeditant.*

Canon 68.

*Antennæ ad characteres generum vix usurpandæ, differ-*  
*entias specificas sæpe optimas offerunt.*

Antennarum proportio cerambyces distinguit.

*Melolontha fullo*, antennarum lamellis septenis.

*Cerambyx hispidus*, antennis hirtis Linn.

———— cerdo antennarum articulis quatuor clavatis  
Linn.

Canon 69.

*Caput differentias interdum naturalissimas subministrat.*  
Curculionum species, demto rostro, difficillime distin-  
guuntur.

Situs oculorum in araneis diversas species optime  
distinguit.

Canon 70.

*Thorax differentias naturalissimas optimas exhibet.*



*Meloe monoceros*, thorace in cornu supra caput protenso Linn.

Canon 71.

*Scutellum in differentia undique magni faciendum.*  
*Scarabæorum divisio in scutellatos & exscutellatos*  
*optima. Cimicès, scutello longitudine corporis.*  
*Stratiomys species scutelli dentibus distinguuntur.*  
*Obs. Inutile igitur copris genus ut supra diximus. V.*

Canon 72.

*Alæ elegantissimas naturalissimasque differentias exhibent.*  
*Natura in nulla parte magis fuit polymorpha, quam*  
*& in figura & in colore alarum.*

Canon 73.

*Differentiæ a cauda petitiæ sæpius naturales, ab aculeo*  
*vero desumptæ nullo modo valent.*  
*Marès plerumque nullum aculeum gerunt.*

Canon 74.

*Pedibus species haud pauca facile & rite determinantur.*  
*Curculionum amplum genus secundum pedes dividitur.*  
*Chrysomelæ saltatoriæ.*  
*Scarabæus Schæfferi pedibus saltatoriis.*  
*Julus & scolopendra numero pedum.*  
*Observandum tamen semper erit, pedes anteriores*  
*sæpius sexu differre, posteriores vix unquam.*

Canon 75.

*Notæ genericæ in differentia specifica usurpatæ absurdæ sunt.*  
*Notæ genericæ in omnibus speciebus consentiunt ideoque nullo modo distinguunt.*



Erroneas ideo esse omnes differentias statuimus, quæ notas specificas a generibus defumunt.

*Silpha pedicularia* thorace marginato Linn.

*Obs.* Canon hic, licet optimus, durius enuntiatur: Silpharum genus antennarum structura, elytrorum capiteque prominenti ab aliis coleopterorum generibus præcipue distinguitur. Sed in omnibus thorax non est marginatus, inde characterem thoracis memoravit Linn. non ut differentiam specificam, sed ut speciei generis characteri conformis. V.

Canon 76.

*Differentiæ characteri generico contrariæ genus haud rite determinatum demonstrat.*

Character genericus sit singulis speciebus sub eodem genere militantibus.

In genere ideo rite determinato character genericus & differentia nunquam contraria esse possunt.

*Elater degener* thorace edentato Scop.

*Papilio antennis* filiformibus.

*Obs.* *Papilio*. *Antennæ* apicem versus crassiores, sæpius capitatæ; ergo antennæ filiformes inter differentias specificas admitti possunt. V.

Differentia specifica genuina est vel synoptica vel essentialis: synoptica insectis congeneribus notas semidichotomas imponit.

Canon 77.

*Differentia essentialis synopticæ semper anteponenda & ubi illa inventa, hæc omnino deferenda erit.*

Detecta enim differentia essentiali, primo species rite distinguitur.

*Nepa* abdominis margine ferrato.

*Hippobosca* alis subulatis.

———— alis nullis.

} Linn.

## Canon 78.

*Differentia specifica quo brevior, eo etiam, cæteris paribus, præstantior.*

Differentiam nunquam plura quam duodecim vocabula admittere statuit Linn. in re herbaria. Sufficiant etiam in Entomologia, quin raro duodecim opus habeamus.

## Canon 79.

*Differentia nulla admittit vocabula, nisi quibus a congeneribus necessario distinguatur insectum.*

Exulent ideo tautologia & flosculi oratorii.

Scarabæus viridis nitens, thorace infra æquali non prominente Geoff.

Sphex segmentis fulvo colore tinctis, pro fulvis Scop.

## Canon 80.

*Differentia nulla speciei in suo genere solitaria imponi potest.*

Pulex irritans. Antennæ articulis quatuor, oculi nigri, pupilla alba Scop.

## Canon 81.

*Differentia non erit tropis rhetoricis figurata, multo minus erronea, sed fideliter, quæ natura dicat, exponat.*

## Canon 82.

*Differentia terminis positivis utatur, nunquam vero negantibus.*

Negativa tantum vocabulorum augent numerum sine necessitate & absque utilitate, quum vocabula habeamus positiva quæ ideas oppositas exprimunt.

## Canon 83.

*Similitudo omnis in differentia usurpata notissima sit, licet & hæc Entomologo minus digna.*

Omnis similitudo claudicat, nunquam certas firmasque ideas communicat ideoque prorsus potius erit excludenda.

Malæ imprimis sunt omnes similitudines de rebus quæ variant, nec omnibus notis desunt.

Papilio *pruni Scop.* supra ad angulum ani maculæ gummi cerasorum.

Phalæna *chlorosata* ejusd. albida feu colore eodem fere ut vultus in cachexia virginea.

Canon 84.

*Omne adjectivum in differentia sequi debet substantivum suum.*

Canon 85.

*Adjectiva in differentia usurpata e terminis artis selectis, si modo sufficiant, petenda sunt. Synonyma terminorum excludenda & unicus optimus retinendus.*

Canon 86.

*Particulas adjectiva & substantiva conjungentes differentia omnino excludit.*

*Obs.* Grammaticus hic canon benevole excipiendus. V.

Canon 87.

*Paranthefin differentia specifica nunquam admittit.*

Arguit parenthesis aut exceptionem aut defectum ordinis ideoque non admittenda.

Canon 88.

*Sexus varietates naturales constituit, reliquæ omnes sunt accidentales.*

*Fæmina* plerumque major, crassior, sæpius caudata aut aculeata antennisque simplicioribus minoribus.

*Mas* plerumque minor, antennis crassioribus, sæpe pectinatis, interdum caudatus, nunquam aculeatus.

*Neutra* minora , aculeata rarius occurrunt.

Cavendum ne sexus varietatibus novas & erroneas species fingamus.

*Platycerus fuscus* , cornubus apice bifurcis *Geoff.* mas.

*Platycerus fuscus* , capite lævi . . . . . *Geoff.* fæmina.

*Obs.* *Platyceros* fuscos capite lævi copula junctos vidit hic clariss. Entomologus ; species igitur non erronea , licet alii primum cum secundo copulatum invenerint. V.

Canon 89.

*Synonyma singula novam ordiantur lineam , ut eo facilius dignoscantur.*

Canon 90.

*In synonymis auctor & pagina ubique ad finem indicanda sunt.*

Auctoris nomen solum haud sufficit , quum idem auctor plura sæpius scripta evulgaverit.

Canon 91.

*Synonymia absoluta insecti primum inventorem asterisco notare placeret.*

Canon 92.

*Descriptio continet insecti differentiam naturalem , quæ describat omnes ejusdem partes externas & visibiles.*

Canon 93.

*Descriptio ordinem a partibus primariis ad reliquas sequatur.*

Præstat ordinem certum sequi a capite ad thoracem cum scutello , abdomen , caudam , alas , halteres , pectines , pedes.

Male ideo primum pedes , dein caput , tum cauda demum , abdomen , tandem thorax & instrumenta cibaria promiscue & confuse proponerentur.

Canon 94.

*Descriptio distinctas insectorum partes in distinctis paragraphis tradat.*

Ordo, perspicuitas & brevitās sunt præcipuæ virtutes descriptionis bonæ.

Perspicuitas optime conservatur, quum insecti partes mox reperiuntur & omīssa & errata percipiuntur. Exempla descriptionis bene ordinatæ sistit Linn. musæum Reginæ.

*Obs.* Canon hic si observetur, sumptuosior tunc *Entomologiæ* editio.

Canon 95.

*Descriptio justo longior aut brevior utraque mala & semper evitanda.*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
CHICAGO, ILL.  
JANUARY 1, 1900  
TO THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY  
OF CHICAGO  
FROM THE FACULTY  
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE FACULTY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
HONORABLE MEN AND WOMEN  
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
CHICAGO, ILL.  
JANUARY 1, 1900





